

11,695
Mar. 30, 1889

BOLLETTINO

dei

Musei di Zoologia e di Anatomia comparata

della R. Università di Torino



VOL. III - 1888

N. 35-52



TORINO

TIPOGRAFIA GUADAGNINI E CANDELLERO

via Gaudenzio Ferrari, 3

BOLLETTINO

dei

Musei di Zoologia ed Anatomia comparata

11/695
Feb. 3, 1881

della R. Università di Torino

N. 37 pubblicato il 21 Febbraio 1888

VOL. III

CARLO POLLONERA.

Nuove specie di molluschi terrestri raccolti nello Scioa

dal Dottor V. Ragazzi.

Vitrina Licatae.

Testa suborbicularis, solidula, supra depresso-convexiuscula, pallide corneo-virescens, spira depresso; anfractus $3 \frac{1}{2}$, parum convexit, irregulariter plicato-striati, rapide evoluti, ultimus amplissimus; apertura subovato-rotundata, obliqua, margine membranaceo angustissimo. Diam. max. $23 \frac{1}{2}$; diam. min. 18; alt. 15; diam. apert. 15; alt. apert. $12 \frac{1}{2}$, mill.

Hab. Assechign (Bulga).

Vitrina Ragazzii.

Testa suborbiculari-convexa, subitus convexiuscula, solidula, corneo-rufescens, spira prominula; anfractus $3 \frac{1}{2}$ -4, convexi, irregulariter plicato-striati, rapide evoluti, ultimus amplissimus; apertura subovata, obliqua, margine membranaceo angustissimo. Diam. max. 27-30; diam. min. 22-23 $\frac{1}{2}$; alt. 18-19; diam. apert. $17 \frac{1}{2}$ - $18 \frac{1}{4}$; alt. apert. $14 \frac{1}{2}$ -16 mill.

Hab. Assechign (Bulga).

Vitrina Bianchii.

Testa subsemiglobosa, pertenuis, sub lente minutissime striatula, oleoso-micaus, succineo-virescens; spira brevis, apice submamillo; anfractus 3 convexiusculi, celeriter accrescentes, sutura marginata divisi; ultimus subventrosus, superne convexo-devexus, inferne inflatus; apertura subobliqua, ovata, basi recedens, intus margaritaceo-opalina; peristoma simplex, inferne margine membranaceo angusto; columella arcuata, inflexa. Diam. max. 14; diam. min. 10; alt. 8; diam. apert. 9; alt. apert. 6 mill.

Hab. Garobela.

Vitrina Giuliettii.

Testa semiovata, pertemis, irregulariter subuplicata, sub lente minutissime striatula, oleoso-micans, succineo-virescens; spira convexa, obtusa; anfractus 3 subconvexi, rapide accrescentes, sutura anguste marginata divisi, ultimus magnus, declivis, prope suturam subplanulatus; apertura subovata, obliqua, basi recedens, intus submargaritaceo-albida; peristoma simplex, inferne margine membranaceo angusto; columella arcuata. Diam. max. $15 \frac{1}{3}$; diam. min. $11 \frac{1}{2}$; alt. 10; diam. apert. $9 \frac{3}{4}$; alt. apert. $8 \frac{1}{2}$ mill.

Hab. Garobela.

Vitrina Martinii.

Testa semiglobosa, tenuis, per longitudinem regulariter semirugata, succineo-virescens, spira convexiuscula, apice minuto, submamillato; anfractus 3 convexit, celeriter accrescentes, sutura marginata divisi, ultimus subventrosus, superne convexo-devexus, inferne convexiusculus; apertura obliqua, ovata, basi recedens, intus inmargaritaceo-albida; peristoma simplex, inferne margine membranaceo angusto; columella tenuissime arcuata, fere recta. Diam. max. 14; diam. min. $10 \frac{1}{4}$; alt. $9 \frac{1}{2}$; diam. apert. $8 \frac{1}{2}$; alt. apert. $7 \frac{1}{2}$ mill.

Hab. Let Marefia.

Vitrina Antonellii.

Testa globosa, tenuis, succinea, per longitudinem regulariter semirugata; spira brevis, apice minuto, submamillato; anfractus 3 convexit, regulariter accrescentes, sutura marginata divisi; ultimus inflatus, rotundatus, prope suturam planulatus; apertura subobliqua, subrotunda, intus pallidula; peristoma simplex, inferne margine membranaceo angusto; columella subarcuata. Diam. max. $12 \frac{1}{2}$; diam. min. 9; alt. $9 \frac{1}{2}$; diam. apert. $7 \frac{3}{4}$; alt. apert. 7.

Hab. Farre.

Sitala trochulus.

Testa rimata, conoidea, fragillima, nitidissima, minute et irregulariter striatula, pallide cornea; spira conica subdepressa; anfractus 6 convexit, lente accrescentes, sutura impressa divisi; ultimus maior, ad aperturam non dilatatus; apertura irregulariter lunata, obliqua, peristome simplici, recto, acuto, margine columellari supra rimam angustissime dilatato. Alt. $3 \frac{1}{3}$; lat. $4 \frac{1}{4}$ mill.

Hab. Let Marefia.

Buliminus Vigonii.

Testa anguste umbilicata, ovato-conica, tenuiuscula, irregulariter et rude plicata, lineis spiralibus subtilissimis obsolete decussata; cerea, strigis linearibus flavo-corneis sparse notata; spira conica, apice obtusulo; anfractus 6 convexiusculi, 2 primi lœves; ultimus magnus, spiræ longitudinem superans; sutura impressa, irregularis, in ultimo anfractu subcrenulata; apertura parum obliqua, angulato-subovalis, intus albidula; peristoma simplex, interruptum, marginibus externo et basali acutis, columellari dilatato reflexo. Alt. 24; lat. 15; alt. apert. $13\frac{3}{4}$ mill.

Hab. Havash presso il monte Bosset.

Buliminus Sacconii.

Testa anguste umbilicata, ovato-conica, tenuiuscula, obsolete stria-tula, striis spiralibus minutissimis et confertissimis decussata, nitidula, pallide cerea, strigis linearibus pallide-corneis sparse notata; spira conica, acuta, apice obtusulo, albido, nitido; anfractus $6\frac{1}{2}$ subconvexi, ultimus spira brevior, convexiusculo, basi rotundatus et pallidissime corneo-flavo late bifasciato; sutura impressa; apertura subovata, superne acutangula, inferne subangulata, intus pallidula; peristoma album, interruptum, marginibus callo tenuissimo junctis, columellari reflexo et dilatato, basali et externo rectis, acutis, intus callo albido munitis. Alt. $24\frac{1}{2}$; lat. $13\frac{1}{2}$; alt. apert. 11 mill.

Hab. Havash presso il monte Bosset.

Buliminus scioanus.

Testa perforata, ovato-conica, tenuiuscula, nitida, striatula, striis spiralibus minutissimis decussata, pallide cornea, strigis linearibus corneis sparse notata; spira conica, apice obtusulo; anfractus 6 convexiusculi, ultimus magnus, spiræ longitudinem superans; sutura impressa; apertura angulato-subovalis, intus albidula; peristoma simplex, interruptum, marginibus externo et basali breviter reflexis, solidulis, columellari subverticali, dilatato, reflexo. Alt. 21; lat. $13\frac{1}{2}$; alt. apert. fere 11 mill.

Hab. Assechign (Bulga).

Buliminus Meneliki.

Testa obtecte umbilicata, oblongo-conica, solida, per longitudinem subtilissime striatula et regulariter costulata, striis spiralibus minutissimis decussata, brunneo-fulva, albido-costulata; spira producta, apice obtuso, albidulo, lœvigate; anfractus $6\frac{1}{2}$ subconvexi, ultimus dimidiata

longitudinis partem non attingens; sutura impressa, in ultimo anfractu crenulata; apertura subovata, parum obliqua, intus brunnea, ad angulum superum tuberculo calloso ornata; peristoma crassum, albido, interruptum, marginibus callo tenuissimo junctis, columellari reflexo et dilatato, umbilicum omnino tegente, superne extus subtuberculoso, basali et externo validis, reflexis, extus in labium albido, latum, planumque expansis. Alt. 30; lat. 15; alt. apert. $13\frac{1}{2}$ mill.

Hab. Fehere Ghembre.