

REVUE et magasin de
zoologie pure et appliquée...

ZOOLOGIQUE,

PAR

LA SOCIÉTÉ CUVIERIENNE ;

ASSOCIATION UNIVERSELLE

POUR

L'AVANCEMENT DE LA ZOOLOGIE, DE L'ANATOMIE
COMPARÉE ET DE LA PALÉONTOLOGIE ;

Journal mensuel.

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION

DE M. F.-E. GUÉRIN-MÉNEVILLE. !

PARIS,

AU BUREAU DE LA REVUE ZOOLOGIQUE,

Rue de Seine-Saint-Germain, 18. !

1840.

sans se servir de leur queue. Ce n'est que d'après les rapports dans la forme des pattes très-développées, que nous avons rangé ces deux espèces, qui sont certainement d'après cet organe, espèces grimpanes; mais nous ne pouvons savoir si elles sont sylvaines et grimpeuses aux arbres, ou riveraines et araudi-nicoles. Dans ce dernier cas, elles seraient également bien placées avec les Thriothores, près du Coraya, dont elles rappellent un des caractères de coloration dans leurs petites stries transversales sur les ailes et la queue.

J'ai remarqué dans la collection de Santa-Fé de M. Boissonneau un certain nombre d'espèces qui avaient été rapportées de Bolivie par M. Alc. d'Orbigny et décrites dans notre Synopsis des oiseaux de son voyage, et un certain nombre d'espèces regardées comme mexicaines ou des États-Unis. La position géographique de Bogota est effectivement entre ces deux pays et sert naturellement de passage aux espèces qui émigrent de l'un à l'autre; j'y ai remarqué également quelques oiseaux de Caienne, puis un grand nombre d'autres espèces qui sont nouvelles et paraissent particulières à cette localité.

DESCRIPTION de deux espèces nouvelles de Mollusques d'Europe, par M. CH. PORRO.

Helix Meda. — Testa vix rimata; supra globosa, subtus planiuscula; anfractu ultimo subcarinato; strigis crebris ab infera perforatione irradiantibus: colore plerumque albido, aliquando subferrugineo, strigis semper albis. Sæpe monochroma quandoque maculis et fasciis brunneis picta. Apertura depressa; subquadra; peristomate recto, intus rufo-circinato. — Haut. : 8 mill. — de Sassari, en Sardaigne.

Pomatias striolatum. — Testa perforata, turrita, luteofuscula, maculis brunneis albidisque alternis insignita, et in triplici serie dispositis, una cervicalis, altera carinatis, postrema suturalis; superficie striis argutis, crebris, diagonaliter dispositis ornata. Apertura rotundata, labio vix reflexo, auricularis nullis. Operculo viridi, teres. — Haut. : 9 mill. — De Gènes.