



508
L-048

9162


LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF VERMONT.

L.O.S. Photo


Oct. '95

正義の勝利を

REDACTED




BIBLIOTHECA
CARCINOLOGICA
L.B. Holthuis



CAROLI A LINNÉ

S Y S T E M A
N A T U R Æ.

T O M. I. P A R S VI.



CLASSIS VI.

VERMES.

*Mihi contuenti sese persuasit verum Natura
nihil incredibile existimare de ea.*

PLIN. XI. 3.

TARDIGRADA, mollia, pendentia, vivacissima; redintegranda, humidi Animantia, multa *acephala* & *apoda plurima*, *androgyna vel neutra*, multa, *tentaculis plurima* dignoscenda.

IMPERFECTA veteribus, nec adeo inepte, dicta animantia, detinuntur auribus, nafo, multa capite, oculis a) pedibusque distinctis, ab insectis itaque diversissima, a quibus dudum removi naturae cryptogamia: sunt *Intestina*, *Mollusca*, *Testacea*, *Zoophyta*, *Infusoria*.

INTESTINA terrena quondam dicta, summa corporis simplicitate conspicua, alia intra alia animantia vivunt, alia in aquis potissimum dulcibus, pauciora in terra habitant; perforat *Gordius* argillam, ut aqua tranet, *Lumbricus* humum, ne situ corrumpatur, *Teredo* ligna, ut destruantur, quemadmodum *Pholades* & *Mytili lithophagi* petras, ut solvantur.

MOLLUSCA nuda, brachiata, vagantur pleraque per maria, cœlo resplendentia, tanquam totidem lucernis tenebricotum illuminant abyssum phosphorea.

TESTACEA, mollusca domiporta, calcareaque domuncula nobilitata, calcifica, & ipsa saepe calcivora, insectis opposita specierum numero, magna ludentis Naturae varietate b) multi-

a) Vermium genus omne oculis catere, tradidit quidem Plinius, at præter maritimos multos, *limacibus*, *nercidibus*, *hirudinibus*, oculi sunt, ut que ab humanis diversi.

b) Plin. IX. 33. Tot colorum differentiae, tot Figure planis, concavis, longis, luvatis, in orbem circumactis, dimidio orbe cæsis, in dorsum elatis, levibus, rugatis, denticulatis, striatis, vertice mucicatum intorto, margine in mucronem emiso, foris effuso, intus replicato; jam distinctione virgulata, crinita, crispa; canaliculatim, pectinatim, imbeciatim undata; caucellatim vetriculata, in obliquum, in rectum expansa, densata, porrecta, sinuata, brevi nodo ligatis, toto laterc connexis, ad plausum apertis, ad buccinum recutvis. V. Bonanni, Rumpfii, Kleiniij explicationem.

plicata. TESTAS polydædalas Conchyliorum parium æque attente legit summa sapientia, ac care emit erudita luxuria, a quisquiliis c) ad Ammirates Scalaresve, margaritis d) suis pretiosiores, quas artificum politura vitiando nobilitat, ut pulchrius pateat in tritonis COCHLEIS vividis ad Umbilicum aut Cardinem posteriorem Apertura rarius Operculo clausulis, cum Labro exteriore interioreve, sæpe dentato ad Columellam, circa quam Spiræ Anfractus sinistri, rarius contrarii dextri, sutura connexi rarius varice cincti; læves, sulcati, striati, angulati, nodosi, aculeati, spinosi, frondosi usque in Mucronem apicis rarius decollatum, & ut intueatur in Veneris CONCHIS vividis lectis testarum nativa paria, determinatam figuram, valvulas sinistras & dextras, æquales vel inæquales, aquilateres vel inæquilateres; interius dentatos Cardines inter Natis infimas Umbonum tumentium; inferius Ani impressuram, anterius Vulvae rimam, Labii nymphisque conviventem, Hymene obtefactam, Pube interdum cinctam; harum Limbus exterior circumscribitur Margine integerrimo, crenulato s. dentato: superiore ante vulvam; posteriore pone anum; exteriore uatibus opposito. Decet in primis inquirere in fossilium incognita protypa, in primis anomiarum, abyssi cimelia, cum alia sint terrestria, fluviatilia, lacustria, littorea, maritima, pelagica alia.

ZOO PHYTA composita animantia, in bivio animalium vegetaliumque constituta, radicata (plurima) caulescunt multipli- cata vita ramis, gemmis cæduis, metamorphosique florum animantium sponte sepe moventium, eo si plantæ escent Zoo- phyta, sensu motuque destituta, & Zoophyta veræ plantæ, sed sensus motusque organo instructæ (equidem his inesse sensum, quæ nec animalium, nec fruticum, sed tertiam ex utroque naturam habent. Plin. e) adeoque vegetabilia naturali metamorphosi mutanda in animalia. Horum alia mollia, nuda, Zoophyta strio sensu audiunt; alia testa quasi dura obtefacta Lithophyta. Hæc prisci plantas aeris contactu lapides germinare, in primis ob calcaream horum indolem visi, usque dum Marsiglii diligentia extraxerat e mari corallia vegetantia floribus octandris octopetalis, a contactu aeris se contrahen- tibus, inque aqua denuo expandendis; at eodem tempore

c) Speculatio god vulgo.

d) Margaritarum duos in candore, magnitudine, orbe, lavora, pondere. PLIN. IX. 35. Pretiosissima Cleopatrae Antonio exposita. Ibid.

e) Amoen. acad. 5. l. 350.

(1727) *Peyssonellus* corallia ab animalculis fabricari, ultra seculum post eandem apud sapientiores indos ratam sententia f) primum vidit vix auditus, nisi *Trembleus* (1741) hydras omnium admiratione detexisset, & ad littora curiosos allicuissest, quo via per *Ellisi* septularias ad corallia aperta fuit. g)

INFUSORIA animalcula omnium minima, plurima oculis nudis vix usurpanda, tentaculis destituta, plurima in infusis habitant, semel exsiccata denuoque humectata non reviviscunt.

AUCTORES, hæc animalia illustrantes pauci inter hos pretiosi; meritissimus O. F. Müller, tum *Bellonius* (1553), Rondelet (1554), C. Gesner (1558), Columna (1606), Aldrovandi (1606), Jonston (1650), Reimarus (1773); de intestinalium historia meruere Pallas (1760), Verstöei de Czer (1772), Henn (1780), Goeze (1782), Bloch (1782), Werner (1782), Retzius (1785), Schrank; de reliquis intestinis vix ulli. De MOLLUSCIS Brachadisch (1761), Klein (1734), Leske (1776); de TESTACEIS primario sobrius Bonzini (1681), ditissimus Lister (1685), solidissimus Rumpf (1705), curiosissimus Petiver (1702), absolutissimus Gualtieri (1742), nitidissimus Argenville (1742), pulcherrimus Regenfus h) (1758), locupletissimi Martini (1768), Chemniz (1784), & Schroeter (1784), nec non Columna, Barrelier, Bianchi, Klein, Ginanni, Lange, Lesser, Knorr, Geve, Geoffroy, Ad. Murray, Favart, d'Herbigny, Duchene, Kaenmerer, Spengler, Adanson infelicique partu Seba, alii. De ZOOPHYTORUM historia meruere Comes Marigli, oculatus Donati, lynceus Ellis, indefensus Baster, acutissimus Pallas, Solander, Cavolini, alii; de infusiorum princeps, O. F. Müller, tum Gocze, Wrisberg, Terechowsky, Schranck, Baker, Hill, Joblot, Ledermüller, Hermann, Eichhorn.

f) Rumpf mus. 152. ad tab. 16. F.

g) Amoen. acad. 5. p. 350.

h) Regenfusii operis commentatore Cl. Krazenstein & Spengler prodiere tantum tabulae XII.

GENERUM Charakteres.

- I. INTESTINA. Animalia simplicia, nuda, artibus destituta.
 * *intra alia animalia degentia, oculis nullis.*
276. ASCARIS. *Corpus teres, posterius attenuatum, capite trinodi.*
- TRICHOCEPHALUS. *Corpus teres, capite filiformi longo.*
 UNCINARIA. *Corpus filiforme elasticum : capite labiato; labiis membranaceis angulatis, cauda (*feminæ*) aciformi (*maris*) uncis 2 vesicæ pellucidæ inclusis armata.*
- TILARIA. *Corpus filiforme totum.*
 SCOLEX. *Corpus minimum gelatinosum opacum, capite exsertili & retractili : auriculis 4 pellucidis.*
- LIGULA. *Corpus lineare æquale elongatum.*
 LINGUATULA. *Corpus depresso oblongum : ore anteriori ostiis 4 cincto.*
- STRONGYLUS. *Corpus teres elongatum ; anterius globoso-truncatum : apertura circulari margine ciliata, posterius (*feminæ*) acuminatum (*mari*) cucullatum.*
- ECHINORHYNCHUS. *Corpus teres : proboscide cylindrica retractili aculeis uncinatis coronata.*
- HÆRUCA. *Corpus teres : capite aculeis coronata.*
 CUCULLANUS. *Corpus posterius acuminatum, anterius obtutum : ore orbiculari.*
- CARYOPHYLLÆUS. *Corpus teres laxe, ore amplio.*
 FASCIOLA. *Corpus depresso ovatum gelatinosum.*
351. TÆNIA. *Corpus articulatum depresso, anterius tubulo instructum : poro ventrali duplo.*
353. FURIA. *Corpus lineare aculeis reflexis utrinque ciliatum.*
281. MYXINE. *Corpus teres subitus carinatum pinna adiposa.*
- * * *extra alia animalia habitantia.*
 ** *poro laterali nullo.*
275. GORDIUS. *Corpus æquale filiforme totum, teres, laxe.*
280. HIRUDO. *Corpus anterius & posterius truncatum, ore caudaque progrediendo dilatata.*

Vagientem etiamnum in cunis scientiam a matre lactante longius remotam ministrant adulterios. Qui ordini adscribendum *Cascinum Solandri*?

¶ poro laterali pertusa.

277. LUMBRICUS. *Corpus teres annulatum : aculeis conditis.*
 279. SIPUNCULUS. *Corpus teres : rostro cylindrico angustato.*
 278. PLANARIA. *Corpus depresso : poro ventrali.*

II. MOLLUSCA. Animalia simplicia artibus instructa:

* ore supero.

288. ACTINIA. *Apertura unica communi , dilatabili ; nuda , basi affixa.*
CLAVA. *Apertura unica communi , dilatabili verticali : tentaculis clavatis cincta.*
MAMMARIA. *Apertura unica , cirris nullis , lavis.*
PEDICELLARIA. *Corpus pedunculatum fixum : pedunculo rigido.*
 287. ASCIDIA. *Aperturis duabus : altera humiliori affixa.*
 SALPA. *Aperturis duabus : utraque terminali.*
 DAGYSA. *Aperturis duabus. Corpus angulatum.*

** ore antico :

¶ pinna mobili ad abdomen vel caudam.

PTEROTRACHEA. *Corpus pervium , gelatinosum tracheatum.*

¶ corpore pertuso foraminulo laterali.

282. LIMAX. *Tentacula 4. Anus communis cum poro laterali.*
 283. APLYSIA. *Tentacula 4. Anus supra posteriora.*
 284. DORIS. *Tentacula 2. Anus supra posteriora.*
 289. TETHYS. *Foramina lateralia sinistra gemina.*

¶ corpore tentaculis anterius cincto.

290. HOLOTHURIA. *Tentacula carnosæ.*
 291. TEREBELLA. *Tentacula capillaria.*

¶ corpore brachiato.

292. TRITON. *Brachia bipartita : quibusdam cheliferis.*
 296. SEPIA. *Brachia 8-10 , instructa cotylis.*
 295. CLIO. *Brachia 2 dilatata.*
 LOBARIA. *Corpus supra convexum , subtus planum lobatum.*
 293. LERNÆA. *Brachia 2. s. 3. teretia.*
 294. SCYLLÆA. *Brachia 6 : remotis paribus.*
 GLAUCUS? *Brachia 4 ramosa.*

TTTTT *corpore pedato.*

- | | |
|-----------------|--|
| 285. APHRODITA. | <i>Os inerme. Corpus ovale, oculatum.</i> |
| AMPHITRITE. | <i>Os inerme. Corpus subrotundum. Oculi nulli.</i> |
| SPIO. | |
| 286. NEREIS. | <i>Os unguiculatum. Corpus elongatum. Tentacula simplicia.</i> |
| NAIS. | <i>Os inerme. Corpus elongatum. Tentacula o.</i> |

*** *ore infero ut plurimum centrali.*

PHYSSOPHORA ? *Corpus gelatinosum e vesicula aerea pendens.*

- | | |
|----------------|---|
| 297. MEDUSA. | <i>Corpus gelatinosum laxe.</i> |
| LUCERNARIA. | <i>Corpus gelatinosum rugosum brachiatum.</i> |
| 298. ASTERIAS. | <i>Corpus coriaceum, muricatum.</i> |
| 299. ECHINUS. | <i>Corpus crustaceum, aculeatum.</i> |

III. TESTACEA. Mollusca simplicia, obtecta testa calcarea.

* *Multivalvia.*

- | | |
|--------------|--|
| 300. CHITON. | <i>Testa multivalvis, longitudinaliter dorsalis.</i> |
| 301. LEPAS. | <i>Testa multivalvis inaequivalvis, sessilis.</i> |
| 302. PHOLAS. | <i>Testa bivalvis: accessoriis posterioribus.</i> |

** *Bivalvia CONCHA.*

- | | |
|-----------------|--|
| 303. MYA. | <i>Teste cardines (sæpius) dente crasso vacuo.</i> |
| 304. SOLEN. | <i>Teste utrinque hians: cardinis dente subulato reflexo, saepe dupli.</i> |
| 305. TELLINA. | <i>Cardinis dentibus lateralibus alterius valvae utplurimum vacuis.</i> |
| 306. CARDIUM. | <i>Cardinis dentibus lateralibus remotis penetrantibus.</i> |
| 307. MACTRA. | <i>Cardinis dente intermedio complicato triangulo cum adjecta foveola.</i> |
| 308. DONAX. | <i>Cardinis dente laterali (utplurimum) remoto vacuo.</i> |
| 309. VENUS. | <i>Cardinis dentibus approximatis divaricatis.</i> |
| 310. SPONDYLUS. | <i>Cardinis dentibus duobus distinctis foraminulo,</i> |
| 311. CHAMA. | <i>Cardinis dentibus (in altera testa) duabus obliquis obtusis.</i> |
| 312. ARCA. | <i>Cardinis dentibus numerosis penetrantibus.</i> |
| 313. OSTREA. | <i>Cardinis dente o, scrobiculo ovato.</i> |
| 314. ANOMIA. | <i>Cardinis dente o, scrobiculo (in multis linearis marginali,</i> |

315. MYTILUS. *Cardinis dente o : scrobiculo subulato distincto.*
 316. PINNA. *Cardinis dente o ; margine altero coalito.*

*** *Univalvia.*

† *spira regulari COCHLEÆ.*

317. ARGONAUTA. *Testa unilocularis , spiralis , involuta.*
 318. NAUTILUS. *Testa multilocularis : loculis per foramen
communicantibus.*
 319. CONUS. *Testæ apertura effusa linearie edentula.*
 320. CYPRÆA. *Testæ apertura effusa , linearie utrinque dentata.*
 321. BULLA. *Testæ apertura subcoarctata obliquata.*
 322. VOLUTA. *Testæ apertura effusa : columella plicata.*
 323. BUCCINUM. *Testæ apertura canaliculo dextro.*
 324. STROMBUS. *Testæ apertura canaliculo sinistro.*
 325. MUREX. *Testæ apertura canaliculo recto.*
 326. TROCHUS. *Testæ apertura coarctata subtetragona.*
 327. TURBO. *Testæ apertura coarctata orbiculari.*
 328. HELIX. *Testæ apertura coarctata lunari.*
 329. NERITA. *Testæ apertura coarctata semiorbiculari.*
 330. HALIOTIS. *Testæ apertura dilatata : Spira occultata.*

† : sine *spira regulari.*

331. PATELLA. *Testa patent-conica , quiescens.*
 332. DENTALIUM. *Testa libera subulata nitroque sine aperta.*
 333. SERPULA. *Testa adnata (ut plurimum) tubulosa.*
 334. TEREDO. *Testa intrusa ligno.*
 335. SABELLA. *Testa granis arenaceis conflata.*

IV. ZOO PHYTA. Animalia composita vegetabilium more efflorescentia.

* *stirpe calcarea LITHOPHYTA.*

336. TUBIPORA. *Corallium tubis cylindricis.*
 337. MADREPORA. *Corallium stellis concavis.*
 338. MILLEPORA. *Corallium poris subulatis.*
 339. CELLEPORA. *Corallium cellulis cavis.*
 340. ISIS. *Stirps lapidea.*

** *stirpe molliori.*

- ANTIPHATES. *Stirps cornea , spinulis obsita , carne gelati-
nofa testa.*
 341. GORGONIA. *Stirps cornea , carne cellulosa vel vasculosa
testa.*
 342. ALCYONIUM. *Stirps suberosa.*

343. SPONGIA. *Stirps stuposa.*
 344. FLUSTRÆ. *Stirps porosissima.*
 345. TUBULARIA. *Stirps fistulosa.*
 346. CORALLINA. *Stirps articulis filiformibus calcareis,*
 347. SERTULARIA. *Stirps articulis filiformibus fibrosis.*
 350. PENNATULA. *Stirps coriacea penniformis.*
 349. HYDRA. *Stirps medullosa nuda.*

V. INFUSORIA. Animalia minima simpliciora.

* *organis externis instructa.*

- BRACHIONUS. *Corpus testa tectum apice ciliatum,*
 348. VORTICELLA. *Corpus nudum apice ciliatum.*
 TRICHODA. *Corpus altera parte crinitum.*
 CERCARIA. *Corpus rotundato-caudatum.*
 LEUCOPERA. *Corpus undique ciliatum,*

** *organis externis nullis.*† *complanata.*

- GONIUM. *Corpus angulatum.*
 COLPODA. *Corpus sinuatum.*
 PARAMECIUM. *Corpus oblongum.*
 CYCLIDIUM. *Corpus orbiculare vel ovatum.*

†† *teretia.*

- BURSARIA. *Corpus cavum.*
 VIBRIO. *Corpus elongatum.*
 ENCHELIS. *Corpus cylindraceum.*
 BACILLARIA. *Corpus ex trabeculis in varias formas accommodatis compositum.*
 352. VOLVOX. *Corpus sphæricum.*
 MONAS. *Corpus punctiforme.*

Admiranda tibi levium spectacula rerum.

VIRG.

I. INTESTINA.

Animalia simplicia, absque artibus, nuda.

276. ASCARIS. *Corpus teres elasticum utrinque attenuatum, capite trinodi; cauda obtusa aut subulata.*

Vasa spiralia lactea pellucentia.

a. *hominis.*

- vermicularis. 1. Asc. cauda subulata, cute ad latera corporis subtilissime crenata. *Goeze Eingew. p. 102. t. 5. f. 1-3.*
Syst. nat. XII. 2. p. 1076. n. 1. Fn. sivec. 1269. Ascaris pollicaris.
Aldrov. inf. 6. p. 651. 656.
Mouff. theatr. inf. p. 297.
Valisn. op. I. t. 20. f. 5-10.
Cleric. lambr. t. 3. f. 5-10.
Bianch. hist. morb. t. 3. f. 20.
Phels. hist. ascar. t. 1. f. 3-II. t. 2. f. 1-3.
Pall. inf. viv. p. 12.
Müll. hist. ver. I. 2. p. 6. t. 34.
Hill hist. anim. p. 14.
v. *Doever. ver. p. 59. 60.*
O. Fabr. Fn. groenl. 248.
Bloch Eingew. p. 31.
Happ ver. hom. int. p. 8.
Werner ver. intest. p. 72. t. 5. f. 133-137.
Habitat in puerorum, etiam recens natorum, intestinis, potissimum recto, vivipara.

- lumbricoides. 2. Asc. cauda obtusa vel subincurva, ani rima transversa, intestino aurantio. *Goeze Eingew. p. 65,*
Syst. nat. XII. 2. p. 1076. n. 2. Ascaris spithamea.
Aldrov. inf. l. 6. p. 652. f. 4. 5.
Jonst. inf. p. 158. t. 24. n. 1.
Mouff. theatr. inf. p. 282. 296.
Red. anim. viv. negl. an. viv. p. 19. 20. t. 10. f. 2. 3.
opusc. 3. t. 10. f. 1-4.
Valisn. op. I. p. 271. t. 34. 35.
Cleric. lumbr. p. 218. t. 4. f. 1-4. t. 10. II.

- Klein herpetol. p. 63. t. 1. f. 3. t. 2. f. 1-7.
Að. angl. 1678. n. 147.
Barthol. cent. 2. h. 23.
Pallas diff. de inf. viv. p. 13.
Odhel. að. Stockh. 1776. p. 140. t. 4. f. 1. 3. & p. 313.
Doeveren. verm. p. 68. t. 8. f. 1. 2.
Müller hist. vermt. I. 2. p. 35.
Naturf. 12. p. 180.
Bloch Eingew. p. 29. t. 8. f. 1-6.
Wern. vermt. intest. p. 75; t. 6. f. 144-148. t. 7. f. 153-159.
Rauh de asc. lumbric. Linn. *Gaett.* 1779.
Pereboom descr. nov. gen. vermt. Stomachida, &c. *Amstel.* 1780.
Habitat in hominis intestinis, præsertim tenuibus, aliquando in ductum pancreaticum penetrans setarum descedu facile a lumbrico terrestri dignoscendus, cingulo nullo, σιγογγυνος Hippocratis, Lumbricus teres aliorum.
- vespertilio-* 3. *Asc. Goeze Eingew.* p. 86.
nis. *Habitat in vespertilionis auriti intestinis.*
 b. *mammalium.*
- phocæ.* 4. *Asc. pallida, intestino lacteo spirali.* *Müll. zool. dan.* 2. t. 74. f. 1. *prodr.* 2590. *rar.* 2. p. 101. *O. Fabr. fn. groenl.* p. 272. n. 250.
Goer. Eingew. p. 73. t. 2. f. 9. 10.
Habitat in phocarum, vitulinæ, groenlandicæ, hispidæ intestinis, $\frac{1}{2}$ -3 pollices longa, utroque fine attenuata, posteriore acuminata, adunca, tota pellucida.
- bifida.* 5. *Asc. posterius furcata, anterius curva scisiformis.* *Müll. zool. dan.* 2. t. 74. f. 3. *rar.* 2. p. 102. *prodr.* 2592. *O. Fabr. fn. groenl.* p. 273. n. 253.
Habitat in phocæ groenlandicæ intestinis, asc. phocæ magnitudine, pallida, intestinis contortuplicatis, rostro anterius acutissimo, ad cuius basin porus pro proboscide brevi.
- canis.* 6. *Asc. cauda acuminata, capite applanato, membrana utrinque alato, vasis spermaticis cincinnatis.* *Wern. vermt. intestin. cont.* I. p. 11. t. 9. f. 38-40. *Goeze Eingew.* p. 81. 84.
Barth. anat. cent. 2. p. 318.
Red. opusc. 3. t. 8. f. 1-4.
 β) *Red. anim. viv. n. an. viv.* p. 75.
 γ) *Red. anim. viv. n. an. viv.* p. 73. t. 13. f. 8?
opusc. 3. t. 17. f. 3.

- Habitat in canis familiaris intestinis.*
- visceralis. 7. Asc. Red. anim. viv. n. an. viv. p. 308. t. 8. f. 1.
Habitat in canis familiaris renibus.
- lupi. 8. Asc. Red. anim. viv. n. an. viv. p. 75.
Habitat in lupi intestinis.
- vulpis. 9. Asc. membranis capitum lateralibus retrosum attenuatis. Goeze Eingew. p. 84.
 Froelich Naturf. 24. p. 140. t. 4. f. 30. 31.
 Klein herpet. p. 63.
Habitat in vulpis intestinis, potissimum duodeno.
- leonis. 10. Asc. Red. anim. viv. n. an. viv. p. 75. & p. 309.
 t. 9. f. 3.
Habitat sub leonis pelle.
- tigridis. 11. Asc. Red. anim. viv. n. an. viv. p. 19.
 Acad. acad. puriss. 1763. p. 47.
Habitat in tigridis intestinis.
- felis. 12. Asc. capite vesicula utrinque oblonga posterius obtusa pellucida ex albo cinerascente. Goeze Eingew. p. 79.
 t. 1. f. 5. 9-13.
 Froelich Naturf. 24. p. 141.
 Red. anim. viv. n. an. viv. p. 12. t. 13. f. 8.
Habitat, ut plurimum gregaria & taniam ferrata comitenti habens, in felis cati ventriculo & intestinis, praesertim tenuibus.
- cati. 13. Asc. Goeze Eingew. p. 80.
Habitat in felis cati intestinis, vesicularum capitis defecta ab asc. felis distincta.
- martis. 14. Asc. Goeze Eingew. p. 84.
Habitat in martis intestinis.
- bronchia- 15. Asc. albida contorta granulis quasi infarcta. Wern.
 lis. verm. int. ant. I. p. 9. t. 3. f. 20. 21.
Habitat in martis pulmonibus, bronchiorum dichotomiae glomeratim adhaerens.

Ascarides, plurimæ in intestinis ob. ix, ut plurimum gregaria, valvula triplici ad caput instructa, qua se, dum nutrimentum hauriunt, affigunt, feminæ a more distincta, frequentius ovipara utero bicorni gaudent. Plures species adhuc ignotas, vel imperfectius justæ definitas & distinctas detegit dies; An quos Red. oper. 3. p. 8. in anguis bicipitis intestinis consperxit albii & rubelli vermes huc spéndant? quo spéctat ascaris acuta, a Müllerio zool. dan. 3. p. 53. dicta, & t. 222. f. 1-5. delineata?

- renalis. 16. Asc. Red. anim. viv. n. an. viv. p. 309. t. 9. f. 1.
Habitat in martis reñibus.
- mephitidis. 17. Asc. Red. anim. viv. n. an. viv. p. 14.
Habitat in mephitidis intestinis.
- gulonis. 18. Asc. Red. anim. viv. n. an. viv. p. 14.
Habitat in gulonis intestinis.
- talpæ. 19. Asc. Goeze Eingew. p. 75. 87.
Habitat in talpæ intestinis & ventriculo.
- muris. 20. Asc. cauda pennata, intestino obscuriori. Wern. verm.
intest. cent. I. p. 10. t. 8. f. 1-7. Goeze Eingew.
p. 86. 87.
*Habitat in musculi ventriculo, annulata, feminæ geni-
talibus triplici foramine hiantibus.*
- hirci. 21. Asc. Soemmer. ap. Goeze Eingew. p. 175.
Habitat in hirci intestinis.
- vituli. 22. Asc. filiformis cauda rotundata. Goeze Eingew. p. 91.
t. 2. f. 7. B.
Camper. Schrift. berl. Naturf. I. p. 115.
Pall. de inf. viv. p. 14.
Valish. op. t. 34. 35. f. 2. 3.
Cleric. Iumbr. t. 10. II. f. 2. 3.
*Habitat gregaria in vitulorum per artem infectorum pul-
monibus & tracheis, vivipara.*
- equi. 23. Asc. cylindrica magna. Goeze Eingew. p. 62. t. I.
f. 1-3.
Bloch Eingew. p. 30. t. 8. f. 4-6.
Pall. n. nord. Beytr. I. p. 72.
Barthol. ad. Hayn. I. p. 37.
Vandell. diss. p. 71. t. 2. f. 6.
*Habitat in equi intestinis, inter congeneres gigas, ut
sesquipedalis digitii minimi crassitie occurrat.*
- fuis. 24. Asc. pallida, linea utrinque longitudinali subochracea.
Goeze Eingew. p. 71. Pall. inf. viv. p. 14.
Doever. verm. int. p. 67.
*Habitat in suis serosæ intestinis, asc. equi longitudine
æqualis, at multo tenuior.*
- apri. 25. Asc. Ebel Besch. der berl. Naturf. 3. p. 420. Goeze
Eingew. p. 92. t. 2. f. 6.
*Habitat in apri pulmone, vivipara, friabilis, utrinque
attenuata, filii tenuissimi crassitie, pollicem circiter longa.*

c. avium.

- aquilæ. 26. Asc. Red. anim. viv. n. an. viv. p. 81.
Habitat in falconis chrysaëti intestinis.
- albicillæ. 27. Asc. Bloch Eingew. p. 31.
Habitat in falconis albicillæ intestinis.
- buteonis. 28. Asc. Goeze Eingew. p. 85.
Habitat in buteonis intestinis, ventriculo vicinis.
- milvi. 29. Asc. Goeze Eingew. p. 85. 126.
Habitat satis magnæ spiraliter convoluta in milvi intestinis, ventriculo & recto propinquis; an forsitan duæ species distinctæ?
- subbuteo- 30. Asc. Bloch Eingew. p. 31.
 nis. *Habitat in subbuteonis intestinis, acui affinis.*
- herma- 31. Asc. posterius oblique truncata obtusa breviter mucro-
 phrodita. nata, aculeis duobus incurvis pone aperturam pos-
 teriorem prominentibus. Froelich Naturf. 24. p. 151.
 t. 4. f. 11-13.
Habitat in plittaci æstivi intestinis tenuibus.
- cornicis. 32. Asc. Soemmer. apud Goeze Eingew. p. 75.
 Red. anim. viv. n. an. viv. p. 83.
Habitat in cornicis ventriculo.
- coraciæ. 33. Asc. alba lævis. Frisch misc. berol. 3. p. 47. Pallas
 inf. viv. p. 61. Goeze Eingew. p. 90. t. 2. f. 5. Bloch
 Eingew. p. 31.
Habitat sub cute jugulari coraciæ garrulæ.
- cygni. 34. Asc. Red. anim. viv. n. an. viv. p. 80?
Habitat in cygni intestinis.
- anatis. 35. Asc. alba posterius planiuscula. Bloch Besch. der berl.
 Naturf. 4. p. 552.
 Goeze Eingew. p. 85.
Habitat in anatis boschadis intestinis, 4-6 pollices longa vivipara.
- fuligulæ. 36. Asc. Bloch Eingew. p. 31.
Habitat in anatis fuligulæ interaneis, ovipara.
- lari. 37. Asc. Bloch Besch. der berl. Naturf. 4. p. 552.
Habitat in lari cinerei intestinis.

- ciconiæ. 38. Asc. Red. anim. viv. n. an. viv. p. 86.
Habitat in ciconiæ intestinis.
- tardæ. 39. Asc. Blöch Eingew. p. 31.
Habitat in otidis tardæ interaneis.
- papilloſa. 40. Asc. subtus papilloſus, cauda in ſetam abeunte aculeata. Blöch. Eingew. p. 32. t. 9. f. 1-6.
Habitat in otidis tardæ intestino, cæco & recto, 6-8 lineaſ longa, criniſ equini craſſtie, ovipara, cauda nunc una, nunc tribus ſetiſ terminata, mucronibus 2 inæqualib⁹ prope caudam, papilliſ in abdomen ut plurimum 4, cui interdum quinta, & 3 minores ad utrumque caudæ latus accedunt.
- gallopavo- 41. Asc. Goeze Eingew. p. 85.
 nis. *Habitat in gallopavonis intestinis.*
- galli. 42. Asc. capite uncinato, cauda acuta. Goeze Eingew. p. 75. 76. 85. 86. t. 1. f. 4. 7. 8.
Habitat in galli junioris & gallinæ intestinis.
- gallinæ. 43. Asc. intestino clavato, cauda rotundata. Goeze Eingew. p. 86.
Habitat in gallinæ intestino cæco.
- phasiani. 44. Asc. intestino clavato, cauda rotundata. Goeze Eingew. p. 86.
Habitat in phasiani piſti intestino cæco, an eadem cum asc. gallinæ?
- tetraonis. 45. Asc. Red. anim. viv. n. an. viv. p. 82.
Habitat in tetricis interaneis.
- columbæ. 46. Asc. Goeze Eingew. p. 84. 85. t. 1. f. 6.
Habitat in columbæ domesticae intestinis.
- alaudæ. 47. Asc. Vandell. diff. p. 76.
Goeze Eingew. p. 125.
Habitat in alaudæ interaneis.
- ſturni. 48. Asc. Goeze Eingew. p. 86.
Habitat in ſturni vulgaris intestinis.
- turdi. 49. Asc. Goeze Eingew. p. 75. 77. 78. 85. t. 2. f. 1-3.
Habitat in turdi iliaci, viſcivori, pilaris intestinis, hepate.
- d. reptilium.

d. *reptilium.*

- testudi- 50. Asc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p. 80.*
nis. *Habitat in testudinis orbicularis interaneis.*
- lacertæ. 51. Asc. cauda subulata. *Goeze Eingew. p. 108.*
Doever. verm. p. 57.
Habitat in lacertæ palustris intestinis.
- bufonis. 52. Asc. filiformis, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p. 93:*
94. 434. t. 4. f. 1 - 3. & t. 35. f. 7 - 10.
Habitat in bufonis intestinis, vivipara.
- pulmona- 53. Asc. filiformis, intestino nigro, cauda rotundata. *Goeze*
lis. *Eingew. p. 95 - 97. t. 5. f. 6 - 17.*
Habitat in bufonis & rubetræ pulmonibus, vivipara.
- rubetræ. 54. Asc. cauda subulata. *Goeze Eingew. p. 95. 97. 101.*
Habitat in bufonis & rubetræ intestino recto, vivipara.
- trachea- 55. Asc. cauda subulata. *Goeze Eingew. p. 98. t. 2. f. 8.*
lis. *Habitat in bufonis pulmonibus, vivipara.*
- ranæ. 56. Asc. cauda subulata, intestino clavato. *Goeze Eingew.*
p. 101. t. 4. f. 4 - 9.
Doever. verm. p. 97.
Habitat in ranæ temporariæ intestino recto, vivipara.
- intestina- 57. Asc. filiformis, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p. 100.*
lis. *Habitat in ranæ temporariæ intestinis.*
- dyspnoos. 58. Asc. cauda subulata. *Goeze Eingew. p. 98.*
Habitat in ranæ temporariæ pulmonibus, respirationem &
nationem impediens, vivipara, fertilissima, spiraliter,
convoluta.
- infons. 59. Asc. cauda rotundata. *Goeze Eingew. p. 98.*
Swammerd. bibl. nat. p. 317.
Habitat in ranæ temporariæ pulmonibus, innoxia.

e. *pisicium.*

- anguillæ. 60. Asc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p. 86. opusc. 3. p. 231?*
Habitat in murænæ anguillæ interaneis.
- marina. 61. Asc. filiformis albidus lævis, plano spirali convolatus,
intestino tubulofo.
Syst. nat. XII. 2. p. 1075. n. 4. Müll. zool. dan. prodr. 2578.
O. Fabr. fn. groenl. p. 166. n. 241. Gordius (marinus)
filiformis plano spirali convolutus.

K k k k k k k

Leeuwenh. arc. nat. p. 370.

Pall. inf. viv. intr. viv. p. 16.

Ascan. ic. rer. nat. t. 7. f. a. b. c.

Müll. Naturf. 12. p. 183. Schr. der berl. Naturf. I. p. 203. 212.

Brit. zool. t. 20. f. 3.

Habitat in piscibus marinis, potissimum gadis, visceribus ut plurimum extus adhaerens, ad sesquipollicem longa, sub techo suo immobilis, at in aquam coniecta mirifice se torquens, lepræ norwegicæ nequaquam causa.

blennii. 62. Asc. Müller Schr. der berl. Naturf. I. p. 216.

Habitat ad & in blennii vivipari intestinis, partim in nodos convoluta.

rhombi. 63. Asc. Müll. Schr. der berl. Naturf. I. p. 213.

Habitat in Pleuronecte Rhombo.

Percæ. 64. Asc. recta acicularis utroque fine incurva. Goeze Eingew. p. 90.

Habitat in perca fluviatili.

globicola. 65. Asc. anterius obtusior subbisida, globulum membranaceum inhabitans. O. Fabr. fn. groenl. p. 268. n. 243. Jonst. inf. 183? Vermis Bellonii in cernuis obvius.

Habitat nuda, & globulo inclusa in gasterosteo aculeato, ventriculi cuti exteriori adhaerens, gelatinosa, lœvis, planiuscula, aquæa, utroque fine lineaque longitudinali dorji lacteis, 4 lineas longa.

lacustris. 66. Asc. plano spirali convoluta utrinque attenuata. O. Fabr. fn. groenl. p. 268. n. 242.

Syst. nat. XII. 2. p. 1076. n. 5. Gordius lacustris.

Habitat in gasterostei aculeati intestinis, lucii hepate, alba, lœvis, an forte eadem cum globicola.

filuri. 67. Asc. recta acicularis utroque fine incurva. Bloch Eingew. p. 31.

Habitat in glanide.

farionis. 68. Asc. teres cinerascens. Goeze Eingew. p. 77.

Habitat in farionis intestinis.

truttae. 69. Asc. filiformis, cauda rotundata. Goeze Eingew. p. 93.

Habitat in farionis intestinis.

marænæ. 70. Asc. *Koelr. comm. petrop.* 18. p. 509.
Habitat in maræna.

Acus. 71. Asc. recta rigida acicularis, utroque sine subincurvo:
Bloch Eingew. p. 30. 31.
Besch. der berl. Naturf. 4. p. 544. *Goeze Eingew.* p. 90.
Müll. Naturf. 14. p. 140. *Ascaris Seta.*
Habitat in lucii intestinis, alba, ad 2 pollices longa.

halecis. 72. Asc. filiformis plano spirali convoluta.
Bloch Eingew. p. 33. t. 8. f. 7 - 10. *Gordius harengum,*
Müll. berl. Naturf. Schr. 1. p. 212.
Habitat in halecis vesiculis & mihiibus, & extus ad intestina,
ad pollicem longa, crinita equini crassitie.

argenti- 73. Asc. *Red. anim. viv. n. an. viv.* p. 88.
næ. *Habitat in argentina.*

gobionis. 74. Asc. canda truncata. *Goeze Eingew.* p. 127. t. 8. f. 1-3.
Habitat circa cyprini gobionis hepar, tenerima.

rajæ. 75. Asc. posterius attenuata integra, anterius setiformis
subcurva. *O. Fabr. Fn. groenl.* p. 273. n. 253. *Niüil.*
zool. dan. prodr. 2593. ic. 2. t. 74. f. 1 - 3.
Habitat in rajæ fulloniæ ventriculo, bifidæ similis & aqua-
lis, cauda tamen non fissa, & quasi abrupta, rostro lon-
giore, compresso, linea longitudinali, quasi fissæ discer-
nenda.

squali. 76. Asc. *Red. anim. viv. n. an. viv.* p. 89.
Habitat in squalo glaberrinæ.

lophii. 77. Asc. rigida cornea glaberrima dilutius fusca; intestino
filoque multipliciter contorto lacteis, globulo minimo
ad caudam. *Müller Schr. der. berl. Naturf.* 1. p. 211.
zool. dan. 3. p. 53. t. 111. f. 1 - 4.
Habitat in lophii pectoris canali cibario, magna.

f. *vermum.*

lumbrici. 78. Asc. minutissima, cauda subulata, punctorum obscurorum
ordinibus duobus. *Goeze Eingew.* p. 110. t. 4. f. 10.
v. Gleich. auserl. microsc. Entd. p. 58. t. 27. 28.
Habitat in lumbricis, infra cutem & in humoribus, nudo
oculo non usurpanda.

TRICHOCEPHALUS. *Corpus elasticum, contortum : parte posteriori crasso clavato ; anteriore capillari duplo longiori, ad finem interdum nodosa.*

* *capite simplici.*

hominis. 1. *Tr. supra subcrenatus, subtus laevis, anterius subtilissime striatus.*

Mant. 2. p. 543. Trichuris.

Roeder. & Wagler de morb. mucos. ed. Wrisb. p. 62. t. 3. f. 4. Trichuris.

Roeder. Goett. gel. Anz. 1761. St. 25.

Wrisb. de animalc. infus. p. 6. & Roeder. & Wagl. de morb. muc. præfat.

Happ verm. intest. hom. hist. p. 21.

Wern. verm. intest. p. 84 - 86. t. 6. f. 138 - 143.

Müller Naturf. 12. p. 182.

Bloch Eingew. p. 32. f. 7 - 9.

Goeze Eingew. p. 113. &c. t. 6. f. 1 - 5.

Blumenb. Naturg. p. 410.

Habitat in hominis, potissimum morbo mucoso laborantis, intestinis, rarer in tenuibus, frequentissimus in cæco, ad 2 pollices longus.

equi. 2. *Tr. Goeze Eingew. p. 118. t. 6. f. 8.*

Habitat in equo, 2½ pollices longus, parte posteriore pollicari, anteriori sesquipollicari.

apri. 3. *Tr. cauda utrinque squamis crenatis ornata. Goeze Eingew. p. 122. t. 6. f. 6. 7.*

Habitat in apro, humano æqualis.

muris. 4. *Tr. capite trinodi. Goeze Eingew. p. 119. t. 7. A. f. 1 - 5.*

Habitat in muris intestinis, medio fere inter duodenum & rectum loco, parte tenuiore vesiculis albis obseffa.

- vulpis. 5. Tr. capite acutiusculo anguis, collo transversim striato: vesiculis unilateralibus. *Froelich Naturf.* 24. p. 142^r t. 4. f. 25 - 29.
Habitat in vulpis intestino. cæco.

* * *capite uncinato.*

- lacertæ. 6. Tr. cauda utrinque squamata. *Goeze Eingew.* p. 123. t. 7.
A. f. 6. 7.
Pallas nov. comm. petrop. 19. t. 10. f. 6. n. nord. *Beytr.*
p. III. *Tænia Spirillum.*
Müll. Naturf. 12. p. 182.
Habitat in lacertæ apodis intestinis.

FILARIA. *Corpus teres filiforme, æquale, lœvif-
sum, ore dilatato: labio subro-
tundo concavo.*

* *hominis.*

- medinen- sis. 1. F. tota pallida.
Syst. nat. XII. 2. p. 1075. n. 3. *Gordius medinensis.*
Welsch monogr. Vena medinensis.
Sloan. jam. 2. p. 190. t. 233. f. 1. Vena medinensis.
Kaempf. amœn. exot. p. 524. *Dracunculus persarum.*
Gallandat n. að. ac. caes. 5. app. n. 3.
Grun. að. ac. el. *Erf. ad* 1777. med. n. 3.
*Habitat in Guinca, America & Asia meridionali, nudi-
pedum obambulantium servorum pedes intrans, dolorenz-
febreneque excitans, caute extrahendus, ad 12 pedes
longus; mercurio sublimato corroso in spiritu frumenti
soluto intra 20 dies, qui alias demum post 40 dies, edu-
citur: An inter intestinales locum meretur?*

* * *mammalium.*

- equi. 18. F. posterius attenuata, cauda acutissima incurvata.
Abildeard apud Müll. zool. dan. 3. p. 49. t. 109. f. 12.
Habitat in equini corporis cavis variis telaque cellulosa.

*Filariae, a gordiis habitaculo & plurimæ cauda non uncinata distinctoræ, sèpius te-
lam cellulosam, rarius intestina inhabitant, ex piscibus, amphibiliis, vermi-
bus exules, an singulæ pro animali, in quo degunt, diverso, diversæ species?*

Kkk kkk kk k 3

- leonis. 2. F. *Red. anim. viv. n. an. viv. p. 14. t. 9. f. 2.*
Habitat in leone.
- martis. 3. F. *Red. anim. viv. n. an. viv. p. 15. t. 9. f. 1.*
Habitat in marte.
- leporis. 4. F. *Pall. n. nord. Beytr. I. p. 83.*
Habitat in leporum coxae tela cellulosa,
** * * avium.*
- falconis. 5. F. *Pall. n. nord. Beytr. I. p. 83.*
Vandell. diff. p. 75.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 80.
Habitat in falco sum tela cellulosa abdominali & crurali.
- strigis. 6. F. *Pall. n. nord. Beytr. p. 83.*
Habitat in strigibus, in tela cellulosa capitis & aures cingente.
- cornicis. 7. F. *Pall. n. nord. Beytr. I. p. 83.*
Habitat in cornicis thorace & pulmonibus.
- ciconiæ. 8. F. *Red. anim. viv. n. an. viv. p. 83. op. 3. p. 223?*
Habitat in ciconia.
- gallinæ. 9. F. *Goëze Eingew. p. 126. t. 7. B. f. 8-10.*
Müll. Naturf. 12. p. 187.
Habitat in gallinæ intestinis tenuibus, 2 pollices longa, capillaris.
- * * * * insectorum.
 :+ perfectorum.
- scarabæi. 10. F. *Að. angl. I. p. 49.*
Habitat in scarabæo fimetario.
- filphæ. 11. F. *Goëze Eingew. p. 128.*
Habitat in filpha obscura.
- carabi. 12. F. *Pall. de. inf. viv. p. 12.*
Cit. að. angl. n. 81.
Habitat in carabo.
- grylli, 13. F. *Goëze Eingew. p. 128.*
Frisch inf. 12. p. 3. t. 2. f. 1.
Roesl. inf. 2. p. 58.
Sulz. hist. inf. p. 81.
Pall. it. I. p. 26.
N. Mannigf. 4. I. p. 55. 117.
Habitat in gryllis.

monocu- 14. F. *Walch Naturf.* 12. p. 64.
li. *Habitat in monoculo apode.*

++ larvarum.

lepidop- 15. F. cauda uncinata. *Schränck Beytr. z. Naturg.* p. 98.
terorum. *Goeze Eingew.* p. 127.

papilio- a) F. *Wern. verm. intest. cont.* I. p. 6.
num.

polychlo- a. F. alba. *Wern. verm. intest. cont.* I. p. 6.
ri.

urticæ. b. F. ex flavescente cinerea. *Wern. verm. intest. cont.* I. p. 6.
betulæ. c. F. alba. *Wern. verm. intest. cont.* I. p. 6.

quercus. d. F. alba. *Wern. verm. intest. cont.* I. p. 6.

sphingum. β) F. sphingis euphorbiæ. *Roef. inf.* I. phal. I. p. 20.
phalæna- γ) F. *N. Mannigf.* 4. app. p. 455.
rum.

quercus. a. F. alba. *Wern. verm. intest. cont.* I. p. 6.
cajæ. b. F. spadicea. *Wern. verm. intest. cont.* I. p. 6.

Ziczac. c. F. *Degeer inf.* I. p. 309. t. 34. f. 6-8.

nuptæ. d. F. *Goeze Eingew.* p. 127. t. 8. f. 4-6.
Pfi. e. F. *Roef. inf.* I. phal. 2. p. 65.

ponionel-f. F. *Goeze Eingew.* p. 128.

læ. *Habitat sub larvarum cute, his pernicioſifima, non raro
solitaria, 4, 5, 6, 7, pollices longa, glaberrima, dura,
utroque fine attenuata, anteriori obtusiore, labiis quasi
3 oblongis munito.*

tenthre- 16. F. *Az. Stockh.* 35. p. 181.
dinis. *Habitat in tenthredinum larva.*

phryga- 17. F. *Degeer inf.* II. I. p. 555. A. 14. f. 12 - 14.
neæ. *Habitat in phryganearum larvis.*

UNCINARIA. *Corpus filiforme elasticum, antror-
sum obsolete nodulosum :
labiis membranaceis angu-
latis.*

*Cauda feminæ aciculata, maris
uncis 2 cuspidatis vesicæ
pellucidæ inclusis armata.*

melis. I. U. femina subrecta, maris uncis approximatis : vesica
rotundata. *Froelich Naturf.* 24. p. 136.

Goeze Eingew. p. 106. A. B. f. 1 - 4. Ascaris criniformis.

Müll. Naturf. 22. p. 55. Strongylus melis.
Habitat in melis intestinis crassis.

vulpis. 2. U. femina ad angulum inflexa, maris uncis remotis quadricuspidatis : vesica cordato-biloba. Froelich, Naturf. 24. p. 137. t. 4. f. 18. 19.
Habitat in vulpis intestinis crassis, præcipue recto,

SCOLEX. *Corpus gelatinosum, polymorphum, anterius latiusculum, posterius acuminatum, nunc lineare & elongatum, nunc regosum & breve, teres, flexuosum vel depresso, capite exsertili & retractili.*

pleuro- 1. Sc, capite auriculis quaternis. Müll. zool. dan. 2. t. 58. nectis. par. 2. p. 53. Schr. der berl. Naturf. I. p. 206. 207. 210. 213.

Habitat in Pleuronectis Rhombi, Linguatulæ, Platessæ, Salmonis Lavareti & Cyclopteri Lumpi muco intestinali, nudo oculo non distinguenda, capite colloque pellicidis, illo pone punctis 2 sanguineis, ut plurimum oblongis splendidis picto: auriculis in varias formas plicatilibus; hoc brevi: margine lunato, in vivis sanguineo, capite ad tænias accedens.

lophii. 2. Sc. Müll. berl. Naturf. Schr. I. p. 211.

Habitat in Lophii piscatorii muco intestinali, nudo oculo vix discernenda; an diversa a sc. pleuronectis species?

LIGULA. *Corpus lineare æquale elongatum; anterius obtusum, posterius acutum sutura dorsali impressa.*

intestina- 1. L. albissima angustissima.

lis, Bloch Eingew. p. 4. t. I. f. 1. 2.

Goeze Eingew. p. 183. t. 14. f. 1 - 3.

Habitat in mergi minutis, albelli & mergenseris colymbi auriti intestinalis, abdomine adeo peccore ad pedem usque longa, fasciam exadē referens.

- abdominalis. 2. L. cinerascens latiuscula. Goeze Eingew. p. 187.
Syst. nat. VI. p. 70. t. 6. f. I. XII. 2. p. 1078. n. 2.
Fn. succ. 2076. *Amoen. acad.* 2. p. 71. *act. Stockh.*
1747. t. 5. f. 6. *Fasciola (intestinalis) linearis longa,*
Bloch Eingew. p. 2. *Ligula piscium,*
Bloch Besch. berl. Naturf. 4. p. 549. Fiek.
- cobitidis. α) L. *Bloch Eingew.* p. 2.
- cyprinorum. β) L. *Goeze Eingew.* p. 187.
Gronov. act. helv. 2. p. 374.
Pall. n. nord. *Beytr.* I. p. 94. *Tænia cingulum.*
- gobionis. a. L. *Bloch Besch. der berl. Naturf.* 4. p. 549.
- trincæ. b. L. *Bonnet. insectol. Abb.* p. 62.
- carassii. c. *Pallas n. nord.* *Beytr.* I. p. 100.
- leucisci. d. *Pallas n. nord.* *Beytr.* I. p. 95.
Bloch Besch. d. berl. Naturf. 4. p. 549.
- alburni. e. *Bloch Eingew.* p. 2.
- vimbæ. f. *Pallas n. nord.* *Beytr.* I. p. 94.
Bloch. Eingew. p. 2.
Goeze Eingew. p. 189. t. 16. f. 7. 9.
- bramæ. g. *Pallas n. nord.* *Beytr.* I. p. 96. *elench. zooph.* p. 414.
Bloch Eingew. p. 2.
Beschr. der berl. Naturf. 4. p. 549.
Goeze Eingew. p. 187. t. 16. f. 4-6.
Ruysh observ. anat. n. 64. *opp.* I. p. 61. t. f. C.
Habitat in piscium abdomen, præsertim mesenterio, pisces emaciatus, deformans, abitura cutem perterebrans, nunc solitaria, nunc gregaria, $\frac{1}{2}$ lineata crassa, $\frac{1}{2}$ - 5 pedes longa.

STRONGYLUS. *Corpus teres elongatum, pellucidum glabrum, anterius globosa truncatum : apertura circulari margine ciliata, posterius in femina integrum acuminatum, in mare in membranas pellucidissimas, laxas distantes dilatatum.*

equinus. 1. Str. capite opaco, intestino nigro. *Müll. zool. dan.* 2. t. 42.
f. I - 12. *rar.* 2. p. 6.

Barthol. act. havn. t. p. 37.

Goeze Eingew. p. 137. t. 9. B. f. 10. II.

Habitat gregarius in equi ventriculo; mas pallide luteus, membrana flavicante subtilissima interanea involvente, cauda triphylla: inter membranulas nunc e papillula exente spiculo simplici appositis 3 lacinias nunito, nunc praeter uncum spiculo dupli utroque tricuspidate, feniæ intestinum involventibus vasculis, filiformibus albis.

ovinus. 2. Str. *O. Fabr. apud Müll. zool. dan. rar. 2. p. 8.*

Habitat in ovium intestinis.

ECHINORHYNCHUS. *Corpus teres: proboscide cylindrica retractili echinata.*

a. mammalium.

phocæ. 1. E. pallidus, intestino lacteo spirali.

Müll. zool. dan. 2. t. 74. f. 1. prodr. 2590. rar. 2. p. 101.

O. Fabr. fn. groenl. p. 272. n. 250. Ascaris phocæ.

Habitat gregarius in phocæ groenlandicæ & hispidæ intestinis, quam non raro fere consumit, 3 $\frac{1}{2}$ 8 pollices longus, pellucidus, membranaceus, utroque fine attenuatus, posteriori acuminatus, aduncus.

tubifer. 2. E. albidus glaber, posterius in setam attenuatus.

Müll. zool. dan. 2. t. 74. f. 2. prodr. 2591, rar. 2. p. 101.

O. Fabr. fn. groenl. p. 273. n. 251. Ascaris (tubifera) albida, antice rostro cylindrico quasi pro'ongata.

Habitat in phocæ barbatæ ventriculo, vix pollicem longus.

Gigas. 3. E. candidissimus, collo nullo proboscide vaginata: aculeorum uncinatorum ordinibus pluribus, papillis suctoriis senis. Goeze Eingew. p. 143. t. 10. f. 1 - 6.

Bloch Eingew. p. 26. t. 7. f. 1 - 8.

Pall. comment. Petrop. 19. p. 202. t. 11. f. 3. & n. nord. Beytr. 1. p. 107. Tænia hirudinacea.

Müll. Gesch. der. daen. u. norw. Tù. 1. p. 136. b.

Habitat in porcorum, præsertim in stabulo sagittorum, intestinis, gregarius, in apro magis cærulescens, 12 pollices ad 1 $\frac{1}{2}$ pedes longus, proboscidis filamentis quasi ligamentis duobus lateralibus, aculeis furiantibus, ovalis primo hyalinis, maturis margine fuscescentibus.

balænæ. 4. F. *Phips it.* p. 103. t. 7. f. 1. A. B. C.
Habitat in balænæ intestinis.

b. *avium.*

buteonis. 5. E. *candidissimus*, vesiculis caudæ cærulescentibus lentifor-
mibus. *Goeze Eingew.* p. 154. t. 12. f. 1. 2. A.
Habitat in buteonis intestinis, 2 1/4 pollices longus.

scopis. 6. E. *proboscidis aculeis numerosissimis*. *Goeze Eingew.*
p. 154. t. 11. f. 13.
Habitat in strigis scopis intestinis crassis.

aluconis. 7. F. *corpore subrugoso opaco*, proboscide incrassata. *Müll.*
zool. dan. 2. t. 69. f. 1 - 4. *inf. rar.* 2. p. 86.
*Habitat in Strigis Aluconis intestinis, flexuosus, probos-
cide aculeis innumeris armata, in centro apicis pertusa.*

strigis. 8. F. proboscide clavata. *Goeze Eingew.* p. 153. t. 11.
f. 8 - 12.
Habitat in strigis stridulæ intestinis crassis.

pici. 9. E. *candidus*, collo nullo, proboscidis aculeis ferratis.
Goeze Eingew. p. 150. t. 11. f. 1 - 5. & A.
*Habitat in pici erythrocephali & viridis intestinis, grega-
rius, 1 1/2 pollicis longus, proboscidis aculeis minimis.*

borealis. 10. F. *anatis mollissimæ*,
Phips it. p. 103. t. 7. f. 1. *Sipunculus Lendix.*
Habitat in anatis mollissimæ intestinis.

boschadis. 11. E. *collo filiformi, proboscide subechinata*. *Goeze Eingew.*
p. 163. t. 13. f. 6. 7.
Habitat in anatis domesticae intestinis.

anatis. 12. E. *coccineus ovatus*, thorace proboscideque undique
uncinatis: collo longo lævi intermedio. *Goeze Eingew.*
p. 164. t. 13. f. 1. 2.
Habitat in ana'tis fuscæ intestinis.

mergi. 13. E. *capite coloque ambo*. *Bloch Eingew.* p. 28. t. 7.
f. 9 - 11.
*Habitat gregarius in mergi minutis intestinis, 1 - 1 1/2 polli-
cem engus.*

alœ. 14. E. *anter' u. subtus rugis lateralibus medietatem elevatam
includentibus*.
Müll. zool. dan. 2. t. 74. f. 8. *prodr. 2597. rar.* 2. p. 106.
O. Fabr. jn. grænl. p. 276, n. 257. *Ascaris alœ.*

Habitat in alcæ picæ intestinis, ad 4 pollices longus, albus, dorsi linea longitudinali nigra, teretusculus, anterius acutiusculus, subtus planus, posterius subprismaticus fine exquisite ocuto, an hujus generis?

- ardeæ. 15. *E. striatus*, proboscide clavata. *Goeze Eingew.* p. 152.
t. 11. f. 6. 7.
Habitat in ardea cinerea, posterius conicus, medio utrinque sinuato.
- gazæ. 16. *E. Red. anim. viv. n. an. viv.* p. 85. t. 15. f. 13. *opusc.*
3. p. 229. t. 21. f. 9.
Habitat in ardea alba.

- vanelli. 17. *E. caudæ vesica alba: centro albo.* *Goeze Eingew.* p. 155.
Habitat in vanelli intestinis mediis.
- merulæ. 18. *E. ovatus, thorace aculeato.* *Goeze Eingew.* p. 165.
Habitat in merula & fringilla montana.

c. reptilium.

- ranac. 19. *E. candidus, proboscide intus filamentis duobus tenellis albis directa.* *Goeze Eingew.* p. 159. t. 12. f. 10. 11.
Pall. Coniment. petrop. 19. p. 452. t. 9. f. 2. a. A. n. nord.
Beytr. I. p. 109. t. 3. f. 37. *Tænia hæruca.*
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 82. *opusc.* 3. p. 221.
Habitat gregarius in ranarum, præsertini temporariæ, intestinis, fixus interdum virescens aut cinerascens.

- falcatus. 20. *E. proboscide longa longitudinaliter uncis multifariam armata, anteriori litura, posteriori fine puncto pellicido.*
Froelch Naturf. 24. p. 117. t. 4. f. 22 - 24.
Habitat in solamandræ intestino duodeno prope pylorum.

d. piscium.

- anguillæ. 21. *E. corpore candido lævi, proboscide globosa.* *Müll. zool. dan.* 2. t. 6). f. 1 - 3. *med. rar.* 2. p. 84. *Schr. der berl. Naturf.* I. p. 204.

Echinorhynchi firmissime animalium, que inhabitant visceribus, ut plurimum intestinis saepe per totam vitam uni eademque loco infixi, ut plurimum gregarius, in horae hadenus non inventi, corpore tertii non articulato satis a tænia distincki, proboscidis uncinis nudis immobilebus; mares feminis ut plurimum ovariis minores, sapissime plane segregati in alio individuo habitant: An, quam O. Fabricius in bleamio viviparo Acharius in lota O. Fr. Müller in belone, integrerunt, distinctæ species?

Red. anim. viv. n. an. viv. p. 87. opusc. 3. p. 234.

Leeuwenh. arc. nat. p. 313. 314. f. 1. 2.

Habitat in muræ anguillæ intestinis, opacus, proboscide collo suffulta, uncinorum quinorum vel senorum seriebus 6-8 armata; mas posterius globulis 7 opacis, canaliculo serie dupli concatenatis conspicuus, femina duplo longior, & ova continens ovalia, ob fetus lineares.

xiphiae. 22. *E. xiphiae gladii. Red. anim. viv. n. an. viv. p. 89. t. 24. f. 7. op. 3. t. 19. f. 1.*

Habitat in xiphiae intestinis, quæ sæpe perforat.

candidus. 23. *E. corpore opaco subrugoso albo. Müll. zool. dan. I. p. 139. t. 37. f. 7-10. & 2. t. 34. f. 7. rar. I. p. 92. & 2. p. 105. Schr. der berl. Naturf. I. p. 205. 209. 214.*

O. Fabr. fa. groenl. p. 275. n. 256. Ascaris versipellis. Acharius n. að. Stockh. 1780. I. I. n. 5. Achanthus sipunculoides.

Goeze Eingew. p. 157.

Habitat in gadorum, callariae, barbati, merlangi, blennii ranini, pleuronectis plateosoidis, percæ cernuae & fluviatilis, cyprini idbari intestinis, ad 3 pollicum longitudinem se expandens, æqualis crassitiei, interdum cinerascens aut flavescentia, fuscus, fulvus, croceus, rubicundus, violaceus pro indole fluidi, in quo degit, proboscide uncinorum 9-15 ordinibus 9-16 armata, mas minor, sæpiissime plane separatus a femina habitans.

lineola-
tus.

24. *E. corpore lineolis transversis fuscis medio interruptis.*

Müll. zool. dan. I. p. 142. t. 37. f. 11-14. rar. I. p. 96.

Müll. zool. dan. prodr. 2599. Echinorhynchus (gadi) proboscide cylindrica intixa, corpore filiformi rugoso. Pallas zooph. 415. n. nord. Beytr. I. p. 107. t. 3.

f. 36. nov. comm. Petrop. 19. p. 452. t. 9. f. 2. Tænia Hæruca.

Habitat in gadorum intestinis, ad 2 pollices longus, proboscide minuta.

longicol-
lis.

25. *E. albo-rufescens, capite rotundato longitudinaliter striato, collo filiformi, proboscide subechinata. Goeze Eingew. p. 162. t. 12. f. 12-14.*

Habitat in Callariae intestinis, proboscidis uncis minimis.

pleuronec-
tis.

26. *E. corporis lateribus undulatim impressæ. Müll. Naturf. I. p. 150.*

Habitat in pleuronectis maximi intestinis; an vere distincta species?

- attenua- 27. *E. globiferus*, corpore æquali flavo lævi, collo filiformi.
tus. *Müll. zool. dan.* I. p. 137. t. 37. f. 1-3. *rar.* I. p. 89.
Pallas n. nord. Beytr. I. p. 110. t. 3. f. 38. *Tænia longicollis*.
Habitat rario & minus numerosus in flesi intestinis, pellucidus, æqualis ubique crassitiei, posterius rotundatus obtusus, proboscide ligamento utrinque adnexo.
- annula- 28. *E. globiferus*, corpore acuminato, collo rugoso. *Müll. zool. dan.* I. p. 138.
Müll. zool. dan. prodr. 2601. *Echinorhynchus (lævis) proboscide echinata prope apicem in sphæram lævem dilatata.*
Habitat in Cotti Scorpii, Callariæ & Bramæ intestinis, attenuato proxime affinis.
- plateffoi- 29. *E. rostro attenuato*, posterius cingulo elevato terminali.
dæ. *Müll. zool. dan.* 2. t. 74. f. 5. *prodr.* 2594. *Schr. der berl. Naturf.* I. p. 207. *O. Fabr. fn. groenl.* p. 274. n. 254. *Ascaris pleuronectis.*
Habitat in pleuronectis plateffoidæ ventriculo, 2½ pollices longus, pallidus laevis.
- percæ. 30. *E. mollis rugosus utrinque obtusus*. *Pallas n. nord. Beytr.* I. p. 109.
Müll. zool. dan. I. p. 140. *par.* I. p. 92. *Schr. der berl. Naturf.* I. p. 205.
Habitat in percæ fluviatilis intestinis, an vere distincta species?
- cernuæ. 31. *E. percæ cernuæ*. *Müll. zool. dan.* I. p. 140. *rar.* I. p. 92. *Schr. der berl. Naturf.* I. p. 204.
Habitat in percæ cernuæ intestinis uncinorum proboscidi seriebus 10-12; an propria species?
- cobitidis. 32. *E. striatus*, proboscide clavata. *Goeze Einz. w.* p. 158.
t. 12. f. 7-9.
Habitat in cobitidis barbatulæ intestinis.
- Salmonis. 33. *E. corpore clavato lævi*, proboscide cylindrica. *Müll. zool. dan.* 2. t. 69. f. 1-3. *finer, rar.* 2. p. 83.
Habitat in Salaris intestinis, albus, glater, opacus, arerius ventricosus, posterius acuminatus, proboscide minus echinata, quam in congeneribus.

- sublobata- 34. *E. albus globifer posterius ad latera sublobatus, collo cylindrico annulato, proboscide coronis uncinorum denorum sedecim.* *Herrmann Naturf.* 17. p. 172. t. 4. f. 8-10.
Habitat in Salaris junioris intestinis, candido quadruplo minor, annulato proxime affinis.
- quadrirostris- 35. *E. candidus, cauda rotunda corpori intrusa, proboscide quadruplici.* *Goeze Eingew.* p. 166. t. 12. f. 3-5.
Habitat in Salaris hepate, proboscidis uncinis innumeris, an hujus generis?
- truttæ. 36. *E. Goeze Eingew.* p. 137. t. 12. f. 5. 6.
Habitat in farionis intestinis, rubellus, prælongus.
- marænae- 37. *E. fusiformis laevis subrugosus, pone attenuatus obtusifuscus.*
Martin & Acharius n. act. Stockh. 1780. p. 44, &c. t. 2. f. 1. 2. *Acanthrus spiniculoides.*
Habitat in marænae intestinis.
- lucii. 38. *E. corpore pellucido laevi.* *Müll. zool. dan.* 1. p. 138. t. 37. f. 4-6. *rar.* 1. p. 90. *Naturf.* 12. p. 188. t. 5. f. 1-5. *Besch. der. berl. Naturf.* 4. p. 543. *Schr. der berl. Naturf.* 1. p. 203.
Pall. n. nord. Bovyr. 1. p. 109.
Goeze Eingew. p. 156. t. 12. f. 3. 4.
Habitat in lucii intestinis, flavicans, posterius angustior & obtusus.
- argenti- nae. 39. *E. Barthol. act. havn.* 2. p. 225.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 87.
Habitat in argentina.
- alosæ. 40. *E. filiformis, anterius clavatus rubicundus, aculeorum seriebus sex latioribus armatus, proboscide pallida, aculeorum seriebus octo densioribus.* *Herrmann Naturf.* 17. p. 177. t. 4. f. 11. 12.
Habitat in alosæ intestinis, 2 pollices longus, proboscide cylindrica, medio paulo crassiori, collo brevi, saturatus rubro, aculeorum circulis 2 armato.
- barbi. 41. *E. ovatus flavus, fasciatus, collo longo albo cylindrico ad finem cyathiformi.* *Schranck Naturf.* 18. p. 83. t. 3. f. D.. H.
Habitat in cyprini barbi intestinis, e. lucii affinis.

- carpionis. 42. *E. cyprini carpionis.*
Koelreuter nov. comm. Petrop. 15. p. 500. t. 26. f. 5.
Acanthocephalus.
Habitat in carpionis intestinis.
- idbari. 43. *E. cyprini idbari.* *Müll. zool. dan. I. p. 140.*
Habitat in idbari intestinis, candido proxime affinis.
- affinis. 44. *E. cyprini rutili.* *Müll. zool. dan. I. p. 136.*
Habitat in cyprini rutili intestinis.
- rutili. 45. *E. proboscide tuberosa apice aculeata, altero corporis latere unico, altero quatuor osculis notato.* *Müll. zool. dan. 2. t. 61. f. 1-8. rar. 2. p. 61.*
Habitat rarissimus & solitarius in cyprini rutili intestinis, elongatus, contractus utroque fine obtusus, expansus anteriore acuminatus, proboscide posterius angustata apice aculeis 6 rediis singulis globulo affixis armata.
- bramæ. 46. *E. collo filiformi, proboscide aculeis minimis armata.*
Goeze Eingew. p. 163.
Habitat in bramæ intestinis.
- lophii. 47. *E. lophii piscatorii.* *Müller Schr. der berl. Naturf. 1. p. 211.*
Habitat in lophii piscatorii intestinis, albus, glomeratus.
- sturionis. 48. *E. rotundatus albus.* *Goeze Eingew. p. 157.*
Habitat in sturionis intestinis, candido affinis.
- HÆRUCA.** *Corpus rotundatum: fine anteriori bicollis simplici aculeorum corona cincto, proboscide nulla.*
- muris. 1. *H. ex albo cinerascens rugosa.*
Goeze Eingew. p. 138. t. 9. B. f. 12. Pseudoechinorhynchus.
Habitat in musculi ventriculo, proboscidis retractilis defectu ab echinorhyncho diversa.

CUCULLANUS. *Corpus posterius acuminatum;*
anterius obtusum, ore orbiculari, cucullo striato.

a. mammalium.

talpæ. 1. *C. talpæ europææ.* Goeze Eingew. p. 130. t. 8. f. 7. 8.

Habitat gregarius membrane inclusus in adipे peritonæi talpæ europææ, in spiram contortus.

creatus. 2. *C. corpore fasciolato, cauda ocreata.*

Goeze Eingew. p. 132. t. 15. f. 6. 7.

Habitat in talpæ europææ intestinis, pregarüs, oviparus, 2 pollices longus, culnum stramineum mentiens.

muris. 3. *C. Goeze Eingew. p. 242.*

Habitat in muris intestinis tenuibus.

b. avium.

buteonis. 4. *C. falconis buteonis.* Goeze Eingew. p. 83.

Habitat in buteonis intestinis.

c. reptitum.

ranae. 5. *C. cauda soliacea.* Goeze Eingew. p. 93.

Habitat in ranae temporariae intestinis.

d. piscium.

lacustris. 6. *C. refus, anterius truncatus.* Müll. zool. dan. I. p. 146. prodr. 2596.

a. *C. muræ anguillæ.* Goeze Eingew. p. 130. t. 9. A. f. 1.
 2. Besch. der berl. Naturf. 3. p. 493.
 Leeuwenh. arc. nat. 2. p. 313.

percæ. β. *C. percæ fluviatilis.* Goeze Eingew. p. 132. t. 9. B. f. A. B.

Müll. Schr. der berl. Naturf. 1. p. 205. 2. p. 133.
 t. 1. f. 8-14.
 Bloch Eingew. p. 34. t. 10. f. 1-4.

lucioper- γ. *C. percæ luciopercæ.* Goeze Eingew. 131. t. IX. a. f. 3.
 cæ. Müll. Schr. berl. Naturf. I: p. 217.

cernuæ. δ. *C. percæ cernuæ.* Müll. Schr. berl. Naturf. I. p. 214. 2.
 p. 133.
 Pall. n. nord. Beytr. I. p. 103. 104.

Cucullani plurimi vivipari frequentissime in intestinis, praesertim piscium, rarius in alio viscere habitant.

farionis. ε. *C. salmonis farionis.* *Goeze Eingew.* p. 133.
salaris. ζ. *C. salmonis salaris.* *Goeze Eingew.* p. 133. t. 8. f. 9. 10.
Habitat in piscium aquas dulces inhabitantium intestinis,
ζ) etiam in hepate, fertiliſſimus.

ascaroides. 7. *C. capite orbiculari utrinque uncinato, cauda rotun-*
data brevi acuminata: spiculis binis exsertis. *Goeze*
Eingew. p. 134. t. 8. f. 11-16.
Habitat in Siluri Glanidis ventriculo, larvis niſcæ ſimilis
ad ascarides accedens, pollicem longus, ex albo cineras-
cens, gregarius.

marinus. 8. *C. cinereo-luteus, anterius obtusus.* *Müller zool. dan.* I.
p. 144. f. 1-11. Schr. berl. Naturf. I. *p. 209.*

cirratus. α. *Müll. zool. dan.* I. *p. 144. t. 38. f. 1-7. rar.* I.
p. 99.

muticus. β. *C. Müll. zool. dan.* I. *p. 144. t. 38. f. 8-11. rar.*
I. p. 99.

Habitat in gádorum plurimoruni intestinis, oviparus,
elongatus, flexuofus, teres, pellucidus subtiliflamine
transverſe ſtriatus, intestino fulvo, capite latiore,
suborbiculato, anterius quaſi aduerto, mare ad caudam
trope anum aculeo nigricante ſetaceo bicuspidé armato,
ſeminæ in corporis medio tuberculo rima notato.

CARYOPHYLLÆUS. *Corpus teres: ore fimbriato.*

piscium. I. *C. Goeze Eingew.* p. 180. t. 15. f. 4. 5. *Bloch. Eingew.*
p. 34. t. 6. f. 9-13.

Habitat in piscium, aquas dulces inhabitantium, potiſſimum
cyprinorum, carpionis, tincæ, jefis, bramæ intestinis,
rarior, margaritaceus, ad pollicem longus, reliquis
intestinalibus vitæ tenacior, fine posteriori rotundato,
anteriore latiori.

LINGUATULA. *Corpus depreſſum oblongum.* *Os anterius ostiis 4 cinctum.*

ferrata. I. *L. Froelich Naturf.* 24. *p. 148. t. 4. f. 14. 15.*
Habitat in leporis timidi pulmonibus.

278. FASCIOLA. *Corpus planiusculum, poro duplo, rarius solitario.*

a. hominis.

humana. 2. F. hominis. *Doever. verm. p. 54.*
Cleric. lumbr. p. 119.

b. mammalium.

vulpis. 4. F. orbicularis, capite crasso rotundato arcu circulari a trunco separato, parte posteriori ad latera repanda, caudae appendicibus utrinque duabus cylindricis membranaceis. *Goeze Eingew. p. 176. t. 14. f. 11-13.*

Habitat in vulpis intestinis, an hujus generis?

putorii, 5. F. minutus subrotunda, poris duobus approximatis. *Goeze Eingew. p. 175. t. 14.*

Habitat in Mustelæ Putorii intestinis, 1½ lineas longa

melis. 6. F. crassa, capite triangulari. *Goeze Eingew. p. 176. t. 14. f. 9. 10.*

Habitat in melis intestinis, brevis.

vespertilio. 3. F. elongata teres, intestinis rubris. *Müll. zool. dan. 21. t. 72. f. 12-16.*

Goeze Eingew. p. 171. t. 14. f. 1-3.

Habitat in vespertilionis auriti intestinis, quæ sæpe perforat, ex rubro fusca, carnosa, punctis minimis transversim striata, hermaphrodita.

hepatica. 1. F. ovata subpetiolata. *Fn. suec. 2075. it. goth. 200. Pall. inf. viv. p. 27.*

Müll. verm. terr. & fluviat. hist. 1. 2. p. 7. 52. zool. dan. 1. p. 103. prodr. 2707. O. Fabr. fn. groent. p. 327. n. 312. Fasciola depressa ovata fusco-albida, antice tubulo instructa.

Schaeffer monogr. von Egelschn. f. 1-17.

Amœn. acad 2. p. 86. 185. 186. Limax ovatus lividus margine acuto.

Bloch. Eingew. p. 5. t. 1. f. 3. 4.

Goeze Eingew. p. 55. 179. Planaria latiuscula.

Aldrov. ins. 1. 7. p. 722.

Leeuwenh. arc. nat. p. 147.

Barthol. act. Havn. 3. p. 133. f.

Cleric. lumbr. p. 141. t. 9. f. 2. & t. 12. f. H-M.

Brauners tank vid.

Smoets. och mytt. afloesk. och. fiäderfå. p. 12. t. 3. f. 5.

Bianchi hep. p. 342.

Lesk. Naturg. p. 507.

Act. angl. 49. p. 248. t. 7. f. 1.

Bresl. Samml. p. 694. f. 1-4.

Act. helvet. 5. p. 374.

boum. *B.* F. *Goeze Eingew.* p. 170. 171. 205.

Müll. Naturf. 18. p. 35. t. 4. f. 11.

Aldrov. inf. l. 7. p. 133. f.

Falck. Viehseuch. t. 2. f. 6. 7.

porcorum. *y.* F. *Goeze Eingew.* p. 171.

apri. *δ.* F. *Cleric. lumbr.* p. 119.

cervi. *ε.* F. *Borlac. cornub.* t. 24. f. 10. *Porus cervinus.*

Cleric. lumbr. p. 119.

equi. *ζ.* F. *Buffon. hist. nat.* IV. p. 174. &c.

Habitat in ovium, boum, suumi, equorum, elaphorum, capreolorum hepate & ductu choledocco, androgyna, ovipara, foro duplice hepatico infixa, hydropem ascitem excitans, ad pollicem longa, anterius latior, tubuloque terminata, fusca vel ex fusco albida.

elaphi. *η.* F. conico ovata, sphinctere amplissimo: ore affurgente remoto.

Zeder Schr. berl. Naturf. 10. p. 65. t. 3. f. 8-11.
Festucaria cervi.

Habitat in cervi elaphi ventriculo gregaria, foro unico, villis adnarentibus.

c. avium.

bilis. *8.* F. torosa. *Braun Schr. berl. Naturf.* 10. p. 61. t. 3. f. 4. 5.

Habitat in falconis melanuati cystide selleo, gregaria.

buteonis. *9.* F. *Goeze Eingew.* p. 85.

Habitat in buteonis intestinis tenuibus, foro duplice.

milvi. *20.* F. plana, foro duplice, intestinis frondosis. *Goeze Eingew.* p. 173.

Habitat in milvi intestinalium tenuium muco, minuta.

fasciolæ androgynæ, oviparæ præter intestina alia quoque frequenter, nonnullæ species non nisi alia viscera inhabitant, intestinis flexuosis, ovarii lateralibus conspicuæ; an quas Redi in lepore, Cl. Merrem in mure, O. Fabricius in perca fluviatili & trinca, alii in scombro invenerunt, distinda a reliquis hujus generis species?

- strigis. II. F. teretiuscula, poro simplici. Goeze Eingew. p. 174.
t. 14. f. 4-6.
Habitat in strigis intestinis, an hujus generis?
- pusilla. 12. F. minutissima polymorpha vitae tenax cystidi inclusa.
Braun Schr. berl. Naturf. 10. p. 63. t. 3. f. 6. 7.
*Habitat in strigis Aluconis thorae in erinaceo europio
süb cupe, an hujus generis?*
- anatis. 13. F. rufescens teretiuscula pori simplici. Goeze Eingew.
p. 174. t. 13. f. 8-11. Naturf. 14. p. 137.
Bloch Eingew. p. 35. t. 10. f. 5-7. Cucullanus conoideus.
Müll. zool. dan. 2. t. 54. f. 1-3. rar. 2. p. 39.
Hirudo fasciolaris.
Müll. Schr. berl. Naturf. 1. p. 206.
*Habitat in & ad anatis domesticæ intestina, parva,
pellucidissima, interdum alba, antrorsum in trian-
gulum apice truncatum terminata, posterius rotun-
data, statura media filiformi nigra transversim cur-
vata, margines versus bifurca, intestino flexuoso
nigricante, ovarii lateralibus; an hujus generis?*
- anseris. 14. F. oblongo-ovata, subtus papillis oppositis bifariam
digestis, poris approximatis. Froelich Naturf. 24.
p. 112. t. 4. f. 5-7.
Habitat in anseris domestici pascentis intestino recto.
- gruis. 15. F. Bloch Eingew. p. 35. t. 10 f. 5-7.
Habitat in gruis intestinis, an distincta ab fasciola anatis?
- ardeæ. 16. F. suborbicularis. Goeze Eingew. p. 177. t. 15. f. 1.
Habitat copiosissimum in ardeæ stellaris intestinis, quæ perforat,
d. reptilium.
- salamand- dræ. 17. F. oblonga sublinearis, mota lagenam æmulans, poris
remotis. Froelich. Naturf. 24. p. 119. t. 4. f. 8-10.
Habitat in salamandræ nigræ intestino recto.
- ranæ. 18. F. subclavata ore sessili. Pallas inf. viv. p. 29. n. 1. 2.
Goeze Eingew. p. 93. 178. t. 15. f. 2. 3.
Sylvanimerd. bibl. nat p. 317.
*Habitat in ranæ pulmonibus, hepate, intestinis, tardis-
sime se movens, nunc in globum contrahens, nunc
in fasciam expandens.*

- uncinula- 19. F. uncinulis duobus elasticis in parte posteriori armata.
 ta. *Braun Schr. berl. Naturf.* 10. p. 58. t. 3. f. 1-3.
*Habitat in rana esculenta sub integumentis abdominalis coniuncti-
 bus, nunc solitaria, nunc gemina, nunc gregaria, gradiente hirudinem emulans.*
- e. piscium.
- binodis. 20. F. elongata teres, poro laterali papillari caudata.
Müll. zool. dan. 1. p. 108. t. 30. f. 8. prodr. 2717
rar. 1. p. 69.
*Habitat in piscium intestinis, aequalis, poris papillaribus,
 anteriori majore, finem anteriorem complectente, cauda
 filiformi, dimidia corporis longitudine. Zoega.*
- albithaca. 21. F. elongata teres poro laterali porrecto excavato.
Müll. zool. dan. 1. p. 108. t. 30. f. 9. prodr.
 2716. rar. 1. p. 69.
*Habitat in piscium intestinis, magnitudine ad f. lucii
 accedens, rugosa, retrorsum attenuata, fine ante-
 riori subbifido: lacinis inaequalibus apice excavatis.
 Zoega.*
- anguillæ. 22. F. Leeuwenh. arc. nat. p. 316. f. 6.
Habitat in anguilla.
- Scabra. 23. F. elongata teres, seriatim denticulata. *Müll. zool. dan.*
 2. t. 51. f. 1-8. rar. 1. p. 31.
*Habitat in gadi barbati ventriculo, oculo nudo vix
 conspicua, vivida, pellucida, sphærulam duriorem
 & foveatam ex ore protrudens, transversim striata,
 margine serrulata, vase dupli albo filiformi, alio-
 que flexuoso nigricante ovis farto per totam corporis
 longitudinem excurrente.*
- æglefini. 24. F. linearis depressiuscula, collo nulla. *Müll. zool. dan.*
 p. 106. t. 30. f. 4. prodr. 2712. rar. 1. p. 65.
*Habitat haud rara in æglefini intestinis, semipollicaris,
 cinerea, utroque fine rotundata.*
- blennii. 25. F. linearis plana, collo elato basi divergente truncato.
Müll. zool. dan. 1. p. 106. t. 30. f. 5. 2. t. 78. 9. 14.
prodr. 2711. rar. 1. p. 66. & 2. p. 116. *Schr. berl.*
Naturf. 1. p. 217.
Bloch. Einger. t. 2. f. 10. 11.
*Habitat in blennii vivipari muco intestinali, oculo nudo
 non conspicua, alba, pellucida, in angulum obtusum
 ut plurimum curvata, poro laterali majore in angulo
 corporis, saliente prominente, vesiculas albas 2,
 terminali unicam comprehendente.*

- scorpii. 26. F. elliptica, altero fine papilla minima perforata, collo nullo. *Müll. zool. dan.* 1. p. 105. t. 30. f. 1. prodr. 2709. rar. 1. p. 64.
Habitat in cotti Scorpii intestinis, nudo oculo non usurpanda, pellucida, utroque fine obtusa, ex albo cinerea, ovulis farta.
- plateffæ. 27. F. elliptica viridis. *Müller zool. dan.* 2. t. 78. f. 1-5. rar. 2. p. 114.
Habitat in plateffæ muco intestinali, minutissima, ut nudum oculum subterfugiat, opaca, in 3 areas virides totidemque albas alternantes divisa, poro terminali ampio, laterali in medio, ovis saturate viridibus.
- lucioper-
cæ. 28. F. ovato oblonga subventricosa, collo brevi, pori terminalis margine dilatato lævi. *Müll. zool. dan.* 1. p. 105. t. 30. f. 2. prodr. 2710. rar. 1. p. 64.
Habitat in lucioperæ intestinis, granuli arenæ magnitudine, fuscescens, collo cylindrico, poro laterali prominulo, retrorsum angustior.
- percæ. 29. F. ovata ventricosa, collo brevi, poro terminali margine noduloso. *Müll. zool. dan.* 1. p. 105. t. 30. f. 3. prodr. 2711. rar. 1. p. 65.
Habitat in percæ cernuae intestinis, f. lucioperæ paulo major, fusca, collo albo cylindrico, noduloso, poro terminato, poro laterali ad basin colli sito, posterius obtusa. Zoega.
- Lagena. 30. F. corpore rotundato, collo longo. *Braun Schr. berl. Naturf.* 8. p. 236. t. 10.
Habitat in percæ fluviatilis intestinis.
- Varica. 31. F. linearis teres, collo divergente obtuso infra apicem perforato. *Müll. zool. dan.* 2. t. 72. f. 8. 11. rar. 2. p. 93.
Habitat in salaris ventriculo, elongata, sœpe in anguluni acutum divergens, extensa lævis, contracta rugulosa, poro laterali in medio fere corporis posito, vesculo dupli filiformi albo utrinque decurrente, cum corpusculis 2 ovatis albis opacis retrorsum cohærente, ovulis innumerus sparsis ex luteo viridibus canaliculo hyalino flexuoso, singulisque membranæ pelliculæ inclusis.
- eriocis. 32. F. elliptica hyalina medio rufa. *Müll. zool. dan.* 2. t. 72. f. 4-7. rar. 2. p. 92.

Habitat in eriocis intestinis, nuto oculo vix conspicua, anteriore parte retradiili & extensili intestinum filiforme conglomeratum. media ovula conferta virescens, duasque vesiculas includente.

- fariōnis. 33. F. oblonga depresso-*scula*, anterius lobis sex æquibus marginata. *Müll. zool. dan.* 2. t. 72. f. 1-3. *rar.* 2. p. 91.
Habitat in fariōnis muco intestinali, flavescentia, vix linea longior, margine obtuse crenulata, lobis anterioribus subquadragulis membranaceis.
- fruttæ. 34. F. oblonga, maculis duabus albis lucidis orbiculatis pone porum inferiorem. *Froelich Naturf.* 24. p. 126. t. 4. f. 16. 17.
Habitat in fruttæ intestino recto.
- umbilæ. 35. F. oblonga plana, collo angustiore retractili. *O. Fabr. fn. groenl.* p. 329: n. 314.
Habitat gregaria in umbilæ sanguine dorsali, albida, 1½ lineam longa, lagenam figura refreng., posterius latior obtuse truncata, margine acuto.
- lucii. 36. F. lanceolata, margine depresso crenato, collo elongato tereti. *Müll. zool. dan.* 1. p. 107. t. 30. f. 7. 2. t. 78. f. 6-8. *prodr. 2713. rar.* 1. p. 67. 2. p. 115. *Schr. berl. Naturf.* 1. p. 203. *Naturf.* 14. p. 136. *Bloch Eingew.* p. 6. *Besch. berl. Naturf.* 4. p. 537. t. 14. f. 1-4.
Goeze Eingew. p. 172. t. 14. f. 3.
Habitat in lucii œsophago & ventriculo, in hujus plicis latens, vivida, rubra, 1½ pollicem longa, vite tenacioris.
- halecis. 37. F. *Leeuwenh. epist.* 97. p. 47.
Habitat in halece.
- bramæ. 38. F. oblonga teres, basi attenuata obtusa, collo tereti subincurvo. *Müll. zool. dan.* 1. p. 107. t. 30. f. 6. *prodr. 2714. rar.* 1. p. 66.
Habitat in bramæ intestinis, alba, poro lateralí ab basin colli sita, apud oblongis fusca.
- jelis. 39. F. ovata anterius angustata. *Bloch Eingew.* p. 11. t. 2. f. 10. II.
Habitat in jelis intestinis, lagenum formâ sua mentiens.

f. vermium.

- loliginis. 40. *F. ore papillis fasciculato.* Müll. prodr. zool. dan. 2708. *O. Fabr. fn. groenl.* p. 328. n. 313.
Syst. nat. XII. 2. p. 1078. Fn. suec. 2077. *Fasciola barbata.*
Habitat in loliginis intestinis, an hujus generis?

351. TÆNIA. *Corpus depresso articulatum.**Caput vesicis suctoriis quatuor.*

+ *capite corona uncinorum vaginaturum exsertilium & retractilium duplii armato.*

In aliis præter intestina visceribus habitantes, vesica ad partem posteriorem auctæ Hydatulæ s. Vesicariæ, s. Viscerales, s. Hydatigenæ.

a. hominis.

Visceralis. 5. *T. pisiformi, vesicæ inclusa, anterius lata, posterius acuminata.* Tyson ad. angl. 43. n. 475. p. 305.

Haen. rat. med. II. 3. c. 16. §. 2. p. 282.

Pall. misc. zool. p. 174. n. nord. Beytr. I. p. 83. Stralsund. Magaz. I. p. 81.

Hælpin Schrift. berl. Naturf. I. p. 348.

Bloch Eingew. p. 24.

Goeze Eingew. p. 196. & 249. t. 20. B. f. 12. a. b.

Wern. ver. int. p. 68. t. 9. f. 29-33.

Habitat in hepate, placenta uterina, sacco hydropico, aliisque tumoribns morbosis hominis, nunc solitaria, nunc gregatim inclusa vesicæ, an una eademque species?

cellulo-
fæ. 6. *T. vesicæ cartilagineæ tuniceque posterius bicaudatae solitaria inclusa.* Werner ver. int. cont. 2. p. 2. seq. t. I. f. 1-8.

Goeze Entd. dass die Finnen Blösenw. sind. Halle 1784.
Habitat in tela cellulosa muscularum, pollicem integrum longa, dimidium lata, & $\frac{1}{2}$ crassa, capitis uncinulis obtusis (an forsan intra vaginam retractis) vitæ tenacissima.

b. mammalium.

fæniæ. 7. *T. Bloch Eingew. p. 24.*
Habitat in fæniæ diaphragmate, arellanæ magnitudine; an eadem cum hydatula?

- vespertilio. 8. T. Bloch Schr. berl. Naturf. I. p. 334.
lionis. *Habitat in vespertilionis hepate, an eadem cum hydatigena?*
- vulpis. 9. T. Red. anim. viv. n. an. viv. p. 13.
Habitat in vulpe.
- putorii. 10. T. Goeze Eingew. p. 206.
Habitat in putorii hepate, an eadem cum t. ferarum?
- ursi. 11. T. Red. anim. viv. n. an. viv. p. 74.
Habitat in urso.
- gulonis. 12. T. Red. anim. viv. n. an. viv. p. 14. 15.
Habitat in gulone.
- hydatige. 13. T. simplex, corpore elongato sensim antrorsum latefcante, vesicula parte anteriore duplo longiore & latiore terminato, capite sessili distincto. Batsch Bandw. p. 100. n. 8. f. 46.
Pall. miscell. zool. p. 168. t. 12. f. 12. 13. n. nord.
Beytr. I. p. 82.
Bloch Eingew. p. 23. n. I. Schrift. der berl. Naturf. I.
p. 338. t. 10. f. 9.
Goeze Eingew. p. 223. t. 19. f. 1. 2.
Habitat in muris decumani, ratti, amphibii hepate, fine posteriore anteriore duplo. & vesicula adhaerente quadruplo angustiori, $1\frac{1}{4}$ - $8\frac{1}{2}$ pollices longa, capite fini anteriori æquali, collo nullo, corpore medio linearie.
- murina. 14. T. simplex corpore elongato sensim antrorsum latefcante: articulis pone ad latera denticulatis, vesica caudali fini anteriori æquali capite sessili distincto. Batsch Bandw. p. 100. n. VIII. β. f. 12-16. 18. 20. 29. 30. 47-49.
Maratt. zooph. p. 38.
Frisch misc. Berol. 6. I. p. 121.
Pallas inf. viv. p. 51. elench. zooph. p. 413. n. 5. misc.
zool. p. 160. 168. 171. t. 10. f. 12. 13.
Doever. vermi. intest. p. 105.
Bloch Eingew. p. 23.
Goeze Eingew. p. 227-247. t. 18. B. f. 10-14. t. 19.
f. 3-14.
Werner vermi. intest. cont. I. p. 13. t. 9. f. 22-33.
Habitat in muris terrestris & musculi hepatis superficie, pisi, aliquando avellanæ magnitudine, articulis longioribus & magis distinctis, vesica caudali longe angustiori ab hydatigena dignoscenda, an vere specie diversa?

cordata: 15. *T. simplex teres corpusculo distincte inserto in angulum infracto, vesica terminali ventricoso cordata pone acuminata.* Batsch Bandw. p. 94. n. 4. f. 42. 43.
Goeze Eingew. p. 218 t. 18. B. f. 6. 7, & p. 236. t. 18. B. f. 15-17.

Habitat in leporum muriumque hepate, vesica minuta, an vere distincta a pisiformi species?

Pisiformis: 16. *T. simplex teres turbinata, corpusculo contiguo, inferius cum vesica ovato-ventricosa confluenta.* Batsch Bandw. p. 96. n. 5. 44. 45.
Pall. misc. zool. p. 158. n. nord. Beytr. I. p. 82.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 73. t. 5. f. 6. Opusc. 3. t. I. f. 3.
Bloch. Eingew. p. 25. Schr. der berl. Naturf. I. p. 338.
Goeze Eingew. p. 210-219. t. 18. A. & t. 19. B. f. 4. 5.
Habitat copiosissima in leporis, potissimum senescens, hepate, racematinis saepius cohaerens, nisi circiter magnitudine, ex albo cærulescens.

Utricula- 17. *T. simplex teres corpusculo distincte inserto recto, vesica oblonga, retrosum utriformi obtusa.* Batsch Bandw. p. 99. n. 7.
Goeze Eingew. p. 219. n. 3. t. 18. B. f. 8. 9.
Habitat in leporis uteri gravidi tela cellulosa.

ferarum. 18. *T. simplex teres clavata, corpusculo contiguo inferius cum vesica ovali oblonga confluenta.* Batsch Bandw. p. 98. n. 6.
α. Hydatula cervorum. Goeze Eingew. p. 205. 206.
Steno apud Barth. act. hævn. I. n. 36. p. 68.
β. Hydatula Saigæ. Pall. spicil. zool. 12. p. 43. t. 3. f. 5.
n. nord. Beytr. I. p. 82.
Habitat in elaphi, capreoli, rangiferi, Saigæ etiam sanissimorum omento, peritonæo, hepate, avellaneæ, juglandis, ovi gallinacei magnitudine, vesica magis coriacea: striis transversis magis evidentibus, collique rugis distincta.

caprina. 19. *T. capri hitci.*
Barthol. hist. anat. 2. p. 49.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 75.
Hartmann miscel. Nat. Curios. 1705. p. 152. f. 21-24.
Habitat in capræ visceribus.

villa. 20. *T. ovis arietis.*
Goeze Eingew. p. 257. t. 17. f. 10. II.

Pall. misc. zool. p. 161. t. 12. f. 1-11. n. nord. Beytr. I.
p. 82.

Habitat in ovium potissimum vertiginosarum peritonæo,
hepate, omento, an satis diffinda a reliquis species?

cerebra- 21. T. multiplex, corpusculis pluribus basi sua vesicæ communis magnæ adnatæ acervatim in superficie distributis & in eandem retractilibus, vesica exteriore nulla. Batsch Bandw. p. 84. n. 1. f. 34-36. Schr. der berl. Naturf. I. p. 339.

Bloch Eingew. p. 25. Vermis vesicularis socialis.

Leske Dreher der Schaafe Leipz. 1780. t. 1. f. 1-3.

Goeze Eingew. p. 248. t. 20. A. f. 1-5. t. 20. B. f. 6-8. neust. Manigf. 4. p. 619.

C. a Borke Naturf. I4. p. 342.

Fontana opusc. scientif. Florenz. 1783. 8.

Boerner n. econ. schles. Nachr. I. p. 241.

Geutebrück Unterr. v. Schaeff. I. p. 277.

Hastfer Unterr. v. Zucht u. Wart. der Schaafe p. 98.

Ranftler Anz. der leipz. econ. Societ. 1776. p. 20.

Habitat in ovium vertiginosarum, potissimum annularum cerebro insigni sua copia morbi hujus pecorini causa vesica evacuata, insanabilis, singulis latice limpido repletis (vesiculis 300-400-500) vermiculis semen millii magnitudine æquantibus & ligamentorum operadherentibus, qui omnes capite 32-36 uncinulis armato, cerebro potissimum ejus superficie, aut parti medullæ spinali vicinæ firmissime infiguntur, in illo casu eam vertiginis speciem, quæ Drehen opilionibus audit, in hoc Springen causantes.

vervecina. 22. T. vesica magna, corpore brevi rugoso-imbricato. Goeze Eingew. p. 208. t. 17. A. f. 3-5.

Pallas Strals. Magaz. I. p. 81.

Habitat in vervecum, præsertim impinguatorum, peritonæo, an eadem cum globosa?

granulo- 23. T. multiplex, corpusculis pluribus vesicæ communis parietibus laxe adherentibus minutissimis granum referentibus, vesica externa internaque callosis. Batsch Bandw. p. 87. n. 2. f. 37.

Goeze Eingew. p. 258. t. 20. B. f. 9-14.

Pall. n. nord. Beytr. I. p. 85.

Habitat in vervecum hepate, vesicis nunc avellanam, nunc ovum columbinum, nunc gallinecum magnitudine æquantibus, plura millia vermiculorum continentibus, interiori

cærulecente; vermiculis ipsis libere natantibus in fluido vesica contento, oculo nudo vix conspicuis, brevibus, crassis, punctatis, utroque fine obtusis.

- Lovina. 24. T. simplex, vesica magna, corpore brevi rugoso imbricato.
Parihol. hist. anat. cent. 4. p. 381.
Hartmann miscell. Nat. Curios. dec. 2. ann. 4. obs. 73.
Pall. misc. zool. p. 172.
Goeze Eingew. p. 205.
Habitat in vitulorum boumque visceribus thoracis & hepate, an a globosa vere distincta?
- apri. 25. T. suis apri. *Goeze Eingew. p. 205. 206. t. 17. B. f. I. II.*
Habitat in apri hepate, juglandis magnitudine, t. ferarum proxime affinis.
- globosa. 26. T. simplex teres, corpusculo distincte insecto in angulum infracto, vesica terminali globosa integra. *Batsch Bandw. p. 89. n. 3. f. 38-41.*
Bloch Eingew. p. 24. n. 2. Schr. der berl. Naturf. I. p. 337. t. 10. f. 1-8.
Pallas n. nord. Beyer. I. p. 83.
 α . Hydatula pulmonis. *Bloch Schr. der berl. Naturf. I. p. 337.*
 β . Hydatula lienis. *Bloch Schr. berl. Naturf. I. p. 337.*
 γ . Hydatula hepatis. *Goeze Eingew. p. 197. t. 17. A. f. I. 2. 4. 5.*
 δ . Hydatula peritonæi. *Goeze Eingew. p. 203. t. 17. B. f. 6-9.*
Syst. nat. XII. 2. p. 1320. n. 5. Hydra (Hydatula) tentaculis quaternis obsoletis, corpore veliculofo.
Pallas miscell. zool. p. 162. t. 12. f. 1-II. Strals. Mag. I. p. 64. t. 1. 2.
Tyson ad. angl. vol. 17. n. 193. p. 505. Lumbricus hydropticus.
Payer misc. nat. cur. dec. I. ann. 7. obs. 205. Hydatis animata.
Haren. misc. nat. cur. dec. 3. ann. 2. obs. 193.
Barth. obs. cent. 2. n. 87. p. 293. Ova in porcis.
Habitat in porci visceribus, præsertim abdominalibus, evi columbini malive oitrei non raro magnitudine, distincte, at subtiliter rugosa, vesica terminali corpus multoties superante, cærulecente, post abitum animalculi slavicante.
- Finnæ. 27. T. conica, duplice vesicæ inclusa, interiori basi sua adhærens, capite collum vesicæ versus directo. *Fischer in Werner verm. intest. cont. 3. p. 65. t. 5.*
O. Fabr. nov. ad. Soc. Hafn. 2. p. 287.
Goeze Entd. dass die Finnen Blasenw. sind. Halle 1784.

VERMES INTESTINA. Tænia.

Habitat fixa in tela cellulosa, suis carnibus intertexta, morbum illum, quem Finhen nuncupant laniones, excitans, vesica ovali, senien milii & quante, exteriori ex tela cellulosa ipsa conflata, densa, elastica, intus laevi, & sero latice nitida, interiori pellucida, subtilissima rubello sero repleta, qua nonnisi collabente vermiculus inclusus lobos oculis offert, vitæ tenacissimus: an eadem species cum t. cellulose?

c. amphibiorum.

salamandriæ. 28. T. Red. animi. viv. n. an. viv. p. 124.
Habitat in Salamandra.

serpentum. 29. T. Red. animi. viv. n. an. viv. p. 124.
Habitat in serpentibus.

d. piscium.

truttæ. 30. T. Fraelich. Naturf. 24. p. 127.
Habitat gregaria in truttæ hepate.

¶ in intestinis solis habitantes, vesica terminali nulla.
a. hominis.

folium. 1. T. articulis subvaginatis, ovario fasciculatim ramoso: ramis sublinearibus crebris, fasciculis transversis compressis: margine articuli laterali angusto compresso. Bausch Bandw. p. 117. n. 3. f. 1-6. 9-11. 21-23. 53.

Syst. nat. XII. 2. p. 1323. n. 1. Fn. suec. 2264. Anæc. ac. 2. p. 74. t. 1. f. 1. Tænia osculis marginalibus solitariis.

Pall. inf. viv. p. 38. elench. zooph. p. 405. n. 1. n. nord. Beytr. I. p. 46. n. 1. t. 2. f. 1-9. Tænia cucurbitina.

Andry gener. des vers I. p. 195. f. pag. 33. 198. 200. 202. 205. 268. Ver solitaire sans épine.

Tyson act. angl. 1683. n. 146. t. 1. & 2. f. 2. 6. 10. lumbricus latus.

F. Plater prax. 993. Vermis cucurbitinus.

Ernst diff. de tænia brasili. 1743. Tænia secunda Plateri. Hayd exper. 47. t. 47. Lumbricus latus.

Bonnet mem. prés. à. l'acad. de Par. I. p. 511. & Journ. de phys. 1777. apr. p. 277. Tænia à anneaux longs.

Coulet monogr. Lugd. b. 172. lumbricus latus.

Hill hist. an. p. 16. Sicyonia.

Dionis monogr. Tænia articulos demittens.

Eeverw. thes. p. 202. t. 202. f. 3.

Raul. morb. aer. 1752. app. t. f. 1-4.

- Roederer progr. de tænia. 1760.
 Limburg act. angl. 56. a. 1766. p. 128. t. 6.
 Goeze Eingew. p. 269. sqq.
 Bloch Eingew. p. 20. n. 20.
 Müll. Naturf. 14. p. 134. 198-201.
 v. Gleichen Besch. berl. Naturf. 4. p. 203. t. 6. f. 10-13.
 Werner verm. intest. p. 18.
 Aristot. anim. l. 5. c. 19.
 Aldrov. inf. 6. p. 562. t. 1.
 Valisn. op. p. 177.
 Cleric. lumbr. t. 7. A. B.
 Berthol. act. havn. 2. p. 148. 3. p. 116.
 α) Tænia grandis. Goeze Eingew. p. 278. t. 21. f. 1-7.
 β) Tænia plana pellucida. Goeze Eingew. t. 21. f. 9-12.
 Wern. verm. intest. p. 18. t. 1. 2. f. 1-46.
 Habitat in hominis intestinis, frequentior feminis, frequenter Saxonibus & Batavis, quam quidem aliis certe Europæ gentibus, nimia copia durissima aliquando mala creans, non raro mortem, difficultius longe pellenda, quam alii hominem infestantes vermes, rarissime solitaria, ut dentur exempla 200 ejusmodi vermium uigilis hominis intestina affligentium, a 3-8, imo, ut referunt, ad 60 usque pedes longa, uncinis 6-7 priorem, 8-9 posteriore capitis coronam formantibus, cute alba pellucidissima, ut ovaria eleganter rarioſa transluceant, articulis primis ex oblongo quadratis, sequentibus cucurbitæ semen referentibus, postremis, quos crebrius quam aliae species dimitit, longioribus.

- vulgaris. 2. T. orificio ovorum duplice: altero in tergo ovarii punctiformi, altero ante illud positio papilliformi expressili. Baſsch Bandw. p. 107. n. 1. f. 33. 50.
 Syst. nat. XII. 2. p. 1323. n. 2. Fn. succ. 2262. Amœn. acad. 2. p. 7. t. 1. f. 2. Müll. zool. dan. prodr. 2654. Tænia oculis lateralibus geminis.
 Pallas inf. viv. p. 30. n. 1. el. zooph. p. 408. n. 3. Tænia grisea.
 Pall. n. nord. Beytr. I. p. 59. n. 3. t. 3. f. 13-16. Tænia membranacea.
 Plater prax. 992. Lumbricus latus s. Tænia intestinorum.
 Spigel monogr. Lumbricus latus.
 Schenck obſerv. III. p. 408. Tænia.
 Cleric. lumbr. p. 132. t. 6. f. 2. Lumbricus latus. p. 136. c. 7. t. 7. Tænia prima.

Plateri p. 129. t. 5. f. I. p. 159. t. 8. f. I. B.
 Fabric. observ. 2. c. 70. *Lumbricus latus*.
 Barthol. act. Havn. 2. p. 148. t. 39. *Lumbricus latus*.
 Andry gener. des vers. c. 3. t. 2. f. 9. & t. 3. f. 16.
Tulp observ. p. 170. t. 7. f. I.
Bornet journ. de phys. 1777. p. 243: t. I. f. 3. 4.
Gadol satag. 88.
Goeze Eingew. p. 297.
Werner verm. intest. p. 49. t. 3. f. 47-57.
 Habitat in hominum intestinis in Suecia vulgarior,
 pertinacissime infixa ut violentioribus etiam remediis
 resistat tenuis, laxa, quasi membranacea, solio tena-
 cior viva laelescens, subpellucida, 10-16 pedes longa
 & fine latiori ultra $4\frac{1}{2}$ lineas lata, articulis nunc
 quadratis, nunc paulo magis oblongis, medio secun-
 dum longitudinem subtiliter striatis, ad latera trans-
 verse rugosis, ovarii florum corollam referentibus.

b. mammalium.

- catenifor- 4. *T. articulis oblongis ellipticis*: osculis marginalibus
 mis. solitariis. *Goeze* Eingew. p. 305.
 canina. a. *Tænia* osculis marginalibus oppositis. Syst. nat. XII.
 2. p. 1324. n. 4. *Fn. suec.* 2265. *Amœn. acad.* 2. p. 81.
 t. I. f. 4. *Act. Stockh.* 1747. t. 5. f. 0.
Pall. inf. viv. p. 48. n. 5. *elench: zooph.* p. 408. n. 2. n. nord.
Beytr. I. p. 57. n. 2. t. 3. f. 10-12. *Tænia canina*.
Blumenb. Naturg. p. 412.
Goeze Eingew. p. 311. t. 23. f. A-C. *Naturf.* 14. p. 134.
Bloch Eingew. p. 17. t. 5. f. 6. 7. *Tænia cucumerina*.
Werner verm. intest. p. 58. t. 3. f. 64-69. 77-79. cont.
 I. t. 9. f. 34-37.
Batsch Bandw. p. 129. n. 7. f. 7. 8. 24-26. 57. 65.
 161. *Tænia elliptica*.
Wagler apud *Goeze* Eingew. p. 324. t. 23. f. D. E.
Ruysh obs. 84.
- lupi. b. *Tænia (marginata)* articulis subvaginatis: lateralí margine
 latiusculo, ovario fasciculatim ramoso: ramis sublineari-

Tænia cryanis in capite positis nutrimentum haurientes rarissime solitariae, fertilissimæ oviparæ, ovis per canales proprios ductis, per oscula marginalia excurrentibus, in articulis posterioribus senioribus copiosioribus, species pauciores adhuc satis accurate definitæ, plures incognitæ, multæ forsitan pro diffinitis habita-
 erem, discrimine solum a nutrimenti & habitaculi indole varia proficiunt.

bus divaricatis, fasciculis obliquis magis disjunctis.
Batsch Bandw. p. 125. n. 4. f. 54.
Goeze Eingew. 307. t. 22. A. f. 1-5.
Bloch Eingew. p. 20. t. 6. f. 6-8.
Werner verm. intest. p. 59.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 72.

Vulpis. 2. Tænia (*cratægaria*) articulis subvaginatis non marginatis, ovario facisculatim ramolo : ramis inverse ovatis subpetiolatis. *Batsch Bandw. p. 126. n. 5. f. 55.*
Bloch Eingew. 20. n. 19. t. 6. f. 6-8. Tænia canina.
Goeze Eingew. p. 310. t. 22. A. f. 6-9. & Naturf. 14: p. 144.

litterata. ♂. Tænia articulis subvaginatis non marginatis, ovario angustato longitudinali serie linearum serpentiformium conflato. *Batsch. Bandw. p. 128. n. 6. f. 56.*
Goeze Eingew. p. 310. t. 22. A. f. 10-12.

felis. ε. Tænia. *Goeze Eingew. 315. t. 22. B. f. 13-22.*
 sciuri. ζ. Tænia (*floribunda*) articulis leviter cohærentibus elongatis, utroque fine rotundatis linearibus, ovario pinnato lobulato ; lobis crispatis, papillis solitariis. *Batsch Bandw. p. 137. n. 10. f. 60.*
Goeze Eingew. p. 332. t. 23. f. 5. 6.

glirium. η. Tænia (*pusilla*) articulis conglutinatis oblongo-ellipticis, ovario vase pinnato : ramis gracillimis, papillis solitariis. *Batsch Bandw. p. 134. n. 8. f. 58.*
Goeze Eingew. p. 335. t. 23. f. 5. 6.

Habitat in canum (♂. in vulpis), cati, sciuri, vespertilionis, & murium ratti musculique intestinis, 18-24 pollices, η) 1½ pollicem longa, proboscide tereti collo, non articulato, ovis pist more rotundis, rufis vel fuscis, albida.

eucurbi-30. tina. T. opaca ex albo slavecens proboscide æquali, articulis omnibus quadratis : osculis alternis. *Werner vermi intest. p. 56. t. 3. f. 70-76.*
Red. opusc. 3. t. 17. f. 4.

Habitat in canum intestinis, crassior capite latiori, articulis magis æqualibus, retrorsum pecto latioribus & tumido margine cinctis, ovulis minoribus a folio distincta.

ferrata. 31. T: articulis ferratis striatis capite magno. *Goeze Eingew. p. 337.*
Batsch Bandw. p. 138. n. 11. f. 19. 32. 61. 63. 67.
Red. anim. viv. an. viv. p. 71. t. 13. f. 6. 7. opusc. 3: t. 17. f. 1. 2.

VERMES INTESTINA. Tænia.

- canis. a. Tænia. Goeze Eingew. p. 349. t. 25. B.
Vandell. diff. tres p. 151. t. 5.
- felis. b. Tænia collo brevissimo. Bloch Eingew. p. 19. n. 18. t. 6.
 f. 1-5.
Goeze Eingew. p. 337. t. 24. f. 1-6. t. 25. A. f. 1-5.
Pall. n. nord. Beytr. p. 47. t. 2. f. 1. 2. A. B. 3.
Valisn. op. I. p. 147.
Cleric. lumbr. p. 41. 47. 51. t. 3. f. 1. 2. t. 9. f. 3. 4.
Morgagn. opus. I. p. 174.
Vandell. diff. p. 148.
Habitat in canis felisque intestinis, ad 19 pollices usque longa, 3½ lineas lata, articulis rectangulis, anterioribus sensim latioribus & brevioribus, ovario minus distincto per paria pinnato.
- monili- 32. T. articulis orbiculatis, ovario pinnato : pinnis vageramolis ; ramis apice crassiusculis, capite rotundato, collo non articulato. Batsch Bandw. p. 135. n. 9. f. 59.
Goeze Eingew. p. 350. t. 26. f. 1-4.
Habitat cum cateniformi in felis intestinis, 22½ pollices longa, ad 3½ lineas lata, colore margaritaceum, linea longitudinali media, articulis subglobosis.
- lineata. 33. T. articulis subquadratis truncatis, fascia alba longitudinali, ovariis seriatis sacciformibus constante, collo contorto. Batsch Bandw. p. 143. n. 12. f. 68. 69.
Goeze Eingew. p. 352. t. 25. A. f. 6-10.
Habitat in cati sylvestris intestinis, ex albo cæruleo, sex pollices longa, culmi straminei latitudine ; an hujus familiae ?
- mustelæ. 34. T. Goeze Eingew. p. 336.
Batsch. Bandw. p. 143.
Habitat in mustelæ vulgaris, martis, putorii intestinis, pollicem longa, ½ lineæ lata ; an propria, eadem species hujus familiae ?
- filamen- 35. T. articulis quadrangulis : ovariis lateralibus contortis ultra marginem lateralem elongatis osculo terminatis, capite rotundato, proboscide pyriformi. Goeze Eingew. p. 360. t. 27. f. 6.
Batsch Bandw. p. 160. n. 18. f. 84. 85.
Habitat in talpæ intestinis tenuibus, satis longa ; articulis brevibus conico truncatis : disco ovali distincto.

- erina- 36. T. articulis ferratis brevibus, collo nullo, capitis uncinulorum corona simplici. *Bloch Eingew.* p. 20. t. 6. f. 1. 2. 3. 7. 8.
Habitat in erinacei intestinis, an distincta a ferrata species?
- strami- 37. T. collo simplici tenuissimo, proboscide pyriformi, articulorum latitudine longitudinem quater superante.
Goeze Eingew. p. 357. t. 27. f. 1-3.
Sulzer Naturg. Hamst. p. 88. not. 1.
Batsch Bandw. p. 188. n. 31. f. 116. 163.
Habitat in criceti intestinis, anteriori fine capillari, posteriori conico, ad 8 pollices longa.
- magna. 87. T. articulis brevibus latissimis altero margine nodulosa, capite magno truncato-tetragono, plica gulari. *Abildg.* ap. *Müll. zool. dan.* 3. p. 50. t. 110. f. 1.
Pallas n. nord. Beytr. I. p. 75. t. 3. f. 20.
Chabert malad. vermin. p. 22. t. 2. f. 1.
Habitat in equi ventriculo & intestino tenui, 26-30 pollices longa.
- quadri- 88. T. lanceolata, articulis brevissimis, capite truncato-tetragono: lobulis binis in utroque colli latere. *Müll. zool. dan.* 3. p. 51. t. 110. f. 2. 3.
Pallas n. nord. Beytr. I. p. 71. t. 3. f. 21-24.
Habitat in equi intestinis tenui & ventriculo.
- caprina. 89. T. terete-conica, articulis brevissimis, osculis quatuor lateralibus. *Müll. zool. dan.* 3. p. 52. t. 110. f. 4. 5.
Habitat in caprae hepatis superficie.
c. avium.
- pistaci. 38. T. corpore filiformi, articulis brevissimis, capite minutissimo. *Goeze Eingew.* p. 406.
Habitat copiosissima in pistaci brachyuri intestinis, ultra 14. pedes longa, capite rotundato, collo non articulato.
- corni- 39. T. articulis prioribus: infundibuliformibus, posterioribus ellipticis. *Goeze Eingew.* p. 337. t. 23. f. 7.
Habitat in cornicis intestinis, an propria species?
- serpen- 40. T. proboscide apice incrassata, basi dilatata, articulis tiformis, cuneiformibus dilatatis abbreviatis. *Batsch Bandw.* p. 176.

VERMES INTESTINA. *Tænia*.

Pall. n. nord. Beytr. I. p. 87. t. 3. f. 29. 30. *Tænia avium*:
Bloch Eingew. 4. p. 556.

α. *Tænia capite sessili*, proboscide pistillari apice convexa. *Goeze Eingew.* p. 391. a t. 31. f. 7-9.
Batsch Bandw. f. 96-98.

β. *Tænia collo non articulato*, proboscide pistillari apice subumbonata. *Goeze Eingew.* p. 391. b. t. 31. f. 10. II.
Batsch. Bandv. f. 99. 100.

γ. *Tænia capite sessili*, proboscide ventricoso pyriformis. *Goeze Eingew.* t. 31. f. 12. 13.
Batsch Bandv. f. 101. 102.

δ. *Tænia galbulæ*. *Goeze Eingew.* p. 393.

ε. *Tænia scolopacum*. *Goeze Eingew.* p. 394.

ζ. *Tænia fulicarum*. *Goeze Eingew.* p. 394.

η. *Tænia charadrii*. *Goeze Eingew.* p. 394.

θ. *Tænia vanelli*. *Goeze Eingew.* p. 394.

ι. *Tænia turturis*. *Goeze Eingew.* p. 394.
Docver. verm. p. 130.

κ. *Tænia turdorum*. *Goeze Eingew.* p. 393.

λ. *Tænia loxiæ*. *Blumenb. Naturg.* p. 412.

Habitat in Corvorum Corona, frugilegi, Cornicis, Monedulae, glandarii, Picæ, Orioli Gabulae, scolopacum, fulicarum quarundam, charadrii haemantopodis, vanelli, turturis, turdorum pilaris, viscivori, iliaci, musici, migratorii, saxatilis, Merulæ, & loxiæ curvirostræ intestinis, alba, ad pedis longitudinem se expandens, capite tenuissimo; an una species?

caryo- 41. *T. articulis utroque margine acutis prominentibus, ovariis inconspicuis*. *Müll. Naturf.* 14. p. 157.

Habitat in caryocatactis intestinis, an distincta a serpentiformi species?

crateri- 42. *T. articulis crateriformibus, collo longiore simplicissimo formis*. *proboscide sagittata*. *Goeze Eingew.* p. 396. t. 31. B. f. 16-18.

Batsch Bandw. p. 180. n. 16. f. 103. 104.

Habitat in pici majoris intestinis, fili tenuissimi forma, uncinoruni capitum corona simplici.

torqua- 43. *T. capitis annulo nigro, collo capillari, articulis brevibus latis: ultimo acuto*. *Bloch Eingew.* p. 16. t. 4. f. 11-13.

Habitat in anatis domesticæ pinguis intestinis, copiosissima, 8-9 pollices longa, lineam lata.

- colo- 44. T. alba. Müller Schr. der. berl. Naturf. I. p. 218.
pacis. *Habitat in rusticolæ intestinis; an hujus familie?*
- Filum. 45. T. capite rotundato, proboscide obtusa collo simplici,
articulis inconspicuis. Goeze Eingew. 393. n. 8. t. 32.
A. f. 1-7.
Werner verm. intest. p. 54. t. 3. f. 58-63.
Batsch Bandw. p. 163. n. 19. t. 86. 87.
*Habitat copiosissima in rusticolæ intestinis, filii crassitie,
vix ultra 7 pollices longa, 560 articulis tenuissimis,
collo simplici punctato.*
- infun- 46. T. articulis infundibuliformibus ferratis, proboscide cy-
dibuli- lindrica elongata. Goeze Eingew. p. 386. t. 31. A. f. 1-6.
formis. Bloch Eingew. p. 14. n. 8. t. 3. f. 3. 4. Tænia collo lon-
gissimo.
*Besch. berl. Naturf. 4. p. 555. t. 12. f. 3-5. Tænia
Infundibulum.*
Müller Naturf. 14. p. 179. Tænia anatis.
*Pall. n. nord. Beytr. I. p. 87. t. 3. f. 29. 30. Tænia
avium.*
Batsch Bandw. p. 172. n. 23. f. 31. 91-93. 164.
β) Tænia otidis. Goeze Eingew. p. 390.
*Habitat copiosissima in galli anatisque domesticæ, rarius
in feræ, anierisque, β) in tardæ intestinis, expansa
ad 13 pollices longa, osculis alternis, proboscidea
uncinis retroversis acutissimis.*
- sturni. 47. T. articulis longioribus, postremis utrinque tumidis, collo
breviore simplici, capite subquadragulo. Goeze Ein-
gew. p. 397. n. 31. B. f. 19-21.
*Habitat in sturni vulgaris intestinis, tenuissima, ad 5
pollices longa, articulis prioribus rugas subtilestes refe-
rentibus, medius ex plano ovali globosus.*
- passo- 48. T. crassiuscula, articulis brevissimis posterius sulco sim-
ris. briatis. Pall. n. nord. Beytr. I. p. 87. n. 10. t. 3. f. 29. 30.
*Habitat in fringillæ domesticæ & cannabinæ intestinis;
an vere distincta ab infundibuliformi?*

*Quorum spectant tæniæ in urogallo, tetricæ, calidri Squalo acanthia teste Mül-
lero Naturf. 22. p. 44. in farione, umbra p. 47. belone p. 48. reperte?
a Doeverti verm. intest. 151. in gobio nigro, ab aliis in cyprinis tringa
& albino notatae?*

- hirun- 49. T. capillaris, collo simplici, articulis truncato-infundibuliformibus. Goeze Eingew. p. 390.
dinis. *Habitat in hirundinibus urbicæ intestinis, vix visibilis, & pollicis longa.*

d. piscium.

- nodu- 50. T. articulis nodulosis medio punctatis, capite bilabiato: labio utroque aculeis tricuspidatis geminis. Goeze Eingew. p. 418. t. 34. f. 3-6.
lofa. *Pallas inf. viv. p. 37. n. 3. Tænia rugosa.*
elench. zooph. p. 413. n. 6. Tænia piscium.
n. nord. Beytr. I. p. 90. n. 12. t. 3. f. 32. & 32. C. & p. 105. t. 3. f. 34. Tænia nodulosa, & 2. p. 62.
Tænia lucii.

Bloch Eingew. p. 19. & Besch. berl. Naturf. 4. p. 541. t. 15. n. 4. & p. 547. Tænia tricuspidata.

Müll. zool. dan. prodr. 2655. & Naturf. 14. p. 138. 141-143. Tænia lucii.

Batsch Bandw. p. 148. n. 15. f. 76-79. Tænia nodosa.

β. Tænia cystica. Pall. n. nord. Beytr. I. p. 101. t. 3. f. 33. Tænia hydatidis. Bloch Besch. berl. Naturf. 4. p. 547. n. 3.

Habitat in lucii, percæ fluvialis, & cernuæ anguilæ scalaris, leucisci intestinis, β) in percæ fluvialis hepatis, cystidi inclusa, articulis numerosis, medio paullum elevatis, ad latera depresso: & subcrenatis, posterioribus paulo latioribus.

†† capite inermi.

a. hominis.

- lata. 3. T. candida, articulis brevissimis medio nodosis: osculo solitario. Pall. elench. zooph. p. 110. n. 4. infest. viv. p. 35. n. 2. nord. Beytr. I. p. 64. t. 3. f. 17. 18. *Syst. nat. XII. 2. p. 1324. n. 5. Fn. suec. 2263. Amæn. acad. 2. p. 80. t. 1. f. 3. Tænia (lata) osculis laterilibus solitariis.*
Plater prax. c. 14. Tænia prima.
Bonnet, mem. présent. de Paris I. p. 478. t. 15. 16. journal de phys. 1777. p. 262.
Bloch. Eingew. p. 17. n. 16.
Goeze Eingew. p. 298. t. 21. f. 8.
Müll. Naturf. 14. p. 160.
Gleichen Besch. berl. Naturf. 4. p. 204. t. 6. f. 1-9.
Batsch Bandw. p. 111. n. 2. f. 51: 66.

8) *Tænia tenella*. *Pall. n. nord. Beytr. p. 69. t. 2. f. 19. A. B.*
Habitat in hominis intestinis, in Helvetia & Russia aliis
frequentior, facilius, ricini potissimum oleo, pellenda,
ab 18-120 pedes longa, vulgari magis opaca, crassior,
latrior, ut dimidium pollicem interdum superet, articulis
transversim subtilissime striatis, sesquilineam longitudi-
nine rarissime superantibus, ovarii petalorum rose in
modum dispositis.

Dentata. 51. T. capite acuminato sessili, articulis majoribus transverse
striatis, omnibus dilatatis brevioribus: osculo in mar-
ginis lateralis utriusque medio elatiore. Batsch Bandw.
p. 184. n. 29. f. 110-113.

Werner verm. intest. p. 49. t. 3. f. 47-57. Tænia vul-
garis.

Habitat in hominis intestinis, elongata, angusta, 10-12
pedes longa, antrorsum latior, folio crassior, & tena-
cior, ovarii nudo oculo non conspicuis, capite subius
cordis truncata formam referente.

b. mammalium.

phocæ. 52. T. capite longo tetragono: auroculis quatuor. O. Fabr.
fn. groenl. p. 316. n. 296. O Müll. Naturf. 14. p. 179.
Habitat in phocæ barbatæ intestino recto, fastida, flava,
gregaria, $3\frac{1}{2}$ pedes longa, 2 lineas lata, articulis 400
& ultra, anterioribus confertissimis minutissimis, capite
colli angustioris interventu cum trunco connexo; an-
hujus familiæ?

bacil-
laris. 53. T. capite rotundato: proboscide pyriformi, articulis an-
gustissimis bacilos sibi appositos æmulantibus. Goeze
Eingew. p. 359. t. 27. f. 4: 5.
Batsch Bandw. p. 191. n. 34. f. 122. 123.
Habitat in talpæ intestinis, fili tenuissimi crassitie, collo
non articulato.

pecti-
nata. 54. T. oblongo-lanceolata, anterius in rostrum breve coarcta-
ta, collo vix conspicuo. Batsch Bandw. p. 168. n. 21.
f. 89. 168.
Goeze Eingew. p. 363. t. 27. f. 7-13. Tænia articulis
latis pectiniformibus, apice acutissimo, capite inermi
quadrivesiculato.

Pailas n. nord. Beytr. I. p. 75. n. 7. t. 3. f. 25-27.
Tænia acutissima.

Limburg. ad. angl. 56. t. 6. f. 1.

Mmm mmm mmm 4.

Red. anim. viv. n. an. viv. p. 74.

β) *Tænia cuniculi. Goeze Eingew. p. 363.*

Mariques journ. de phys. Sept. 1778. p. 229. t. 2. f. 3.

Buff. hist. nat. 12. t. 13. p. 103.

γ) *Tænia marmotæ. Blumenb. Naturg. p. 412.*

Habitat in leporis, β) cuniculi, γ) marmotæ intestinis & ventriculo, gregaria, lancolata proxime affinis, vix ultra 6 pollices longa, plus quam 200 articulis constans.

Ovina. 55. T. longissima, articulis angustissimis brevibus utrinque rotundatis: valis lateralibus pellicidi distinctis osculique geminis marginalibus oppositis.

Bloch Eingew. p. 16. n. 14. t. 5. f. 1-5. Tænia vasorum nutriciis distinctis.

Goeze Eingew. p. 369. n. 10. t. 28. f. 1-12.

Batsch Bandw. p. 182. n. 28. f. 109. 162.

Rautin des malad. occas. par les var. de l'air. p. 444.

δ) *Tænia bovinæ? Cleric. lumbr. p. 74.*

Habitat in ovium, præcipue lactentium, intestinis, alata, articulis sibi prioribus, osculis marginalibus oppositis, ovis obtuse conicis, canalibus lateralibus luculentis, fine anteriori capillari, insigni fertilitate & longitudine, quæ sapius 20, aliquando 200 pedes. affequitur, distincta.

Equinæ. 56. T. capita quadrangulo: foraminibus quatuor, articulis dilatatis brevissimis: osculis inconspicuis. Müller Naturf. 14. p. 158-179.

Buff. hist. nat. 12. tom. 7. p. 444.

Pall. elench. zool. p. 411. n. nord. Beytr. I. p. 71. n. 6. t. 3. f. 20.

Goeze Eingew. p. 353. t. 25. B. f. 11-13.

Batsch Bandw. p. 201. n. 42. f. 137. 138.

Habitat in equi ventriculo, ad 10 pollices longa, articulis lamellarum aut articulorum melolonthæ inßar superficie sua sibi incumbentibus, capite magno, lobis membranaceis parti posteriori utrinque 2 appositis acuto manifeste distincta.

Equis. 57. T. Pall. spic. zool. p. 22. t. 3. f. 13.

Habitat in sue æthiopico, an propria species hujus familiæ?

c. avium.

Globifer. 58. T. articulis prioribus rhombis, mediis ovalibus & pyriformibus, posterioribus globosis petiolatis.

Goeze Eingew. p. 402. t. 32. A. f. 13-16. Tænia brachium globulosum.

Bloch Eingew. p. 14. t. 3. f. 5-7. *Tænia cylindracea.*
Batsch Bandw. p. 191. f. 119-121. & p. 199. f. 134-136.
Habitat in falconum, Buteonis & Lanarii juniorum etiam turdi viscivori intestinis, ad 12 pollices longa, fine anteriori capillari: proboscide brevi, obtusa.

Perlata. 59. T. capite quadrangulari, articulis quadratis acute marginatis: nodo medio albo margaritæ simili.

Goeze Eingew. p. 403. t. 32. B. f. 17-23.

Batsch Bandw. p. 146. n. 14. f. 73-75.

Habitat in buteonis intestinis, tenuibus pedem longa, margaritæ colore, per totam longitudinem nodosa, articulis brevibus, collo aut simplici aut nullo.

Flagel- 60. T. parte posteriori dilatata subito in capillarem anteriorem lum.

Goeze Eingew. p. 406. t. 32. B. f. 28-31.

Batsch Bandw. p. 170. n. 22. f. 90. 169.

Habitat in milvi intestinis, 2 circiter pollices longa, proboscide brevi, lata, truncato-conica.

cande- 61. T. articulis oblongis: mediis subcampanulatis; pictura labraria. pellucente margini parallela, fine anteriori capillari.

Goeze Eingew. p. 405. t. 32. B. f. 24-27.

Batsch Bandw. p. 144. n. 13. f. 70-72.

Habitat in aluconis intestinis, collo longissimo subtilissime punctato, articulis collo proxinis obtusangulis, sequentibus pictura candelabrum referentibus.

crenata 62. T. capite obtuso, collo longissimo, articulis crenatis: latitudine longitudinem sexies superante.

Goeze Eingew. p. 395. t. 31. B. f. 14. 15.

Batsch Bandw. p. 187. n. 30. f. 114. 115.

Habitat in pici majoris intestinis, collo punctato.

lanceo- 63. T. lanceolato - oblonga anteriusum æquabiliter decrescens, capite papillæ simili, articulis brevissimis.

Bloch berl. Naturf. Besch. 4. p. 553. n. 10. *Tænia an-*

seris. *Eingew.* p. 9. t. 1. f. 5. 6.

Müll. Naturf. 18. p. 27.

Goeze Eingew. p. 377. t. 29. f. 3-12.

Pallas n. nord. Beytr. 1. p. 78. t. 3. f. 26.

Frisch misc. Berol. 1727. p. 42.

Batsch Bandw. p. 165. n. 20. f. 88. 167.

β) *Tænia lanceolata nodosa.* *Bloch Eingew.* p. 10. t. 1. f. 9;

Habitat in anseris domestici, β) in merganseris & abbelli intestinis, ad 10 pollices longa, modo pura sit, albiflava, tenera.

setigera. 90. T. corpore ad unum latus setoso : setis tenuissimis brevissimis cylindricis truncatis. *Froelich Naturf.* 24. p. 106. t. 4. f. 1-7.

Habitat in anseris domestici pascentis intestinis, tenuibus ad confinia crassorum.

anseris. 64. T. minuta angustissima, fine anteriori capillari. *Goeze Eingew.* p. 380. t. 29. f. 1.
Habitat in anseris domestici intestinis, an distincta a trilineata?

anatis. 65. T. capite obtuso, articulis subtriangulis : osculis lateralibus sub margine. *Müll. Naturf.* 14. p. 156. 179.

fasciolaris. α) T. Pall. n. nord. *Beytr.* 1. p. 85. t. 2. f. 23;
lineata. β) T. Bloch *Eingew.* p. 12. n. 5. *Besch. berl. Naturf.* 4. p. 555. t. 14. f. 5-7.

Batsch Bandw. p. 196. n. 38. f. 130. *Tænia trilineata.*

Malleus. γ) T. Goeze *Eingew.* p. 383. t. 30. f. 1-3.

avium. δ) T. Pall. n. nord. *Beytr.* p. 87. t. 3. f. 29.

Habitat in anatum intestinis, α) 6, β) 4, γ) ad 17, pollices longa, suis lævis, γ) anterius malleolata.

lævis. 66. T. capite cylindrico, collo tenuissimo longo, articulorum latitudine longitudinem sexies superante. *Bloch Eingew.* p. 15. t. 4. f. 4-6.

Batsch Bandw. p. 194. n. 36. f. 126. 127.

Habitat in anatum, clangulæ & clypeatæ intestinis, articulis nudo oculo non conspicuis.

cuneata. 67. T. capite acuminato sessili, articulis cuneatis. *Batsch Bandw.* p. 190. n. 32. f. 117. 118.

Bloch Eingew. p. 13. t. 3. f. 1. 2. *Tænia articulis conoides.*

Habitat in tardæ, anatumque fulicæ & clangulæ intestinis, 1-2 pedes longa, proboscide brevi.

alæ. 68. T. articulis viminalibus, fine anteriore tenuiore cylindrico. *O. Fabr. fn. groenl.* p. 318. n. 297. b.

Habitat gregaria in alæ picae iestinis, albida, ad 9 pollices longa, posterius latior, articulis circiter 18¹/2 singulis quinque ad marginem papilla notatis.

- tardæ. 69. T. teretiuscula, articulis cordatis, fine anteriori filiformi acuminato. *O. Fabr. fn. groenl.* p. 319. n. 298.
Habitat in alcæ picæ intestinis, albicans, vix ultra 3 pollices longa, articulis circiter 87, margine utrinque papilla notatis.

- tardæ. 70. T. articulis rhombis: lineis in medio aliquot transversis, ovariisque in margine posteriori tumido.
Bloch Eingew. p. 12. t. 2. f. 5-9. *Tænia villosa.*
Werner verm. intest. p. 34. t. 3. f. 58-63.
Batsch Bandw. p. 163. n. 19. f. 86. 87. *Tænia fimbriata.*
Habitat copiosissima in tardæ intestinis, crinis equinæ crassissime, ad 4 pedes longa, capite oblongo, collo capillari, articulis circiter 32000 brevibus, latis, tenellis, altero latere denticulato, altero ovario, tanquam membrana articulo ipso duplo latiore, acuto.

- Linea. 71. T. tenuissima, collo simplici, proboscide subpetiolata capiteque globosis, articulis brevibus dilatatis: angulo posteriore prominente acuto. *Goeze Eingew.* p. 399. t. 32. A. f. 8-12.
Batsch. Bandw. p. 194. n. 37. f. 28. 128. 129.
Red. opusc. 3. p. 219?
Habitat numerosissima in perdicum intestinis, ad 5 lineas longa, in hac familia minima.

- macu-
lata. 72. T. tenuis pellucida marginè serrata, articulis brevissimis dilatatis: eminentia media nigra & angulo posteriore prominente acuto.
Bloch Eingew. p. 14. t. 4. f. 1-3. *Tænia tenuis nodis instrueta.*
Batsch. Bandw. p. 193. n. 35. f. 124. 125.
Habitat in turdi iliæi intestinis, angustissima, alba,

d. reptilium

- bufonis. 73. T. anterius subteres, posterius filiformis, capite continuo obtuso, articulis membrana tenella obvolutis cylindricis oblongis: margine argenteo.
Goeze Eingew. p. 425. t. 35. f. 1-6. *Tænia dispar.*
Batsch Bandw. 216. n. 50. f. 155-163. 165.
Habitat in bufonis & salamandræ intestinis, alba, 6 pollices circiter longa, opaca.

e. *piscium.*

- anguil- 74. T. capite sessili distincto crassiore , articulis oblongis vagatorulosis : osculis duobus in uno latere. *Batsch. Bandw.* p. 211. n. 46. f. 148-150.
Besch. berl. Naturj. 3. p. 490. *Goeze Eingew.* p. 414 t. 33. f. 6-8. *Tænia claviceps.*
Müll. Schr. berl. Naturf. 1. p. 208. *Naturf.* 14. p. 156.
Doever. verm. p. 130.
Red. an. viv. n. an. viv. p. 86. t. 14. f. 4. *opus.* 3. p. 252. t. 18. f. 4.
Habitat in anguillæ iutestinis, ad 4 pedes longa, capite anterius truncato, articulis 8 proximis longiore, articulis circiter 600, prioribus subquadratis, latitudine longitudinem duplo, posterioribus orbicularibus : latitudine longitudinem octuplo superante.
- rugosa. 75. T. ferrata capite obtuse conico : papillis binis utrinque ad apicem usque adnatis, articulis brevissimis dilatatis. *Batsch Bandw.* p. 208. n. 44. f. 142-145.
Goeze Eingew. 410. t. 33. f. 1-5.
Red. an. viv. n. an. viv. p. 91. t. 15. f. 10. *op.* 3. p. 245. t. 21. f. 5.
Struffenf. act. Stockh. 35. n. 2. p. 23.
Habitat in Gadorum, Mustelæ & Lotæ intestinalis cæcis, copiosissima, tripedalis, collo sub cylindrico articulato, in spiritu vini fuscescens, articulis posterioribus ovorum plenis, capitum forma externa, totoque corporis habitu tetragonocephalæ affinis, an vere distincta?
- scorpii. 76. T. capite carinato , osculis lateralibus divergentibus , articulis inæqualibus. *Müll. zool. dan.* 2. t. 44. f. 1-7. rar. 2. p. 13. nov. *act. soc. dan.* 1. p. 61-151. *Naturf.* 14. p. 144. 179.
Müll. zool. dan. prodr. 2656. *O Fabr. fn. groenl.* p. 319. n. 299. *Tænia* osculis lateralibus , ultimo tenuioris extremitatis articulo tetragono.
Leeuwenh. arc. nat. p. 376. *Vermes ex rhombi intestinis.*
 g) Tænia pleuronectis maximi. *Müll. Naturf.* p. 145-151. 18. p. 25.
Habitat in Cotti Scorpii & pleuronectis maximi ventriculo & intestinis, capitum forma nivatili, corporis marginé quasi crenato, linea utrinque longitudinali, cauda obtusa integra, articulorum anteriorum osculo nullo.

- Percæ.** 77. *T. capite bulboso, ocellis quatuor, articulis quadrangularis : osculis marginalibus.* Müll. zool. dan. 2. t. 44. f. 1-4. rar. 2. p. 11. nov. act. soc. dan. 1. p. 59. 64. 65. Müll. Naturf. 14. p. 152. 153. 179. Schr. der berl. Naturf. 1. p. 206-209.
Pall. n. nord. Beytr. 1. p. 102.
- 80) *Tænia lineolis lateralibus nullis.* Müll. zool. dan. rar. 2. p. 12.
Goeze Eingew. p. 416. t. 33. f. 11-14. *Tænia alternatim transverse lineata, articulis quadrangularibus, quadriverrucoso.*
Batsch Bandw. p. 157. n. 16. f. 80-82. *Tænia siluri.*
Habitat rario in percæ marinæ, & in glanidis intestinis, linea utrinque longitudinali candida, articulis crassioribus & planioribus, quam in congeneribus, capite obtuso insequentibus articulis angustiore.
- Erythri-** 78. *T. latiflma, capite brevi tetragono ostolobato, ore antico punctato.* O. Fabr. fn. groenl. p. 317. n. 297.
Habitat in percæ norwegicæ intestinis, vivax & in aqua quidem marina vita tenax, 6 circiter pedes longa, 4 lineas lata, laetitia, intestino ex griseo violaceo, articulis margine papillari retrorsum tendente utrinque terminatis, anali margine decemferrato.
- Cernuæ.** 79. *T. Pallas elench. zooph. p. 414.*
Habitat in percæ cernuæ intestinis, vix propria species.
- Solidæ.** 80. *T. osculis sub margine articulorum : alterius extremitatis articulo acuto.* Müll. zool. dan. prodr. 2657. Naturf. 18. p. 24-26. t. 3. f. 1-5.
Linn. it. g. & h. p. 268. Fasciola. hepatica.
Pall. inj. viv. p. 135. elench. zooph. p. 410. β. n. nord. Beytr. 1. p. 76. 78. t. 3. f. 27.
O. Fabr. fn. groenl. p. 320. n. 300. Batsch. Bandw. p. 224. n. 52. f. 170. Tænia. gasterostei.
Habitat in gasterostei aculeati ventre, quem tumidum reddit, Sæpius solitaria albissima, congeneribus durior & solidior, utrinque obtuse marginata, articulis brevissimis, linea utrinque longitudinali excavata. Zoega.
- Gasterostei.** 81. *T. tenuissima, cauda obtusa.* Müll. Naturf. 18. p. 28. t. 3. f. 6. 7.
Habitat in gasterostei aculeati intestinis, minima articulis nudo oculo vix discernendis.

filuri. 82. *T. crenata*, capite continuo, articulis brevibus parallelepipedis: osculis binis bimarginatis.

Goeze Eingew. p. 415. t. 33. f. 9. 10. *Tænia osculata*.
Batsch Bandw. p. 209. n. 45. f. 146. 147.

Habitat in glanidis intestinis crassis, minus copiosa, nodulosa minor, distincto in proboscide retractili ore, articulis minus evidenteribus.

Salmo- 83. *T. capite globoso mutabili, osculis articulisque annularibus inconspicuis. Müll. Naturf. 14. p. 179. 202. 18. p. 22. nov. ad. dan. I. p. 68.*

Goeze Eingew. p. 417. t. 34. f. 1. 2. *Tænia Proboscis suilla.*

Blosch Eingew. p. 15. t. 4. f. 7-10. *Tænia capite truncata*.
Besch. berl. Naturf. 4. p. 545. t. 10. f. 8. 9. *Tænia crassa*.

Batsch Bandw. p. 212. n. 47. f. 151. 152. *Tænia proboscidea*.
β) *Tænia tetragonoceps. Pall. n. nord. Beytr. I. p. 87. t. 3. f. 31. A-D.*

Batsch Bandw. p. 204. n. 43. f. 139-141. 175.

Habitat in salmonis salaris & ariocis ventriculo ac intestinis, a 2 lineis ad 3 pedem longa, capite ovali articulum quinquies superante, corpore teretiusculo, articulis posterioribus sensim angustioribus ultimo reliquis quinque longiore.

Froeli- 91. *T. capite cum collo longissimo tenuissimo inarticulato continuo, ovariis dendaticis linea lateraliter cinctis. Froelich*

Naturf. 24. p. 124. t. 4. f. 20. 21.

Habitat in Salmonis Wertmanni intestino duodeno.

Cuinam hujus sectionis generi adscribendi sunt vermes a Redi in aquilæ pedibus an. viv. n. an. viv. p. 83. op. 3. p. 225. in lari œsophago an. viv. p. 83. op. 3. p. 226. t. 21. f. 10. in testudinibus variisque ratiæ squalique speciebus an. viv. p. 110. 111. 107. op. 3. p. 296. 285. in gadorum intestinis an. viv. p. 90. t. 15. f. 6. opusc. 2. p. 243. t. 21. f. 2. 3. 4. in pisce tam baro an. viv. p. 92. t. 15. f. 1-4. op. 3. p. 250. t. 20. f. 1-4. in cancri ovariis an. viv. p. 101. t. 17. f. 1. op. 3. p. 270. t. 24. f. e. in ascidia specie, (qui quidem hoc spedit) an. viv. p. 105. t. 15. f. 7. op. 3. p. 276. t. 21. f. 7. in aphrodisiæ aculeata anim. viv. p. 105. t. 17. f. 5. op. 3. p. 287. t. 25. f. 4. in sepia an. viv. p. 95. t. 16. f. 6. op. 3. p. 255. t. 23. f. 1. notati? cuinam, si quidem struda sit violentia vomitus & habitaculo inconfueto nequaquam deformata species vermis a b. Scopoli notatus & delic. insubr. p. 1. t. 20. descriptus & delineatus: erat ille per vomitum in semina reiectus, in os amplum supra verrucosum exentiibus dentibus 2, quorum alter in veste an. ovi gallinacei magnitudine, alter in processum capitis vermiformem corporis reliqui longitudine terminatur? An proprium genus echinorhyncha proximum pleurorynchus corpore filiformi, capite rotundo, proboscide longa inermis, laterali distinditus, a Cl. Nan. in flurionis intestinis repertus, & Schr. berl. Naturf. 7. p. 471. descriptus & t. 7. delineatus?

- Rectan-84. T. articulis transversis margine rotundatis, ductu pellucido in medio ad angulum subrectum flexo. *Batsch Bandw. p. 159. n. 17. f. 83. 174.*
Bloch Eingew. p. II. n. 3. t. I. f. 7. 8.
Habitat in Cyprini Barbi intestinis, pollice vix longior, alba, tenuis, semipellucida, fine anteriori acutiore.

- torulosa.85. T. elongata torulosa, capite obtuso, collo crenato, articulis orbiculatis: osculis &eminis disformibus. *Batsch Bandw. p. 181. n. 27. f. 105-108.*
Bloch Eingew p. II. n. 4. t. 2. f. 1-4. 10. II. Tænia articulis rotundis.
Habitat in Cyprino Jese, ad 2 pedes longa, capite plano, anterius truncato, collo brevi, articulis brevibus crassis.

- laticeps.86. T. subtiliter transverse rugosa, parte posteriori crassiore: fine obtuso anterius lobo contractili crenato terminata.
Pall. n. nord. Beytr. p. 106. n. 16. t. 3. f. 35.
Habitat copiosa in bramae intestinis, minuta, pollicem circiter longa, molliuscula.

353. FURIA. *Corpus lineare, æquale, filiforme, utrinque ciliatum aculeorum reflexorum corpori appressorum serie simplici.*

- infernalis. I. F. Fn. suec. 2070. * Amæn. acad. 3. p. 322.
Solander nov. act. Upsal. I. n. 6.
Pallas nord. Beytr. I. p. 113.
Habitat in Bathniæ paludibus vastis cespitosis, unguis longitudine, carneæ vel ochroleuca, apice scæpius nigra, carices crebro fruticesque ascendens, ventoque per aërem ducta hominuni equorumque partes nudas non perpendiculariter sitas per cutem intrans, sensationem primum acupunduram mentientem, excitans, locoque, per quem introgressa est, punctum nigrum & vehementem pruritum, mox dolorem atrocem, maculam rubram, & gangrenam a punto illo nigro undequaque progredientem, febrem inflammatoriani, frequenibus animi deliquiis & deliriis stipatum, altero, aliquando primo die, imo paucas post horas morte terminatani, nisi cito citius,

Furia & Myxines genus inter utramque sectionem hujus ordinis ambigunt.

*quæ summa difficultas est, vermis extrahatur, aut si
jam profundius penetraverit, caro, quam ferri exscin-
datur, oleumque, ut fertur, betulæ enpyreuniaticum
infundatur, vel lac coagulatum caseusve imponatur.*

281. MYXINE. *Corpus teres subtus carinatum
pinna adiposa.*

Os terminale cirrosum.

*Maxillæ binæ pinnatæ: dentibus
plurimis acutis in fauce.*

Dens superior solitarius acutus.

glutino- I. M. Fn. suec. 2086. Mus. Ad. Fr. I. p. 91. t. 8. f. 4.
fa. Stroem spondni. I. p. 287. ad. nidros. 2. p. 250. t. 3.
Müll. zool. dan. prædr. 2755. O. Fabr. f. groenl. p. 344.
n. 334.

Helv. it. I. p. 100.

*Will. ichth. 107. Raj. pîsc. 36. Lampetra cæca, oculis
carens.*

*Habitat in Oceano europæo, pîsces intrans, devorans;
aquani in gluten vertens.*

275. GORDIUS. *Corpus teres æquale læve.*

aquaticus. I. G. filiformis fuscus.

Syst. nat. XII. p. 2. 1052. Fn. suec. 2068. Gordius palli-
dus, extremitatibus nigris.*

It. goth. 282. Gordius.

Müll. hist. verm. I. 2. p. 30: n. 161. Gordius Seta.

*Gefn. ag. 463. Vitulus aquaticus, Seta, amphibæta
aquatica.*

Aldr. inf. 720. t. 765. Seta f. vitulus aquaticus.

Jonst. inf. t. 25. Meerwijn.

Klein tent. herp. p. 68. Lumbricus aquaticus. 4.

Planck. conch. app. c. 22. t. 5. f. F. Seta palustris.

Hill. hist. anim. p. 14. Chætia.

*Habitat in vivis, aliisque aquis fundi potissimum argilla-
cei, quem, uti pîscis aquam tranat, scaturiginum plu-
rium audor, opacus, sepe in spiram varie se contor-
quens, interdum pallidus, rarius altero fine parumper
acuminatus, morsura paronychiam excitare, opio jæ-
licissime sanandam fertur in Waldai pîsces occidere,
honiñibus non perinde infestus.*

- argilla-* 2. *G. flavescentis totus.* *Fn. suec. 2059.**
ceus. *Habitat in argilla, proprio quasi elemento, quam ubique*
tranat, adeoque ubi illa foditur, frequens; vix distinctus
ab aquatico.
- Filum.* 3. *G. filiformis candidus.* *Müll. hist. verm. I. 2. p. 31. n. 162.*
Habitat in cuniculis, in cortice tubi abiegni, olim aquae
duci infervientis, excavatis, subtilissimus, altero fine
subattenuatus, hyalinus.
- Lacteus.* 4. *G. totus albus opacus.* *Müll. hist. verm. I. 2. p. 32. n. 163.*
Habitat per myriades à Junio ad Septembrem in aquis, in
quibus fagifolia pubescunt, tactus momento citius se con-
trahens, rursumque expandens.
- arenarius.* 5. *G. fulvus obtusus.* *Müll. hist. verm. I. 2. p. 33.*
Habitat in fundo sabuloso sinus Christianensis Norwegiae.

277. LUMBRICUS. *Corpus teres annulatum sa-*
pius cingulo elevato genita-
lium receptaculo cinctum,
aculeis ut plurimum condi-
tis longitudinaliter exaspera-
rum, poro laterali infra-
cum.

- terrestris.* 1. *L. ruber octofarium aculeatus.* *Müll. hist. verm. I. 2. p.*
24. n. 157.
Syst. nat. XII. 2. p. 1076. n. 1. Fn. suec. 2073. *Lumbricus*
trifarium retrosum aculeatus.
Hill. hist. anim. p. 15. *Lumbricus lœvis.*
Aldrov. ins. 693. *Lumbricus terrestris.*
Raj. ins. 2. *Lumbricus terrestris minor.*
Sloan. jam. 2. p. 189. *Lumbricus terrestris minor rubicun-*
dus.
Petiv. gazoph. t. 130. f. 6.
Red. exper. 4. t. 15. f. 1.
Paulini de lumbr. terr. Francof. 1703.
Lesser theolog. des ins. par Lyonn. f. I. 2. 3.
Vandelli dissert. 3. Patau. 1748. p. 98. 147. t. 4.
Klein tent. herpetol. p. 58.
Murrey de lumbric. sét. observ. t. 2. f. 1-5.

Nnn nnn nnn

VERMES INTESTINA. *Lumbricus*.

Phelfam hist. ascarid. t. 2. f. 4. 5.

Bonnet insectol. 2. t. 4.

Wichmann. Besch. berl. naturf. Fr. 3. p. 231.

β) *Lumbricus major. Raj. inf.* I.

Habitat in ligno putrido & humio, quam bibulam reddit, coquledones plantarum consumens, nocte pro copulis exiens, a nasua, talpa, erinaceo, gallina, creoce, effosus fuligine, vino pellendus, 6-8. polices longus 117-133. segmentis constatus, singulis quatuor paribus acutiorum oculo nudo non conspicuorum armatis, expansus utrinque convexus, contractus subtus planiusculus, canali rubro totum corpus percurrente, cingulo rugoso, poroso utrinque tumido subtus planiusculo, ore infra proboscis dem positio.

marinus. 2. *L. papillis dorsalibus geminatis setigeris. It. wgoth.* 189.
t. 3. f. 6. *It. scan.* 315. *Fn. suec.* 2074.*

Bell. aquat. 444. *Lumbricus marinus.*

Pallas nov. ad. Petrop. 2. p. 233. t. 1. f. 19. 29. *Nereis lumbricoides.*

Habuit in maris Europae fundo sub arena, nonne potius ad nereides relegandus?

vermicularis. 2. *L. albus bifariam aculeatus. Müll hist. verm.* I. p. 26. n. 158.
Habitat haud infrequens in truncis humentibus ac inter folia madida, in humidiusculis commode repens, in siccis valde se torquens, glaber, nitidus.

variegatus. 4. *L. rufus maculatus sexfariam aculeatus. Müll. hist. vermtus.*
I. 2. p. 26. n. 159.
Bonnet, vers d'eau douce. t. 1. f. 1-5.

Habitat in alnetorum & nemorum limo aquoso, pulcherimus, rubro colore tessilis fascis minimis interstincto, linea sanguinea media totum corpus percurrente, facilissime redintegrans, & sponte in frustula diffiliens, integrum animal referentia.

tubifex. 5. *L. rufescens bifariam aculeatus. Müller. hist. verm.* I. 2.
p. 27. n. 160. *zool. dan.* 3. p. 4. t. 84. f. 1-3.
Bonnet, vers d'eau douce. t. 3. f. 9. 10.

Trembley, hist. des polyp. t. 7. f. 2.
β) *L. feta anterius utrinque porrecta. Müll. hist. verm.* I. p. 27.

γ) *Schäffer Armpolypen.* 1755. t. f. 1-3?

Habitat in rivulorum fundo, pellecidus, simplicissimus, truncatus intestines obscuro, ex terra tu-

bulum perpendicularēm erectū sibi singens, quem inhabitat.

Cineatus. 6. L. albus, linea longitudinali rubra. *Müll. hist. verm. I. 2. p. 29.*

Müller v. Würm. p. 110. 118. t. 3. f. 4. 5.

Habitat frequentissimus ad littora maris Baltici, copiosissimus inter fucos, pellucidus setis brevissimis, arteria dorsale, vena caput versus bifida, ovario albo Maio pleno.

Ciliatus. 7. L. rufus ciliis annulatus. *Müll. hist. verm. I. 2. p. 30.*

Habitat in Norwegiæ maritimis, glaber, segmentis ultimis 40, intersectionibus fasciculis 4 setarum brevissimarum armatis.

Tubicola. 8. L. albus, macula segmentorum dorsali rubra. *Müll. zool. dan. prodr. 2633. zool. dan. rar. 2. t. 75.*

Habitat rarus in fundo argillaceo sinum Norwegiæ, tubulum, teretem, membranaceum, limo obducum, se uncia longiorem inhabitans, segmentis corporis 27, intersectionibus utrinque 2 setis armatis, intestino nigro totum corpus percurrente.

Echiurus. 9. L. seriatim granulosus, posterius obtuse truncatus, duplique setarum corona cinctus. *Pall. miscell. zool. p. 146. t. 11. f. 1-6. spicil. zool. 10. p. 3. t. 1. f. 1-5.*

Habitat in mari fundo arenoso, frequens, hieme potissimum, in littore belgico, gadi morrhuae esca, digitii medii magnitudine, lingua carnosa, crassifuscula, scaphoidea, ex griseo albido : visceribus fulvis.

Thalasse-ma. 10. L. striatus sordide ruber rutilo-maculatus, subtus griseus, ore infundibulo intus rugoso ad marginem plicato cincto.

Pall. misc. zool. p. 147. t. 11. f. 9. spicil. zool. 10: p. 8. t. 1. f. 6.

Habitat in Cornubiæ littore profunde inter rimas rupium submarinarum, glaber, mucosus, altero fine crassior, altero subacuminatus, ore supero : infundibulo croceo.

edulis. 11. L. ex albido carneus posterius subclavatus anterius dilatatus papillosum, ore terminali papillari ruga villosissima cincto. *Pall. spic. zool. 10. p. 10. t. 1. f. 7.*

Camell. act. angl. 26. n. 318. p. 248. Tambiloc?

Habitat in littore sabulofo insularum Oceani indici, sere pedalis, pennæ anserinæ crassitie, ad pedem vel sesquipedali.

dem intra arenam latens, pervio ad superficiem canaliculam prodens, Sinenibus esculentus propriaque arte captus nonnullis inter partem villosam finemque posteriorem 278 stria annulari diremitis, sine posteriori bulboso papilla gemina, anteriori carneis confertis per series transversas digestis obsezzo.

oxyurus. 12. L. ex livescente albidus fine posteriore acutissimus, anteriore obtusus, rostro tereti latescente retractili & exsertili. *Pall. miscell. zool. p. 146. 147. t. 11. f. 7. 8. spicil. zool. 10. p. 16.*

Habitat in Sussexiæ littore, subesquipolllicaris, striis tenerrimis annulosus, rostro truncato subtiliter granuloso, poro vix conspicuo ad basin rostri sito.

fragilis. 13. L. ruber, verrucis lateralibus fissis setis, fasciculatis. *Müll. zool. dan. prodr. 2611. zool. dan. rar. descr. I. p. 45. zool. dan. I. p. 73. t. 22. f. 1-3.*

Habitat in fundo limoso sinus Norwegiæ Drotbacenensis, terrestris facie, nereidibus affinis at aculeis manifestis, annulis ultra 500. levibus fragillimis, capite, conico ore huic proximo rugoso.

armiger. 14. L. ruber, lamellis ventris lanceolatis, geminatis, anterius nullis. *Müll. zool. dan. prodr. 2610. zool. dan. rar. I. p. 46. zool. dan. I. p. 73. n. 29. t. 22. f. 4. 5.*

Habitat in fundo impatio sinus marini insularum Teist oceani Norwegici, nereidibus proximus, 20 lineas longus, annulis ultra 100 constans.

cirratus. 15. C. cirris longissimis. *Stroem. act. Nidr. 4. t. 14. f. 7.*
Habitat in mari Norwegico, cirris annulatis 3-24. per totum corpus dispersis.

fabellaris. 16. L. articulatus, altero fine truncatus, intersectionibus articulorum incrassatis biaculeatis. *Müll. zool. dan. 3. p. 37. t. 104. f. 5.*

Habitat in sinu Norwegiæ Drotbacenensi, an forte cum tubicola diffundi generis?

278. PLANARIA. *Corpus gelatinosum planiusculum : poro ventrali duplice ; ore terminali.*

* *oculis nullis.*

Flaginalis. 1. Pl. ovata fusca anterius pallida. Müll. *verm.* I. 2. p. 53. n. 178.

Pallas inf. viv. intra viv. p. 272. Fasciola ovata plana subpetiolata aquatica.

Habitat in flaguis, opacus, supra & subtus æqualis antrorum subacuminatus pellucens : maculis binis laetis : ovis numerosis albidis ad latera congettis.

nigra. 2. Pl. oblonga nigra, anterius truncata. Müll. *hist. verm.* I. 2. p. 54. n. 179. *zool. dan.* 3. p. 48. t. 109. f. 3. 4.
Habitat in rivo, subtus tota plana, posteriora versus poris duobus albidis secundum longitudinem dispositis.

brunnea. 3. Pl. oblonga brunnea : linea longitudinali nigra. Müll. *hist. verm.* I. 2. p. 54. n. 180.
Habitat - - - nigræ proxime affinis.

ciliata. 4. Pl. elongata depressa ciliis cincta. Müll. *hist. verm.* I. 2. p. 55. n. 181.
Joblot. microsc. I. 2. p. 66. t. 8. f. 52-II. & t. 10. f. 13. ? Solea aurea & parva.
Habitat in aqua sub lenna, grisea, e granulis quasi constata, ciliis mobilibus, organo antico rotatorio vorticellam mentiens, a propria generis?

Gulo. 5. Pl. elongata pellucida, anterius truncata. Müll. *hist. verm.* I. 2. p. 56. n. 182.
Habitat rara in aquis sub lenna primo intuitu ciliatam referens, pellucida granulosa, at ciliis orba, margine omnibus striis tenerrimis tessulato, pro lubitu lente celeriterve incendens, cyclidia cohabitantia uno laevo ingurgitans, & post aliquot horas simul iterum evomens.

punctata. 6. Pl. elongata teres viridis. Müll. *hist. verm.* I. 2. p. 57. n. 183.
Habitat primo vere in pratis inundatis, antrorum obtusa, posterius subacuminata punctulis nigris conspersa, & ova 5 rubra, sphærica undique pellucida continens..

- gaccida.** 7. Pl. elongata brunea : linea laterali transversisque albis.
Müll. hist. verm. I. 2. p. 57. zool. dan. prodr. 2678. zool. dan. rar. 2. p. 69. zool. dan. t. 64. f. 3. 4.
Habitat inter rudera testarum in sinibus Norvegiae, quietus spirali ter se convolvens, & partem corporis quamcumque pro lubitu attenuans, dilatans, corrugans, utroque fine subacutuata, supra convexiuscula subtus plana, rubicunda, immaculata.
- rosea.** 8. Pl. elongata rubra. Müll. hist. verm. I. 2. p. 58. zool. dan. prodr. 2679. zool. dan. rar. 2. p. 68. zool. dan. 2. t. 64. f. 1. 2.
Habitat in sinibus Norvegiae passim nigro-striata, utroque fine obtusa, supra convexa nigro-punctata, subtus pallidior: anterius pone caput lunula utrinque ex punctis nigris conflata.
- angulata.** 9. Pl. elongata rufa fusca : anterius angulis binis albis. Müll. hist. verm. I. 2. p. 58.
Habitat in fundo arenoso Oceani, ingens, anterius subacuminata, posterius obtusa, supra convexa subtus pallida, tubulo albo pellucido, intestino subrubente spirali instruто, ano terminali. O. Fabricius.
- rubra.** 10. Pl. oblonga depressa pallide rubra. Müll. hist. verm. I. 2. p. 59. zool. dan. prodr. 2683. zool. dan. 2. t. 68. f. 9. 10. O. Fabr. Fn. groenl. p. 304.
Habitat in profundo littoris Groenlandici super ulvas & fucos frequens, supra lineis transversis tenerrimis exarata. O. Fabricius.
- viridis.** 11. Pl. oblonga. supra convexa viridis : striis transversis albis. Müll. hist. verm. I. 2. p. 59. zool. dan. prodr. 2684. zool. dan. 2. p. 77. t. 68. f. 1-4. O. Fabr. Fn. groenl. 305.
Habitat in radicibus fucorum marinorum, crassiuscula, subtus pallidior, unicolor, entrorsum obtusa: rima utrinque rubra; posterius oblique truncata, subtus versus medium foramine ovato, ano in dorso medio. O. Fabricius.
- opercula-12.** Pl. subovata grisea subtus operculo tubulum exsertilem condente instructa. Müll. zool. dan. rar. 2. p. 78. t. 68. f. 5-8. O. Fabr. Fn. groenl. 307.
Habitat rara in littoribus arenosis & inter fucos sinuum marinorum Norvegiae, fabae coffae non dissimilis, marginem flexendo cito satius progrediens, plicarum marginalium n.

*ope superis quoque corporibus se affigens & adscendens,
ex viridi grisea, subtilis, dorsique linea longitudinali pal-
lidiori, operculo candido, margine subius plicato.*

- fibulata.** 13. Pl. elongata, anterius acuminata posterius truncata. Müll.
zool. dan. 2. p. 79. t. 68. f. 11. 12. O. Fabr. Fn.
groenl. 308.

Habitat copiosa in confervis Groenlandiae marinis & fundo limoso cavernarum rupium aquam subæstu retinentium, alba, supra grisea, motu rostri serpentino celerrime ingrediens, rostro autem tæco in cubum minutum se contrahens.

- Ventrico-14. Pl. ovata ventricosa, anterius collo cylindrico-conico
fa. elongata, posterius obtusa.

Pall. spicil. zool. 10. p. 17. t. 1. f. 9. 10. *Fasciola ventricosa*.
Habitat in Amboina, prægrandis, ex livido exalbida, striis,
rugisque tenuissimis exara'a, poro utrinque ad fossam
colli basilarem amplissimam circularem; nonne e:dem cun-
tetragona?

- Quadrang. 15. Pl. pallida ovata anterius acutissima membranulis quadrangularis. tuor longitudinalibus crispulis alata.

Pall. spicil. zool. 10. p. 20. t. 1. f. 12. a-e. *Fasciola quadrangularis*.

Habitat haud infrequens prope Hagam Comitum in fossis
inter leninam, mollissima, pellucida, forma mutabili,
limacis more ingrediens, super alia corpora gliscens, &
alteri animalculo obvia quasi sternita contrausta quiescens:
An hujus tribus?

- bicornis. 16. Pl. ovato-lanceolata utrinque obtusa ex griseo cinerea nigro-punctata : anterius tubulis binis brevissimis divergentibus.

Pall. spicil. zool. 10. p. 23. t. 1. f. 14. a. b. *Fasciola punctata*.
Habitat in Belgii aquis lemina cooperitis, forma mutabili,
læsa aut irritata tubulorum ope hirudinis more corpus
sigens, subtus albidior: venis fuscescentibus; an hujus
tribus & generis? an diversa a tentaculata species?

- grisea.* 43. Pl. corpore griseo dilatato antrorsum elongato-acumina-
ta, fine posteriori abbreviata acuta. *Müll. zool. dan.* 3.
p. 38. t. 105. f. 1.
Habitat in aquis lacustribus inter conervas.

- fulva. 44. Pl. depressa latiuscula utroque fine acuta, macula longitudinali nigra elongata media. *Müll. zool. dan. 3. p. 39. t. 105. f. 2.*
Habitat - - -

- viridata. 45. Pl. oblonga teres viridis utroque fine acutiuscula. *Müll. zool. dan. prodr. 3. p. 39. t. 105. f. 4.*
Habitat auctumno in pratis inundatis.

** oculo unico.

- glauca. 17. Pl. subelongata cinerea, iride alba. *Müll. hist. verm. I. 2. p. 60 n. 184.*
Habitat in aquis, torvæ affinis, lineam longa, anterius acuminata, posterius latiuscula, linea interdum dupliciti nigra in medio dorſi anterius & posterius coeunte.

- ineatz. 18. Pl. elongata supra convexa cinerea: linea longitudinali pallida. *Müll. hist. verm. I. 2. p. 60.*
Habitat vaga in litore maris Baltici, sequilineam longa, subtus alba: area media fusca, antrorsum attenuata, retrorsum dilatata.

- rutilans. 46. Pl. linearis, antrorsum acute attenuata, oculo nigro. *Müll. zool. dan. 3. p. 49. t. 109. f. 10. II.*
Habitat in maris baltici fusca.

*** oculis duobus.

- fusca. 19. Pl. fusca nigro-venosa oblongo-lanceolata anterius truncato subretusa, posterius acuta.
Pall. spicil. zool. 10. p. 21. t. 1. f. 13. a. b. Fasciola fusca.
Habitat vulgatissima in Europæ aquis stagnantibus herboſis, ad Menyanthis, Sii aquatichi, Nymphææ folia, tenerissima, limacis more in superfice aliorum corporum gliscens, per aquas sui celeriter currens, dum quiescit aut irritatur, se contrahens forma mutabili; nonne eadem cum torve?

- laetea. 20. Pl. depressa oblonga alba anterius truncata. *Müll. hist. verm. I. 2. p. 61. n. 185. zool. dan. 3. p. 47. t. 109. f. 1. 2.*
It goth. p. 250. Hirudo depressa alba, lateribus acutis.
Habitat frequens in palustribus sub nymphææ foliis, posterius acuminata, margine laterali acuto, macula media laetea retrorsum in lineam pallidam extensa, vasis linearibus apice bifidis plurimis utrinque excurrentibus interraneis saepc late purpureis.

fervida.

21. Pl. depressa oblonga cinerea vel nigra subtus albida, irride alba. *Müll. hist. verm. I. 2. p. 62. n. 186. zool. dan. 3. p. 48. t. 109. f. 5. 6.*

Habitat in aquis, 4-5 lineas longa, anterius obtusa, posterius subacuminata, oculis subtus pellcentibus, poris ventralibus albis interaneis pinnatis fuscis, interdum nigricans, poris subtus tribus, & macula pone oculos angulare alba.

tentacula-2. Pl. depressa oblonga cinerea anterius tubulosa. *Müll. hist. verm. I. 2. p. 63. n. 187.*

Habitat in aquis palustribus, 7 lineas longa, supra solida ventre repens, in aquis ventre dorsoque æque mota, utrinque fere perinde obtusa, marginibus lateralibus sinuatis, macula dorsi media albida, ventre interdum albo dorsoque fusco, rarius dorso fusco punctis nigris marginato & ventre cinereo, interaneis subtus nunc conspicuis nunc inconspicuis: pinnis nunc simplicibus nunc furcatis.

crenata. 23. Pl. depressa ovato-oblonga pallida margine crenulata. *Müll. hist. verm. I. 2. p. 64. n. 188.*

Habitat rara in lacu vici Lyngbye Daniæ, lacteæ facie, dorso obscure brunneo: macula media alba, interaneis ramoſissimis.

Helluc. 24. Pl. ovata teres viridis. *Müll. hist. verm. I. p. 64. n. 189. zool. dan. 3. p. 39. t. 105. f. 3. prodr. n. 2692.*

Habitat in pratis inundatis ad sesquilineam longa, punctatæ facie, anterius obtusa, posterius acuminata, dorso obscuræ, ora candida.

obscura. 25. Pl. ovato-oblonga utrinque obtusa alba. *Mull. hist. verm. I. 2. p. 65. n. 190.*

Habitat in piscinæ, lineam longæ, subpellucida.

obstrata. 26. Pl. oblonga hyalina, extremitate elongata, oculis rubris. *Müll. hist. verm. I. 2. p. 65. n. 191. zool. dan. 3. p. 40. t. 105. f. 9.*

Habitat in paludosis, lineam longa, candida, media massa helvola.

atomata. 27. Pl. plana membranacea alba, superne atomis sparsis rufis. *Müll. zool. dan. prodr. 2706. zool. dan. rar. I. p. 73. zool. dan. I. p. 115. t. 32. f. 3. 4.*

Habitat in sinu Norwegiae Droebacensi, doridis obvelatae facie, subtus immaculata, punctorum nigrorum agminibus 2 oculos referentibus.

cornuta. 28. Pl. plana oblongiuscula, tentaculo ab utroque capitis latere. *Müll. zool. dan. prodr. 2681. zool. dan. rar. I. p. 74. zool. dan. I. p. 116. t. 22. f. 5-7.*

Habitat in sinu Norwegiae Droebacensi, albida, subtus albo-punctata, fine anteriori proboscidis instar exsertili & retrahibili, pone tentacula agmen punctorum nigrorum angulatum aliudque ad basin utriusque.

radiata. 29. Pl. oblonga rufa, dorso rosula candida. *Müll. hist. verm. I. 2. p. 66. n. 192. zool. dan. 3. p. 41. t. 106. f. 1. & t. 109. f. 7. 9.*

Habitat rara in aquis silvaticis, prima facie vorticellam rotatoriam referens, sesquilineam, longa, opaca: margine pellucido, antrorsum radiis pallidis: medio macula candida varia.

strigata. 30. Pl. oblonga pallida: lineis tribus longitudinalibus. *Müll. hist. verm. I. 2. p. 66. n. 193. zool. dan. 3. p. 41. t. 105. f. 8.*

Habitat in aquis paludosis, strigis rufis.

grossa. 31. Pl. cylindracea alba, anterius & posterius acuminata: oculis nigris. *Müll. hist. verm. I. 2. p. 67. n. 194. zool. dan. 3. p. 40. t. 105. f. 5.*

Habitat in plantis aquaticis, 2 lineas longa, interdum decuplo minor, pellucida, ovis 5-33 magnis, sphæricis, rubris, confertis.

linearis. 32. Pl. elongata teretiuscula pallide lutea. *Müll. hist. verm. I. 2. p. 67. n. 195. zool. dan. 3. p. 42. t. 106. f. 2.*

Habitat in silvarum foveis palustribus, sesquilineam longa, decuplo latitudine sua longior: margine pellucido candido, obvia evitans.

sis 33. Pl. linearis supra convexa cinerea subtus alba. *Müll. hist. verm. I. 2. p. 68. n. 196.*

Habitat in asperibus muscisque humidis, quam terram spectant, extra humiditatem præcorum minitorum intervallo pariens, hirudinis instar se contrahens & expandens: limacis more progreiens, & viscosa, ut igitur utrumque genus jungat, opaca.

tetrago- 34. Pl. lutea, lamellis quadrangulis quatuor. *Müll. hist. verm. na.*
I. 2. p. 69. n. 197. zool. dan. 3. p. 42. t. 106. f. 1-5.
Habitat rario in stagnis foveisque aquæ purioris, lamelliæ submembranaceis pellucidis, saepius oscillatæ, rarius bilateræ.

capitata. 35. Pl. oblonga cinerea, capite discreto. *Müll. hist. verm.*
I. 2. p. 70.
Habitat in mari Balthico, torvæ affinis, at capite discreto fasciolæ limacibus aquaticis neclens, resupinata quiescens & ut plurimum aquæ innatans, viscida, anterius obtusæ, posterius acuminata, supra gibba nigricans: punctatis albis sparsis, subtus plana alba; versus oram utriusque lateris superne macula alba, in cuius angulo externo oculus.

caudata. 36. Pl. anterius rotundata, posterius in caudam attenuata. *Müll. hist. verm. I. 2. p. 70. zool. dan. prodr. 2702. zool. dan. rar. 2. p. 80. zool. dan. 2. t. 68. f. 13-15. O. Fabr. Fn. groenl. 310.*
Habitat gregaria in Groenlandiæ fucis ulvisque littoralibus, vivacissima, 2 lineas longa, a flavo rufu subconvexa.

auricula- 37. Pl. oblonga anterius truncato-emarginata posterius acuta. *Va. Müll. zool. dan. 2. t. 68. f. 16. 17. rar. 2. p. 81.*
Habitat in sinum Norwegiæ aqua marina, nudo oculo inconspicua, gelatinosa, pellucida, macula media opaca oblonga, in formam sphaericam & ovatam passim se contractans.

iliaris. 38. Pl. linearis, cauda filiformi contractili. *Müll. zool. dan. 2. t. 68. f. 18-20. rar. 2. p. 82.*
Habitat in madreporea prolifera, limacis more vitri parietes ascendens, pollicem longa, lineam lata, carnosa, ex rufu fulva, anterius obtusa, posterius macula rufa notata, antrorsum ciliis brevissimis micantibus obsita.

Lingua. 47. Pl. pellucida fusco cinerea utroque fine obtusissima. *Müll. zool. dan. 3. p. 40. t. 105. f. 7.*
Habitat auctumno in piscinis.

**** oculis tribus.

Gesserens- 39. Pl. elongata viridis pone caput rufa. *Müll. zool. dan. 2. t. 64. f. 5-8. rar. 2. p. 70.*
Habitat in littoris Gesserensis Falstriæ fuco furcellato, teres, anterius obtusæ, posterius acuminata, corporis segmentis.

inæqualibus, serie punctorum albidorum minimorum inscriptis: interseptionibus pallidis.

***** *oculis quatuor.*

marmorata. 40. Pl. oblonga pallida. *Müll. hist. verm. I. 2. p. 71. n. 198.*
ta. *zool. dan. 3. p. 43. t. 106. f. 2.*

Habitat rara in fossis aquaticis, dimidiata lineam longa, ex cœruleo grisea, interaneis glomeratis albis: macula media magna rotunda flava.

candida. 41. Pl. elongata albida. *Müll. hist. verm. I. 2. p. 71.*

Habitat in Groenlandiaë littore sub lapidibus, 2-3. pollices longa, admodum glutinosa, linea media longitudinali lattea, ore tubulum exferente. O. Fabricius.

truncata. 48. Pl. pallide rubens, antrosum late truncata, posterius acutiuscula. *Müll. zool. dan. 3. p. 43. t. 106. f. 1.*

***** *oculis pluribus.*

tremella- 42. Pl. plana membranacea lutea, margine sinuato. *Müll. hist. verm. I. 2. p. 72. zool. dan. 1. t. 32. f. 1. 2. prodr. 2705. rar. I. p. 72.*

Habitat in mari Balthico Hafniam alluente in sinu Christianensi & Drosbacensi Norvegiaë, tremellam referens, 9 lineas longa, tarda supra cinerascens, disco subluteo: media linea pinnata infraque hanc lunulæ duas albæ, subtus albicans, maculis tribus latetis.

279. SIPUNCULUS. *Corpus teres elongatum.*

Os anterius attenuatum cylindricum.

Apertura lateralis corporis verruciformis.

nudus. 1. S. epidermide stricta. *Martin on marin. verm. &c. I. p. 4. t. 1. f. 2.*

Syst. nat. XII. 2. p. 1078. n. 1. Sipunculus corpore nudo. Gesn. ap. 1026. Vermis mærorhynchopterus Rondeletii 2.

Bodadsh mar. 93. t. 7. f. 6. 7. Syrinx.

Habitat in Oceano europæo sub lapidibus.

faccatus. 2. *S.* epidermide laxa.

Syst. nat. XII. 2. p. 1078. n. 2. *Sipunculus corpore tunica laxa induto.*

Martin. on mar. verms. I. p. 6. t. 1. f. 3? *Sipunculus reticulatus.*

Aman. acad. 4. p. 454. t. 3. f. 5. *Nereis facculo induta.*

Gesn. aq. 1026. *Vermis macrorhynchopterus* I.

β) *Lumbricus phalloides*. *Pall. spic. zool.* 10. p. 12. t. 1. f. 8.
Habitat in Oceano indicō, etiam Vitaminico β) americano,
insulam Granadā alluente.

280. HIRUDO. *Corpus oblongum, anterius & posterius truncatum, muticum, cartilagineum, os caudamque dilatando progrediens.*

indica. 1. *H. depressa fusca*, striis transversis muricatis centum.

Habitat in Indiæ marinis, ore admodum dilatato, striis annularibus expansis elevatis.

medicina- 2. *H. elongata nigricans*: supra lineis versicoloribus, subtus maculis flavis. *Müll. hist. vermt.* I. 2. p. 37. n. 167.

Syst. nat. XII. 2. p. 1079. n. 2. *Fn. suec.* 2079. *Aman. ac.* 7. p. 42. *Hirudo depressa nigricans* supra lineis flavis sex intermediis nigro arcuatis, subtus cinerea nigro maculata.

Hill. hist. anim. p. 16. *Hirudo nigrescens* flavo variegata.

Raj. ins. 3. *Schmuck chir. Schrift.* I. *Hirudo medicinalis.*

Gesn. pisc. 425. t. 425. *Hirudo major & varia.*

Bergman. act. Stockh. 1757. p. 308. n. 4. t. 6. f. I. 2. *Gisler act. Stockh.* 1758. p. 95. n. I.

Salomon act. Stockh. 1760. p. 35.

Habitat in stagnis & paludosis, præstantissimus phlebotomus, in primis hæmorrhoidum, supra rugis plurimis annularibus pro lubitu dilatandis vel contrahendis constans, lineis in dorso utrinque 4, prima rufa, altera rufa nigro maculata, tertia nigra, quarta flava, ventre flavo maculis nigris vario, oculis orisque uncis, ut videtur, nullis.

sanguifuga. 3. *H. elongata nigra*, subtus cinereo-virens: maculis nigris. *Müll. hist. vermt.* I. 2. p. 38. n. 168.

Syst. nat. XII. 2. p. 1079. n. 3. *Fn. suec.* 2078. *Aman. acad.* 7. p. 44. *Hirudo depressa fusca*: margine laterali flavo.

Hill. hist. anim. p. 16. *Hirudo nigra* abdomen plumbeo.

Raj. ins. 3. *Hirudo maxime vulgaris.*

Petiv. gazoph. t. 130. f. 7.

Bergm. act. Stockh. 1757. n. 4. t. 6. f. 3. 4.

Gist. act. Stockh. 1758. p. 95. n. 2.

Habitat in fossis, stagnis, palustribus, ultra 4 pollices interdum longa, ventris medio interdum immaculata, & Norlandis medicinalis instar adhibita, crux aedeo avida, ut novem sanguine & vita privare equum dicantur, à dyticorum larvis nonnunquam ad mortem usque exsucta.

lineata. 10. *H. elongata grisea, dorso lineis quatuor longitudinalibus nigris. Müll. hist. ver. I. 2. p. 39. n. 169.*
Habitat rara, primo vere in paludosis, 16 lineas longa rugis conferitis annulata, oculis 6 aterrimis serie dupliciti transversim dispositis.

vulgaris. 4. *H. elongata flavo fusca, oculis octo: serie lunata. Müll. hist. ver. I. 2. p. 40. n. 170.*

Syst. nat. XII. 2. p. 1079. n. 4? Fn. suec. 2080. Hirudo (octoculata) depressa fusca, punctis octo nigris supra os.

Bergm. act. Stockh. 1756. p. 199. & 1757. t. 6. f. 5. 8.

Habitat vulgatissima in plantis aquaticis, 15. lineas longa monoculis & animalculis infusorii minimis, helicum quoque incolis vivitans, ab his postremis jure talionis iterum exsucta, ovulis in gravida sphæricis diaphani ad 70, oculis interdum 9, nunc fusca immaculata, nunc cinerea punctis nigris superius conspersa, nunc fusca, punctis flavescens supra conspersa, nunc luteo-fusca: linea medio nodosa, laterali nigricante anterius intus pinnata, nunc flavescens, lineis longitudinalibus, media nodosa, lateralibus punctis remotis sanguineis..

biloculata. 5. *H. elongata cinerea, oculis duobus. Müll. hist. ver. I. 2. p. 41. n. 171.*

Syst. nat. XII. 2. p. 1079. n. 5. Fn. suec. 2081. Hirudo (stagnalis) depressa nigra, abdomine subcinereo.

Bergm. act. Stockh. 1757. n. 4. t. 6. f. 9-11.

Habitat frequens in paludosis foveis numerosis, rivis, 9 lineas longa, cum incola helicis planorbis sape conflictatis, tota albida, pellucida, punctis cinereis conspersa, ad latum plicata, crenulata, ovis ad 40 in gravida, cibulo pellucido cinctis, junioribus cinereis, maturioribus fuscis, pullis jam exclusis cauda matris ventri adhaerentibus.

~~compla-~~ 6. *H. dilatata cinerea*, linea dorsi duplice tuberculata, margine ferrato. *Müll. hist. ver. I. 2. p. 47. n. 175.*

Syst. nat. XII. 2. p. 1079. n. 6. Fn. suec. 2082. Hirudo depressa ovato-oblonga interaneis fuscis pinnatis pellucentibus.

Hill. anim. p. 16. Hirudo lateribus attenuatis.

Bergm. act. Stockh. 1757. t. 6. f. 12-14. Hirudo sexoculata.

Habitat haud frequens in rivis 4 lineas longa, deses, helicum incolas aggrediens, fasciis transversis et lineis 3 pallidis compositis varia, margine albido, subtus grisea, capite acuminato albo, oculis sex, cauda orbiculata cinerea.

hyalina. 7. *H. dilatata pellucida flava: margine integro. Müll. hist. ver. I. 2. p. 49. n. 176.*

Syst. nat. XII. 2. p. 1080. n. 7. Hirudo (heteroclyta) hyalina postice lutea.

Trembl. hist. polyp. t. 7. f. 7.

Ledermüll. microscop. p. 165. t. 84. f. k-q. (Junior.)

Habitat in rivorum plantis aquaticis, quieta, 7 lineas longa, saniem ex incolis helicis planorbis emanantem frequenter ingurgitans, planinscula, anterius acuminata, posterius latiuscula, supra striis atomorum longitudinalibus cincrascentibus, subtilissimis, confertis, & transversis remotis fuscescientibus, remotioribus nigris punctisque fulvis sparsis varia, capite albo, oculis 4-6, matre ova sphærica, viridia, annulo pellucido cincta ad 100, ex quibus pulli primi partus flavi, secundi virides produdent gestante.

piscium. 8. *H. elongata flavicans: linea dorsali pinnata alba. Müll. hist. ver. I. 2. p. 43. n. 172.*

Syst. nat. XII. 2. p. 1080. n. 8. Fn. suec. 2083. Hirudo (geometra) teres, extremitatibus dilatatis.

Hill. hist. anim. p. 17. Hirudo dorso elevato, cauda latiore.

Frisch. inf. 6. p. 25. t. 11. Hirudo ore caudaque ampla.

Roef. inf. 3. p. 199. t. 32. Hirudo piscium.

Bergm. act. Stockh. 1757. p. 310. n. 3.

Ledermüll. microscop. t. 84. f. a-i.

Gesellschaf. Erzährl. 4. p. 303.

Habitat in aquis dulcibus, 8 lineas longa, pisces infestans, antrorsum attenuata, interdum cinerea: subtus flava fus-

eo-punctata fine anteriori albo : margine discoque fuscescente, posteriori albido, radiis fuscis punctoque intermedio nigro, oculis 4.

tessulata. 11. *H. cinerea*, margine tessulato, oculis octo : serie dupli longitudinali. Müll. hist. ver. I. 2. p. 45. n. 173.

Habitat rara in rivis, pro aetate admodum varia, raro quiescita, junior elongata, probedior, dilatata; ad 18 lineas longa, atomis undique nigris, supra maculis aurantiis vel albis, margine maculis albis, vel partim griseis partim aurantiis varia subtus grisea: maculis 2 mediis rotundis albis, femina interdum pullis 300 fata.

marginalta. 12. *H. dilatata fusca*, margine tessulato, oculis quatuor. Müll. hist. ver. I. 2. p. 46. n. 174.

Habitat rara in rivo, tessulatae affinis, 10 lineas longa, capite candida pellucido: fasciis 2 transversis fuscis, anterius obtuso posterius coarctato, ab domine ex fusco brunneo: striis subtilissimis subtus in lineolas duplicates fuscas coenitibus, punctorum alborum in dorso seriebus 5, margine laterali albo, lineola dupli fuscata in quadratas areas diviso, cauda orbiculata pallida: marginis maculis fuscis.

grossa. 13. *H. dilatata flavicans* anterius fissa. Müll. zool. dan. I. p. 69. n. 27. t. 21. f. 1. 5. prodr. 2668. rar. I. p. 43.

Habitat in mari, venerem exoleam intrans, 12 lineas longa, & 7 lata, striis subtilissimis albis exarata, anterius angustata, obtusa, matre ovulis pellucidis sphæricis in latice gelatinoso natantibus ad 1000 referta.

hippoglossi. 14. *H. dilatata albida* medio corporis ocello didymo candido. Müll. zool. dan. 2. t. 54. f. 1-4. prodr. p. 2669. rar. 2. p. 41. O. Fabr. Fn. groenl. p. 302. t. 1. f. 8.

Bast. opusc. subsec. 2. p. 138. t. 8. f. 11.

Habitat in cute P. euronectis Hippoglossi, cui tuberculis, hanulis, cuspidibus tenacissime adhaeret, ovalis, deprepta, pellucida anterius subacuminata, posterius in orbiculum destinens, capite subtriangulari macula cinerea utrinque notato, oculis non conspicuis, cauda subtus tuberculis seriatim a centro excurrentibus hanulis 2, ac versus medium cuspidibus 2 armata.

muricata. 9. *H. teres*, corpore verrucoso. Fn. suec. 2084. Mus. Ab Fr. I. p. 93. t. 8. f. 3.

Rondel. aquat. 2. p. 111. Hirudo marina.

Bast. opusc. subsec. I. p. 82. t. 10. f. 2. Hirudo piscium.

Habitat in Oceano atlantico,

I I. M O L L U S C A.

Animalia simplicia, nuda (absque testa in habitata) artibus instructa.

282. LIMAX. *Corpus oblongum repens: supra clypeo carnosō: subtus disco longitudinali plano.*

Foramen laterale dextrum pro genitalibus & excrementis.

Tentacula 4 linearia supra os, oculis in apice majorum.

lævis. 8. L. niger glabriusculus. Müller hist. verm. II. p. 1. n. 199.
Habitat haud frequens Octobri in muscis, 5 lineas longis, nitidus, clypei striis transversis undulatis, atro angustior.

ater,

I. L. niger rugosus. Müll. hist. verm. II. p. 2. n. 200.
α) Limax aterrimus subtus pallidus.

Syst. nat. XII. 2. p. 1081. n. 1. Fn. suec. 2088. List. anim. angl. p. 131. t. 2. f. 17. Synops. f. 102. tab. anat. 5. f. 1. 23. exerc. anat. t. 3. f. 1-5. Limax ater. Aldrov. ins. 702. Limax tota nigra.

Gesn. aquat. p. 254. Cochlea nuda.

Argenv. conch. t. 28. f. 28.

Sibbald. prod. hist. nat. Scot. 2. l. 3. p. 34.

Hill. hist. anim. p. 87. t. 3.

Berl. Magaz. 3. p. 341. t. 5. f. 72.

β) Limax ater, dorsi carina pallide virente.

γ) Limax niger, ore lutescente subtus albus.
Swammerd. bibl. nat. t. 9. f. 1.

δ) Limax ex fusco castaneus, ore lutescente subtus albus.
Lister synops. t. 101. a. f. 103. & app. t. 2. f. 1. Limax subrufus.

Berl. Magaz. 3. p. 339. t. 6. f. 71.

ε) Limax obscure fuscus, ore strigaque utrinque lutescente.
Habitat α) vulgaris in silvaticis, β) in nemorosis, γ, δ,
ε rariores in hortis, a 16 lineis ad 5 pollices longus,
tentaculis semper nigris, clypeo punctis confertis sca-

ooo ooo ooo

VERMES MOLLUSCA. Limax.

*briusculo abdominis dorso sulcis rugoso, corporisque
ora lineolis nigris transversis tessulata.*

albus. 2. L. albus. Müll. hist. verm. II. p. 4. n. 201.

α) *Limax totus albus.*

β) *Limax albus, margine flavo.* Syst. nat. XII. 2. p. 1081.
n. 2 Müll. Eterv. an Swan. p. Hafn. 1763. p. 61.

γ) *Limax albus, margine & syncipite aurantio.*

δ) *Limax albus, tentaculis nigris.*

*Habitat in nemoribus si visque, 3 lineas ultra 5 pollices
longus, colore constante.*

fuccineus. 3. L. supra subrufus, subtus albus. Müll. hist. verm. II.
p. 7. n. 203.

Syst. nat. XII. 2. p. 1081. n. 3. *Limax (rufus) subrufus,*
Aldrov. inf. 702. Limax magna colore rufo.

Hill. hist. an. p. 87. t. 3.

*Habitat in umbrosis, ad montium radices, sesquipollini-
caris, sine maculis aut cingulo, tentaculis majoribus
supra nigris.*

cinereus. 4. L. cinereus maculatus & immaculatus. Müll. hist. verm.
II. p. 5. n. 202.

Lister exerc. anat. t. 3. f. 6. 7. 9. 10. *Limax maximus
cinereus striatus.*

α) *Limax immaculatus, clypeo nigro-ceruleo.*

β) *Limax clypeo maculis, abdomine fasciis longitudinali-
bus nigris.*

Syst. nat. XII. 2. p. 1081. n. 5. Fn. suec. 2090. It. ed.
61. *Limax (maximus) cinereus maculatus.*

Lister anim. angl. p. 127. t. 2. f. 15. *Limax cinereus
maximus striatus & maculatus.*

Swannierd. bibl. nat. t. 8. f. 7. *Cochlea nuda domestica.*
Sibb. prodr. hist. nat. Scot. 2. 1. 3. p. 33.

Schirach. von Erdschneck. t. 2. f. 10.

Berl. Magaz. 3. p. 336. t. 9. f. 69.

γ) *Limax clypeo abdomineque maculis nigris.*

*Lift. synops. f. 104. tab. anat. 5. f. 6-10. Limax varie-
gatus five fasciatus cellarius.*

*Limaces voraces, hortis, agris, pratis infestii, a cor. icibus, anatibus, aliis
vulnibus & mammalibus saepius devorati, cineribus, fuligine arcendo p.
lendi, cr. br. exp. rimen. oru n. r. d. integracionem vernum testanum videtur p.
gelatina sua ricta glutinat, nutritur, in clypeo, hinc superius a mediis
comprendati, discutente etiam vi celebrati; an distincti a reliquis fasciatis
et lateus a Com. Raszowsky histor. natur. Jerez. 1. p. 267, & 269, p.
macti;*

Argerv. conchyl. t. 28. f. 31. Limax cellaria.

- δ) *Limax abdomine striis quinque albidis : infima abrupta;*
- ε) *Limax abdomine rugis albis cinereis que ac maculis nigris ordine duplici.*

ζ) *Limax margine albo.*

Habitat α) vulgaris β) rarer in nemorosis, reliquæ rariores γ) in hortis, ε) in silvis, δ) & ζ) in umbrosis, ultra 5 pollices longus, ζ) minor.

hyalinus. 5. *L. hyalinus, tentaculis obsoletis : lineola fusca a tentaculis ad clypeum.*

Habitat in muscis, phaseoli cotyledonibus infestus, cineribus clavellatis pellendus, rug.s ventris creberrimis interruptis. Scopoli.

albidus. 6. *L. albidus, tentaculis nigris. Müll. hist. verm. II. p. 8. n. 204.*

Syst. nat. XII. 2. p. 1082. n. 6. Limax cinereus immaculatus.

Lift. anim. angl. p. 130. t. 2. f. 16. Limax cinereus parvus immaculatus pratinus.

Lift. synops. f. 101. tab. anat. 5. f. 11. exerc. anat. t. 3. f. 11. Limax parvus cinereus.

Argerv. conchyl. t. 28. f. 27.

Berl. Magaz. 36. p. 345. t. 8. f. 74.

Schirach von Erdsehn. t. I.

Blanka inf. 151. t. 13. f. X.

α) *Limax torus albidus immaculatus.*

β) *Limax albidus clipeo flavescente.*

γ) *Limax albidus, capite nigro.*

δ) *Limax albidus, dorso cinereo.*

ε) *Limax albidus, atomis nigris sparsis.*

Habitat in hortis, pratis, agris nemoribusque a Maio ad

Decembrem usque, 2-9 lineas longus, auctumno secale recens satum depascens, in horis sepius nocte helianthum annum adscendens, ejusque folia consumens, tacitus digito quasi mortuus viscositate sua adhaerens, occidente sole reviviscens, videturque querendo vagans, si digito rursus tangatur, tentacula quidem condens, mox vero exsertis pergens, clypei & abdominis linea longitudinali nulla, tentaculis minoribus minimis, medicato usu celebris.

cinereus. 9. *L. flavescens, clipeo abdomineque cingulo cinereo. Müll. hist. verm. II. p. 9. n. 205.*

Habitat haud frequens in nemorosis, immaculatus, subtus albus, 2 pollices longus.

margi- 10. L. cinereus, clypeo utrinque striga obscura, abdomine pallide cærulecente. Müll. hist. verm. II. p. 10. n. 206.

Habitat in fago, primo vere & Novembri vulgaris, colore cum ætate non mutato, dorso carina alba, utrinque ex cinereo subcærulecente, abdomine interdum nigro-maculato.

reticu- 11. L. fuscus, clypeo punctis, abdomine lineolis nigris. lata. Müll. hist. verm. II. p. 10. n. 207.

Schaeff. Vers. mit Schneek. I. t. I. & t. 2. f. 1-3.
Habitat vulgaris in Daniae & Germaniae horis, sesqui- pollicaris.

flavus. 7. L. flavus maculatus. Fn. succ. 2092.

Lift. exerc. anat. I. t. I. Limax succini colore, albidis maculis insignitus.

Habitat inter herbas; an propria species?

aureus. 12. L. flavus immaculatus. Müll. hist. verm. II. p. 10. n. 208.

Habitat in Daniae & Norwegiae umbrosis, sesquipoili- caris, subtus albus, linea inter tentacula intermedia tentaculisque ipsiis nigris.

fuscus. 13. L. rufescens, linea laterali dorsoque nigricante. Müll. hist. verm. II. p. 11. n. 209.

Habitat in nemorosis, subtus albus, abdominis macula longitudinali fusca, 8 lineas longus.

tenellus. 14. L. virescens, capite tentaculisque nigris. Müll. hist. verm. II. p. 11. n. 210.

Habitat primo vere in nemorum fossulis foliis aridis re- platis, 10 lineas longus, clypeo albido in luteum ver- gente.

lanceo- 15. L. linearis lanceolatus utrinque acutissimus, margine laris. undique limbo membranaceo aucto, tentaculis nullis. Pall. spic. zool. 10. p. 19. t. I. f. 11.

Habitat in mari Cornubiam alluente, margine subtus bilobato & sulcato, laterum striis obsoletis antrorsum obliquatis, prope dorsum angulo recurvatis: vix hujus generis, sed cuius?

283. APLYSIA. *Corpus repens, obvelatum membranis reflexis : Clypeo dorsali membranaceo pulmones obtegente.*

Foramen laterale dextrum pro genitalibus.

*Anus supra extremitatem dorsi.
Tentacula quatuor anterius sita.*

depilans. 1. *Apl. tentaculorum membrauarumque margine cum disco concolore.*

Syst. nat. X. p. 653. Tethys limacina.

Rondel. pisc. I. p. 520. Lepus marinus.

Gefn. aquat. 475. Lepus marinus Rondeletii.

Bohadsch. marin. 3. t. 1. 2. 3. Lernea (graphice.)

Seb. mus. 3. t. 1. f. 8. 9.

*Habitat in mari mediterraneo, sanie depilans tadu (B. 51.)
fætidissima ad nauseam usque.*

fasciata. 2. *Apl. nigra unicolor, membranis tentaculisque margine coccineis. Poiret, voy. en Barbarie. 2. p. 2.*

Habitat ad Barbariae littora, sub rupibus degens contacta laticem nigrum rubrumque, nequaquam tamen fætidum aut depilantem eructans.

284. DORIS. *Corpus repens, oblongum, subtus planum.*

Os anterius subtus.

Anus posterius in dorso, supra cinctus ciliis.

Tentacula duo ad quatuor, supra corpus antrorsum intra foramina retractilia.

* *corpo retrosum acuminato, supra convexo nudo,*
Limaciæ Mülleri.

verrucosa. 1. *D. corpore supra undique tuberculato.*

Rumpf. mus. 38. Limax marina verrucosa.

Seb. mus. 2. t. 61. f. 5. Mitella verrucosa.

Habitat in oceano indicō, semicylindrica, fine anteriorē rotundato, tentaculis brevissimis, margine lateralē deflexo, pede ovali, oblongo, margine plano.

glavigera. 5. *D. ovalis candida, pedicellis dorsi clavatis croceis.*
Müll. zool. dan. prodr. 2770. zool. dan. I. p. 58. n. 22.
t. 17. f. 1-3. Ad. Nat. Curios. 6. p. 118.

Bommé, aet. Vlijg. 3. p. 296. n. 4. f. 3? geknootide Zee-Slakje met vic. Hoornen.

Habitat in fucis maris Norwegici, gelatinosa, subpellucida, cauda acuta: macula flava; capitis verruca laterali flava, truncata, tentaculis 2 croccis.

quadrili- 6. *D. alba, lineis quatuor nigris, auriculis sulphureis.*
neata. Müll. zool. dan. I. p. 59. n. 23. t. 17. f. 4-5. prodr.
2771. Ad. nat. Cur. 6. p. 50.

Habitat in fnuum maris Norwegici fucis, congeneribus agilior, sulphureis maculis varia, tentaculis 2 albis, brevibus distantibus.

fascicula- 7. *D. linearis ex cinereo ferruginea, papillis dorsi acutiusculis subferruginea.*

Forsk. Fn. arab. p. 99. n. 3. anim. t. 26. f. 5. Limax marinus.

Habitat in mari mediterraneo, frustulis ligneis natantibus adhaerens, pollicem longus, subtus pallidus, tentaculis 4 pallidis, pellucidis.

papillosa. 8. *D. supra papillis tecta: linea dorsali laevi.*

Syst. nat. XII. 2. p. 1082. n. 8. Fn. suec. 2093.* Limax papillosum.

Bafer op. sups. I. p. 81. t. 10. f. 1. Doris spinis molibus hispita.

Forsk. anim. mar. t. 26. f. H? Limax marinus.

Ad. hayniens. 10. f. 11-16. Doris bodoensis.

Ad. Vlijg. 3. p. 318. f. 2.

Habitat in Oceano europæo.

auricu- 9. *D. alba, fasciculis dorsalibus rubris apice albis.* Müll.
lata. zool. dan. prodr. 2773.

Ad. havn. 10. p. 16. t. 5. f. 6.

Habitat in mari Norwegico.

Dorides, in mari habitantes pruduræ quoque majori elegancia a limacibus in terra degentibus distant, plures jam, sed imperceptius justo ab Aldrovando descriptæ, prima ab Aeliano.

- laciuu- 10. D. albida , papillis dorsi obovatis utrinque sex.
lata. *Forsk. Fn. arab. p. 99. n. 4. anim. t. 26. f. 4.* *Limax tergipes.*
Habitat in fundo maris ad fretum Oeresund inter fucos , magnitudine pediculi majoris , forma variabili , plurimum vermium more supinus reptans.
- minima. 11. D. pallide cinerea , papillarum dorsalia seriebus quatuor. *Forsk. Fn. arab. p. 100. n. 15.*
Habitat in mari mediterraneo , fucis natantibus incumbens , seminis oryzæ magnitudine , sub us palmar , oblongo-arctata , tentaculis 4 , juxta caput albis . papillæ plurimis ex ovato oblongis , obtusis , cinerascentibus.
- terrina. 12. D. ex rubescente cinerea , papillis dorsi octonis ramosis. *Bonimé , act. Vliss. 3. p. 290. n. 2. f. 1.* *Haarts hoora gelyk getakte Zee-slakje.*
Habitat in settularia abietina , $\frac{1}{3}$ pollicis longa , capite etiam caudaque papillis ramosis ornata , clavigerae affinis.
- radiata. 13. D. ex argenteo cærulea , subtus alba , papillis lateralibus quaternis radiato-dentatis. *du Pont act. angl. 53. p. 57. 58. t. 3.*
Habitat in Oceano , ultra pollicem longa , fasciculatae affinis , tentaculis 4 , linea dorsi media argentea , lateribus 2 apice profunde cæruleis.
- cotorea- 14. D. lactea , subtus hyalina , papillis dorsi rubro punctatis pyramidalibus utriaque sex apice rubris.
ta. *Bonimé , act. Vliss. 1. p. 394. t. 3. f. 1-3. & 3. p. 288.*
Geknifde of gekroonde Zee-slakje.
Habitat ad littus insulae Walcheren Seelandiæ , $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{2}$ pollicis longa.
- Pennata. 15. D. dorso papillis retrosum incumbentibus subcylindricis testo.
Bonimé , act. Vliss. 3. p. 292. t. 3. f. 2. *Gevederde of zacht gedoornte Zeeslakje.*
Habitat ad Seelandiæ littus in zoophytis , quorum quoque colorem nunc ex cinereo album , nunc rubescentem refert , $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ pollicis longa , fertilissima , tentaculis 4.
- peregrina. 16. D. tentaculis quatuor non retractilibus , corpore lacteo , cirrorum ex fusco cæruleorum in dorso seriebus decem.
Cavolin. polip. mar. 3. p. 190. t. 7. f. 3.
Habitat in mari mediterraneo , ad promontorium Miseneum.

- affinis.* 17. *D. purpurea*, dorso cirrorum seriebus septem, tentaculis quatuor non retractilibus annulatis apice albis. *Cavol. polip. mar. 3. p. 193. t. 7. f. 4.*
Habitat in mari mediterraneo, circa promontorium Misennse.

- tetra-* 18. *D. quadrangularis coriacea*, posterius acuminata supra plana : angulis carunculato-hiulcis. *Pallas nov. act. Petrop. 2. p. 237. t. 5. f. 22.*

Habitat in mari Kurilas insulas alluente, à quarum incolis conda coquaque comeditur, media inter utrumque tribum.

** *corpore utrinque obtuso, plano, tecto.*

- fusca.* 2. *D. ovalis*, lamella scabra punctata. *Müll. zool. dan. 2. p. 22. t. 47. f. 6-8. prodr. 2768. rar. 2. p. 22.*

Syst. nat. XI. 2. p. 1083. n. 2. Doris (bilamellata) corpore supra lamella plana scabra.

Fn. suec. 2094. Limax bilamellatus.

Habitat in mari norwegico, limacis more incedens, glaber, supra pallide fusces cinereo punctatus, subtus albus, lamella tegente supra sulphureo punctata, subtus alba, glabra, tentaculis 2 fuscis, ano transverso plumis 6 sulphureis cincto.

- obvelata.* 19. *D. alba* corpore elongato : lamella repanda supra punctata. *Müll. zool. dan. 2. t. 47. f. 1. 2. prodr. 2758. rar. 2. p. 19.*

Planc. conch. min. not. p. 105. t. 5. f. G. H. Concha sine testa.

Habitat in fundo sinus Drobacensis Norvegiae, limacis instar incedens, subpellucida, subtus glabra, lamina supra punctis convexis aspera, tentaculis 2 simplicibus.

- murica-* 20. *D. ovalis* supra undique verrucis luteis. *Müll. zool. ta. dan. 3. p. 7. t. 85. f. 2-4. prodr. 2773.*

Habitat in mari norwegico.

- pilosa.* 21. *D. corpore ovato luteo pilis mollibus albis tecto, tentaculis occultis.* *Müll. zool. dan. 3. p. 7. t. 85. f. 5-8.*

- lævis.* 22. *D. ovalis alba, corpore supra planiusculo lævi.* *Müll. zool. dan. 2. t. 47. f. 3-5. prodr. 2774. rar. 2. p. 21.*
Habitat in mari norwegico atlantico, carnosa, glabra, ana plumis 8 cincto. Koenig.

~~Arbores-~~ 23. D. tentaculis ramosis, dorso gibbo fruticante. *Müll.*
 cens. *Zool. dan. prodr. 2776. Að. havn. 10. p. 14. t. 5. f. 5.*
Habitat in mari norwegico.

frondosa, 24. D. corpore utrinque cirrhis plurimis ramosis.
Ascan. act. Dronth. 5. p. 155. t. 5. f. 2. Amphitrite
frondosa.
Habitat in mari norwegico, tentaculis 2.

Argo. 4. D. ovalis, corpore lævi, tentaculis duobus ad os, an-

ciliato phrygio.
Bohadsch. mar. 65. t. 5. f. 4. 5. Argo.
Column. ecphr. t. 32. Lepus marinus alter major.
Dicquemere, journ. de phys. 1779. jul. p. 56. t. 2. f. 10.
Limace à plante.
Habitat in mari mediterraneo, coccinea, ano cincto ramis,
quasi opere phrygio laceris.

stellata. 25. D. ovalis, stella ad anum octoradiata : radiis ramosis.
Bonimé, act. Vlissing. 3. p. 298. n. 5. f. 4. Eegeltje met
eene ster op de stuit.
Habitat ad littora Seelandiæ in alcyoniis, ex albo cine-
rea, subtus plana, supra tuberculis obtusis aspera, ten-
taculis 2.

285. APHRODITA. *Corpus repens oblongum,*
squamis tectum : pedi-
bus utrinque setosum.
Os terminale, cylindricum.
Tentacula duo setacea an-
nulata.
Oculi quatuor.

aculeata. 1. Aphr. ovalis hirsuta aculeata. *Fn. suec. 2099. Gunnar.*
act. Nidros. 3. p. 59. Pall. misc. zool. p. 77. t. 7.
f. 1-13. Bæster opusc. subs. 2. p. 62. t. 6. f. 12.
Mus. Ad. Frii. 1. p. 93. Aphrodita nitens.
Jacob apud Barthol. act. Hafn. 3. p. 88. t. 88. Vermis
aureus.
Barrel. ic. plant. rar. p. 131. t. 1284. Eruca marina.
Swammerd. bibl. nat. t. 10. f. 8. Physalus.
Red. opusc. 3. p. 276. t. 25. Hystrix marina.
Molyn. act. angl. vol. 19. n. 225. p. 405.

Ruysch theatr. an. I. p. 23. n. 49.

Dale h. fl. of Harwich and Doverc. p. 394.

Seb. mus. I. t. 53. f. 3. & t. 90. f. I. 2. & 3. t. 3. f. 7. 8.

Column. ecphr. 25. I. 26.

*Habitat in Oceano europæo, 4-7 pollices longæ, testaceis
victitans, cæsta uiruque 40-41 pedunculis ornata, &
supra pedunculos fasciculo villoruni aureo, cupreæ &
viridi-cæruleo colore splendentium.*

scabra. 2. Aphr. oblonga, dorso squamato scabro.

*Habitat in mari belgico, onijo paulo longior squamis 20
alternis, scabris obiecta, pedibus utrinque circiter 20;
an vere distincta species?*

squama- 3. Aphr. oblonga squamis asperis unicoloribus nigro puncta-
ta.

Syst. nat. XII. 2. p. 1084. n. 3. Aphrodita oblonga, dorso
squamato: squamis XXIV.

Müll. von Würmern, &c. p. 170. t. 13. zool. dan. 3. p. 25.
t. 96. f. 1-4. prodr. n. 2642. Gedüpfelte Aphrodite.

Pallas misc. zool. p. 91. t. 7. f. 14. a-d.

Bift. op. subs. 2. l. 3. t. 6. f. 5.

*Habitat in Oceano europæo, mari glaciali & ad pro-
montorium Bouæ Spei, inter fucos & fentularias libera
vagans, & per maris fundum circumrepens, 11 lineas
ad pollicem usque longa, ventre medioque dorso leví
& nudo, reliquo dorso squamis piscinarum æmulis ri-
gidis semipelucidis ochroleucis teido.*

imbricata. 4. Aphr. oblonga, squamis glabris variegatis.

Syst. nat. XII. 2. p. 1084. n. 4. Aphrodita oblonga,
dorso squamato: squamis XXXVI.

*Habitat in Oceano septentrionali, an propria species
diversa à sequenti? Koenig.*

plana. 5. Aphr. oblonga, squamis lævibus bicoloribus. Müll. von
Würmern. p. 180. t. 14. f. 1-5.

Müll. prodr. zool. dan. 2644. Aphrodita (cirtata) postice
acuminata, pedibus cirtatis.

*Habitat in mari boreali, præfertim Islandiam alluente,
8-20 lineas longa, utrinque plana, caudam versus an-
guilata, segmenti 36, tot dem utrinque pedibus, toti-*

Aphroditæ per mare vagantur, sexu distincto; siccæ facile cum crepitu in frustis
difficiunt.

demque caudam versus decrescentibus in 2 series digestis
squamis dorsum contegentibus instructa, proboscide
magna crassa.

lepidota. 6. Aphr. oblonga, fascia dorsi longitudinali sanguinea. Pall.
musc. zool. p. 94. t. 7. f. 15. a. b. t. 8. f. 1. 2.

Baßt. opusc. subs. I. l. I. t. 4. f. 3. A-C.

Habitat satis copiosa in mari inter Angliam & Belgium
intermedio, pedunculis 16, squamis subtilissime puncta-
tis imbricatis 14 parium, an satis distincta a plana?

cirrhosa. 7. Aphr. lienari-a-tenuata, pedunculis compressis apice
bipartitis, squamis vesiculosis. Pall. musc. zool. p. 95.
t. 8. f. 3-6.

Habitat in mari septentrionali, tenerima, squamis subro-
tundis 11 parum, pedunculis utrinque 35 productiori-
bus; an satis distincta species?

violacea. 8. Aphr. oblonga violacea, squamis dorsalibus utrinque quin-
decim. Müll. prodr. zool. dan. 2645. Ad. Nidros. 4. 93.
Habitaç . . .

longa. 9. Aphr. squamis concoloribus, medio dorsi nudo, pedibus
papilla simplici setigera, cirris lateralibus nullis. Müll.
zool. dan. prodr. 2646.

Habitat in mari Groenlandiam alluente, inter squamatam
& lepidotam media.

SPIO. Corpus protensum in tubulo, articulatum:
filis dorsalibus.

Pedunculi setis hispidi dorsum versus positi.

Tentacula 2 longa simplicia.

Oculi 2 oblongi.

feticornis. I. Sp. tentaculis tenuibus striatis. O. Fabric. Schr. der berl.
naturf. Ges. 6. p. 259. n. I. t. 5. f. 1-7.

Syst. nat. XII. 2. p. 1085. n. 4. Nereis (feticornis)
tentaculis capitinis binis longitudine fere corporis.

O. Fabric. Fn. groent. sp. 283. Nereis feticornis.

Baster op. subs. 2. p. 134. t. 12. f. 2.

Habitat gregaria in Oceano, potissimum sinus Groenlan-
diae fundo argillaceo, rarius arenoso, ad 3 pollices longa,
tubulo e particulis terreis formato tenui erecto triplo lon-
giore, e quibus animalcula piscatura exserit tentacula ca-

pillaria, *alba*, ceterum ex *albido viridis*: linea *dorsum media sanguinea*, *posterior thalassina*, *anterius ex nigro cinerea*: *striis transversis albis*, *capite pallido*.

filicornis. 2. Sp. tentaculis crassis annulatis. O. Fabr. Schr. der berl. naturf. Ges. 6. p. 264. n. 2. t. 5. f. 8-12.

Habitat *gregaria* in sinu *Groenlandiae*, *oblonga*, *pollicem longa*, *flavicans aut rubicunda*, *linea media & utroque fine cincreis*, *tubulo fragili*, *erecto*, *virescente*, *quem non nisi invita relinquit*, *tentaculis exsertis & circumvolutis planarias piscans*.

AMPHITRITE. *Corpus protensum in tubulo, annulatum.*

Pedunculi verrucosi.

Tentacula acuminata approximata, plumosa.

Oculi nulli.

renifor- 1. A. corpore rotundato, palpis simplicibus. Müll. von Würm. p. 194. t. 16. f. 1-3.

Müll. zool. dan. 3. p. 13. t. 89. f. 1. 2. prodr. 3063. *Tubularius unicillus*.

Habitat *gregaria* in fundo maris Islandiam *alluentis*, *pulcherrima*, *rubra*, *3 pollices longa*, *capiere arcubus duobus semicircularibus munito*, *pluniis 14 colore rubro alboque alternante amoenissimis ornatis*, *corporis annulis 30-90*, *utrinque tuberculis minimis appositis*, *cauda acuta non articulata*, *tubulo*, *quem vix relinquit rubro*, *tenaci*, *coriaceo*, *simplici*, *4 pollices longo*; *an ad tubulariam referenda?*

Penicil- 2. A. scuto aculeato, proboscide clavata. Müll. von. Würm. lus. p. 8. n. 3.

Column. aquat. & terr. c. II. p. 22. Προστκιπλευρας. Habitat in syrtibus maris Neapolin *alluentis ultra 2 pollices longa linea media nigra*, *per totam corporis longitudinem excurrente*, *fasciculo plumarum numerosissimarum tentacula exornante rubro flavo maculato*, *proboscide huic aequali*; *pedunculo albo tubuloso*, *clava rubra striata*, *tubulo albo*, *laevi firmo*, *interdum inflexo*:

Ventila- 3. A corpore verrucofo , proboscide nulla. Müll. von Wür-
brum. p. 8. n. 4.

Syst. nat. XII. 2. p. 1269. n. 814. Sabella (Penicillus) testa membranacea erecta radicata.

Ellis corall. 92. t. 34. Corallina tubularia melitensis.

O. Fabr. Fn. groenl. p. 438. n. 449. Tubularia Penicillus.

β) Baster opusc. subsec. 2. p. 178. t. 9. f. 1.

Habitat in mari mediterraneo , fasciculo plumarum ten-
acula exornante in 2 brachia diviso.

auticoma. 4. A. cirris binis utrinque , anterius flabellis duobus aureis
rigidis. Müll. zool. dan. 1. p. 87. t. 26. f. 1-6. prodr.
2622. rar. I. p. 54. O. Fahr. Fn. groenl. 272.

Syst. nat. XII. 2. p. 1268. n. 809. Sabelia (granulata) testa solitaria libera simplici curvata granis arenaceis
fuscis.

Pall. miscell. zool. p. 117. t. 9. f. 1-13. Nereis cylindraria.
Martin. Conchyl. p. 18. & p. 69-72. t. 4. f. 26. 27. Tubu-
lus vermicularis.

Klein tubul. mar. p. 21. t. 1. f. 5. & echinod. p. 62. t. 33.
f. A. B. Solen fragilis.

Brit. zool. 4. p. 130. t. 92. f. 163. Sabella tubiformis.

Dicquemar. journ. de physiq. 1779. Jul. p. 54. t. 2. f. 1-12.
Ver à fourreau conique.

Martin. Conchyl. I. t. 4. f. 26.

Habitat in mari septentrionali, glaciali atlantico , indico,
tubulo fusco , diaphano , fragili : altero fine cuneato an-
gusto , intus lœvigato , capite ramoso albò : anterius
uncis 16 albis armato , trunco inverse conico , chalybeo,
lœvissimo , ad marginem utrinque fasciculis setarum
ternarum quaternarumve aurearum 34 , cauda ex la-
mellis tribus ovalibus minuis duris conflata.

cristata. 5. A. corniculis ramosis binis. Müll. zool. dan. 2. t. 70, f. 1-4.
prodr. 2620. rar. 2. p. 87.

Habitat in ostreis vetustis sinuum maris norwegici , elon-
gata , teres , flexuosa , ex rubro flava , posterius acunii-
nata , segmentis 17 , anterioribus utrinque verruca se-
taque instrutis , capitis cirris pluribus , corpore scxtuplo
brevioribus , tubulo fragili flexuoso , e limo testarumque
rejectamentis composito.

chrysoce- 6. A. capitis discreti vertica paleolis aureis confertis bifariam
phala. coronato.

Pall. nov. act. Petrop. 2. p. 235. t. 5. f. 20.* Neris chry-
socephala.

Habitat in indici maris fundo, sabellæ alveolatae affinis, mollis attenuata, supra planiuscula, & circiter pollices longa, pedunculis crissam annulantibus, penicilligeris, cirrigeris, nucrone carneo & 2-4 tum retrorsum brachio terminatis, tentaculis numerosis.

plumosa. 7. A tentaculis binis articulatis sub fasciculis setarum portatarum, corpore tereti caput versus incrassato clavato hispidulo. Müll. zool. dan. 3. p. 16. t. 90. f. 1. 2. prodr. n. 2621.

Habitat in mari Norwegici argilla inter mytilos edules.

291. TEREBELLA. *Corpus oblongum repens nudum, branchiis ad latera instructum, saepius in tubulo.*

Os anterius labiatum edentulum, proboscidem clavatam exferens.

Tentacula circum os capillaria plura, ciliata.

cirrata. I. T. corpore tereti, penicillis corporis lateralibus triplicibus. Syst. nat. XII. 2. p. 1085. n. 3. Nereis (cirrosa) tentaculis oris longissimis, capite utrinque cirris X. Müller von Würmern p. 188. t. 15. f. 1. 2. prodr. zool. dan. 2617. Amphitrite cirrata.

Dicquemare Journ. de phys. 1777. Mars. p. 215. t. 1. f. 10. II. Ver-medusa.

Habitat in mari Islandiam alluentis fundo arenoso, Koenigio detecta, & Spio cirrata nuncupata, rubra, 3rd pollices longa, sensim retrorsum attenuata, annulis conflata 60-70 retrorsum decrescentibus, labio superiori cirris protensis, dorsi superioris lateribus breviorum serie ornatis, tubulo crassò, fragili, incolae longitudo, lœsa rubrum succum fundens, quo aquani tingit & opacat.

spidaria. 2. T. cirris ad anteriora corporis octo, circa os quatuor. Syst. nat. XII. p. 1092. n. 1. Terebella. Kaehl. act. Stockh. p. 1754. p. 144. t. 3. f. A-E+

Habitat in mari mediterraneo, intra rupium foramina, quæ jam excavata deprehendit.

- conchi-lega. 3. *T. albida*, cirris oris numero's filiformibus : superioribus longissimis, branchiis ruberrimis.

Pall. misc. zool. p. 131 t. 8. f. 17-22. Nereis conchilega. Habitat in mari Belgum alluente copiosa, ad quinque pilices longa, lumbrici œmula, tania subitus rubra, carite subitus squamis & munita, tubulos e testaceorum fragmentis calami anserini crassitie & ad $\frac{1}{2}$ pedem longos struens.

- compla-nata. 4. *T. depressa*, cirris oris quatuor, corporis verrucis lateralibus penicilligeris duplice utrinque serie digestis.

Pall. misc. zool. p. 109. t. 8. f. 19-26. Aphrodita complanata.

Brown jam. p. 395. t. 39. f. 1. Nereis tentaculis capitis binis tripartitis, corporis pluribus penicilliformibus duplice serie ad latera potitis.

Habitat in mari insulis cambæis circumfuso, corporis segmentis 130 minutis, dorsi cristula carnosa, obtusa, longitudinaliter adnata.

- carunculata. 5. *T. depresso - quadrangula*, penicillorum corporis serie quadriuplici ventralium cirris nullis.

Syst. nat. XII. 2. p. 1086. n. 10. Nereis (gigantea) tentaculorum fasciculis triplici ordine.

Pall. misc. zool. p. 102. t. 8. f. 12. 13. Aphrodita carunculata.

Seba mus. 2. p. 31. t. 81. f. 7. Millepeda marina amboinensis.

Habitat in mari americano & indico, tenera, 1-14 pollices longa, penicillis lateralibus slavecentibus papille transversæ insidentibus, ventralium cirris nullis, pone cirros dorsi caruncula ovali depressa, branchiis ramosissimis, segmentis corporis ultra 90.

- rostrata. 6. *T. tetraëdra*, penicillorum corporis serie quadruplici, palato quasi elongato.

Pall. misc. zool. p. 106. t. 8. f. 14-18. Aphrodita rostrata.

Habitat in mari indico, carunculata affinis, at cute ruddiori, penicillis magis prominentibus, omnibus cirro instrutis, branchiis insignibus distincta, 8 pollices ad pedem longa, penicillorum setis rigidis, ventralium ex fusco aureolis, dorsalium ex ferrugineo fuscescens.

- flava.* 7. *T. depressa*, branchiis utrinque 37, cauda bifurca.
Pall. misc. zool. p. 97. t. 8. f. 7-11. Aphrodita flava.
Habitat in mari indicō, 2 $\frac{1}{2}$ - $4\frac{1}{2}$ pollices longa, segmentis corporis 33-40, penicillorum cirratorum pilis tenuissimis flavicantibus, dorſi cristula ex triquetro compressa, cirris duobus anterius ornata.
- rubra.* 8. *T. rubra*, depressa, cauda cirris duobus terminata, capite maxillis duabus cornēis mobilibus.
Bommé, act. Vlissing. 6. p. 379. f. 4. A. B. Rood-glinsterende Nereide of Zee-duczend-been.
Habitat in mari, Seelaudia insulis circumfuso, branchiis oculorumque defectu ad hoc genus accedens, 3 cincte pollices longa, stria dorſali nigra, capite albo cylindrico, quassata saniem mucosanu albida fundens, nitens, corporis segmentis 144.
- aphrodi-* 9. *T. teres* retrosum lente attenuata, subtus depresso-
zoides. fulco obsoleto exarata : branchiis in segmentis octo prioribus nullis, in sequentibus tribus simplicibus, in postremis sensim majoribus uno versu pinnatis.
Pall. nov. act. Petrop. 2. p. 229. t. 5. f. 1-7. Nereis aphroditoides.
Habitat in Oceano indicō, sesquipedalis segmentis 148 ultra, pedunculis carnosis cirro instrutis, papilla penicilligera, capite bicirrato.
- bicornis.* 10. *T. proboscidis* disco simplici terminali bicorni. *Abildg. Schr. berl. Naturf. 9. p. 138. t. 3. f. 4.*
Seb. mus. 3. t. 16. f. 17.
Habitat in Oceano americano.
- stellata.* 11. *T. proboscidis* disco triplici perfoliato, anteriore armato cornu truncato aculeis radiato. *Abildg. Schr. berl. Naturf. 9. p. 138. t. 3. f. 5.*
Habitat in Oceano americano.

An hujus generis vermis a M. Slabbero, act. Vlissingens. 1. p. 387. fqq. descriptus & t. 2. delineatus indicus?

286. NEREIS. *Corpus repens longum.*
Pedunculi laterales penicillati.
Tentacula simplicia, rarius o.
Oculi quatuor aut duo, rarius o.

* ore unguiculato s. forcipato.

Verfico-
lor. 2. N. subdepressa, pedunculis acuminatis setiferis. Müll. von
 Würm. p. 104. t. 6. f. 1-6. zool. dan. prodr. 2624.
 Syst. nat. XII. 2. p. 1064. n. 11. It. wgoth. 191. Stroem.
 sondm. 1. p. 160. Fabr. sp. inf. 1. p. 534. n. 13. mant.
 inf. 1. p. 341. n. 31. Scolopendra (marina) pedibus
 utrinque, corpore pallido, linea dorsali rubra.
 Habitat in mari septentrionali, male pro caussa mali haleces
 infestantis habita, corporis articulis 85, posterioribus
 sensim minoribus, ochroleuca, stria media obscure rubra,
 cauda segmentisque corporis anterioribus sordide viridi-
 bus, medium versus iridis coloribus ludentibus, tentacu-
 lis superioribus brevibus subulatis 3, inferioribus pellu-
 cidis conicis 2, lateralibus corneis 4, sanguine rubro.

Noctiluca. 1. N. corpore vix conspicuo. Fn. suec. 2098. Müll. zool. dan.
 prodr. 2623. O. Fabr. Fn. groenl. p. 291. n. 273.
 Ancon. acad. 3. p. 203. t. 3. Noctiluca marina.
 Grisl. venet. quart. Scolopendra marina lucida.
 Vianell. monogr. Luciolella aquæ marinæ.
 Habitat in omni facile mari, minutissima, agilissima, ful-
 gore e cæruleo viridi micans, & aquas perfundens.

Fimbriata. 3. N. subdepressa, pedunculis cirratis lentigeris. Müller von
 Würm. p. 144. t. 8. f. 1-3. prodr. zool. dan. 2627.
 Habitat in mari Balthico, linearis, 3 pollices longa, fulva,
 dorso medio ventrisque linea longitudinali media cæru-
 leis, tentaculis capitatis 8, cauda 2 filis terminata.

armilla-
ris. 4. N. subdepressa, pedunculis conicis: cirris lenticularibus:
 Müll. von Würm. p. 150. t. 9. f. 1-5. zool. dan. prodr.
 2626. O. Fabr. Fn. groenl. p. 294. n. 276.
 Habitat in mari septentrionali, in sabulo littorum profunde
 se condens, agilissima, filiformis, 15 lineas longa, ten-
 taculis ad utrumque capitatis latus 3 moniliformibus, cor-
 poris articulis 120, singulis utrinque pedunculo munitis,
 cauda filis 2 longis terminata.

mollis. 5. *N. fasciculis pilorum lateralibus supra pedunculos.* Fn.
suec. 2097.
Habitat in mari norwegico; an hujus generis et tribus?

Pelagica. 6. *N. supra convexa, pedunculis cirratis verrucosis.* Müller
von Würm. p. 140. t. 7. f. 1-3.
Syst. nat. XII. 2. p. 1086. n. 6. Fn. suec. 2096. Nereis
segmentis XL, subtus sulcata.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 292. n. 275.
Müll. prodr. zool. dan. 2628. Nereis verrucosa.
Act. Havn. 10. p. 169. t. e. f. 10. Nereis ferruginea.
Baster ob. subf. 2. p. 133. t. 6. f. 6.
Habitat in Oceani europaei fundo, inter radices ulvarum,
sub lapidibus et intra testas vacuas, motu flexuoso ingre-
diens, et urceolis frontis fundum perfodiens, spadicea,
tentaculis, cirris frontalibus, caudalibus lateralibusque
et pedunculis albidis, maxillis ex fusco nigricantibus,
lineadoris coccinea; ad 7 pollices longa, macula capitis
inter oculos trigona alba, 2 aliis ad latera, setis ferru-
gineis, cauda binis cirris terminata.

tubicola. 10. *N. subdepressa, pedunculis subcirratis globosis.* Müll. zool.
dan. I. p. 60. t. 18. f. 1-6. rar. I. p. 38. prodr. 2625.
Habitat in mari septentrionali, linearis, tentaculis capitis
rectis, tubulum tenacem ex proprio succo indurato fruens.

norwegi- 11. *N. convexa, pedunculis cirratis pennigeris.*
ca. *Syst. nat. XII. 2. p. 1086. n. 11. Nereis glabra, segmentis*
CXX. annularibus, ore dentato duplicitate forcipato.
Müll. zool. dan. I. p. 99. t. 29. f. 1-3. rar. I. p. 60.
prodr. 2630. Nereis pennata.
Gunner act. Nidros. 4. p. 51. t. 2. f. 7-12. Nereis madras-
poræ pertusæ glabris segmentis CXX. annularibus,
ore dentato et duplicitate forcipato.
Mus. Kirch. cl. 13. p. 412. f. 8-10.
Habitat in maris norwegici sinibus, calami anserini crassi-
tie, slavicans, linea dorsi obscure rubra, capitis tentacu-
lis 5, æqualibus, collo superne utrinque cornuto, cor-
poris articulis 126, cauda filis 2 subiliibus terminali-
tentaculis triplo longioribus.

pinnata. 12. *N. convexa, pedibus cirratis pinnigeris.* Müll. zool.
dan. I. p. 102. t. 29. f. 4-7. rar. I. p. 62. prodr.
2629.

Habitat in sinuum maris norwegici limo cærulescente, spadicea, nitoris chalybei, tentaculis capitis, 5 articulatis, segmentis corporis 106 - 122, cauda filis 2. crassis brevissimis terminata, norwegicae proxime affinis.

- corniculata.* 13. *N. subdepressa pinnata, pedunculis cirro setaque longa simplici. Müll. zool. dan. 2. t. 52. f. 1-4. rar. 2. p. 33.*
Habitat in mari Norwegico, minimia, sp. candida, agilis, albida, uirinque incisa, capitis tentaculis 6, oculis glomeratis ruberrimis, corporis segmentis 28, cauda cirris 2 longioribus terminata.

- pusilla.* 14. *N. depressa, pedunculis cirratis: filamentis articulatis. Müll. zool. dan. prodr. 2631.*
Habitat in mari norwegico.

- incisa.* 15. *N. convexa, segmentis distantibus, pedunculis simplicibus cirratis. O. Fabr. Fn. groenl. p. 295. n. 277.*
Habitat rare in mari Groenlandiam alluente procul a littore inter radices ulvarum maxinuarum, 2½ pollices longa, elongata, subtus ex albido rubicunda, sulco medio longitudinali exarata, supra pallida, ferruginea, medio subgrisea, capitis tentaculis 4, frontis cirris 2, maxillaris flavis, corporis segmentis 80.

- aphrodisoides.* 16. *N. depressa, non sulcata, pedunculis cirratis papilligeris. O. Fabr. Fn. groenl. p. 296. n. 278.*
Habitat haud frequens in mariis Groenlandiam alluentis fundo limoso, admodum vivida, vix pollice longior, capite albo: maxillis oculisque nigris, tentaculis 4, frontis cirris 2, pellucida anterius ochroleuca, ceterum rubicunda, lineis abdominalis 2 ferrugineis, rarius viridans, lineis abdominalibus, dorsi et transversalibus rubris.

** ore proboscideo.

- cærulea.* 7. *N. glabra cærulescens. O. Fabr. Fn. groenl. p. 198. n. 280.*
Syst. nat. XII. 2. p. 1086. n. 7. Amœn. acad. 4. p. 254. n. 38. Fn. suec. 1095. Nereis glabra cærulescens segmentis CLXXXIV.
Mus. Ad. Fr. 1. p. 93. Nereis tentaculorum 184. paribus.
Habitat in Oceano splendida.

- viridis.* 8. *N. depressa, lamellis peduncularum lanceolatis. Müll. von Würm. p. 162. t. 11. f. 1-6. zool. dan. prodr. 2536.*
O. Fabr. Fn. groenl. p. 297. n. 279.

Habitat in mari Islandiam & Groenlandiam alluente, in foraminibus lavæ a monte Hecla ejusdem, 3 pollices longa, graminea (junior rubicunda, linea dorsi longitudinali viridi, capite, tentaculis cirris lamellisque niveis) sili-formis, capitatis tentaculis utrinque 3, oculis 2 nigris, proboscide clavata, quam lata protrudit, corporis segmentis 130 æqualibus, candeæ cirris 2 brevibus.

maculata. 9. N. convexa, lamellis pedunculorum subcordatis. Müll. von Würm. p. 156. t. 10. f. 1-6. zool. dan. prodr. 2635. O. Fabr. Fn. groenl. p. 298. n. 281.

Syst. nat. XII. 2. p. 1086. n. 9. Nereis viridis, dorso nigro-punctato, articulis CC.

Habitat ad Islandæ & Groenlandæ littora, 2½-4 pollices longa, supra virescens: linea utrinque longitudinali obscuriore, subtus cardæque cirris brevibus pallidior unicolor, collo & parvo capite cum frontis cirris brevibus utrinque 2, & tentaculis 4 albis, pedunculorum setis & lamellis ex flavo viridibus, oculis tantum 2, proboscide clavata longa, alba, rubro filiata.

craffia. 17. N. deppressa, proboscide cylindrica, pedunculis sanguineis: setis ramosis. Müller von Würm. p. 166. t. 12. f. 1-3.

Habitat in Oceani fuso natante, 4 pollices longa, æqualis, capitatis parvi tentaculis 4 cirris 2 frontalibus rubris brevioribus, oculis 2 nigris, proboscide truncuta emissili, caudæ setis 2 rigidis inæqualibus.

stellifera. 18. N. deppressa, pedunculorum lamellis ellipticis. Müll. zool. dan. 2. t. 62. f. 1-3. prodr. 2632. rar. 2. p. 62.

Habitat in maris Norwegici sinubus, proboscide squamisque dorsi oblongis, nereides aphroditis jengens, at flexilis, filiformis, alba, subtus linea media longitudinali rubra, capitatis tentaculis sex, oculis 2, pedunculis conicis, retrosum curvatis: apicis alteriusque lateris setis in ventilabrum dispositis.

punctata. 19. N. subdeppressa, pedunculis longissime cirratis. Müll. zool. dan. 2. t. 62. f. 4. 5. prodr. 2633. rar. 2. p. 63.

O. Fabr. Fn. groenl. p. 301. n. 284? Nereis rosea.

Habitat in Norwegiae & Groenlandiae sinubus, in testis ostreorum aut fabulo sub lapidibus latens, slavescens: striis transversis fuscis, lineaque dorsi longitudinali rubra, ca-

pitis cirris, oculisque 4, pedunculorum cono punctis 4 nigris notato, corporis segmentis 40 & ultra, caudae cirris 2.

alba.

20. *N. convexa*, fronte cornuta, pedunculis bisiidis. *Müll. zool. dan. 2. t. 62. f. 6. 7. prodr. 2634. rar. 2. p. 64.*

Habitat in Norvegiae sinuum fundo argilloso, alba, annulata, retrosum attenuata, oculis nullis, proboscide nemibranacea, pellucidissima, in duplam corporis latitudinem inflanda, pedunculis utrinque 77, verrucosis.

flava.

21. *N. depressa*, pedunculorum lamellis oblongo-ovatis. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 299. n. 282.*

Habitat in mari septentrionali procul a littore Groenlandiae inter radices ulvarum, 27 lineas longa, viridi affinis, tota flava, solis pedunculorum setis, 2 oculis caudaeque cirris nigris, rostri cirris 2 brevissimis, tentaculis 2 basi unitis, corporis segmentis 140.

longa.

22. *N. subdepressa*, papillis mammillaribus pro lamellis pedunculorum. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 300. n. 283.*

Habitat ad littoro sinuum Groenlandiae in fundo argillaceo vel arenoso, praesertim ad fluviorum ostia, ad 9 pollices longa, nunc alba, setis modo caudaeque cirris nigricantibus, nunc supra rubicunda vel ex griseo viridis, nunc supravirens: lateribus obscurioribus, subtus ex aeneo albida, corporis segmentis 190, 200, 240, pedunculis bifiidis.

Prismati-
ca.

23. *N. triquetra*, pedunculis distantibus: papilla simplici setigera supra cirrata. *Müll. prodr. zool. dan. 2637. O. Fabr. Fn. groenl. 302. n. 285.*

Habitat in massa flava spongiosa facta, quæ lapides majores ad litus Groenlandiae subtus vestit, rarius in arena, 6 lineis vix longior ochroleuca, lineis dorso 3 griseis, capitis collique cirris 11, plurimis, caudaeque albis, oculis 4, corporis segmentis 25.

bihorns.

24. *N. depressa*, pedunculis papilla simplici setigera supra cirrata, mediis simul ramigeris. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 303. n. 286. Müll. prodr. zool. dan. 2638.*

Habitat cum prismaticæ, continuo se movens, pollicem longa; ex fulvo brunnea, prismaticæ affinis, capite albo, oculis 4, cirris 7, corporis utrinque attenuati segmentis 56.

cæca.

25. *N. subconvexa*, tentaculis duobus brevissimis, lamellis pedunculorum duplicatis ciliatis. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 304. n. 287.*

*Habitat in Groenlandie littoribus arenosis sub lapidibus
more lumbrii papilloſi cuniculos profundos agens, 8
pollices longa, candide linearis, tentaculis obtuse coni-
cis, proboscide ampla, sphærica, corporis segmentis
89 - 100, oculis nullis; an eadem cum naide cæca.*

ebranchi- 26. *N. teres annulosa utrinque attenuata: pedunculis cylin-
ata. dricis brevibus utrinque bifariam pinnata, tentaculis
nullis.*

Pall. nov. ad. Petrop. 2. p. 231. t. 5. f. 8-10.

*Habitat (cærulescens) in mari germanico, (ex griseo fusca)
in indico, pannis segmentiis corporis 269, ultimo crenato.*

lamelli- 27. *N. teres utrinque attenuata: proboscide mucronibus qua-
gera. tuor carneis stellata, pedunculis compressis folio supi-
semilunato subtus majore semicordato auctis.*

Pall. nov. ad. Petrop. 2. p. 233. t. 5. f. 11-17.

*Habitat in mari indico, mediterraneo & septentrionali,
inter plantas et quisquilias marinas, bipedalis, segmentis
200-550, capitis tentaculis 4, oculis 2 nigris.*

ciliata. 28. *N. depressa, ore cylindrico retractili, margine anterio-
ciliato, tentaculis nullis.*

Müll. zool. dan. 3. p. 14. t. 89. f. 1-4.

* * * ore tubulato.

prolifera. 29. *N. depressa, pedunculis cirratis, tentaculo frontis soli-
tario. Müll. zool. dan. 2. t. 52. f. 5-9. rar. 2. p. 34.*

*Habitat rara in Norvegiae sinibus, generationis modo nati-
bus similis, rufa, capitis tentaculis 3, oculis 4 nigris,
forcipe et proboscide nulla, sed loco ejus tubulo pellucido
crasso flexuoso, corporis segmentis 32-46, caudæ cirris 2-*

NAIS. *Corpus repens, longum, lineare, pelluci-
dum, depresso.*

Pedunculi setis simplicibus.

Tentacula nulla.

Oculi duo aut nulli.

vermicu- 1. *N. setis lateralibus nullis, mento barbato. Müll. 100.
laris. Würm. t. 4. f. 1. 2. hist. verm. I. 2. p. 20. n. 151. 200.
dan. prodr. 2647.*

Rœf. inf. 3. p. 573. t. 93. f. 1-7.

Habitat in aquis stagnantibus, lemnae adhaerens, 2 lineas longa, capite subclavato, oculis nullis, verrucis penduncularum setis 5-6.

Serpenti- 2. *N. setis lateralibus nullis, collari triplici nigro.* Müller.
na. *von Würm. p. 84. t. 4. f. 3. 4. hist. ver. I. 2. p. 20.*
n. 152. zool. dan. prodr. 2648.

Roef. inf. 3. p. 567. t. 92.

Habitat in Europæ aquis stagnantibus ad radices lemnae, vermiculari minus depresso & longior, 9 quippe lineas longa, pedunculis verrucosis: setis 3 uncinatis.

Proboscidi- 3. *N. setis lateralibus solitariis, proboscide longa.* Müll. von
dea. *Würm. p. 14. t. 1. f. 1-4. hist. ver. I. 2. p. 21.*
n. 153. zool. dan. prodr. 2649.

Syst. nat. XII. 2. p. 1085. n. 2. Nereis (lacustris) linearis,
lingua exserta.

Roef. inf. 3. p. 483. t. 78. f. 16. 17. & t. 79. f. 1.

Trembley hist. polyp. t. 6.

Lederm. microsc. t. 82. f. f. & h.

Schaeff. Armpolyp. 1754. t. 3.

Habitat in Europæ aquis paludosis, rivis, piscinis, &c. 2½-4 lineas longa, hyalina, intestino flexuoso nigricante, segmentis singulis utrinque seta simplicissima munita, capite forficato, oculis 2 nigris, ore linguaeque instruendo, ano terminali, partibus & incolis aquæ invisibilibus vivitans.

Linguis. 4. *N. setis lateralibus solitariis, proboscide nulla.* Müller. von
Würm. p. 74. t. 2. f. 1-4. hist. ver. I. 2. p. 22. n. 154.
zool. dan. prodr. 2650.

Habitat rorior in aqua rivulari proboscideæ affinis, angustior, 4-5 lineas longa, ore antertus obtuso, forficis & proboscidis expertise, ano laterali.

digitata. 5. *N. setis lateralibus solitariis, cauda laciniata.* Müller. von
Würm. p. 90. t. 5. f. 1-4. hist. ver. I. 2. p. 22. n. 155.
zool. dan. prodr. 2651.

Habiteat in rivorum sedimento arenoso, capite in limo condito, oculis nullis 5 lineas longa, subtus duplice verrucarum pusillarum ciliatarum instructa, cauda in 6 laciniæ inæquales sursum porrectus divisa, vena rubra.

Naides partitione transversa naturali & artificiali mirifice multiplicandæ, plurimæ in aquis dulcibus degunt; Nereides, Terebellæ, Amphitrite, Spiones, Aphrodites omnes in aqua salsa.

- barbata*. 6. *N. setis lateralibus fasciculatis, proboscide nulla. Müller. von Würm. p. 80. t. 3. f. 1-3. hist. ver. I. 2. p. 23. n. 156. Zool. dan. prodr. 2652.*
Bonnet tr. d'insectol. obs. 21.
Habitat in foveis silvarum aquosis, helicibus planorbibus saepe adhaerens, digitae similis, at subitus pilis, & ad singula segmenta corporis utrinque setis 4 divergentibus munita, oculisque 2 nigris gaudens, 4 lineas longa.
- cæca*. 7. *N. verrucis lateralibus setosis, oculis nullis. Müll. zool. dan. prodr. 2653.*
Habitat in sinibus Islandiae, & Christianiensi Norvegiae; an propria species hujus generis?
- littoralis*. 8. *N. setis lateralibus nullis solitariis geminatis fasciculatis varia. Müll. zool. dan. 2. t. 80. f. 1-8. rar. 2. p. 120.*
Habitat in Havnix littore sabulo, marina aqua teeto, fragilissima, elongata, filiformis, aequalis, rubra, raro ex albo grisea, segmentis plurimis 16, 30, 37, seta marginali distinguendis, ex annulis conseritis composita.
- marina*. 9. *N. setis lateralibus solitariis tubulo exserendo. O. Fabr. Fn. groenl. p. 315. n. 295.*
Habitat in Groenlandiae littoribus sub conservis marinis, vix 10 lineis longior, supra convexa, subitus plana, posterius acuminata, albicans, linea media longitudinali ex flavo grisea, oculis 2; an vere distincta a nereide prolifera?
- quadricus*-10. *N. verrucis lateralibus bisidis setosis, cirris abdominalibus pidata. et cauda quadrifida. O. Fabr. Fn. groenl. p. 315. n. 296.*
Habitat satis frequens in Islandiae sabulo maritimo sub lapidibus, gordii minutis vietians, $2\frac{1}{3}$ pollices longa, utrinque attenuata, subitus magis plana, oculis tentaculisque carens, nunc pallide rubra, nunc ex rubicundo grisea, linea longitudinali, subitus praesertim pulchre purpurea, corporis segmentis 104 annularibus, caudæ brevis cylindrica, cirris 4.

287. ASCIDIA. *Corpus fixum, teretiusculum, vaginans.*

Aperturæ binæ ut plurimum ad summitatem: altera humiliore.

Papillosa. 1. A. scabra, tuberculis coccineis.

Bohadsch mar. 130. t. 10. f. 1. Tethym coriaceum.

Habitat in mari adriatico.

Gelatino- 2. A. lœvis coccinea subdiaphana.

fa. *Bohadsch mar. 131. t. 10. f. 3. Tethym gelatinosum.*

Gunn. ad̄. Nidros. 3. p. 101. Tethym elegans.

Habitat in mari mediterraneo; nonne eadem cum venosa?

intestina- 3. A. elongata lœvis alba, sacculo in collum producta. Müll.
lis. *zool. dan. prodr. 2733.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 1087. n. 3. Ascidia lœvis alba
membranacea.*

*Gunn. ad̄. Nidros. 3. p. 81. t. 3. f. 3. 4. Tethym so-
ciabile; Soepungen.*

Bohadsch mar. 132. t. 10. f. 4.

Baster opusc. subs. 2. p. 84. t. 10. f. 5.

Habitat in Oceano europæo.

Quadri- 4. A. lœvis alba, aperturis quadridentatis. Müll. zool. dan.
dentata. *prodr. 2721. O. Fabr. Fn. groentl. p. 330. n. 317.*
*Habitat in Oceano septentrionali, subglobosa, rostris 2
prominentibus, balanis adhærens, 4 lineas longa.* Koenig.

rustica. 5. A. scabra ferruginea aperturis incarnatis. Müll. zool. dan.
I. p. 49. n. 18. t. 15. f. 1-5. prodr. 2720. rar. I. p.
30. O. Fabr. Fn. groentl. p. 330. n. 316.

*Olfaff. ref. ist. 900. C. b. Tethya corpore ovato rubro,
auriculis duabus.*

*Rondel. pise. 2. c. 19. poiff. p. 87. Aldrov. zooph. p.
582. Gefn. Fisch. anh. p. 82. Tethya.*

Jonst. exang. t. 19. f. 8. Tethyorum species.

*Habitat in mari septentrionali & mediterraneo, edulis, tef-
faceis, lapidibus, fucis adhærens, subdiaphana, dololi
facie, 2 pollices circiter longa, cute exteriori crassa co-
riacea, intus lœvi albida, sacculo molli lœvi carnosæ, roseo,
infra flavescente, aqua a cute exteriori disercta.* Koenig.

echinata. 6. A. *hemisphærica hispida*, osculis hiantibus coccineis. Müll. zool. dan. prodr. 2722. O. Fabr. Fn. groenl. p. 331. n. 318.

Syst. nat. XII. 2. p. 1087. n. 6. Ascidia verrucosa hispida.
Habitat in Oceano septentrionali, fucis scopario aliisque adhærens, albida, verrucis adspersa, singulis apice armatis, caudi instar, aculeis divergentibus subciliatis, supremis 2 majoribus incarnatis in aperturas terminatis.
 Koenig.

Mentula. 7. A. *compressa pilosa*, sacculo rubro, aperturarum altera laterali. Müll. zool. dan. I. p. 24. n. 6. t. 8. f. 1-4. prodr. 2724. rar. I. p. 24. O. Fabr. En. groenl. p. 331. n. 319.

Rondel. pisca. c. 2. p. 129. poiff. 2. p. 81. Pudendum alterum.
Aldrov. zooph. p. 589. Mentula marina altera.

Gesn. Fischb. p. 154. f. 1. Anh. 4. p. 84. Mentula marina, pudendi marini altera species.

Jonst. exsang. t. 20. f. 2. Mentula marina.

Planc. conch. p. 109. t. 7. Comment. Bonon. 5. p. 243. t. 2. f. 4-7. Mentula marina informis.

Hill. anim. I. t. 5. Salecia.

Dicquemar. Journ. de phys. 1777. Mai. p. 356. t. 2. f. 1. 2. 3. Reclus marin.

Habitat in Oceano septentrionali, rufis quasi & indigesta, ochroleuca, pellucida, gelatinosa, 5-6. pollices longa, conservarum fibrillis vestita.

venosa. 8. A. *elongata subcompressa torosa rubra*, sacculo concolore. Müll. zool. dan. I. p. 85. t. 25. f. 1-3. prodr. 2736. rar. I. p. 52.

Habitat in mari Norwegico, fucis in fundo sinuum nascitibus adhærens, firma, aperturis sanguineis.

Prunum. 9. A. *ovata laevis hyalina*, sacculo albo, aperturarum altera laterali. Müll. zool. dan. I. p. 127. n. 61. t. 34. f. 1-3. prodr. 2730. rar. I. p. 83.

Habitat in mari Norwegici sinu Christianensi & glacialis Karikensi, pruni figura et magnitudine, cute laetea subtilissime rugosa, aperturarum radiis fuscis.

conchile- 10. A. *frustulis testarum vestita*, sacculo albo in cæruleum transeunte. Müll. zool. dan. I. p. 128. n. 62. p. 34. f. 4-6. prodr. 2724. rar. I. p. 84.

Mus. Ad. Fr. 96. Microcosmus gelatinosus pellucidus.
Habitat in Norwegiae sinu Drobacensi, gelatinosa, subdiaphana, cylindrica vel ovalis.

Parallelo- 11. A. candida convexa hyalina, sacculo reticulato lutescente, gramma. aperturarum altera laterali. Müll. zool. dan. 2. t. 49. f. 1 - 3. prodr. 2737. rar. 2. p. 25.

Habitat *haid frequens in fu-is sinus Norwegiae Laurwigenis, oblonga, subquadrata; angulis obtusis, lineis interdum coccineis picta.*

virginea. 12. A. elongato-compressa crystallina lævis : striis transversis coccineis, sacculo rubente. Müll. zool. dan. 2. t. 49. f. 4. prodr. 2732. rar. 2. p. 27.

Habitat *sub initium Julli ad rupes orientales arcis Norwegiae Stavern, glaciem referens, parallelogramma durior; apertura utraque punctis raris coccineis cincta.*

canina. 13. A. elongata teres flaccida : sacculo rubro. Müll. zool. dan. 2. t. 55. f. 1 - 6. prodr. 2734. rar. 2. p. 43.

Red. opusc. 3. t. 21. f. 6. et anim. viv. negl. anim. p. 101. t. 15. f. 6. Mentula marina.

Planck. conch. p. 45. t. 5. f. 5. Tethyum s. mentula marina penem caninum referens.

Bohadisch anim. mar. p. 132. t. 10. f. 4. 5. Tethyum fasciculatum.

Dicquemar. journ. de phys. 1777. Fabr. p. 137. t. 1. f. 1 - 7. Sac-animal.

Habitat *in mari Norwegico & atlantico, cute ampla, glabra, alba, subpellucida, aperturarum anteriorum ambitu ruberrima.*

Patula. 14. A. teretiuscula lutescens scabra, sacculo rufo, orificeis coccineis patulis altero laterali. Müll. zool. dan. 2. t. 65. f. 1. prodr. 2729. rar. 2. p. 71.

Habitat *infucis rupium Suerne oceanii Norwegici, pellicula, sacculo lagenæ forniam meniente.*

Afpersa. 15. A. subcompressa scabriuscula alba, sacculo maculis rubris, Müll. zool. dan. 2. t. 65. f. 2. prodr. 2728. rar. 2. p. 72.

Dicquemar. journ. de phys. OZ. 1780. p. 304. t. 2. f. 1 - 3?

Habitat *in mari Norwegico, fucis racematis adhaerens, cordiformis, cute pellucida intus lævi, sacculo flavicante.*

Ascidia, in mari modo obviae, se dilatant alternatim et contrahunt, expuunt tanquam e siphone aquam, magis minusve gelauenoje, lapidibus, fucis, testaceis affixæ, mytilum interdum includentes, piccium frequens esca, nonnullæ etiam hominibus esculentæ, pau:æ olim officinales.

Scabra. 16. A. compressa albida scabriuscula, sacculo rubro, orificiis concoloribus. *Müll. zool. dan. 2. t. 65. f. 3. prodr. 2726. rar. 2. p. 73.*

Habitat in Norwegiæ sinu Christianensi, facis latere adhærens, prima facie patulam referens, ab oculo glabra; digito tantum aspera, aperturis potius coarctatis, collo utroque conico, sacculo non maculato, cute exteriori pellucidissima, gelatinosa, duriuscula.

orbicula- 17. A. depressa albida, sacculo punctis elevatis inæqualibus. *Müll. zool. dan. 2. t. 79. f. 1. 2. rar. 2. p. 117.*

Habitat solitaria Augusto in sinu Norwegiæ Christianensi, fuco ruso affixa, gelatinosa, orbicularis, pollicis diametro, pellucida, disco opaco, aperturis collateralibus 6-7 dentatis: puncto in apice dentium coccineo, sacculo albido.

corrugata. 18. A. elongata glabra, sacculo cinereo: fasciis albis. *Müll. zool. dan. 2. t. 79. f. 3. 4. prodr. 2735. rar. 2. p. 118.*

Habitat in Norwegiæ sinubus, basi fibrillosa fucis adhærens, teres, flaccida, plicata, rugosa, cute exteriori hyalina, orificiis luteis.

Iepadifor- 19. A. clavata byalina, intestino flavo. *Müll. zool. dan. 2. mis. t. 79. f. 5. prodr. 2738. rar. 2. p. 119.*

Habitat in Norwegiæ sinubus, fucis & cancris brachyuris adhærens, facile flaccescens, clava compressa subquadrangula.

compla- 20. A. depressa inæqualis albida, interaneis nigris, orificiis fulvo punctatis. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 332. n. 320.*

Habitat frequens in littore arenoso Groenlandiæ, basi sua lapidibus arcte adhærens, subcarnosa, oblonga, pellucida, 9 lineas longa.

Tuberu- 21. A. oblonga compresso-gibba flavicans, punctis eminentibus concoloribus, orificiis verticalibus rubris. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 332. n. 321.*

Habitat in fundo maris Groenlandiam alluentis, ulvarum radicibus arcte adhærens, 3 lineis vix longior.

villoſa. 22. A. obovata radicata albida lanugine conferta vestita, aperturis terminalibus concoloribus. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 333. n. 322.*

Habitat in fundo maris Groenlandiam alluentis, radice inter radices ulvarum fixa, 4 lineas longa, erecta, teres cutes substuposa, verrucis minutissimis confertis obsita.

- clavata.* 23. A. stipite filiformi, aperturarum utraque laterali. *Müll. zool. dan. prodr. 2740. O. Fabr. Fn. groenl. p. 333. n. 323. Mant. plant. p. 552. Vorticella Bolteni. Bolten. epist. de nov. zooph. Hamb. 1771. 4.*

Habitat in mari septentrionali, scopulis rupibusque basi sua arctissima adhaerens, serpulis & zoophytis sapientia tota obducta, 9 pollices, & ultra longa, spadicea, rarius rubicunda, radicata, cute crassa callosa, intus glabra, alba, stipite filiformi, rigido, erecto, subsflexuoso, sursum invassato dilatato, nunc longiori, nunc breviori, clavata, nunc laevi, nunc subsulcata, aperturis rugosis, eminentibus.

- peduncu- lata.* 24. A. stipite sensim attenuato, capitulo fusiformi, apertura utraque terminali.
Syst. nat. XII. 2. p. 1319. n. 14. Vorticella (ovifera) simplex solitaria, flore ovali, stirpe simplicissima scabra. Pall. spic. zool. 10. p. 25. t. I. f. 16. Ascidia clavata. Edw. glean. t. 356.

Habitat in mari inter Asiam & Americam borealem intermedio, basi variis marinis affixa, coriacea, rugosissima, coccinea, orificeis papillaribus, rugis aliquot circularibus cindis.

- mammili- taris.* 25. A. subparallelepipedo albicans, aperturis terminalibus concoloribus. *Pall. spic. zool. 10. p. 24. t. I. f. 15.*
Habitat in salo Cornubiens, situ horizontali scopulis submarinis tenacissime adnata, valde irritabilis, difformis, varie rugosa & gibbosa, hinc inde sevis mollibus adspersa, coriacea sordide albicans, aperturarum papilla hemisphaerica intus elegansissime coccinea.

- globula- ris.* 26. A. ovali-sphaerica semipellucida, aperturis terminalibus vix prominentibus. *Pall. it. 3. p. 709. n. 57.*

Habitat copiosa in littoribus radosis arenariis Oceani glacialis, cerasi magnitudine, pedunculo brevissimo affixa, cute duriuscula extus laevi, arenulis adglutinatis obducta.

- Phusca.* 27. A. teres rubra, apertura utraque laterali.
Forsk. Fn. arab. &c. p. 129. n. 32. Alcyonium Phusca;

Habitat in Smyrnam et Constantinopolin alluente mari, saxis adhærens, 2½ pollices longa; lævis, utrinque obtusa, nunc recta, nunc incurva, cortice stupoſo recedo Græcis cum succo limoniorum edulis.

Gelatina. 28. A. compressa lævis alba, fæcculo pallido, orificiis punctis luteis cinctis. Müll. zool. dan. prodr. 2723.
Habitat in mari Norwegico.

crystal- 29. A. compressa lævis, fæcculo albo atomis coccineis sparso-
lina. Müll. zool. dan. prodr. 2725.
Habitat in mari Norwegico.

octoden- 30. A. oblonga birostris lævis albicans, aperturis hinc octo-
tata. illinc sexdentatis. Müll. zool. dan. prodr. 2731. Ad-
Havn. 10. p. 168. f. 7. B. 8. 9.
Habitat in mari Norwegico.

patellifor- 31. A. alba, disco rubro. Müll. zool. dan. prodr. 2739.
mis. *Habitat in mari Norwegico.*

Pyura. 32. A. conica lævis intus papillosa rubra, tubulis duobus terminalibus punctisque inter hos duebus nigris. Mol. hist. nat. Chil. p. 172.
Habitat gregatim sacco inclusa ad littus Chilense, edulis, utrum hujus, an proprium genus?

Auran- 33. A. subglobosa: fæcculo coccineo punctis duriusculis tium. scabro, pupillis terminalibus cylindraceis rugosis. Pallas n. ad. Petrop. 2. p. 246. t. 7. f. 38.
Habitat in mari Curilas insulas alluente basi testis lapiliisque adhærens pomii aurantii magnitudine.

globula- 34. A. ovato globosa semipellucida glabra pedunculata: ria. fæcculo extus subtilissime punctata, aperturis distantibus vix prominulis. Pallas n. ad. Petrop. 2. p. 247. t. 7. f. 39. 40.
Habitat frequens in maris hyperborei littoribus vadofis arena subtili striatis e. g. ad sinum Caræ, cerasi majoris magnitudine, simplicissima, cinerascens, arena tenera agglutinata scabra, pedunculo brevissimo.

SALPA. *Corpus liberum gelatinosum utroque apice apertum intus vacuum : intestino obliquo.*

* appendice instrudæ.

maxima. 1. *S. corpore utroque apice appendiculato.* *Forsk. Fn. ægypt. arab. p. 112. n. 30.*

Habitat in mari mediterraneo et Archipelago, hyalina, spithamiam longa subquadrigula, nucleo obscure testaceo opaco ad anum, appendice posteriore subulata, priore conica longiore.

pinnata. 2. *S. ore terminali, linea dorsali hinc flava inde alba, abdominis lineis duabus albo rubentibus.* *Forsk. Fn. arab. ægypt. p. 113. n. 31.*

Habitat in mari mediterraneo, 2 pollices longa, hyalina, subiriquetra, dorfi linea opaca, appendice pinnam cæmulante, triquetro-prismaticæ.

democra- tica. 3. *S. punctata fasciata, aculeis pone octo.* *Forsk. Fn. arab. ægypt. p. 113. n. 32.*

Habitat numerofissima ad Majorcam, ovalis antrorsum truncata, digitum latum longa, nucleo baseos opaco cæruleo, rarius ejus loco circulo multiradiato cærulefcente, cauda biseta.

mucrona- ta. 4. *S. ore laterali, mucrone hyalino interno ad frontem dextro, ad anum sinistro, nucleo cæruleo oblongo.* *Forsk. Fn. arab. ægypt. p. 114. n. 33.*

Habitat ad Yvicam, hyalina, oblongo-ovata, posterius acuta, digitum transversum longa, nucleo opaco.

* * appendice nulla.

punctata. 5. *S. ore subterminali, dorso rubro-punctato pone mucronato, ano porrecto.* *Forsk. Fn. arab. ægypt. p. 114. n. 34.*

Habitat rario in mari mediterraneo, sequipollicaris, hyalina, abdominis fasciis obsoletis, nucleo ad anum globoso opaco ex ferrugineo flavescente.

Salpa, gregarie, sæpius cohærentes, systoles et diastroles phænomena egregie monstrantes, et ascidiarum more aquam quasi ex siphone expellentes, et Dagysa, an proprium ambo constituant genus, hunc ordinu adscribendum, judicent animalia vivorum animalium: Hujus species adhuc incognita a Banksio et Solanero in mari hispanico captæ, illiusq; viri examen cum orbe litterario communiceandum adhuc expedient, gregarie, cohærentes, eximiis coloribus conspicue-

- confœde. 6. *S. ore terminali, dorso gibboſo. Forsk. Fn. arab. ægypti rata.* p. 115. n. 35.
Habitat in Mari Mediterraneo, & Archipelago, pollice longior, subtetragona, hyalina, mollis, nucleo pone gibbum dorsi globoſo-ovato, opaco, obscure brunneo: linea ex hoc exeunte pellucida.
- fasciata, 7. *S. ovato-oblonga, ore terminali, abdomen fasciato, intestino filiformi incurvo supra nucleum. Forsk. Fn. arab. ægypt. p. 115. n. 36.*
Habitat rario ad ingressum Archipelagi, sesquipollicaris, hyalina, abdominis fasciis 5, nucleo marginali ferrugineo, opaco.
- Sipho. 8. *S. subcylindrica obtusa hyalina, nucleo brunneo, fronte tubulis duobus: apicibus perforatis rubris. Forsk. Fn. arab. ægypt. p. 115. n. 37.*
Habitat in mari rubro ad Djiddam, basi saxis marinis aucti spongiæ affixa, vix digitum transversum longa, nucleo prope basin globoſo, opaco, intestino ex fuso cœruleo-
- africana. 9. *S. subtriquetra transverse, decemstriata, ore terminali, gibbo ad basin aucto nucleis tribus. Forsk. Fn. arab. ægypt. p. 116. n. 38.*
Habitat ad littora Tunetana, sesquipollicaris, hyalina, nucleo priori opaco brunneo globoſo, reliquis albidis, subpellucidis.
- Solitaria. 10. *S. hyalina ovalis, ore terminali: tubulo cœruleo, annulari cœruleo. Forsk. Fn. arab. ægypt. p. 116. n. 39.*
Habitat in mari rubro ad Djiddam, gramine adhærens, digitum transversum longa, depressoſcula, nucleo prope basin medianam globoſo pallide brunneo.
- polycra- tica. 11. *S. ore infra apicem, fronte caudaque truncatis. Forsk. Fn. arab. ægypt. p. 116. n. 40.*
Habitat in mari mediterraneo, sesquipollicaris, congeneribus rigidior, abdominis fasciis 5 transversis, nucleo globoſo fuso.

DAGYSA. *Corpus angulatum cavum, utroque fine apertum.*

notata. I. D. altero fine macula fusca notato. Banks & Solander apud Hawkesworth. it. 2. p. 2.
Habitat in mari hispanico, 3 pollices longa, at 1 crassa, lateribus altera alteri adhaerente.

CLAVA. *Corpus carnosum, gregarium clavatum, pedunculo tereti affixum: apertura unica verticali.*

Parasitica. I. Cl. pedunculo albido pellucido, clava rubra opaca, mucronibus pellucidis conicis erectis obsessa. Müller. Beschr. berl. Naturf. I. p. 406. t. 5. f. 3. 4.
Habitat in maris balthici fuco nudoso, testaceis, palis, trabibus, parum vivida, ostamen dilatans & contrahens, hydris affinis.

288. ACTINIA. *Corpus rugosum, cirris eccentricis, apertura unica terminali, basi affixum.*

rufa. I. A. rufa, foramine rosaceo, cirris pallidis. Müll. zool. dan. I. p. 75. t. 23. f. 1-5. rar. I. p. 47. prodr. 2797. Syst. nat. XII. 2. p. 1088. n. I. Müll. zool. dan. prodr. 2793. Actinia (equina) semiovulis laeviuscula. Mus. Ad. Fr. I. p. 93. Tethys (mentula) semiovatus. Brown. jam. p. 787. Actinia subfuscata mollis, fundo muculoso. Rondel. poiss. p. 380. Urtica marina libera Aristotelis. Aldrov. zooph. p. 567. Urtica parva Rondeletii. Gesn. Fischb. 2. p. 10. Urtica parva marina. Jonst. exang. t. 18. Urtica parva. Hill. anim. t. 5. Medusa, species I. Dicquem. atl. angl. vol. 63. t. 16. f. 1-3. Anemone de la première espèce. *Habitat in Oceano, etiam glaciali, & mari mediterraneo, rupibus adhaerens, rarius versicolor, formæ variabilis, nunc cylindricæ, nunc globosæ, nunc conicæ, nunc*

Qqq qqq qqq

*evolatæ, cirris albidis, tenuibus, flexilibus, mobilissimis;
diametro corporis brevioribus, apice truncatis.*

- crassicorn. 2. *A. rubra, cirris conico elongatis.* Müll. zool. dan. I. p. 77.
nis. Syft. nat. XII. 2. p. 1088. n. 2. *Actinia (senilis) subcy-
lindrica transverse rugosa.*
*Müll. zool. dan. prodr. 2792. Actinia rubra, cirris fu-
formibus.*
*Bast. opusc. subs. 3. p. 120. t. 13. f. 1. Actinia rugis lon-
gitudinalibus, proboscidibus longis crassis.*
Fn. suec. 2103. Priapus senilis.
Forsk. fn. arab. æg. p. 101. Priapus ruber.
*Rondel. poiff. p. 381. c. 14. Bellon. aq. p. 342. Gesn. Fischb.
2. p. II. Jonst. exsang. t. 18. f. 2. Urtica rubra.*
*Aldrov. zooph. p. 568. Urtica rubra, Urtica explicata Bel-
lonii, Urtica contracta Bellonii.*
*Dicquem. að. angl. vol. 63. t. 16. f. 10. & t. 17. f. II. 12.
Anémone de la seconde espèce.*
Stroem. spondm. I. p. 204.
Gunn. að. Stockh. 1767. t. 4. f. 4. 5.
Fabr. it. norw. p. 261.
*Habitat in mari atlantico, mediterraneo, septentrionali,
glaciali.*
- plumosa. 3. *A. tentaculis parvis, margine penicillis cirtata.* Müll. zool.
dan. 3. p. 12. t. 88. f. 1-4. rar. I. p. 77. prodr. 2791.
Syft. nat. XII. 2. p. 1088. n. 3. *Actinia (folina) subcylin-
drica striata laevis glande muricata.*
*Bast. opusc. subs. 3. p. 122. t. 13. f. 2. Actinia rugis orbic-
ularibus, proboscidibus multis tenuibus.*
*Olafs. it. iſl. 2. p. 1002. Actinia corpore ventricoso molli-
tentaculis numerosis variis.*
*Gunn. að. Nidros. 5. p. 425. t. 7. Actinia (polymorpha)
laevis rufa, basi inæquabili & dilatabili, tentaculis du-
plicis gerens.*
*Dicquem. að. angl. vol. 63. p. 397. Anémone de la qua-
trième espèce.*
*Planck. conch. min. nat. p. 43. t. 4. f. 6. Urtica soluta cu-
ryophyllum referens.*

*Actio: m, quibus pro ore & ano unica apertura data est, testaceis, pisciculis, aliis
animalculis marinis videntur, ipsæ esculentæ, nonnullæ per quam sapido:, for-
ma ut tentacula nunc retracta, nunc magis minusve exserta mire variabilis, ab-
scissæ partes redintegrant, lucem vividissime sentiunt, plurimæ vivipare.*

Habitat in Oceano europeo, pulcherrima, nunc castanea, nunc ex luteo fusca, nunc ex luteo virens, nunc alba; modo opaca, modo pellucidissima, fauci laciniis nunc albis, nunc rufis, nunc aurantiis.

Judaica. 4. A. cylindrica laevis truncata, praeputio interne undulato laevi.

*Planct. conch. min. not. p. 43. t. 6. Colum marinum,
Habitat in mari mediterraneo.*

effeta. 5. A. subcylindrica angulo-striata.
*Bast. opusc. subf. I. p. 122. t. 14. f. 2.
Habitat in Oceano.*

coccinea. 6. A. albo rubroque varia, cirris cylindricis annulatis. Müll.
*zool. dan. 2. t. 63. f. 1-3. prodr. 2794. rar. 2. p. 65.
Nov. act. nat. Cur. 6. p. 53. Actinia virginea.
Habitat rara in Norvegia sinibus, fucis lapidibusque adhærens, cylindrica, truncata, glabra: margine supero tentaculorum conicorum alborum rubro annulatorum, duplii serie muricato, glande glabra: centro fissuris perforato.*

undata. 7. A. conica pallida, striis duplicatis rugosis fulvis. Müll.
*zool. dan. 2. t. 63. f. 4. 5. rar. 2. p. 66.
Habitat in Norvegia sinu Christianienli, fucis & milleporæ polymorphæ adhærens, truncata facie, porrecta cylindracea, retracta truncato-conica, tentaculis ex centro excurrentibus pallidis, pellucieis, longis.*

viduata. 8. A. grisea, striis longitudinalibus cirrisque albis. Müll.
*zool. dan. 2. t. 63. f. 6-8. prodr. 2799. rar. 2. p. 67.
Aldrov. zooph. p. 565. Urtica cinerea Rondeletii.
Habitat haud frequens in fuco saccharino maris norwegici, conico-truncata, strigis 24, aperturæ centro rugoso rubro.*

truncata. 9. A. rufo-lutea conica glabra pellucida. Müll. zool. dan.
*prodr. 2795.
Dicquem. act. angl. 63. p. 387. t. 17. f. 13 ? Anémone de la troisième espèce.*

8) *Actinia intestinalis. O. Fabr. fn. groenl. p. 350. n. 342.
Habitat in Oceano europeo.*

nodosa. 10. A. rugosa sulcata, utroque fine ampliori supero tuberculato cum cirris intermediis brevibus compressis coccineis.
O. Fabr. fn. groenl. p. 350. n. 341.

Habitat in mari Groenlandiam affluentis profundis, fundo rupeſtri adhaerens, 4 pollices longa, ex albo rubens, aperitura cirrorum dupli ordine cincta.

Spectabi- 11. A. cærulea lævis, cirris crassis albo maculatis, foramine radiato. O. Fabr. fn. groenl. p. 351. n. 342. b.

Habitat ad Groenlandiae littora, in cavernis rupium frequens, ad 2 pollices longa, ſtrigis longitudinalibus albo punctatis varia.

ditata. 12. A. fulva punctis albis, cirris roſeis. Müll. zool. dan. prodri. 2796.

β) A. cælificornis. O. Fabr. fn. groenl. p. 348. n. 340.
Habitat in Oceani septentrionalis rupibus littoreis in fissuris, β) tota mollis, lubrica, nunc lenticulae magnitudine, nunc pollicem longa, albida, ſubgrisea vel rubicunda; lineis longitudinalibus albo punctatis.

gigantea. 13. A. cinereo virescens, limbo plicato corpore multoties latiore, tentaculis papillæformibus virescentibus.

Forsk. fn. ar. ægypt. p. 100. n. 8. Priapus giganteus.

Habitat in mari rubro ad littora vadossi Lahajæ & Moccæ, in caeno fabuloso ſe recondens, 4 pollices longa, tentaculis apice violaceis.

alba. 14. A. gelatinosa albido-hyalina, tentaculis parvis papilliformibus oblongis.

Forsk. fn. æg. arab. p. 101. n. 9. Priapus albus.

Habitat in mari rubro, lapidibus littoreis adhaerens, vis pollicis diametro, vittis longitudinalibus obscuris.

viridis. 15. A. fusco vires, tentaculis diametri longitudine.

Forsk. fn. æg. arab. p. 102. n. 11. Priapus viridis.

Habitat Alexandriæ in Ægypto, lapidibus submarinis infidens, pollicis diametro, tentaculorum serie multiplici; sub his glandulae marginales.

Priapus. 16. A. corpore cylindrico basi dilatato, tentaculis maculatis.

Forsk. fn. æg. ar. p. 102. n. 12. Priapus Polypus.

Habitat in mari rubro prope urbem Ghomfoda, teſtaceis adhaerens, albida fusco nebulosa, ad 2 pollices longa, circa lo circa os rubro, tentaculis diametro triplo brevioribus, exterioribus rufescentibus, interioribus flavis.

- candida.** 17. A. lœvis foramine rugoso, tentaculis setiformibus flexuosis ad summum marginem dispositis. *Müll. zool. dan.* 3. p. 58. t. 115. prodr. n. 2798.
Habitat in Oceano septentrionali.

- bicornis.** 18. A. hemisphærico-ovalis glabra bicornis. *Müll. zool. dan.* prodr. 2800.
Olafs. it. isl. p. 900.
Habitat in Oceano septentrionali.

- Volva.** 19. A. corpore cylindrico superne plano, appendicibus orificiis sex. *Müll. zool. dan. prodr. 2801.*
Olafs. it. isl. 900. Gigarpissa.
Habitat in Oceano septentrionali, an hujus generis?

- Caryophyllus.** 20. A. rubro fusca, tentaculis parvis penicilliformibus. *Martin in marine verm. I. p. 1. t. 1. f. 1.*
Habitat in mari britannico.

- Iris.** 21. A. corpore tentaculisque obtusis cylindricis: exterioribus rufis; interioribus cæruleis. centro albido. *Müll. zool. dan. 3. p. 3. t. 82. f. 5. 6.*
Habitat in Oceano norwegico.

- Fiscella.** 22. A. rugis longitudinalibus transversim striatis, tentaculis cylindricis obtusis annulatis. *Müll. zool. dan. 3. p. 13. t. 88. f. 3.*
Habitat in mari norwegico.

- Pusilla.** 23. A. elliptica lœvis, radiis duplicis ordinis; exterioribus apice nigris. *Ol. Swarts n. aet. Stockh. 1788. 3. n. 7. t. 6. f. 2.*
Habitat in Oceano 57. latitudinis, pist majoris magnitudine, cætaceorum pabulum.

MAMMARIA. Corpus lœve cirris nullis: apertura unica.

- Mammilata.** 1. M. conico ventricosa alba. *Müll. zool. dan. prodr. 2718.*
Habitat in mari norwegico.

- Varia.** 2. M. ovata, albo & purpureo varia. *Müll. zool. dan. prodr. 2719.*
Olafs. it. isl. 900. Sættu Koppar i Sæ.
Habitat in Oceano septentrionali.

Globulus. 3. M. globosa cinerea. libera. O. Fabr. Fn. groenl. p. 329. n.
315.

Habitat frequens in Groenlandia littore inter radices succorum, terebellæ cirratæ cibus præcipuus, simplicissima, mollis, laevis, sesquilineæ diametro, gelatinosa, cutem tenuissima.

PEDICELLARIA. Corpus molle pedunculatum: pedunculo rigido fixo, apertura unica.

globifera. 1. P. capite sphærico, collo nullo. Müll. zool. dan. I. p. 52^a. t. 16, f. 1-5. prodr. 2782. rar. I. p. 32.

Habitat inter echini Drobacensis aculeos, mucorem referrens, capite rubescente, cerasi facie, pedunculo spadiceo sextupo longiore: cute gelatinosa hyalina.

triphylla. 2. P. capite trilobo: lobis subquadrangularibus muticis, collo tereti. Müll. zool. dan. I. p. 54. n. 20. t. 16. f. 6-9. prodr. 2781. rar. I. p. 33.

Habitat rarius in echini Drobacensis aculeis, collo flexuoso cyaneo, capitis lobis rubentibus aut hyalinis, interdum ovatis, pedunculo spadiceo.

tridens. 3. capite trilobo; lobis ovalibus aristatis, collo tereti. Müll. zool. dan. I. p. 54. n. 21. t. 16. f. 10-15.

Habitat frequens inter echinorum Drobacensium aculeos, collo laevi, hyalino, interdum rubente, lobis capitis interdum 4, collo triplo longioribus, rarissime muticis: Pedunculus rubescens, collo triplo longior.

189. TETHYS. Corpus liberum, oblongiusculum, carnosum, pedunculis nullis. Os proboscide terminali cylindrica, sub labio explicato.

Foramina duo ad latus colli sinistrum.

Leporina. 1. T. labro ciliato,

Column. aquat. 27. t. 26. Lepus marinus major.

Rondel. pisca. 526: Leporis majoris tertia species.

Habitat in mari mediterraneo.

Fimbria. 2. T. labro crenulato.

Bobadisch mar. 54. t. 5. f. 1. 2. Fimbria.
Habitat in mari adriatico.

PTEROTRACHEA. *Corpus liberum, gelatinosum,*
pinna gelatinosa mobili
ad abdomen vel caudam.
Oculi duo intra caput.

coronata. 1. Pt. ventre caudaque pinniferis, capitis proboscide tereti perpendiculati, frontis coronula aculeis decem. *Forsk.*
Fn. æg. ar. p. 117. n. 41.

Habitat in mari mediterraneo & archipelago, sepihamæ ferre longitudine, pollicis crassitie, proboscide 2. fere pollices longa, oculis ovalibus fuscis, cauda verticali trianguli: lineis utrinque 4 aculeatis scabra, pinnula utrinque horizontali semicordata terminata, ventris pinna pone medium, orbiculari, & altera subitus in margine campanulata, hyalina.

hyalina. 2. Pt. capite elongato porrecto lœvi, pinnula centrali. *Forsk.*
Fn. æg. arab. p. 118. n. 42.

Habitat in mari - - - celerrime mota, vix pollicen longa, oculis fuscis internis ad basin capitidis non coronati, pinnula subrotunda.

pulmonata. 3. Pt. capite obtuso hyalino, intestino respiratorio plumis ciliato. *Forsk. Fn. æg. arab. p. 118. n. 43.*

Habitat - - - subcylindrica, hyalino-rufescens, capite a trunco non distincto, oculis pellucidis, transversis, ovalibus, nigris, trunco subeius punctis alvidis opacis vario: prima subrotunda longitudinali, intestino respiratorio ante sibaldi, pone rufescente, insinuato membro violaceo basi fusco, cauda hyalina, compressa, attenuata, dimidium pollicem longa.

aculeata. 4. Pt. ventre ptero, cauda trunco longiore: lineis aculeatis pinnaque terminali horizontali. *Forsk. Fn. æg. arab. p. 118. n. 44.*

Habitat ad Archipelagi ingressum, 2½ pollices longa, hyalina, nucleo opaco flavescente, gelatina alba pellucida circumdata, cauda trunco plus duplo longiori ensiformi: pinna duplii semicordata.

290. HOLOTHURIA. *Corpus liberum crassum;*
cylindricum.

Os anticum inter tentacula
ramosa.

elegans. 10. *H. tentaculis viginti racemosis, corpore papilloso supra rubescente, subtus albo.* Müll. zool. dan. I. p. I. t. I. f. 1-3. prodr. 2804. rar. I. p. 3.

Stroem. sondm. I. p. 205.

Gunn. act. Stockh. 1767. t. 4. f. 3.

Habitat in mari norwegico, aquam siphonis instar extrudens, ex foramine minori, 8-11. pollices longa, ex rubro albo que varia, papillis acuminato distantibus, dorsi in 6 series digestis, tentaculis carnosis albis, apice fasciculo fibrarum intus nodulosarum instrutis.

frondosa. 1. *H. tentaculis frondosis, corpore lavi.* O. Fabr. Fn. groenl. p. 353. n. 344.

Gunner. act. Stockh. 1767.

Habitat in Oceano norwegico, ovato oblonga, tentaculis 10. capite longioribus, foraminibus pone caput 3 approximatis & 1. laterali magis remoto.

Phanta- 2. *H. tentaculis ramosis, corpore posterius attenuato subtus pus.* Müll. zool. dan. 3. p. 54. t. 112. 113. prodr. 2804.

Syst. nat. XII. 2. p. 1089. n. 2. Holothuria tentaculis ramosis, corpore subsquamo trifariam punctato.
Aldr. zooph. p. 590. Pudendum missum a Sittardo, Epipetrum quorundam.

Gesn. Fischb. 2. p. 24. Pudendi marini alia species.

Act. Stockh. 1765. p. 265. t. 10.

Habitat in mari norwegico & mediterraneo, ovata, subtus plana, posterius conica, apice perforato, tentaculis 10 retractilibus.

tubulosa. 3. *H. tentaculis vinginti racemosis, corpore supra papilloso, subtus tubuloso.*

Syst. nat. XII. 2. p. 1090. n. 3. Holothuria (tremula) tentaculis fasciculatis, corpore papillis hinc subconicis illinc cylindricis.

Rond. zooph. c. 17. Aldr. zooph. p. 508. Holothurii prima species.

Jonst. exang. p. 56. c. 2. t; 19. f. 1. & p. 57. c. 4. *Holothurius Rondeletii*.

Aldr. zooph. p. 590. *Epipetrum zoographi simile*, & p. 589. *Genitale*.

Bell. aq. p. 441. *Genitale marinum*.

Column. aq. 16. *Pudendum regale piscatorium*.

Planct. conch. min. not. 103. t. 8. f. A. B. & *vandell. diff.* p. 89. t. 3. f. 1-3. *Mentula marina*.

Bohadisch. anim. mar. p. 75. t. 6. & t. 7. f. 1-5. *Hydra*.

Forsk Fn. ægypt. ar. t. 39. f. A. *Fistularia*.

Gesn. Fisckb. anh. 4. p. 82.

Habitat in mari mediterraneo & adriatico, an hæc, quæ teste Ill. Pallas siccata Sinenibus in cibum cedit?

Physalis. 4. *H. cirris difformibus filiformibus pendulis.* *Amcen. acad.* 4. p. 254. t. 3. f. 6.

Rumpf. mus. 49. ? *Holothuria*.

Sloan. jam. 1. p. 7. t. 4. f. 5. *Urtica marina soluta purpurea oblonga*, cirris longissimis.

Brown. jam. 386. *Arethusa crista subrubella venosa*.

Osb. iq. 284. t. 12. f. 1. *Physalis pelagica*.

Habitat in pelago, mari atlantico, ovata, subtrigona, hyalina, dorso acuto obscure viridi, anterius rufescens; rostrum spirale rufescens; tentacula plurima inæqualia alia teretia, crassiora breviiora, alia media capillaria: apice luteo globose, alia longiora filiformia.

Thalia. 5. *H. crista compressa: lineis lateralibus integris.*

Brown. jam. 384. t. 43. f. 3. *Thalia oblonga*, crista perpendiculari compressa quadrata: lineis lateralibus integris.

Habitat in pelago americano; an hujus generis?

Caudata. 6. *H. caudata, crista compressa: lineis lateralibus interruptis.*

Brown. jam. 384. t. 43. f. 4. *Thalia oblonga caudata*, crista depresso rotundata: lineis lateralibus interruptis.

Habitat in pelago; an hujus generis?

Denudata. 7. *H. deslituta crista caudaque.*

Brown. jam. 384. *Thalia oblonga lineis interruptis, cauda & crista deslituta.*

Pis. bras. 296. *Moucicou*.

Habitat in pelago americano; an hujus generis?

Pentaeta. 8. *H. tentaculis denis, corpore quinquefariam verrucoso.* *Müll. zool. dan.* 1. p. 110. n. 50. t. 31. & 3. p. 45. t. 108. f. 1-4.

prodri. 2806. rar. 1. p. 71. O. Fabr. Fn. groenl. p. 352^a
n. 343.
Plin. hist. nat. l. 9. c. 2. Rondel. pisc. 2. c. 25. Aldrov.
zooph. p. 593. Gesn. Fischb. art. 4. p. 85. Johnst. exang.
c. 5. t. 20. Cucumis marinus.
Vandell. diff. p. 87. t. 2. f. 12. Cucumer marinus.
Planc. conch. min. not. p. 99. t. 6. f. D. E. F. Comm. Bo-
non. V. p. 242. t. 2. f. 1-3. Echinus coriaceus ad os sim-
briatus.
Hill. hist. an. t. 5. Aphroditia quarta.
Olaßt. id. 2. p. 900. Brimbatus.
Penn. act. angl. 1761. p. 75. t. 1. f. 3. A. B. Hydra coral-
liflora, tentaculis retractilibus frondosis.
Dicquemar. journ. de phys. Od. 1778. p. 287. t. 11. f. 1-6.
Fleurilarde.
Habitat in mari europeo omni, ad 6 usque pollices longa;
in fundo maris decurrens, & longe a littoribus natans;
vivipara, laevis, ex viridi brunnea, tentaculis apice ru-
bicundis, cute crassa.

papillosa. 24. H. tentaculis decem frondosis, corpore ovato undique p^a
pilloso. Müll. zool. dan. 3. p. 47. t. 108. f. 5.
Habitat in sinubus insularum Facroc.
Spallan- 25. H. tentaculis 96 filamentosis. Spallanzan. act. soc. ital. 2^a
zani. Habitat in mari mediterraneo.

Priapus. 9. H. ore papillis carnosis, corpore striis annularibus glandi-
longitudinalibus. O. Fabr. Fn. groenl. p. 355. n. 34.
Ancon. acad. 4. p. 255. Priapus (humanus) cylindricus
striis annularibus, glande striis longitudinalibus elevatis
Müll. zool. dan. 3. p. 27. t. 96. f. 1. prodri. n. 2807.
Abildg. Schr. berl. Naturf. 9. p. 133. t. 3. f. 1.
Habitat in Oceano indicō & septentrionali, mari quoque me-
diterraneo, ad 6 pollices longa, cotti gobionis esca: Pa-
dimidia cylindrica striis numerosissimis annularibus exar-
rata osculo terminatur, striis 3 rugosis cinclo, & fasci-
lum tentaculorum oblongum protrudente, altera obovata,
glandiformis striis 24 longitudinalibus, parallelis, elevat-
tis, distantibus, ciliato-scabris exarata, osculo concav-

Holothuriae omnes maris incolae per aperturam anteriorem nutrimentum hauriunt,
fæces expellunt, per posteriore aquam ingressum ejiciunt, veram figuram ^{na}
raro diu occultantes & tentaculis nunc emisis, nunc retractis mutantes, corporis
quoque ipsum nunc expendendo, nunc contrahendo.

stria annulari excavata cincto, intus aculeis plurimis recurvis: exterioribus majoribus. An hujus generis?

- squamata.* II. H. tentaculis octonis subramosis, corpore supra scabro, subtus molli. Müll. zool. dan. I. p. 35. n. 10. t. 10. f. 1-3. prodr. 2810. rar. I. p. 20. O. Fabr. Fn. groenl. p. 356. n. 348.
Nov. ad. nat. Cur. 6. p. 54. Aetinia squamata.
Pall. nov. ad. Petrop. 2. p. 244. t. 7. f. 34-37. Ascidia squamata.
Habitat in Norwegiae sinibus, mari, Groelandiam & insulas Kurilas alluente, saxis tenacissime adhaerens, variae magnitudinis.
- Penicil-
lus. 12. H. tentaculis racemosis octo, corpore oculo pentagono. Müll. zool. dan. I. p. 39. n. 11. t. 10. f. 4. prodr. 2808. rar. I. p. 21.
Habitat in Norwegiae sinus Drobacensis fundo limoso profundo, immobilis, ventricosa, laevis alba, torque fusco, ad margines nigro, annuoque pone tentacula carinata ex nigro slava, parallelo, pallido, granulato.
- Fusus,
inhæ-
rens. 13. H. tentaculis denis, corpore fusiformi tomentoso. Müll. zool. dan. I. p. 37. n. 12. t. 10. f. 5. 6. prodr. 2809. rar. I. p. 22.
Habitat in Norwegiae sinus Drobacensis limo profundo; cinerea, squamis minutis rugosa, fibrisque brevissimis obsoita, corpus cavum cyathiforme protrudens, infra collo angusto instructum, supra in orbiculum foramine medio nigro pertusum dilatum, tentaculis latere denticulatis.
- lævis. 14. H. tentaculis duodenis corpore papilloso sexfariam lineato. Müll. zool. dan. I. p. 109. n. 49. t. 31. f. 1-7. prodr. 2811. rar. I. p. 70.
Forsk. Fn. ag. arab. p. 121. t. 38. f. A. Fistularia (reciprocans) tentaculis lineari lanceolatis utriusque ramosis.
*Habitat in Norwegiae sinuum profundo, etiam in mari ru-
bro, aliquando a piscibus degluita, papillis viscosis in-
numeris obsoeta, quarum ope manui contingentis firmissime adhaeret, porrecta, pellucida, spadicea: fasciis albis, tentaculis carnosis, lanceolatis, rubris, utrinque den-
ticulatis.*
15. H. elongata, tentaculis duodenis, corpore quinquefariam lineato punctatoque. O. Fabr. Fn. groenl. p. 353. n. 345.

Habitat ad scopulos maris Groenlandiam alluentis in fundo argilloso, quem tranat, & in quem se condit, tentacula sena alternatim exserens, mollis, laevis, candida, pellucida, 1-6 pollices longa, tentaculis molibus, albidis, apice oclofidis.

minuta. 16. *H. oblonga*, tentaculis duodenis, corpore quinquefariam papillato. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 354. n. 346.*

Habitat ad littora Groenlandiae in fundo arenoso papillas extendendo lente incedens, laevi proxime affinis, 4 lineas longa, glabra, submembranacea, albida, rarius subrubricunda, papillis singularum serierum denis, tentaculis flagicantibus apice sexfidis.

forcipata. 17. *H. ventricosa*, fine utroque angustato conico : anteriore forcipato. *O. Fabr. Fn. groenl. 357 n. 349.*

Habitat in fundo maris Groenlandiam alluentis argilloso, a cotto scorpio saepe comesta, 5 pollices longa, nollis, lubrica, cute tenui punctis innumeris parum eminentibus subaspera, forcipis rigidæ orichalceæ cruribus curvis.

zonaria. 18. *H. oblonga* depressa, vagina incarnata, sacco ex albido hyalino, zonis quinque luteis vario. *Pall. spicil. vol. 10. p. 26. t. 1. f. 17. A. B. C.*

Habitat in mari, insulam Antiguam alluente, oris transversabiliis extrinsecus prominulis hiantibus.

vittata. 19. *H. corpore molli laxo vittis albis fusca punctatis vario*, tentaculis linearib; lanceolatis ad latera dentatis.

Forsk. Fn. ægypt. arab. p. 121. n. 48.

Habitat in mari rubro ad Lohajam, frequens inter costulas, papillis suis viscosis digito contrectanti firmiter adhaerens, sesquispithamali, vittis 5 albis nigro punctatis, rarius interrupitis, & fuscis albo-guttatis alterna: in angustis, tentaculis 12, medio fuscis, ad latera pallidis.

maxima. 20. *H. corpore rigido subtetragono supra convexo subtus plano marginato albo, tentaculis filiformibus apice peltato-laciiniatis.*

Forsk. Fn. ægypt. arab. p. 121. n. 50. Fistularia maxima, Habitat in mari rubri littore, pedalis, dura, papillis fibra, tentaculis cinereo-hyalinis.

impa-
tens. 21. *H. corpore rigido cinereo, tentaculis viginti filiformi-
bus : apice pepla subseptemfida denticulata.*

VERMES MOLLUSCA. Lobaria. Triton.

3143

Forsk. Fn. ægypt. arab. p. 121. n. 51. Fistularia impatiens.
Habitat ad maris rubri littora sub lapidibus vel in portis
spongiaæ officinalis, diuriuscula, cinerea, fasciis maculatis-
que varia, verrucis hemisphæricis approximatis medio
albidis aspera, tentaculis hyalinis, nigro-punctatis,
obtuse denticulatis.

- nuda. 22. *H. orbicularis cærulea, crista nulla, tentaculis disci*
nudis, radii trifariam glandiferis.

Forsk. Fn. ægypt. arab. p. 103. n. 14. Holothuria denudata.
Habitat in mari mediterraneo a Massilia ad Moliten, dia-
metro digiti transversi, paginæ superioris disco albido striis
concentricis radiato, margine disci limboque cæruleo,
tentaculis filiformibus hyalino-cæruleofuscis; utrum
propria species hujus generis, an medusa umbella?

- spirans. 23. *H. ovalis cærulea oblique cristata, subtus tentaculis*
disci albis, radii longioribus nudis cæruleis. Forsk.
Fn. æg. arab. p. 104. n. 15.
Habitat in mari mediterraneo, 2 pollices longa, es-
culenta, diu in aqua asservata aquam cæruleo colore
inficiens, exuvias suis oniscis & monoculis in habitacu-
lum cedens, supra in umbo nem albidum protuberans,
crista bipartita semiorbiculari, tentaculis filiformibus,
mobilissimis; utrum distincta hujus generis species, an
medusa vetella?

LOBARIA. *Corpus supra convexum subtus pla-*
num, lobatum.

- Quadrilo- ba. 1. I. cauda lobalata. *Müll. zool. dan. 3. p. 30. t. 100. f. 1-5.*
prodr. 2741.
Aescanius ac. Stockh. 1772. 4. 5. t. 10. f. A. B. Philina
quadripartita.
Habitat in mari septentrionali.

292. TRITON. *Corpus oblongum.*
Os proboscide involuta spirali.
Tentacula XII. bipartita, utrinque
sex: posterioribus cheliferis.

- littoreus. 1. TRITON.
Habitat in rupium submarinarum foraminibus, in lepadibus
obvius, tentaculorum articulatorum involutorum intror-

sum ciliatorum paribus sex, posterioribus tribus cheliferis, ad basin tentaculorum os; inter extrema proboscis. Figura simills v. act. angl. 50. v. 2. p. 847. t. 34. f. A. Leeuwenh. arcana. 465. f. 7.

293. LERNÆA. *Corpus oblongum teretiusculum nudum, tentaculis 2-3 teretibus brachia æmulantibus se affigens.*

Ovaria bina, tanquam totidem caudæ.

branchia- 1. *L. corpore tereti flexuoso, ore lateralí inter cornua tria lis, subramosa.*

Müll. zool. dan. 3. p. 65. t. 118. f. 4. prodr. 2743. O.

Fabr. Fn. groenl. p. 336. n. 325. Lernæa gadina.

Strom. sondri. I. p. 209. t. 1. f. 18. Tokn trold.

) *Lernæa minor. Koelreuter commun. ac. Theod. Palat. 3^o p. 57.*

Habitat in Oceani septentrionalis gadorum branchiis, Groenlandis esculenta, digitii minimi longitudine, cava, membranacea, anterius & posterius eminens, sordide alba, vel obscurie rubra, cauda fulco perpendiculari terminata, collo longo tubulari filiformi, ovarii ex eirris 2 longis contortuplicatis.

cyprina- 2. *L. corpore obclavato, thorace cylindrico bifurco, tentaculis apice lunatis. Fn. suec. 2100. t. 2. f. 2100.* Fn. suec. I. n. 1282. f. 1282. Lernæa tentaculis quatuor, duobus apice lunatis.*

Habitat in piscinis frequens supra corpus cyprini carassii, quod maculis rubris vulnerat.

falmonea. 3. *L. corpore obovato, thorace obcordato, brachiis duobus linearibus approximatis. Fn. suec. 2102.**

Müll. zool. dan. prodr. 2744. O. Fabr. Fn. groenl. p. 337. n. 327. Lernæa corpore obovato, thorace obcordato, brachiis duobus in orbiculum cætilagineum connatis.

Brander pisc. cumoëns. 25. t. 1. f. 1.

Gistler. act. Stockh. 1751. p. 185. t. 6. f. 1-5. Pediculus salmonis.

Habitat in salmonum, rarius in gadi barbati branchiis, congeneribus vividior, 6 lineas longa, pallida, mollis capite parvo, oblongo convexiusculo, labiis 2 horizontalibus; superiori uncinis 2 mobilibus rigidis armato, inferiori breviori bifido, abdonine obovato laetiori, ovarii candidioribus, teretibus, intus granulutis, magnitudine totius animalis.

*sellina. 4. L. corpore lunato, thorace cordato. Fn. suec. 2101.
It wgoth. 171. t. 3. f. 4. Lernæa, cauda duplici tereti.*

Habitat in Oceani septentrionalis gadi branchiis.

*huchonis. 5. L. corpore nodofo, tentaculis duobus, ovario dupliciti posterius adnato. Schranck it. bavar. p. 99. t. 2. f. A. D.
Habitat in salmonis huchonis branchiis frequens, salmo-
neæ affinis, candidissima, subcartilaginea.*

clavata. 6. L. corpore cylindrico subsinuato triplicato infra apicem rostri. Müll. zool. dan. I. p. 119. n. 54. t. 33. f. 1. prodr. 2853. rar. I. p. 75.

*Habitat in percæ norwegicæ pinnis, branchiis, ore, oculis,
candida, pellucida, lineis rubris picta, collo angusto,
flavescente, apice acuminato, incurvo, nodofo, ovarii
tubulosis: ovis extrinsecus adhærentibus.*

*uncinata. 7. L. corpore subcordato, rostro simplici curvo, ore terminali.
Müll. zool. dan. I. p. 120. n. 55. t. 33. f. 2. prodr. 2745.
rar. I. p. 76. O. Fabr. Fn. groenl. p. 338. n. 328.*

*Habitat in maris groenlandiam allueniis gadorum variorum
pinnis & branchiis, mollis, pallida, dorso medii sulco
longitudinali, ovarii rotundis, apicem versus incrassatis.*

*gobina. 8. L. corpore rhomboidali, brachiis duobus anterioribus totidemque posterioribus nodosis, cornubus duobus arietinis.
Müll. zool. dan. I. p. 121. t. 33. f. 3. prodr. 2747.
rar. I. p. 77. O. Fabr. Fn. groenl. p. 339. n. 329.*

*Habitat in corti gobionis branchiis, 7 lineas longa, ex
albo cærulescens, intestino superne translucente obscuro,
depressa, subtus subconcava, oris inter cornua 2 cur-
vata intermedii labiis 3, ano bifido, ovarii spiralibus,
tereti subulatis.*

Lernææ, oculis carentes pisticibus infestæ, quorum sanguinem fugunt, in pinnis potissimum & branchiis fixæ, oreque suo, corpore perpendiculari erecto, ovarii rigidis protensis immobilitate & tenacissime adhaerentes.

radiata. 9. *L. corpore quadrato depresso, brachiis utrinque tribus, cornibus quatuor rectis.* Müll. zool. dan. I. p. 122. n. 57. t. 33. f. 4. prodr. 2748. rar. I. p. 78. O. Fabr. Fn. groenl. p. 340. n. 330.

Habitat in coryphaenæ rupestris oris angulis, rario, letæ ab Aristotele & Rondeletio in thynno observata proxima, II lineas longa, sordide alba vel cinerea, tuberibus solidioribus laetis inæqualis, ad latera crenata, capite depresso scuto rotundato, subtus convexiori, par pillars crebris minutis inæquali.

nodosa. 10. *L. corpore quadrato tuberculato, brachiis subtus brevissimis utrinque duobus.* Müll. zool. dan. I. p. 123. n. 58. t. 33. f. 5. prodr. 2749. rar. I. p. 79. O. Fabr. Fn. groenl. p. 341. n. 331.

Habitat in percæ norwæticæ rictu, radiata minor, mollis, dilute cinerea, supra convexa, subius concava, medius dorso tuberculata 4 duris laetis inæquali, dentibus utrinque 5 pariter laetis, capite rotundato, per striam medianam candidam biparito.

cornuta. 11. *L. corpore oblongo, brachiis quatuor rectis emarginatis, capite subovato.* Müll. zool. dan. I. p. 124. n. 59. t. 33. f. 6. prodr. 2750. rar. I. p. 80.

Habitat in pleuronectis Platea & Linguatula, cute pellucida circumdata, verticis mucronibus, frontis cornibus 2, his dente solitario armatis, oris palpis 2, ovariis suis: ovis spadiceis. Zoega.

pectoralis. 12. *L. capite orbiculato hemisphærico, abdominis obcordato papilla terminali truncata.* Müll. zool. dan. I. p. 125. n. 60. t. 33. f. 7. prodr. 2751. rar. I. p. 81.

Habitat in pleuronectarum & æglefini pinnis, potissimum pectoralibus, monoculo piscino similis, alba, diaphana, punctis pullis adpersa, verticis mucronibus 2 falciformibus, rostro conico truncato: cornibus 4 minutis, mucronibus 2 brevissimis, & prope mucronem 3 conicum post pis 2, brachiis 2 non curvatis, ovariis angustioribus subannulatis diametri inæqualis.

lotæ. 13. *L. ovariis quaternis inæqualibus.* Hermann Naturf. 19^a p. 44. t. 2. f. 6.

Habitat in gadi lotæ branchiis, oris uncinulis 2, appendicibus cruciatis 4. Zujef.

- cyclop- 14. L. corpore tereti flexuoso, orificio duplici in medio
terina. rostri cornibus tribus tripartitis terminati. Müll. zool.
dan. prodr. 2745. O. Fabr. Fn. groenl. p. 337. n. 326.
β) Lernæa minor, ovariis virescentibus. O. Fabr. Fn. groenl.
p. 337.

*Habitat in cyclopteri spinosi, β) in liparis branchiis,
branchiali affinis, cornu tamen tenui sursum verso,
apice integro, cauda angustiori: lobis perinque 2
convexit, ovariis simplicibus spiralibus, in longitu-
dinem 5 pollicum extensilibus.*

- pinnæ- 15. L. rufa capite cylindrico anterius rostrato, tentaculis
rum. duobus lunatis apice bifidis, brachio unico. J. Chr.
Fabr. it. norw. p. 282. n. 3.

*Habitat in gadi barbati pinnis dorsalibus, depressa, car-
nosa, dorso canaliculato, brachio cylindrico dorso an-
trorum in seido in canali recondendo, ovariis elongatis
cylindricis.*

294. SCYLLÆA. Corpus compressum : dorso canaliculato.

*Os foramine edentulo termi-
nali.*

*Tentacula f. Brachia sultus
trium parium.*

- Pelagica. 1. Sc. fixa, tentaculis extremis similibus, mediis papillosis.
Syst. nat. XII. 2. p. 1094. Scyllæa.
Mus. Ad. Fr. I. p. 56. Lepus pelagicus.
Osb. it. 306. Zoopterygius.
Seb. mus. I. t. 74. f. I.

*Habitat in pelagi fuso natante, cui fossula dorfi crenata
asigitur, quiescens, oblonga, dorso retrorsum latiore
obtuso, tentaculis extremis minoribus rotundioribus,
mediis foliaceis oblongis repandis, obtusioribus.*

- Ghomfo- 2. Sc. vaga, tentaculis primis nudis apice cavis, reliquis
densis. introrsum vittis ramosis. Forsk. Fn. ægypt. ar. p. 103.
n. 13.

*Habitat parcius in mari rubro inter Ghomfodam & Djefan,
pollicaris, pellucida, flavescens: punctis ex fusco
ferrugineis, dorso plano, ad margines fusco punctato,
serie media longitudinali punctorum cæruleorum, cauda
compressa, dorso in carinam rotundatam repandam*

*margine fuscescem anterius utrinque vittis ramosis
parvis conspicuum elevato, abdomine cæruleo-punctato,
utriusque lateris medio serie papillarum 5 albarum
aspero, tentaculis primis minoribus obovatis, reliquis
contiguis margine denticulato repandis.*

295. CLIO. *Corpus vaginatum natans oblongum,
brachiis duobus dilatatis membranaceis.*

Tentacula tria præter duo in ore.

caudata. 1. *Cl. vagina compressa caudata.*

Brown. jan. 386.

Habitat in Oceano.

pyrami- 2. *Cl. vagina triquetra pyramidata, ore oblique truncato-
data.* *Brown. jan. 386. t. 43. f. 1.*

Habitat in Oceano.

retusa. 3. *Cl. bitentaculata, ore horizontali bidentata, cauda acuminata.* *O. Fabr. Fn. groenl. p. 334. n. 324. nov. ad.
Hany. I.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 1094. n. 3. Müll. zool. dan. prodit.
2742. Clio vagina triquetra, ore horizontali.*

Brown. jan. 136.

*Habitat in Oceano, sesquipollicem longa, gelatinosa,
pellucida, in aqua cærulescens, utroque fine coccinea,
medusarum socia, omni anni tempore obvia, brachiis
s. alulis suis tanquam remis utens, anarhichæ, cy-
clopteri, lari tridactyli frequens cibus, capite angusti-
tiore globoso, sulco longitudinali in 2 buccas diviso; os
terminale labio utrinque instructum dentibus 3 aperto-
orestellatis armatum, interiori apertura alia dentibus
4 minoribus cruciatis munita, tentaculis ad os 2 mol-
itoribus; thorax fere globosus brachiis sive alis sub-
membranaceis, gula Silva.*

borealis. 4. *Cl. albida, capitis lobis papilla carnea acuminata ter-
minatis, tentaculis tribus carnosis conicis ori apposi-
tis.* *Pall. spic. zool. 10. p. 28. t. 1. f. 18. 19.*

*Habitat in mari hyperboreo, niollis, balænarum, ut fer-
tur, esca, cute scabriuscula, capite subdidymo, ore
bilabiato, tentaculis duobus minutis intra os, appen-
dicibus foliaceis prope caput subius quaternis, caudi-
vacua, expressa, acuta; an distinda a retusa species?*

helicina. 5. Cl. nuda corpore spirali. *Phipps it. bor.* p. 195.
Martens Spitzb. p. 141. t. Q. f. e. Snail flune-fish.
Habitat numerosissima in Oceano boreali, pisi magnitudine, alis ovatis, obtusis, expansis, corpore majoribus.

limacina. 6. Cl. nuda, corpore obconico. *Phipps it. bor.* p. 195.
Mart. Spitzb. p. 169. t. P. f. 5.
Habitat numerosissima in mari boreali; an diversa a boreali? An hujus generis est vermis marinus, a de la Martinière, Journ. de phys. 1787. Nov. p. 366. descriptus & t. 2. f. 15. 16. delineatus?

296. SEPIA. *Corpus carnosum: vagina excipiente pectus, ad cujus basin tubus.*
Brachia (præter bina tentacula pedunculata in plerisque) octo interius adspersa cirris verrucosis.
Os inter brachia terminale, corneum.

Octopus. 1. Corpore eccladato, tentaculis pedunculatis nullis. Mus.
Ad. Fr. I. p. 94. Müll. zool. Jan. prodr. 2813. Stroem.
sondm. I. p. 204. O. Fabr. Fn. graenl. p. 360. n. 351.
Hasselq. act. Ups. 1750. p. 33. Octopodia.
Jonst. exang. §. t. I. f. I. Seb. mus. 3. t. 2. f. 1-6.
Koelreut. act. petrop. 7. p. 321. t. II. 12. Polypus.
Rond. pisc. 513. Polypus octopus.
Bell. aq. 330. t. 331.
Habitat in mari, a mediterraneo & rubro ac Groenlandiam usque, cibo ex suo condimento, quo t coctione addito nitro in rubrum vertitur apposito Lister. aliquando firmissime adhaerens corporibus, ut in humano inflammationem & dolores atroces excitet; brachiis basi quasi palmatis, verrucis sessilibus alternis in 2 series digestis, abdome ovato, convexo molli, pinnis lateribus nullis, aperto tantus effusit splendor, ut remota vespere candela totum palatum ardere videatur. Bartholin. act. Hafn. 5. obs. 109.

na- 2. S. corpore ecaudato marginato, tentaculis duobus. Mus.
Ad. Fr. I. p. 93. Fn. suec. 2106.
Aman. acad. I. p. 325⁷. Sepia.
Seb. mus. 3. t. 3. f. 1-4. Sepia.

Gesn. aquat. 851.

Aldrov. exsang. 44.

Bellon. aquat. 336.

Ronael. aquat. I. p. 498.

Olear. mus. 97. t. 97.

Habitat in Oceano, & mari mediterraneo, pleuronecta
limandæ, balænarum frequens præda, a congris quoque
eius brachia rodi, at, sicut lacertis caudam, renesci.
Plinius refert hist. mund. l. 9. c. 29. Huic, quemadmodum sequentibus, squama dorsalis ossæ, os sepia
vulgo dicta, & atramentum, quo effuso hosti persequenti se occultat, quo litteræ pingi, alia tingi possunt.

ungui- 6. *S.* corpore ecaudato, brachiis unguiculatis. *Molin.* hist.
culata. nat. Chil. p. 174.
Habitat in mari pacifico, Chili alluente, rario, sapidissima, brachiis loco verrucarum unguiculis armatis proprias vaginas retractilibus.

hexapus. 7. *S.* corpore caudato quadri-vel quinquearticulato, brachiis sex. *Molin.* hist. nat. Chil. p. 175.
Habitat in mari pacifico, Chili alluente, circiter semipendalis, digitæ indicis crassitie, capite difforni brevissimo, brachiorum verrucis minimis, manum contrectantem per breve temporis spatium rigefaciens.

media. 3. *S.* corpore depresso caudato ancipiiti.

Rondel. pisc. 508. *Loligo parva.*

Habitat in Pelago, officinali similis, at latera membranæ acuta non longitudinali, sed ad dimidium modo affixa.

Loligo. 4. *S.* corpore subcylindrico subulato, cauda ancipiiti-rhombea. *Fn.* suec. 2107. *Osb.* ir. 66.

Rondel. pisc. 506. *Stroem.* fonsdm. p. I. 173. *Loligo.*
Bellon. aquat. 339.

Seb. mus. 3. t. 4. f. 1-4. & t. 3. f. 5. 6.

Olear. mus. 44. t. 26. f. 2.

Needh. microsc. I. t. 12.

Blonro struct. & physiol. pisc. n. 12.

Habitat in pelago, media quasi inter pisces & vermes, corde tritici, arteriis aortæ & pulmonali valvulae nitidis, aqua infuscata effuso atramento, bilis specie se abscondens, cauda tamen extra aquam exsiliens oniscis, canceris, medusis vicitans, rhocarum & monodontis præda, ad 9 pollices longa. Hujus squama dorsalis ossæ a *Seba* mus. 3. p. 40. t. 16. f. 9. nomine

Pennæ marinæ maximæ delineata, & in Syst. nat. X. p. 108. n. 230. inter pinnas relata est. Pinna (pennacea) pellucida pennam referens.

- Sepiola. 5. S. corpore posterius alis duabus subrotundis. +
Jonst. aquat. t. I. f. 8. Sepiola.
Rondel. pisc. 519.
Habitat in mari mediterraneo, parva.

- tunicata. 8. S. corpore toto tunicæ nigrae pellucidæ inclusa, posterius alis duabus semicircularibus. *Molin. hist. nat. Chil. p. 174.*
Habitat in mari pacifico, regnum Chilense alluente, sapidissima, magna, ut 150 libras æquare interdum pondere feratur.

LUCERNARIA. *Corpus gelatinosum, rugosum, ramosum.*

Os inferum.

- quadri- 1. L. corpore elongato tortili, brachiis quatuor dichotomis, cornis. apice tentaculatis. *Müll. zool. dan. I. p. 147. n. 72. t. 39. f. 1-6. prodr. 2754. rar. I. p. 102. Leske Naturg. I. p. 508. t. 10. f. 5.*
Habitat in maris norwegici fucis, hydri monoculisque minimis videntans, capite oculisque carens, asteris affinis, fusca, pellucida, tetragona: angulis singulis in brachium excurrentibus, cuius singuli rami fasciculo 30-40 tentaculorum terminantur, cauda media flexuosa in multas plicas composita, basi incrassata, sensim attenuata, apice obtusa, tentaculorum instar extensili, & in omnes partes mobilis, ore albo cinereo-striato quadridentata.

- Phrygia. 2. L. corpore elongato papilloso, brachiis numerosis globiferis in hemisphaeria deflexis, basi bysso fixa. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 343. n. 233.*
Habitat in maris Groenlandiam alluentis profundo, locum vix, formam sibi mutans, hydri perquam affinis, semiopercularis, rubicunda, globulis papillisque albido-ribus, collo erecto crasso papillis innumeris exsertilibus obsolio, ipso exsertili, brachiis tenuibus, brevibus, implicatis.

- Auricula. 3. L. lagenam referens, collo tereti, extremitate ampliori: fasciculis octonis tentaculorum cincta. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 341. n. 332.*

Müll. prodr. zool. dan. 2817. Holothuria lagenam referens, tentaculis octonis fasciculatis.

Habitat in mari Groenlandiam alluentis profundo, ulyxrum maximarum foliis pertinacissime adhaerens, raro locum mutans, oniscis videntans, ad sesquipollicem usque longa, nigra aut rubicunda, rarius ex brunneus aurea nitens, lubrica, glaberrima, margine tuberculis 8 granulatis cincto, quæ prolongata totidem fasciculos tentaculorum 60 & ultra nigrorum apice alborum referunt, ore albo.

297. MEDUSA. *Corpus gelatinosum, orbiculatum, depresso.*

Os subtus centrale.

* *corpore costata: costis ciliatis, Beroë Müller*

Infundi- 13. *M. ovata, costis ciliatis novem. Müll. prodr. zool. dan-
bulum. 2816. O. Fabr. Fn. groenl. p. 360. n. 352.*

Forsk. Fn. ægypt. arab. p. 111. n. 29.

Syst. nat. X. 2. p. 660. Medusa Beroë.

Syst. nat. XII. 2. p. 1324. n. 1. Volvox (Beroë) ovat-
tus, angulis ciliatis novem.

Bafer opusc. subs. 3. p. 123. t. 14. f. 5. Medusa ovata.
Brown. jam. 384. t. 43. f. 2. Beroë.

Mart. Spitzb. t. p. f. h.

Habitat in mari septentrionali, rubro, mediterraneo.

Pileus. 14. *M. globosa, costis octo cirrisque duobus ciliatis. Müll.
zool. dan. prodr. 2817. O. Fabr. Fn. groenl. p. 360.
n. 354.*

Syst. nat. XII. 2. p. 1325. n. 2. Volvox (bicaudatus)
octagonus, tentaculis duobus elongatis.

Gron. act. helv. 3. p. 36. Beroë corpore octagono ter-
taculis longissimis.

Bafer opusc. subs. 3. p. 126. t. 14. f. 6. 7.

Mart. Spitzb. t. p. f. g.

Habitat in mari septentrionali.

Cucu- 15. *M. oblonga, costis octo ciliatis, cirris nullis. O. Fabr.
mis. Fn. groenl. p. 361. n. 353.*

Habitat in mari Groenlandiam alluente, minus vivida,
cilia costarum movendo tarde ingrediens, tæda in-
pomi figuram se contrahens, cæruleo intermixto alba.
punctis multis sanguineis conspersa, aperturis 2 ter-
minibus in cavitatem medium oblongam coœnibus.

Ovum. 16. M. ovata, costis ciliatis octo, cirrorumque duobus paribus: altero longissimo. O. Fabr. Fn. groenl. p. 362. n. 355.

Habitat in Groenlandicæ sinubus, pileo affinis, avi columbini, rarius anatini magnitudine oniscis visitans, cyclopteri lumpi frequens præda, satis vivida fragilissima: fragmentis alhuc vivis, cœrulea.

** corpore lœvi.

Porpita. 1. M. supra plana subtus convexiuscula sulcata villosa, Amer. acad. 4. p. 255. t. 3. f. 7-9.

Mus. Tessin. 96. Medusa parva figura porpitæ.

Ad. angl. 301. p. 2051. Animalcula ex Yrica maris mediterranei.

Habitat in India.

cruciata. 2. M. cruce alba. Fn. suec. 2110.*

Habitat in Oceano europeo.

lysocella. 3. M. convexa sedecimradiata: subtus tentaculis quatuor unitis. Bast. op. subs. 2. p. 62. t. 7. f. 5?

Habitat in Lusitanicæ Tago, supra albescens, radiis ex punctis minimis e fusco rufescens, subtus concava, tentaculis corpore longioribus lanceolatis rufescens striatis. Vandelli.

equorea. 4. M. planiuscula, margine inflexo villoso tentaculato.

Müll. prodr. zool. dan. 2819. Forsk. Fn. ægypt. arab. p. 110. n. 28.

O. Fabr. Fn. groenl. p. 364. n. 357. Medusa orbicularis planiuscula, margine inflexo ciliato.

Bast. opusc. subs. 2. p. 55. t. 5. f. 2. 3.

Habitat in pelago, simplicissima, mollis, marginis ciliis albis.

aurita. 5. M. civitatibus subtus quatuor. Fn. suec. 2109.* It. oel.

160. It. wgoth. 172. t. 3. f. 2. Müll. zool. dan. 2.

t. 76. 77. rar. 2. p. 109. prodr. 2820. O. Fabr. Fn.

groenl. p. 363. n. 356.

Rondel. poiss. t. 17. p. 384. Sixième espèce d'ortie.

Medusa cyclopterorum alicuiusq; piscium majorum aviumque pelagicarum cibas noctu vagatur; vis puritus (sæpius) mordax; contrahit se rigens, ac preternatae pisciculu frondem suam spargit, complectensque devorat; ora ei in radice esse, excrementa per summa redi Plin. IX. 45. marginem alternatim contrahendo & expandendo progrediuntur; aquæ fluviali immisæ cito pe-

Aldrov. zooph. l. 4. p. 574. f. inf. Urtica sexta.

Kalm. it. 2. p. 109.

Loest. it. 105.

Bast. opusc. subs. I. p. 123. t. 14. f. 3. 4. & 2. p. 58-60.

Merret pin. p. 195. t. 76. 77.

Stroem. spondm. I. p. 172. n. 2.

Habitat in mari baltico, Oceano hemisphaerica, hyalina
2-4 pollicum diametro, pisciculis, & scorpiorum pra-
sertim pullis vicitans, cavitatum corporisque margi-
nibus ciliatis flavis.

capillata. 6. M. convexa, margine sedecies emarginato, subtus pilosa.

Fn. suec. 2108.* It. wgoth. 172. t. 3. f. 3. Müll. prod.
zool. dan. 2821. O. Fabr. Fn. groenl. p. 364. n. 358.

Baster op. subs. 2. p. 60. t. 5. f. 1.

Stroem. spondm. I. p. 172. n. 1.

Habitat in Oceano septentrionali, congenerum maxima,
diametri 8 pollicum, ut cyprini minuti ab aliis pisci-
bus agitati sub hac asylum reperiant, oniscis vicitans,
marginis lobos flectendo progrediens, intus purpurea,
supra levigata, cute tenuissima, annexis vesiculis mate-
riam purpuream (an ova?) continentibus auda.

pilearis. 7. M. disco capitato, limbo foraminibus octo, subtus for-
niculato pilosa.

Habitat in Pelago.

marsu- 8. M. semiovata, margine tentaculis quatuor.

pialis. Planc. conch. rar. 41. t. 4. f. 5. Urtica solitaria marsu-
pium referens.

Habitat in mari mediterraneo.

hemis- 9. M. hemisphaerica, costis transversalibus quatuor, ten-
phärlica. taculis globulisque marginalibus, margine integro.

Müll. zool. dan. I. p. 22. n. 5. t. 7. f. 1-5. prod.
2822. rar. I. p. 13.

Gronov. act. helv. 4. p. 38. t. 4. f. 7.

Habitat in oceano belgico & norwegico, hyalina, dia-
metro 2 lineas æquans, marginem alternatim contra-
hendo & expandendo progrediens.

pelagica. 10. M. hemisphaerico-concava, margine crenato-incur-
vato, tentaculis octo. Loest. it. 105. †.

noctiluca. β. Medusa depressa, verrucis punctisque brunneis, mar-
ginis tentaculis octo rubris. Forsk. Fn. æg. arab. p. 109.
n. 24.

Habitat in mari americano, atlantico, mediterraneo,
gregaria, magnisque saepe in glomeribus obvia, mare

irradians, ♂ *hyalino rufescens*, *rarius subopaca punicea*, *diametro tripollicari*, *in aqua marina concussa mirifice scintillans*.

brachiata. 11. M. margine brachiis novem: apicibus novem, extimo tentaculis novem. +
Habitat in pelago.

Velella. 12. M. ovalis concentrica striata, margine ciliato, supra velo membranaceo.

Loefl. it. 204. Medusa Velella s. Galera.

Bronw. jam. 387. t. 48. f. 1. Pyllidoce labris cæruleis.

Imperat. nat. 912. t. 912. Velum marinum cotocis cærulei.

Col. ecpur. 20. t. 22. Urtica marina soluta.

Habitat in pelago, mari mediterraneo, atlantico, centro prominulo, supra linea oblique transversa, supra etiam membrana lineam dorsalem inferiorem secans, rigida, latitudine corporis.

Pulmo. 17. M. hemisphæri-concava, margine fimbriato, subtus striata, caudice quadri-fenestrato, brachiis octo.

Macri observ. del polm. mar. Nap. 1778. t. 1.

Habitat in mari tyrrheno, hyalina dura, tenax, nitida; cærulescens brachiis magnis, æqualibus, subcylindricis, posterius crispis, in corpore magna oblonga, craffa, levia, tandemque in plana tria membranacea acuta terminatis, appendicibus 16 subtrigonis, anteriorius bifidis, reseissa membra redintegrans.

tyrrhenæ. 18. M. convexa, margine crenato: filis longissimis, subtus tentaculis quatuor. *Macri observ. del polm. mar. p. 19.*
Habitat in mari tyrrheno, levigata, hyalina, rubro maculata, 2 uncias ponderis æquans, cavitatibus subtus 4, singulis stria rubra notatis, an varietas auritæ?

tuberu-lata. 19. M. disco prominulo, margine octies diviso subtus-striata, tuberculis octo. *Macri observ. del polm. mar. p. 20.*
Habitat in mari tyrrheno, hyalina, 2 libras pondere æquans, subtus fulva fibris innumeris curvis, tuberibus ex albo cæruleis in duos truncos membrana pellucida, albicante apice flaccosa cærulea aut laetea terminatos abeuntibus, pruritum contredictata nullum excitans.

Utricu-lus. 20. M. utriculosa, subtus centri tentaculo longissimo granulofo, margine tentaculis numerosis cæruleis apice

flavanticibus. de la Martinière, Journ. de phys. No^e
1787. p. 365. t. 2. f. 13. 14.
Habitat in pelago, hyalina, marginis cirris circiter 3°

Caravel- 21. M. ovata, subtus medio tentaculis longissimis, supra
la, velo crenulato. Müll. Besch. der berl. Naturf. 2. p. 19°
t. 9. f. 2.

Sloan. jam. 1. p. 7. t. 4. 5. Urtica marina soluta purpu-
rea oblonga, cirris longissimis.

Brown. jam. p. 287. Aretusa crista subrubella venosa.
Habitat in mari atlantico, pituita sua contredantis marini
inflamminans, tenuis, laevis, nitens, cærulescens;
hyalina utrinque attenuata, crista per totam dorsi lon-
gitudinem excurrente, semilunata, compressa, sulci-
ramosis exarata, venis roseis pida, filis subtus cubi-
talibus articulatis, cærulcis, fragilibus: tubulis bre-
vioribus intermisitis.

Umbrella. 22. M. tentaculis disci nudis, marginis glandulosi. Müll.
Besch. der berl. Naturf. 2. p. 295. t. 9. f. 2. 3.

Habitat in mari mediterraneo & indicio, rigida, depresso,
supra fulcis radiatis, limbo membranaceo crenato,
subtus in medio proboscide quasi clavata, tubulis bre-
vibus clavatis cincta, tentaculis articulatis æquilibri
diametri, trifariam nodulosis.

Minor- 23. M. dorso eminente, subtus cruce minuta foraminibus
pha. quinque cincta, margine ciliato. Müll. zool. dar-
prodr. 2823. O. Fabr. Fn. groenl. p. 365. n. 359.

Habitat in mari, potissimum septentrionali, æquore
paulo minor, expansa orbicularis, margine infles-
ta quadrata, dorso per radios sulcata in 4 areas diviso-
cruce centrali elata ciliisque albis, subtus concava.

Campa- 24. M. disco gibbo, limbo ampliato ciliato, subtus cruce
nula. pilosa. O. Fabr. Fn. groenl. p. 366. n. 360.

Habitat in Groenlandia sinibus, autumno haud infre-
quent, oniscos prædens, capillatæ insular incedens, di-
morphæ magnitudine, conico - orbicularis, marginis
crucisque ciliis flavis, his interdum albis, subtus caya-
nivea.

An hujus etiam generis Medusa palliata. Bohlsch t. 11. f. 1. Stroem fundit
1. p. 164. balænarum esca; plures etiam in maribus australibus viduntur
species Solander & uterque Forsterus, ut videtur novas, nondum, quantum
noxi, amplius descriptas.

- Digitala. 25. M. hyalina subtus centro pistillifero, margine ciliato.
Mull. prodr. zool. dan. 2824. O. Fabr. Fn. groenl. p. 366. n. 361.
Habitat in mari Groenlandiam alluente, satis vivida, margine flexo in aquam saliens, minimus, conica, striata, ciliis introrsum hamatis flavis albisque, pistillo in penicillum nunc flavum, nunc album terminato.
- Flexuosa. 26. M. disci margine masculis guttisque opacis albis vario; tentaculis octo dichotomis verrucis albis pedunculatis obsecisis in floccos terminatis. *Pall. spicil. zool. 10. p. 29. t. 2. f. 1-3.*
Habitat in archipelago caribæo, volam implens, planiuscula, supra convexior, limbo membranaceo fasciolis albis fimbriato, nucleo subtus villoso, minoribus odogono, majoribus decagono.
- Octopus. 27. M. marginis papillis semicircularibus, subtus cruce media, tentaculis octo, & foraminibus lunulatis intermediis. *Borl. corn. p. 258. t. 25. f. 16. 17.*
 β) Urtica marina ex trunco octopedalis limbo imbricatum undante. *Borlus. cornw. p. 257. t. 75. f. 15.*
Habitat in Cornubia littore & mari Belgium inter & Angliam intermedia, magna, hyalina, interdum viridis, appendicibus subtus 8, quarum 4 scutiformes, 4 cordatae; sulco intermedio, marginis papilliis apice cæruleis.
- Tetrastylo. 28. M. hemisphærica, tentaculis nullis, tubulis marginibus quatuor in prisma coadunatis. *Forsk. Fn. æg. arab. p. 106. n. 17.*
Habitat in mari rubro, hyalina, rigidiuscula, diametri sesquipithamalis, marginis tubulis linearibus, triplicaribus rectis, planis.
- Octostylo. 29. M. hemisphærica, marginis tentaculis nullis, subtus columna quadriplicata: apice lobis octo multifidis, laterumque appendicibus sedecim. *Forsk. Fn. ægypt. arab. p. 106. n. 18.*
Habitat in mari rubro, hyalino-cæruleo, diametri pedalis, columna subtus sesquipollucaris.
- Andromeda. 30. M. hemisphærica, marginis brachiis nullis, brachiis octo terctibus ramosisimis inferius foliaceis. *Forsk. Fn. arab. p. 107. n. 19.*
Habitat copiosa in fundo littoris maris rubri prope Tor, pulcherrima, ex hyalino fusca, radiis albis marginis

integerrima, centri cruce nigra, obsoleta, brachiis albis ad basin penna anserina crassioribus.

corona. 31. *M. hemisphærica, marginis tentaculis nullis, subtus brachiis octo cultratis, infra utrinque dentatis. Forsk.*
Fn. æg. arab. p. 107. n. 20.

Habitat in mari rubro ad Saez ex hyalino rufescens, diametri quadripollicaris, centri cruce cœrulea, brachiis subtus latis apice bilobis.

Persea. 32. *M. hemisphærica hyalina, intus annulo opaco albo quater interrupto, marginis tentaculis nullis. Forsk.*
Fn. æg. arab. p. 107. n. 21.

Habitat in mari mediterraneo, diametri bipollicaris, margine longe proniinente, brachiis 4, sublineolatis, fere pollicaribus, margine undulatis.

Cephea. 33. *M. hemisphærica tuberculata fusco-rufescens, margine crenato, brachiis subtus octo lanatis. Forsk. Fn. ægypt. arab. p. 108. n. 22.*

Habitat in Djiddæ ad littus maris rubri, pellucida radiis oculo pallidioribus, brachiis hyalino-fuscis.

probos- 34. *M. hemisphærica, subtus in medio proboscide longa, eidalis, marginis tentaculis sex. Forsk. Fn. æg. arab. p. 108. n. 23.*

Habitat in mari mediterraneo, hyalina, diametri pollicum $2\frac{1}{2}$, margine prominente æquali, proboscide subflexili apice truncata, membrana plicata versatili fibrata.

mollici- 35. *M. deppressa, foraminibus lateralibus tentaculisque duodecim. Forsk. Fn. æg. ar. p. 109. n. 25.*

Habitat in mari mediterraneo, hyalina, diametri sesquipollicaris, marginis prominentis plicis 12.

pileata. 36. *M. ovato-campannulata superne globo hyalino, intus nucleo rubro oblongo, marginis tentaculis numerosis basi flavis. Forsk. Fn. æg. arab. p. 110. n. 26.*

Habitat in mari mediterraneo, sesquipollicem alta, margine parum coarctato.

eracige- 37. *M. hemisphærica, cruce rufescente corporis latitudine. Forsk. Fn. æg. arab. p. 110. n. 27.*

Habitat - - - - cerasi diniidii magnitudine, annulis supra 4 minuissimis albis approximatis, margine tenui prominente, varie flexili saepe rufescente, tentaculis innumeris hyalinis corporis semidiometro vix longioribus.

- unguicu- lata. 38. *M. orbicularis* supra plana sedecimradiata : margine crenato ; unguibus sedecim subincurvis. *Ol. Swarts.*
n. ad. Stockh. 1788. 3. n. 7. t. 6. f. 1.
Habitat ad Jamaicæ littora, diaphana, cærulescens, maculata, nucis moschatae minoris magnitudine.

PHYSOPHORA. *Corpus gelatinosum e vesicula aërea pendens, membris gelatinosis ad latera sessilibus, tentaculis subtus plurimis.*

- hydrosta- tica. 1. *Ph. ovalis*, vesiculis lateralibus trilobis plurimis extrorsum apertis, intestino medio tentaculisque quatuor majoribus rubris. *Forsk. Fn. æg. arab. p. 119. n. 45.*
Habitat in mari mediterraneo, sesquipollicem longa, compressa vesiculae apice semper in aquæ superficie conspicuo natans.

- rofacea. 2. *Ph. orbicularis*, foliolis oblongis horizontalibus vesicæ affixis imbricata. *Forsk. Fn. æg. ar. p. 120. n. 46.*
Habitat in mari mediterraneo, hyalina, pollicis diametro, flori pleno deorsum inclinato similis, vesica media obtusa ovata rufescente: foliolis planis, obtusis, curvis in densas series congestis testa.

- filiformis. 3. *Ph. membris lateralibus oblongis filiformibus dependentibus.* *Forsk. Fn. æg. arab. p. 120. n. 47.*
Habitat in mari mediterraneo, tenerima, fili crassitie, ad spithamam usque longa, hyalina, capitulo ovato, obtuso, seminis oryzæ magnitudine.

Physophoræ vix proprium constituere genus videntur, ad medusas forte referendæ. Asteriæ omnes supra macula alba, rugosa, lapidea netata, parts abscedunt, scissæ facile redintegrant, motu orbiculari jam dextrorum jam sinistrorum in a

298. ASTERIAS. *Corpus depresso subtus sulcatum : crista coriacea tentaculis muricata.*
Os centrale quinquevalve.

* lunatæ.

nobilis. 17. A. granulosa, margine pulvinato, disco pulvilli glabro.
 Müll. zool. dan. prodr. 2826. Asterias equestris.
 Pontopp. norsk. Naturg. 2. c. 7. p. 291.
 Habitat in mari Norwegico.

Pulvillus. 18. A. lubrica, margine integro mutico. Müll. zool.
 dan. 1. p. 64. n. 25. t. 19. f. 1. 2. prodr. 2827. rar. 1.
 p. 40.
 Habitat rario in Norwegiæ sū Droebacensi ad insu-
 lam Kaholm, supra convexa, cute lævi sanguinea, hinc
 inde transversim striata marginem versus mucronibus
 mollibus obtusis, albis, seminis milii magnitudine,
 in 10 areas digestis obsessa, margine non articulato,
 at in angulis papillis acutis 10 & ultra aspero, subtus
 concava, lavis, albida; roseo cincta, sulcis & utrinque
 baculis horizontalibus tædis exarata, aquam calidam
 spadiceo colore tingens.

militaris. 19. A. undique granulosa, margine pulvinato consimili.
 Müll. zool. dan. prodr. 2828.
 Habitat in mari Norwegico.

Luna. 1. A. integra orbicularis. Amæn. acad. 4. p. 256. t. 3. f. 14.
 Habitat in India, imperialis magnitudine, compressa;
 punctis eminentibus undique adspersa.

** stellatae.

papposa. 2. A. murica, marginali serie penicillata. Müll zool. dan.
 prodr. 2832.
 O. Fabr. Fn. groenl. p. 369. n. 364.
 Syst. nat. XII. 2. p. 1098. n. 2. Asterias stellata, raditis
 XIII. undique muricata fasciculis.
 Retzius nov. act. Stockh. 1783. p. 230. n. 4. Asterias
 stellata, radius tredecim, undique aculeata, aculeis
 subtus penicillatis supra pedinatis.
 Jonst. inst. t. 26. f. 16. Stella marina.
 Pontopp. norsk. Naturl. 2. p. 291. Soestierne.
 Olaff. isl. 689.

Linck ast. t. 32. f. 52. & t. 34. f. 54.
Clus. exot. 114.

Seb. mus. 3. t. 8. f. 5.

Column. ephr. t. 38. f. A?

β) *Linck stell. mar.* t. 17. f. 28.

Habitat in Oceano europæo & asiatico, supra subferruginea: disco albo maculato radiisque pallidioribus apice coccineis & interstitiis albidis, subtus alba, papillis pallidioribus, disco rubro tincto, interstitiisque radiorum cærulecentibus, diametro ad 3 pollices & 9 lineas æquante, radiis ut plurimum 13, interdum 11, 12 & 15, lanceolatis, supra parum convexis.

Spongio- 20. A. scabriuscula, radiis semicylindricis obtusis, margine mutico. *O. Fabr. Fn. groenl.* p. 368. n. 363.

Habitat rario in profundo maris Groenlandiam alluentis inter ulvas rubenti affinis, diametro 7 lineorum, paleide rubicunda, verruca minutissima dorso centrali sanguinea, aculeis minutissimis confertis decumbentibus aspera, radiis 5: margine inflexo.

Rubens. 3. A laxa, radiis convexis: superne spinulis solitariis serratis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2830. *O. Fabr. Fn. groenl.* p. 367. n. 362.

Syst. nat. XII. 2. p. 1099. n. 3. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 95. *Fn. suec.* 2111.* *Asterias stellata*, radiis lanceolatis gibbis, undique aculeata.

I. wgoth. 172. *Asterias radiis quinis latiusculis asperis.*

Pet. mus. 6. n. 20. *Asterias.*

Barr. rar. 130. t. 1288. *Stella marina lacte rubens spinosa.*

Linck stell. mar. t. 7. f. 9. t. 9. 10. f. 19. t. 11. f. 15. t. 14. f. 23. t. 15. 16. f. 18. t. 30. f. 50. t. 34. f. 55. 58. t. 35. 36. f. 61. t. 37. f. 67. t. 40. f. 70. *Stella marina.*

Bast. op. subf. 3. p. 116. t. 2. f. 1-4.

Plot. oxfordsh. 85. n. 16. t. 2. f. 2. 3.

Olear. mus. 55. t. 8. f. 4.

Seb. mus. t. 5. f. 3. & t. 6. f. 3. 4.

Stroem. spondm. 1. p. 178. n. 1.

Olaff. isl. 1005. a.

Jonst. inf. 26. f. 5?

β) *Bast. op. subf.* 3. p. 116. t. 12. f. 1-6.

Column. aq. 5. t. 6.

γ) *Linck stell. mar.* t. 38. f. 69.

Habitat frequens in Oceano, mari mediterraneo, rarius pallida frequentius supra rufa, sublutea, cinerea, nigra, rubra, violacea vel brunnea, subitus rubicunda vel flavicans, diametro ad 9 pollices aquante; radiis lanceolatis, subtus quadrifarium papillosum, frequentissime 5, rarius 6 aut 4, tuberculitis nunc nullis, nunc rarissimis sparsis, nunc in series digestis, aculeis numerosis nullis, nunc setis subtilioribus, nunc validis.

Sdeposita. 21. A radiis quinque teretibus subtus reticulatis, supra aculeatis: aculeis pectinatis. Retz. nov. act. Stockh. 1783. p. 229. n. 2.
Linck sstell. mar. t. 4. f. 5. t. 9. f. 16. t. 30. f. 62.
Habitat ad Scaniae littus, minuta.

endeca. 22. A radiis novem undique aculeatis: aculeis pectinatis. Mant. p. 543. Retz. n. act. Stockh. 1783. p. 229. n. 3.
Müll. prodr. zool. dan. 2855. Asterias (aspera) stellata aspera, serie marginali pectinata.
Linck sstell. mar. t. 14. f. 25. t. 15. 16. f. 26. t. 17. f. 27
β) Rumpf. mus. t. 15. f. F.
Habitat in mari septentrionali, radiis 5, 8, 10, ut plurimum 9.

minuta. 4. A. margine pinnulis porrectis distantibus. Müll. zool. dan. prodr. 2835. O. Fabr. Fn. groenl. p. 370. n. 39.
Syst. nat. XII. 2. p. 1099. n. 4. Fn. suec. 2112. * Asterias stellata obtusa ciliata.
Seb. mus. 3. t. 5. f. 14. 15.
Habitat frequens in mari norwegico & Groenlandiam alluente, ochroleuca, utrinque plana, diametri vix linearum, radiis 6.

glacialis. 5. A. radiis angulatis, angulis verrucoso-aculeatis. Müll. dan. 2. t. 41. rar. 2. p. 3.
α) Asterias radiata, radiis pentagonis: angulis verrucoso-aculeatis. Müll. zool. dan. prodr. 2838.
Aldr. inf. p. 749. Stella pectinata teria spinosa tubercululis plurimiis.
Linck sstell. mar. p. 33. t. 38. & 39. f. 69. Sol echinatus cancellatus.
Linck sstell. mar. p. 34. Pentadactylus aster echinatus tuberculosus.
β) Asterias stellata, radiis heptagonis: angulis aculeatis. Syst. nat. XII. p. 1099. n. 5. Fn. suec. 2113. Habitat

Habitat in Oceano septentrionali, viva læte rufa albo undulata, rarius ex cinereo fusca aut viridis, disco supra tuberculis in circulum dispositis aspero, subtus cavo, radiis 5 crassis lanceolatis, tentaculis innumeris pellucidis, utrinque serie pinnularum agilium stipatis.

reticulata. 6. A. radiis reticulato-aculeatis.

Mus. Tess. 114. t. 9. f. 1. Asterias radiata, centro dorsali nodis 5 circumvallata.

Rondel. aq. 122. Stella reticulata.

Stoan. jam. 2. p. 272. Stella marina maxima reticulata

Rumpf. mus. t. 15. f. D.

Linck stell. mar. t. 23. f. 36. et t. 41. f. 72.

Seb. mus. 3. t. 7. f. 1.

Habitat in mari indico.

Phrygia- na. 23. A. ubique papillis subtus rosaceis obsita. *Müll. zool., dan. prodr. 2829.*

Ad. nidr. 4. p. 424. t. 14. f. 1. 2.

Stroem. fondni. 1. p. 178. n. 2.

Habitat in mari Norwegico, an eadem cum reticulata?

Nodosa. 7. A. radiis convexis longitudinaliter elevatis muricatis. *Mus. Tessin. 114. t. 9. f. 2.*

Grew. mus. 123. t. 8. Stella marina coronalis.

Rumpf. mus. 39. t. 15. f. A. Stellia marina quarta.

Linck stell. mar. t. 3. f. 3. t. 7. f. 8. t. 25. f. 40. t. 26. f. 41.

Seb. mus. 3. t. 5. f. 7. 8. t. 6. f. 1. 2. 11. 12. et t. 7. f. 3.

Habitat in Oceano indico.

Violacea. 24. A. laxa, superficie griseo-fusca : tuberculis violaceis, *Müll. zool. dan. 2. t. 46. rar. 2. p. 17.*

Aldrov. inf. 7. p. 753. Stella reticulata nostra.

Laid. apud Linck stell. mar. p. 80. Echinastrum seu stella marina pentadactyla echinata.

Kade apud Linck stell. mar. p. 97. f. 1-9. Stella marina quinque radiorum holsatica coloris violacei.

Fn. suec. p. 512. Stella pentadactyla violacea.

Habitat in mari septentrionali et mediterraneo, jam tota superficie, jam solis tuberculis violaceis, iisque nunc in series dispositis, nunc sine ordine sparjis, disco orbiculari, radiis 5 lanceolatis, apice rubicundis, trifarium tuberculatis, subtus in sulco lutescentibus.

. Sss sss sss

sanguino- 25. A. supra sanguinea , radiis. apice albis. *Müll. zool. dan.*
lenta. *prod. 2836.*
Habitat in mari norwegico.

perforata. 26. A. mutica , dorso punctis pertusa. *Müll. zool. dan. prod.*
2834.
Habitat in mari notwegico.

aranciaca. 3. A. disco lato , radiis subdepressis , summo margine
aculeato. *Müll. zool. dan. 3. p. 3. t. 83. f. 1-3. prod. 2031.*
Akt. n. i. r. 4. p. 425. 426. t. 14. f. 3-6.
Syst. nat. XII. 2. p. 1100. n. 8. Mus. Lud. Ulr. 719. Mus.
*Tess. 14. t. 9. f. 3. Asterias stellata , disco tentaculis
hispidis minicato , margine articulato varie aculeato.*
Retz. nov. a. Z. Stockh. 1783. p. 230. n. 5. Asterias stellata
*radiis quinque , subtus aculeis apice stellato-echinatis
confertis , margine articulato aculeato.*

Barr. ic. 1281.

Linck stell. mar. t. 4. f. 14. t. 5. 6. f. 6. t. 8. f. 12. t. 27. f. 44.
Seb. mus. 3. t. 6. f. 5-8.

Habitat in mari mediterraneo & septentrionali.

equestris. 9. A. disco reticulato punctis perlungo ,
margini subarticulato , subtus simplici serie tentaculato.
Barr. ic. 1285.
Linck stell. mar. t. 6. f. 13. t. 12. f. 21. t. 13. f. 22. t. 23.
f. 37. t. 24. f. 39. t. 27. f. 45. t. 33. f. 53.
Seb. mus. 3. t. 8. f. 6. 8.
Habitat in mari mediterraneo , subtus etiam disco gaudens.

kævigata. 10. A. radiis semicylindricis obtuse octogonis muticis.

Rumpf. mus. t. 15. f. E.

Grew. mus. t. 8. f. 1. 2.

Linck stell. mar. t. 28. f. 47.

*Habitat in mari mediterraneo & jindice , radiis testis re-
tus obsoletis , ad latera inter verrucas punctis exorbi-
tis , subtus verrucis in quinquecum dispositis.*

membra- 27. A pentagona utrinque tuberculis pectinato-aculeatis
nacea. hispida , subtus costis quinque elevatis convexis. *Retz.*
nov. a. Z. Stockh. 1783. p. 230. n. 6.

Linck stell. mar. t. 1. f. 2.

Habitat in mari mediterraneo.

granula- 28. A. pentagona inermis utrinque tessellato-granulata,
margine articulato. *Retz. nov. a. Z. Stockh. 1783. p. 231. n. 7.*

Linck. stell. mar. t. 13. f. 22. t. 23. f. 37. t?. 24. f. 39. ?t.
27. f. 45.

Müll. zool. dan. 2. p. 19. t. 92. f. 1-4.
Habitat ad insulam S. Crucis.

*** radiatæ.

Rosea. 29. A. aspera, granulis reticulata, radiis teretibus. Müll.
zool. dan. 2. t. 67. rær. 2. p. 76. prodr. 2838.
Sel. mus. 3. p. 13. t. 7. f. 5. *Stella marina vulgaris batava.*
Habitat in mari belgico & norwegico, elegans, supræ
læte rosea, rarius aurantia, areolarum punctis nigrican-
tibus sparsis, subitus albida: sulcis dilatatis, tenaculo-
rum serie quadruplici, pinnularum divergentium quin-
uplici, radiis summo apice albis.

Pertusa. 30. A. scabra, radiis teretibus basi angustatis gibbis. Müll.
zool. dan. prodr. 2839.
Habitat in mari norwegico.

Ophiura. II. A. disco squamoſo: squamula angulorum ferrata. Müll.
zool. dan. prodr. 2840. Ad. Nidrof. 4. p. 54. t. 2. f. 15. 16.
O. Fähr. Fn. groenl. p. 371. n. 366.
Syst. nat. XII. 2. p. 1100. n. 11. *Asterias radiata radiis*
quinq[ue] simplicibus, stella orbicularia quinqueloba.
Retz. nov. acq. Stockh. 1783. p. 231. p. 8. *Asterias radiata,*
radiorum peccinibus appressis, disco pentagono tunicato.
Slæan. jem. 2. p. 272. t. 244. f. 8. 9. *Stella marina mi-*
nor echinata purpurea.

Plan. conch. minor. 38. t. 4. f. 4.

Jonst. inf. 1. 26. f. 7.

Stroem. scand. 1. p. 179. n. 4. 5.

Hart. Spitsb. t. P. f. D.

Linck stell. mar. t. II. f. 17.

) *Asterias radiis in morte dissimilientibus.* Olafs. ist. p. 900.
Habitat in Oceano, etiam maxime septentrionali, inter mi-
nores hujus generis celerius incedit, rarer tota candida,
sed supra grisea, rubra vel violacea, aculeis 4 superiori-
bus cum apicibus striisque transversis atbis, glama; ra-
diis 5 corpore orbiculari quadruplo longioribus, quadran-
gularibus, gracilibus, flexuosis, squamarum serie simplici
obtectis, divergentibus, solidis: In hac acri specie certis
anni temporibus a myilo eduli frequentius comesta proba-
bilis causa funestorum effectuum, quos hujus usus ali-
quando excitat, latet, v. de Beunie acq. Bruxell. I. n. 8.

- aculeata. 12. *A. aculeis glabris*, latitudine radii brevioribus. *Müll. zool. dan. prodr.* 2841.
Syst. nat. XII. 2. p. 1101. n. 12. Asterias radiata, *radiis quinque aculeatis.*
Retz. nov. act. Stockh. 1783. p. 232. n. 10. *Asterias radiata*, *radiorum pectinibus divergentibus*, *disco orbiculato squamato muricato.*
Müll. zool. dan. 3. p. 29. t. 99. f. 1 - 3. prodr. 2841.
Linck stell. mar. t. 26. f. 42. t. 40. f. 71.
Habitat in Oceano, colore summiopere varians, orbicularis, subtus squamis minutis obtecta, quarum sex corollam referunt.
- ciliaris. 13. *A. spinis asperis latitudine radii longioribus.* *Müll. zool. dan. prodr. 2842.*
Syst. nat. XII. 2. p. 1101. n. 13. Asterias radiata imbricata: *radiis utrinque ciliatis.*
Retz. nov. act. Stockh. 1783. p. 232. n. 9? *Asterias (ciliata) radiata*, *radiorum pectinibus patulis*, *disco squamato lœvi squamato.*
Barr. rar. 131. t. 1295. f. 1. Stella marina minor ophiocnemos f. ophiurus.
Linck stell. mar. t. 34. f. 56. t. 37. f. 65. t. 40. f. 71.
Habitat in Oceano septentrionali, australiori & indicis filiformis.
- filiformis. 13. *A. disco squamoso*, *aculeis latitudine radii æqualibus.* *Müll. zool. dan. 2. t. 59. rar. p. 55. prodr. 2843.*
Habitat in Norwegiæ fundo argillaceo maritimo, grossa ciliaria; *radiis flexuosis fragilibus aliis corporibus adhærens*, *orbicularis supra ex rufa fusca marginis nigricans*, *subtus nigra*, *quinqueloba*, *saccularum rubrorum serie ad basin radiorum posita*; *hi 5*, *ex hinc fusci in filii tenuitatem abeuntes*, *disco decuplo longiores*, *articulis singulis aculeis 5 puncto nigro et lineis rubra notatis*, *et tentaculis 2 lateralibus instrutis*.
- tenella. 32. *A. radiis duplicatis*: *superioribus quinque bifidis pectinatis* *inferioribus filiformibus*: *geniculis incrassatis.* *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. p. 233. n. 11.
Habitat in mari insulam S. Crucis alluente, pectinata multo minor, alba, caudice radiorum longiore.
- pectinata. 14. *A. radiis duplicatis*: *superioribus quinque bifidis pectinatis* *inferioribus filiformibus paucioribus*: *geniculis æqualibus*, *disco supra lœvi.* *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. p. 234. n. 12.

Syst. nat. XI. 2. p. 1101. n. 14. Amœu. acad. 4. p. 256.
Asterias radiata, radiis duplicatis : superioribus pinnatis,
inferioribus filiformibus.

Barr. rar. t. 1282. f. 1. Stella marina decanemos simbriata.
Column. phytob. 109. t. 29. Stella marina altera.

*Pet. gaz. t. 4. f. 6. Stella chinensis perelegans dupliciter
radiata.*

Linck stell. mar. t. 37. f. 64. 66.

Seb. mus. 3. t. 9. f. 3. 4.

Habitat in mari indicō, lāvis, radiorum caudice vix conspicuo.

multiradiata. 15. A. radiis duplicatis : superioribus decem palmato-subquadri-
drifidis pectinatis ; inferioribus filiformibus pluribus,
disco granulato. Retz. nov. ad. Stockh. 1783. p. 234. n. 13.

Syst. nat. XII. 2. p. 1101. n. 15. Asterias radiata, radiis
palmato-multiplicatis pinnatis ; inferioribus filiformibus.

Linck stell. mar. t. 21. f. 33. t. 22. f. 34.

Habitat in mari indicō.

Caput 16. A. radiis dichotomis, disco radiisque granulatis, ore
Medusæ. depresio. Retz. nov. ad. Stockh. 1783. p. 234. n. 34.

Müll. zool. dan. prodr. 2844. O. Fabr. Fn. groeol. p. 372.
n. 367. Asterias radiata, radiis duplicatis dichotomis.

Syst. nat. XII. 2. p. 1101. n. 16. Fn. suec. 2114. Mus.
Ad. Fr. I. p. 95. Asterias radiata radiis dichotomis.

Jonst. ins. t. 26. f. 11. Stella marina.

Pontopp. norsk. Naturh. 2. p. 292. Stroem sondm. I. p. 179.
n. 6. Soë-Soël.

Martens Spitsb. t. P. f. E.

Linck stell. mar. t. 18. f. 29. t. 19. f. 30. t. 20. f. 32.

Seb. mus. 3. t. 9. f. 1. 2. t. 11. f. 1.

Knorr. delic. nat. sel. t. G.

Thunb. nov. ad. Stockh. 1783. p. 236.

Habitat in mari norwegico, mediterraneo, indicō, æthiopico,
ad Caput Bonæ Spei, viridis aut rufa.

Euryale. 33. A. radiis dichotomis, disco papilloso radiisque granulatis,
ore subelevato. Retz. nov. ad. Stockh. 1783. p. 235. n. 15.

Linck stell. mar. t. 29. f. 48. t. 30. f. 49.

Rumpf. mus. 41. t. 16.

Habitat ad Caput Bonæ Spei, fulva.

oligætes. 34. A. radius longissimis simplicibus : articulis singulis basi
stylis binis mobilibus acutis. Pallas nov. ad. Petrop. 2,
p. 239. t. 6. f. 23. A. B.

Habitat ad Carassuo, Gorgoniis adhaerens, pentagona, exigua, duriuscula ochroleuca.*

nigra. 35. A. radiisque quinque articulatis superne imbricatum squamatis: pectinibus lateralibus patulis disco obtuse pentagono granulato. *Müll. zool. dan. 3. p. 20. t. 93. f. 1-4.*

tricolor. 36. A. radiis quinque articulatis ad latera pectinatis: dentibus scabris, disco hispido. *Müll. zool. dan. 3. p. 28. t. 97. f. 1-5.*

Habitat ad insulam Foeroe.

fragilis. 37. A. disco orbiculato muricato, dorso spinoso, radiis quinque articulatis ad latera pectinatis: dentibus ferrato-muricatis. *Müll. zool. dan. 3. p. 28. t. 98. f. 1-3.*
Habitat in mari norwegico & groenlandico.

292. EC HINUS. *Corpus subrotundum, crusta ossa teclum, spinis mobilibus saepius aspera.*

Os subtus, (saepius) quinquevolva-

* *ano verticali, tentaculis undique simplicibus, Ano cysti Kleinii.*

† *hemisphaericu vel spharoidales, Cidares Kleinii.*

esculentus. 1. E. hemisphaericu - globosus ambulacris denis, areis obsolete verrucosis. *Fn. suec. 2116. Mus. Lud. Ulr. 705.*

Fn. juec. 1. 1289. Echinus subglobosus vertice plano.

Rondel. psc. l. 18. c. 32. p. 581. Echinometra.

Aldrov. aq. p. 405. 409. Echinometra.

Planck. conch. min. nat. p. 20. Meto marinus.

Gault. ind. test. t. 107. f. B. E. Echiometra spinis denudata.

Phelsum Br. over de Zee-egelen. p. 28. n. 21. etbare Zee-egel.

Klein echinolerm. ed. Lesk. p. 76. t. 38. f. 1. Cidaris miliaris.

Lift. angl. 69. t. 3. f. 13. Echinus marinus aculeorum vestigiis nonnihil eminentibus.

Rumpf. mus. 31. t. 13. f. B. C. Echinus esculentus.

Seb. mus. 3. p. 24. t. 11. f. 4. a. b. et c. 12. f. 1. 6-8. 9.

Davila catal. p. 410. n. 926-928.

Argenv. conchyl. p. 307. t. 25. f. F.

Delic. nat. Select. t. D. f. I. t. D. II. f. I.

α) *Phels. ov. de Zee-egel. p. 28. n. II. Bontgeringde Zee-egel met Korte gruppels.*

Seb. mus. 3. t. IO. f. 14.

β) *Phelsuni. Zee-egel. p. 28. n. IO. Bontgeringde Zee-egel met lange gruppels.*

Seb. mus. 3. t. II. f. 6.

γ) *Phels. Zee-egel. p. 28. n. 17. Kegelvormige Zee-egel.*

Seb. mus. 3. t. II. f. 7.

δ) *Phels. Zee-egel. p. 28. n. 14. Tienstraalige Zee-egel.*

Seb. mus. 3. t. II. f. 9.

ε) *Echinus albus. Molina hist. ret. Chil. p. 175.*

Habitat in Oceano europeo & indicō, mari mediterraneo;

& in pacifico ruber, coccineus, flavescens vel spadiceus,

ε) albus altitudinis interdum magis quam dorstantalis,

verrucis ochroleucis, tuberculorum minorum circulo cinc-

tis, spinis albidi, vel violaceis apice albī, ambulacris

trifariam porosī, anomembrana coriacea spinulis hispidae

clauſo.

Sphæra. 18. E. subsphæricus ruber, spinis subcæruleis. Müll. zool. dan. prodr. 2845.

Pontopp. norsk. Naturh. 2. c. 7. p. 275.

Habitat in Oceano norwegico, utrum sati's distincta ab

esculentō species, an sardicus?

Droebachiensis. 19. hemisphæricus pallidus, spinis longis pallidis. Müll. zool. dan. prodr. 2846.

Habitat in Norvegiæ ſinu Droebachiensi.

Miliaris. 20. E. hemisphærico-depressus, ambulacris denis, arcis bifaria verrucoſis.

Klin. echinod. ed. Lesk. p. 82. t. 2. A. C. D. t. 31. A. D. t. 38. f. 2. 3. Cidaris miliaris faxatilis.

Rondel. aquat. p. 578. Gesn. aquat. p. 416. aldrov. exans. l. 3. p. 402. Echinus ovarius.

Echini, mu'ti eſculenti, olim, petrefacti, queque, ad tricavendos et ſonandos morbos, nunc aliis, nunc aliis partitus præscribitur habitus commandati, et adhibiti: maris omnes incola, quod ad teſum attinet, inter petrifacta frequentissimi, inter mollusca et teſlacea ambigui, nervis gaudet, cerebro curvit. Ideam ſequitur diffidam formaturus computationem ejusdem inſitum cum harto in area. pulvilloſis diuīo, ambulacris diſtincta.

Phelf. ov. Zee-egel. p. 28. n. 23. 24. Friesthe Zee-egel.
et Klippegel platte.

Müll. zool. dan. prodr. 2847. *O. Fabr. Fn. groenl.* p.
372. n. 368. *Echinus (saxatilis) hemisphærico-depres-*
sus vel orbicularis, spinis diversicoloribus.

Sloan. jam. 2. p. 268. t. 244. f. 1-3.

Rundm. rar. nat. et art. p. 97. t. V. f. II.

Gualt. test. t. 107. f. G. H. I. L. N.

Davila catal. I. p. 410. n. 928.

Seb. mus. 3. p. 18. t. 10. f. 1-4. 12. p. 24. t. 11. f. 5-8. p.
25. t. 12. f. 1? 2. 7.

Delic. nat. sel. I. p. 94. t. D. II. f. 3. 4. 5. et t. D. III. f. 4.

Basteri. β) E. testa depreſta : tuberculis rarioribus, linea media
arearum argute ferrata, poris ambulacrorum in seriebus
alternis trium et duorum foraminum positis. *Leske ap.*
Klein echinod. p. 87. t. 43. f. 3-5. t. 49. f. I. 2.

Phelsum ov. de Zee-eg. p. 18. n. 16. Zee-Klit.

Bast. op. subs. 3. p. 112. t. 11. f. 2-8.

Reaum. act. par. 1712. p. 177. t. 8.

Gualt. test. t. 107. f. A.

Habitat frequens in Oceano europæo, testa minore, vertet
magis depresso, ambulacris angustioribus ab esculentis dis-
tinctus, nunc ex viridi cinereus, nunc ex olivaceo viridis,
nunc ex violaceo subrubor, areis majoribus tuberculorum
minorum præter interspersa minima serie octuplici, minori-
bus majorum duplii minorumque similiter duplii in æ-
qualibus, ambulacris pororum duplichum serie triplici,
spinis 3-4 lineas longis, striatis, acuis vel obtusis, albi-
dis, violaceis, viridibus, vel ex olivaceo nigricantibus.

Hemis- 21. E. hemisphærico depreſsus, ambulacris denis, arearum fu-
tura media ferrata lineisque transversis, ore pentagono:
angulis obtusis. *Klein echinod. ad. Lesk.* p. 90. t. II. E.
et t. XL. f. 7.

Mus. Linck I. p. 116. n. 43.

Gualt. test. t. 107. f. M.

Delic. nat. sel. p. 88. t. D. f. 6.

Habitat --- ex flavescentii ruber, ambulacris palli-
dioribus, basi ochroleuca, eminentiis majoribus minori-
busque et granulis arearum poris interstitis asper; an-
varietas esculent?

angulosus. 22. E. hemisphærica, areis granulatis bifariam verrucosæ,
majoribus futura media ferrata bipartitis, ambulacris tri-

fariam porosis. *Klein echinod. ed. Lesk. p. 92. t. 2. F.*
t. 42. f. 1.

Phels. Zee-eg. p. 28. n. 15. Fyn wratje Zee-egel.
β) *Echinus minor ex cinereo viridescens. Klein echinod. ed.*

Lesk. p. 94. t. 3. A. B.

Phels. Zee-eg. p. 29. n. 28. Kleine Vyfhoek.

Seb. mus. 3. t. 10. f. 20.

Argezv. conch. 1. p. 310. t. 25. f. H.

Gualt. test. t. 108. f. A.

Delic. nat. sel. 1. p. 88. t. D. f. 4. 5.

Habitat - - - ex cinereo colore in violaceum vergens,
diametro transversa $2\frac{1}{2}$ digitorum β) duorum, areis granularum scriebus, majoribus quidem decem, minoribus 6; verrucarum ordinibus ex 30 circiter conflatis, areis minoribus & ambulacris magis convexis & prominentibus, ambulacris potius ex lutescente cinereis: poris distantibus duplicitibus.

excavatus. 23. *E. hemisphæricus, areis granulatis, omnibus bifariam verrucosis, ambulacris excavatis bifariam porosis. Klein echinod. ed. Lesk. p. 95. t. 44. f. 3. 4.*
Scill. de corp. mar. petrif. t. 22. f. 2. D.
Habitat in calcareum mutatus ex flavo cinereum Veronæ, an mera varietas miliaris?

Globulus. 2. *E. hemisphærico subglobosus, ambulacris denis, areis latere muricatis, medio porosis. Mus. Lud. Utr. 706.*
Habitat in Oceano Indico; an idem cum granulato?

Sphæroi-
des. 3. *E. hemisphærico-gibbosus, ambulacris denis undique muricatis medio porosis.*
Habitat in Oceano Indico.

Gratilla. 4. *E. hemisphærico-gibbosus, ambulacris denis triplicatis, areis decussatim muricatis. Mus. Lud. Utr. 707.*
Habitat in Oceano Indico.

Lixula. 5. *E. hemisphæricus ambulacris denis: paribus approximatis, areis transverse punctatis muricatis. Mus. Ludw. Utr. 707.*
Habitat in Oceano Indico.

Taxatilis. 6. *E. hemisphærico depressus, ambulacrorum poris arcuatis: arcubus in basi obliquis, propius à vertice magis erectis.*

Syst. nat. XII. 2. p. 1102. n. 6. Mus. Lud. Ulr. 708. Echinus hemisphaerico-depressus, ambulacris denis: paribus approximatis, areis longitudinaliter verrucosis.

Rumpf. amb. p. 31. t. 14. f. A. Echinus faxatilis.

Klein echinod. ed. Lesk. p. 111. t. 5. & 30. A. B. Cidaris rupestris.

Planc. conch. min. not. p. 21. Secundum echinorum genus,
Delic. nat. sel. I. t. D. 111. f. 6.

Seb. mus. 3. t. 10. f. 11.

β) *Seb. mus. 3. t. 13. f. 10. Echinometra muscosa amboinenſis*
Klein echinod. ed. Lesk. t. 39. f. 4.

γ) *Phels. Zee-eg. p. 29. n. 1. Byna ronde Egelmoeders*
Klein echinod. ed. Lesk. t. 5. f. c.

δ) *Phels. Zee-eg. p. 29. Breed band.*
Klein echinod. ed. Lesk. t. 5. f. b.

Habitat in mari mediterraneo, β) in indico, mediæ magnitudinis, subelliptica, altitudine dimidii digiti, ex valaceo cinerea, vel alba, verrucis mediae magnitudinis violaceis, subrubris, aut flavescentibus, areis verrucarum maximarum serie duplici, minoribus interjectis ambulacrorum poris duplicitibus: paribus 5 in serie dispositis, ore amplio, ano scutis ovato-acutis cinctis spinis rigidis brunneis apice violaceis.

feneſtra- 24. *E. orbicularis, basi plana feneſtrata, areis decem verrucarum magnisque inæqualibus, ore decagono.* Klein echinod. ed. Lesk. p. 107. t. 4. A. B. t. 39. f. 3.

Rumpf. amb. p. 36? Echini secunda species.

Walh diluv. 2. p. 177. t. E. I. a. I.

Habitat --- albus, granulis per omnes areas et ambulacra inæqualis, in majoribus areis verrucarum papillas æquantium seriebus 6, ambulacris latis: pororum paribus 3, versus verticem 2, spinis ex violaceis nigris, ano pentagono.

Subangu- 25. *E. hemisphaerico orbicularis, areis decem: minoribus elevatis, verrucarum in singulis seriebus decem.* Klein echinod. ed. Lesk. p. 106. t. 3. C. D.

Seb. mus. 3. t. 11. f. 5?

Habitat --- ex cinereo viridescens, paulisper in brunneum vergens, basi pulvinata, arearum tuberculis 4, vespis rhombum mentientibus, ambulacrorum poris 4, 5 peria arcuatis.

- ovarius.* 26. *E. ovatus*, areis majoribus bifariam verrucosis.
Lang. hist. lap. fig. Helv. p. 124. Echinus ovarius minor.
Plot Oxfordsh. p. 108. §. 85. t. 5. f. 6.
Laid. lithoph. p. 46. n. 934-949. t. 9. f. 940.
Bourg. petrif. p. 76. n. 340. t. 52. f. 340. 345. 346.
Davil. catal. 3. p. 177. n. 213.
Habitat in Anglia, Normandia, Helvetia in lapidem conversus.

- Diadema.* 7. *E. hemisphaerico-depressus*, ambulacris quinis longitudinaliter verrucosis, areis lanceolatis. *Mus. Lud. Ulr. 709. Klein echinod. ed. Lesk. p. 14. 100. t. 37. f. 1. 2. t. 51. g. 1. g. 2.*
Rumpf. mus. p. 35. t. 13. n. 5. t. 14. f. B.
Petiv. amboin. t. 8. f. 5.
 ♂) *Phol. Zee-egel. p. 29. n. 27. Cidaris fasciis tuberculatis.*
 ♀) *Seb. mus. 3. t. 11. f. 10. Echinus ex viridi flavus.*
 ♂) *Pzels. Žee-eg. p. 29. n. 39. Steekelpen.*
Seb. mus. 3. t. 13. f. 9. Echinometra setosa sinensis.
 ♂) *Davil. catal. p. 412. n. 923. 935. 938. Cidaris nigrescens, spinis longis, Cidaris variolata rufo-cinerea, & Cidaris variolata americana.*
Seb. mus. 6. t. 13. f. 5. Echinometra nigra americana.
 ♂) *Cidaris variolata. Klein echinod. ed. Lesk. t. 46. f. 1.*
 ♂) *Echinus spinis nigris albo annulatis. Klein echinod. ed. Lesk. p. 101.*
Habitat gregarius in maris indici arenosis, orbicularis, vertice depresso, testa vivi cærulea, alias ex cæruleo cinerea, ore amplio, ano circulari corio pentagono cincto, areis 5 majoribus bifariam verrucosis; verrucis apice perforatis, pororum in ambulacrorum basi paribus 3, versus apicem 1, spinis minoribus violaceis & ex cæruleo cinereis.

- calama-*
rius. 27. *E. sphæroideo depressus*, ambulacris quinis margine postis nigris, medio granulatis: punctorum prominulorum majorum serie dupli. *Pall. spicil. zool. 10. p. 31. t. 2. f. 4-7. Leske apud Klein echinod. p. 115. t. 45. f. 1-4.*
Habitat in mari indico, ex albo virescens, setis verrucis minoribus insidentibus viridibus, fragilissimis, spinis equiseti culmum simulantibus albidis viridi-annulatis, apice griseis.

- araneifor-*
mis. 28. *E. orbicularis griseus*, aculeis dilate griseis purpureo nitentibus medio crassioribus.

Seb. mus. 3. t. 13. f. 6. *Echinometra multipes s. spinosissima americana.*

Phels. Zee-egel. p. 29. n. 38. *Spinnekopf.*
Habitat in mari americano.

stellatus. 29. *E. spinis insimis capillaribus.*

Phels. Zee-egel. p. 29. n. 37. *Kleine Komeet.*

Seb. mus. 3. t. 13. f. 7. *Echinometra purpurea americana.*

Pontopp. norfk. Naturh. p. 320. *Erinaceus marinus.*
Habitat in mari americano.

radiatus. 30. *E. ambulacris quinque radiatis apice bifurcatis.* *Lesk.*
apud Klein echinol. p. 116. t. 44. f. 1.

Phels. Zee-egel. p. 29. n. 36. *Groote Komeet.*

Seb. mus. 3. t. 14. f. 1. 2. *Echinanthus major spinis orbibus.*

Habitat - - - ambulacris singulis radiis binis albicantibus terminatis, foraminibusque dilute rubellis pertutis.

circinatus. 31. *E. arcis decem granulatis bifariam verrucosis, majoribus excavatis, minoribus elevatis, basi subpulvinata.* *Lesk.*
apud Klein echinod. p. 119. t. 45. f. 10.

Rumpf. amb. 59. f. C. p. 336. *Echinites, cui testa rufa mansit, &c.*

Breyn. echin. p. 55. *Echinometra circinata.*

Phels. Zee-egel. p. 29. n. 30. *Kransje.*

Davil. catal. 3. p. 177. n. 214? *Echinites eminentia variolatis.*

Scill. corp. mar. t. 25. f. 1?

Habitat - - - haecenus non nisi inter lapides inventus.

Cidaris. 8. *E. hemisphærico-depressus, ambulacris quinis repandis linearibus, areis alternatim bifariis.* *Fn. suec. 211.*
Mus. Lud. Ulr. p. 710.

Klein echinod. ed. Lesk. p. 125. t. 7. *Cidaris papillata.*

α) Klein echinod. ed. Lesk. p. 126. t. 7. A. t. 39. f. 1.
t. 51. f. h. 1. 2. *Cidaris papillata major.*

Imper. hist. nat. p. 784. *Estrice marino.*

Shaw it. 2. p. 74. *Grand herisson de mer, &c.*

Seb. mus. 3. p. 30. t. 13. f. 11. 12. *Echinometra spinosa, &c.*

Delic. nat. sel. t. D. f. 2. p. 87. *Großer türkischer Bund.*

Phels. Zee-egel. p. 29. n. 32. 34. t. 3. f. 10. *Groote Tulp.*
band et Vootangel.

β) Klein echinod. ed. Lesk. p. 127. t. 7. B. & 36. f. 3. *Cidaris papillata minor.*

Aldrov. exang. p. 403? *Echinus cum spina adjuncta & spinis spoliatus.*

Rumpf. amb. p. 33. t. 12. f. 3. 4. & *muf.* *Richter* p. 119.
Echinometra digitata secunda vel rotunda.

Phelſ. Zee-egel. p. 29. n. 31. 33. *Schubmond & kleine Tulband.*

Argenv. conch. p. 310. t. 25. E.

Seb. muf. 3. t. 13. p. 30.

Delic. nat. sel. t. D. III. f. 5. p. 97.

γ) *Klein echinod.* ed. *Lesk.* p. 129. t. 41. f. 4. & t. 7. D. E.
Cidaris papillata spinis fusiformibus.

Seb. muf. 3. t. 13. f. 8. *Echinometra ex Indiis.*

• *Scill. corp. mar.* t. 22. f. 1-3. *Echinus maris e siculo mari.*

Devil. catal. I. p. 415. n. 943-945. *Turban maure.*

Valent. muf. 2. p. 177? *Echinus marinus.*

Bonann. muf. p. 92. f. 17-18.

Breyn. echin. p. 55. t. I. f. I.

Gualt. test. t. 108. f. D. E.

Petiv. amb. t. 7. f. 2.

δ) ?*Klein echinod.* ed. *Lesk.* p. 134. t. 46. f. 2. 3. *Cidaris pa-*
pillata spinis clavicolatis.

Imper. hist. nat. p. 671.

Lang. lap. fig. t. 36. fig. med.

Deluc Naturf. 8. p. 278. t. 8.

Andreas Brief. aus der Schweiz. p. 40. 267. t. 5. e. f.
t. 14. f. d. & 4.

ε) *Müll. zool. dan. prodr.* 2848. *Echinus spinis obtusis.*

Pontopp. norsk. Naturh. 2. c. 7. p. 278. f.

Stroem. sondm. p. 175.

ζ) *Rumpf. amb.* p. 34. *Echini siamenses.*

Habitat in Oceano, ut plurimum ex livido cinerea, basi pla-
na, areis majoribus & granulatis, verrucarum papillis
apice perforatis alternarum & granulorum circulo, scipius
duplici cinclarum, & sulco circumeunte distinctarum serie-
bus duabus, minorum loco fascia eminente inter ambu-
lacra, ore satis amplio.

mammil- latus. 9. E. hemisphaerico-ovalis, ambulacris denis flexuosis, areis muricatis verrucolis: augustioribus abbreviatis. *Muf.*
Lud. Ulr. 711.
Klein echinod. ed. *Lesk.* p. 121. t. 6. t. 34. & t. 39. f. I.
Cidaris mammillata.
Rumpf. amb. p. 32. t. 13. f. I. 2. *Echinometra digitata pri-*
ma oblonga.

- Phels.* Zee-egel. p. 30. n. 8. Groote Wydbeck.
Breyn. echin. p. 56. t. 1. f. 5.
Gault. test. t. 108. B. C.
Argenv. conch. p. 310. t. 25. f. A.
Seb. mus. 3. t. 10. f. 17.
 β) *Phels.* Zee-eg. p. 30. n. 7. Kleine Wydbeck.
 γ) *Phels.* Zee-eg. p. 30. Karmoisine Egel-moeder.
Seb. mus. 3. t. 13. f. 1. 2.
 δ) *Phels.* Zee-eg. p. 30. n. 6. Holleband.
Seb. mus. 3. t. 13. f. 3.
 ε) *Phels.* Zee-eg. p. 30. n. 12. Rosgeele Egel.
Seb. mus. 3. t. 13. f. 4.
Delic. nat. sel. I. t. D. f. 3. p. 87. & t. D. III. f. 7. 8.
Davil. catal. p. 414 n. 939-941.
Habitat in mariibus magis meridionalibus, depresso et
 flavo cinerens in fuscescentem colore vergens, subtus
 magis albidus; arearum decem papillis omnibus non
 perforatis, circulis elevatis cinctis, in majoribus 16-
 18, quarum medice maximae, in minoribus 14 magis
 ambulacris pororum ad basin paribus 4-5, ore amplio,
 ano rotundo, 10 squamis cinto, quarum 5 perforatae,
 spinarum colore vario.

- Lucunter.* 10. E. hemisphaerico-ovatus, ambulacris denis flexuosis, areis
 muricatis: angustioribus longitudinalibus.
Klein echinod. ed. *Lesk.* p. 109. t. 4. C. D. *Cidaris Lu-*
cunter.
Seb. mus. 3. t. 10. f. 6. 16. & t. 11. f. 11.
Breyn. echin. p. 56. t. 1. f. 6.
Gault. test. t. 107. f. C.
Delic. nat. sel. I. p. 89. t. D. I. f. 8.
Davil. catal. p. 412. n. 934.
 β) *Cidaris Lucunter* ambitu suborbiculari. *Klein echinod.*
 ed. *Lesk.* t. 4. f. E. F.
Phels. Zee-eg. p. 33. n. 3. Smalband.
Habitat in Oceano indicō, magnitudine & colore varians
 ex flavo cireneus, cærulescens vel nigrescens, basi pulvi-
 nata, ore amplio, verrucarum maximarum in singulis
 areis ordine dupliciti, paulo minorum in majoribus aris
 sextuplici, in minoribus quinuplici, pororum in ambu-
 lacris versus utrumque sive in paribus, 4-5, in medio b.

An hujus familie *Echinus* totus niger, ovatus, ambulacris quinque, areis verrucosis, testa Molina hist. nat. Chil. p. 156, ad litus Chilense obvius;

- atratus. II. E. hemisphaerico-ovalis depresso-sculptus : spinis truncatis brevissimis obtusissimis : marginalibus clavatis depresso-serratis. Klein echinod. ed. Lesk. p. 117. t. 47. f. 1. 2. & 1. f. 1. 44. aa. 1. 54. f. 5. Cidaris violacea. Phels. Zee-eg. p. 30. n. 9. Violette Egel-moeder. Argent. conchyl. I. p. 310. t. 25. f. F. G. Davil. catal. I. p. 413. n. 936.

Habitat in India, ambitu suborbiculari, cinereus, in violaceum vergens, areis decem subtilissime granulatis, majorum verrucis majoribus serie interdum octuplici, in quincunce positis, minorum serie duplaci, ambulacris fuscis, excavatis, granulatis, latis : pororum seriebus 4, spinis violaceis, aliis clavatis, aliis apice angulatis, aliis cylindricis.

- coronalis. 32. E. hemisphaerico-orbicularis, areis decem : alternis angustioribus ; papillis sparsis, ambulacris planis, ante verticis aream per paria confluentibus. Leske apud Klein echinod. p. 136. t. 8. A. B. Phels. Zee-egel. p. 28. n. 5. Giersl-korlige Zee-egel, & transwyze Geweloslek. Gefn. petrif. c. 12. p. 34. Echinites eminentiis per quinque ordines triangulares, &c. Luid. lithoph. brit. n. 979-981. Morton Northampt. p. 234. t. 10. f. 10. Lang. lap. fig. p. 122. t. 35. Bourg. petrif. t. 51. f. 334. 335.

β) Cidaris corollaris tenuis. Klein echinod. ed. Lesk. p. 138: t. 8. C.

- Gefn. petrif. c. 12. p. 34. Ombria. Boët de Boodt genit. p. 486. Brontia f. Ombria. Dav. cat. 3. p. 178. Turban à couralle. Meccat. mus. metall. p. 247. Hook Works p. 284. t. 2. f. 2. 3. Plot Staffordsk. p. 178-198. t. 13. f. 21. List. lap. oachl. p. 120. tit. & f. 19. Luid. lith. brit. p. 46. n. & f. 942. 943. Valent. mus. 2. t. 3. f. 8. Lang. lap. fig. p. 124. t. 35. Bourguet petrif. p. 76. t. 52. f. 345. 346. Scheuchz. oryctogr. p. 317. f. 134. phys. sacr. t. 56. f. 65. Baier oryctogr. noric. t. 3. f. 36. γ) Klein echinod. ed. Lesk. p. 140. t. 45. f. 2.

Rumpf. amb. p. 337. t. 59. f. E.

Phelsum Zee-eg. p. 27. n. I.

δ) *Klein echinod. ed. Lesk. p. 141. t. 8. D. E. Cidaris corollaris crassa.*

Habitat --- frequenter in cretam et siliceni conversus; an vera distincta species prototypus?

asteri- 33. *E. orbicularis depresso, tuberculis sulco ad apicem usque exaratis et granulorum circulo cinctis.*

Klein echinod. ed. Lesk. p. 141. t. 8. F. et t. 46. f. 5'

Phels. Zee-eg. p. 29. n. 35. Sterre-wrat Zee-egel.

Habitat --- inter lapides creta repletos, testa in spatum conversa; vix distincta species prototypus.

assulatus. 34. *E. testa scutellata: scutellis per suturas transversas nexus.*

Klein echinod. p. 15. §. 26.

β) *Cidaris tessulata. Klein echinod. ed. Lesk. p. 16. §. 27.*

Habitat --- vix vere distincta species.

sardicus. 35. *E. orbicularis depresso tuberculatus, ambulacris densimpressis, areis multifariam verrucosis: sutura media impressa. Leske apud Klein echinod. p. 147. t. 9. A. B. t. 54. f. 4. 6.*

Phels. Zee-eg. p. 28. n. 18. Sardische Zee-egel.

Planc. comm. Bonon. V. I. p. 236. t. I. f. 4. 5. Echinometra magna, malo marinus.

Bonann. recr. 2. p. 92. n. 19. f. 19.

Scill. corp. mar. t. 13. f. I. & t. 36. f. B.

Habitat in mari tyrrheno & adriatico, magnus, ex cireno flavescente ruber, basi fere plana magis flavescente, arearum majorum verrucis in 8-12 series digestis: interstitiis minoribus et minimis tuberculis obsitis, minorum verrucis minoribus in 4-6 series dispositis, pororum ambulacris paribus 5, arcuato ordine suis, ore parvo decies sinuato.

flamme- 36. *E. hemisphaericus depresso, arearum medio superioribus versus verrucis vacuo, minoribus elevationibus ambulacris angustis, utrinque verrucarum serie cinctis. Leske apud Klein echinod. p. 148. t. 10. A.*

Phels. Zee-eg. p. 28. n. 13. Gevlamde Zee-egel.

Habitat --- ex olivaceo viridis, tuberculis & ambulacris basique albidiobus; arearum majorum latissima parte verrucarum seriebus 12, areis minoribus 3 singulis asperis.

singulis verrucis tuberculorum minorum circulo cinctis;
ambulacris vix 2 lineas latis: pororum paribus ternis granulis interstinctis; ore parvo, ano squamis pentagonis cincto.

- variega- 37. E. orbicularis subangulosus, areis mediis roseis utrinque
tus. laxe viridibus, ambulacris ex viridi albicantibus, basi
albida. *Leske apud Klein echinod. p. 149. t. 10. B. C.*
Phels. Zee-eg. p. 28. n. 12. Buntgeflamte Zee-egel.
Seb. mus. 3. p. 20. t. 10. f. 13.
Gualt. test. 1. 107. f. F.

Habitat - - rarer, arearum majorum parte latissima
verrucarum: granulis circumdatarum vestigis 3-4 obsita,
areis minoribus paulo elevatoriibus: verrucarum seriebus
3, pororum in ambulacris paribus 3, ore subrotundo
levissime sinuoso.

- Pustulo- 38. E. arearum majorum medio sutura interstincto: verruca-
sus. rum seriebus transversis plurimis medium versus numero
 increcentibus, areis minoribus elevatoriibus. *Leske apud*
Klein echinod. p. 150. t. 11. A. B. C. D.
Phels. Zee-eg. p. 28. n. 7 - 9. Digitnistiche, ylpustige &
bynanaakte Zee-egel.
Seb. mus. 3. t. 10. f. 8 - 10. 15..

Habitat - - vix pollicem altus, diametri bipollicaris,
ex brunno cinereus, in rubrum vergens, areis minoribus
dilutioribus, basi magis albida, verrucis rubellis, areis
decem majorum disco aspero, sutura utrinque granulis
minimis cincta, extimo utrinque verrucarum ordine solita-
ria verruca, altero duabus composito, ut in medio sena-
tium numerum aequatur, areis minoribus verrucarum
ordinibus 2, quibus linea serrata, et granula minima
interjacent; pororum in ambulacris paribus 4-5, in
lineis obliquis excurrentium, ore late sinuoso.

- Granula- 39. E. suborbicularis subangulosus, arearum medio nudo fu-
tus. tura utrinque serrata distincto, verrucarum in majoribus
 utrinque ordinibus septem in minoribus quatuor. *Leske*
apud Klein p. 150. t. 11. E. F.
Phels. Zee-eg. n. 27. n. 4. Zand-korlige Zee-egel.
 Habitat - - $\frac{3}{4}$ pollicis altus, diametri sesquipollicaris,
basi pulvinata cum arearum majorum margine ex viridi
cinereus, arearum majorum medio areisque minoribus
obscure viridibus, pororum in ambulacris paribus 3 in
triangulo sitis, ano circulari, ad marginem squamis
10, rosae instar expansis cincto.

tessella- 40. E. areis decem futura media diversis assulatis, ambulacris decem biporosis ore circulari. Klein echinod. ed. Lesk. p. 153. t. II. G.

Phels. Zee - eg. p. 27. n. 2. Leyendak.

Beschr. d. Merkw. Basels. p. 259. t. 22. G?

Habitat --- haecenus modo inter lapides repertus.

botryoï- 41. E. areis futura media longitudinali bipartitis, majoribus des. bifariam verrucosis, pororum in ambulacris serie dupli arcuata. Leske apud Klein echin. p. 154. t. II. H.

Phels. Zee - eg. p. 27. n. 3. Geribde Zee - egel.

Aldrov. mus. metall. p. 457. Echinites laevis valde durus & lucidus, figuram mespili æmulans.

Habitat --- haecenus modo inter lapides inventus.

toreuma- 42. E. hemisphaericus, areis decem bifariam verrucosis: verrucis crenatis granulorum circulo cinctis, areis majoribus fulcis longitudinalibus quatuor, minoribus duobus exaratis. Leske apud Klein echin. p. 155. t. 10. D.E.t.44f.2.
Phels. Zee-eg. p. 28. n. 6. Gegriaveerde Zee-egel.

Habitat --- cinereus levissime vel cærulescens vel virescens, basi & ambulacris flavescens, ambulacris biporosis: poris in linea argute ferrata positis, basi pulvinata, ore parvo, ano squamis 10 cinto.

† † figura ad clypei figuram accedente, Clypei Kleinii.

finuatus. 43. E. convexus ambulacris striatis areisque decem, verrucis granulorum circulo cinctis. Klein echinod. ed. Lesk. p. 157. t. 12.

Plot oxfordsh. p. 91. 92. t. 2. f. 9. 10. Polar stone.

Lift. lep. cochl. p. 224. tit. & fig. 27.

Luid. lithoph. brit. p. 48. n. 471.

Mort. Northampt. p. 233. n. 1.

Habitat --- haecenus modo inter lapides inventus, arearum una sinu excavato divisæ, ambulacris latis marginis utroque punctatis, basi parum excavata, & fulcis 5 divergentibus exarata, ore parvo pentagono.

semiglo- 44. E. hemisphaericus sulcatus, basi plana, verrucis seriatim bosus. Klein echinod. ed. Lesk. p. 158. t. 43. f. 1. Clypeus hæmisphaericus.

Lung. lep. fig. p. 119. t. 34.

Volkm. Sil. subt. I. p. 179. t. 30. f. 5.

Bourg. petrif. t. 52. f. 342.

Habitat --- haecenus tantum inter fossilia deprehensus; an propria species prototypus?

Quinque-labia-tus. 44. *E. annulis innumeris pictus: media fossula, stellulam convexam cingente. Leske apud Klein echinod. p. 159. t. 41. f. 3.*

Phels. Zee-eg. p. 30. n. 2. Vyflip.

Walch monum. diluv. 2. p. 181. t. E. III. f. 4.
Vers. der basel. Merkw. 22. t. 22. f. 1.

Habitat --- adhuc modo inter fossilia obvius.

Conoide-us. 45. *E. subconicus ambitu elliptico, areis & ambulacris decem, his transverse sulcatis, & margine porosis, illis futura excavata recta divisis. Leske apud Klein echinod. p. 159. t. 43. f. 2.*

Hacquet Naturf. T1. p. 105.

Aldrov. mus. metall. p. 456.

Davil. catal. 3. p. 182. n. 225.

Habitat --- haecenus tantum inter fossilia occurrentes, basi plana, arearum verrucis creberrimis, granularum circulo cinctis, basi plana sulcata; ano circulari.

* *ano infero, tentaculis oris nullis, Brissi Müller.*

† *basi circulari, in cujus peripheria anus, Fibulæ Kleinii.*

T *in conum elevati, Conuli Kleinii.*

albo-ga-lerus. 46. *E. areis tuberculis albis minimis dense obsitis ambulacrisque denis, his biporosis, areis majoribus futura ferrata nensis & transversim lineatis, minoribus foramine urticis terminatis. Leske apud Klein echinod. p. 162. t. 13. A. B.*

Phels. Zee-egel. p. 31. n. 15. Egelsteen tienband rondtop.

Aldrov. mus. metall. p. 455. f. 4.

Best. gazoph. contin. t. 19.

Plat. oxfordsh. §. 35. t. 2. f. 13.

Morton. Northampt. p. 235. n. 1.

Luid. lithoph. brit. p. 47. n. 958. 959.

Lachm. oryctogr. Hildes. p. 23.

Lang. lap. fig. p. 125. t. 36. f. 1.

Mell. ech. wagr. p. 7. f. 6.

Breyn. ech. p. 57. t. 2. f. 1. 2.

Bourg. petrif. p. 77. t. 53. f. 361.

Davil. ontal. 3. p. 179. n. 220.

*Habitat - - - hadenus solum inter fossilia inventus,
subovalis, ore orbiculari parvo, ano ovato.*

- depressus. 47. E. areis decem : majoribus sutura media divisis, ambulacris decem biporosis, vertice depresso, ano orbiculari.
Leske apud Klein echinod. p. 164. t. 40. f. 5. 6.
Phels. Zee - eg. p. 31. n. 16. Egelsteen tienband plattop.
Walch diluv. monum. 2. p. 180. t. E. II. f. 6. 7.
Mell. ech. Wagr. p. 7. t. I. f. 2.
Kundni. rar. nat. & art. 5. f. 12.
Natürl. basel. Merkw. 22. t. 22. f. H.
*Habitat - - - hadenus non nisi fossillis, oris mediocris
sinibus 10 acutis, ano magno avato.*

- vulgaris. 48. E. orbicularis ambulacris decem : binis sibi semper vicinis.
*Leske ap. Klein echinod. p. 165. t. 13. f. c-k. t. 14. f.
a-k. t. 40. f. 2. 3.*
Waller. syst. miner. p. 507. Echiniti fibulares.
Phels. Zee - eg. p. 31. n. I - II.
*Walch. diluv. monum. 2. p. 176. 177. & suppl. p. 217. t. E.
f. 1. 2. t. E. I. a. f. 2. t. IX. d. f. 2. t. IX. g. f. 1.*
Aldrov. mus. met. p. 455. f. 3. 6.
Bocc. obs. nat. p. 219. fig. ad fin. tab.
Olear. mus. Gottorp. t. 21. f. 5. 6.
Best. gaz. contin. t. 19. Scholopendrites, Ovum anguinum.
Mus. Calceol. p. 353. Bufonites.
Worm. mus. p. 107. Bufonius lapis.
Mort. Nortchampt. p. 235. n. 2. t. X. f. II.
Lift. lap. cochl. p. 219. tit. & f. 18.
Luid. Lith. brit. p. 46. n. 944 - 950. 957?
Rumpf. amboin. t. I. f. 6 - 9.
Mercat. metatl. p. 246. f. 1-4.
Mell. ech. Wagr. p. 7. t. I. f. 3. 4.
Myl. memor. Saxon. p. 45-47. f. 2. 4. 5. 9. 10.
Volkm. Siles. subterr. p. 179. t. 30. f. 6. E.
Helw. lithogr. angerb. p. 71. t. 8. f. 13.
Breyn. échin. p. 57. t. 2. f. 3. 4.
Bytem. biblioth. app. t. 23. f. 270.
Brom. mineral. p. 51.
Schreb. lithogr. Hal. p. 103. I. a.
Lerch. oryctogr. Hal. 33.
Gesn. petr. p. 24.
Davil. catal. 3. p. 180. n. 220.

Habitat - - - *haecenus solummodo, sed frequentissime fossilis, innumera pristinæ nunc melius conservataæ, nunc magis deletæ formæ varietate.*

quadri- 49. *E. ambulacris quaternis. Leske apud Klein echinod. p. 170. t. 47. f. 3-5.*

Phels. Zee-eg. p. 30. 31. Vierbandige Egel-steen.

Gehler char. fossil. exteri. p. 13. f. 1.

Walch diluv. monum. suppl. p. 218 223 t. IX. d. f. 3. & t. IX. g. f. 7-9.

Habitat - - - *haecenus non nisi fossilis, ambitu nunc orbiculari, nunc proprius ad ovalem accedente.*

sexfascia- 50. *E. ambulacris senis. Leske apud Klein echinod. p. 170. t. 50. f. 1. 2.*

Klein act. nat. Cur. Gedan. 2. p. 292. t. 5. f. 14. 15.

Echinus Terdorpse.

Phels. Zee-eg. p. 31. n. 14. Zesband.

Gehl. charact. foss. ext. p. 13. f. 2.

Walch diluv. monum. suppl. t. IX. g. f. 4-6.

Habitat. - - - *adhuc tantum fossilis.*

† † basi exacte circulari, Discoidei Kleinii.

Subducu- 51. *E. ambulacris biporosis areisque decem, ore anæque parvis orbicularibus. Leske apud Klein echinod. p. 171.*

Gefn. petrif. p. 35. n. 6.

Davil. catal. 3. p. 180.

α) Phels. Zee-egel. p. 37. Roose-top-Egelmats.

Klein echinod. ed. Lesk. t. 14. f. 1. m.

β) Phels. Zee-eg. p. 37. Kreeftvagie Egelnäppje.

Klein echinod. ed. Lesk. t. 14. f. n. o.

Habitat - - - *haecenus tantummodo fossilis, areis circulis minimis obfessis, 5 majoribus, 5 minoribus, ambulacrorum poris subtilissimis dense sibi adjacentibus.*

† † † basi ovali, Echinonei Phelsumii & Leskii.

cyclosto- 52. *E. oblongus subdepressus, verticis poris quinque, ore medio rotundo, ano oblongo vicino. Leske apud Klein echinod. p. 173. t. 37. f. 4. 5.*

Müll. zool. dan. 3. p. 18. t. 91. f. 5. 6. prodr. 28. Spatagus pusillus.

Phels. Zee-eg. p. 32. n. 11. Rond-mond.

Bocc. obs. nat. p. 219.

Rumpf. amb. p. 6. t. 14. f. D.

Breyn. echin. p. 57. t. 2. f. 5. 6.

Seb. mus. 3. p. 36. t. 15. f. 30-33-35-37.

Delic. nat. sel. p. 90. t. D. I. f. 11.

Baier oryctogr. nor. t. 3. f. 35.

Habitat - - - *cinereus*, *subflavescens*, *basi pulvinatus*,
areis 10, *linea media argute serrata divisis tuberculis*,
minimis circulo inclusis obsitis, *ambulacris 10 biporositis*,
ad os usque protensis.

semiluna- 53. E. ano oblongo longitudinali, ore transverso semilunari,
 ris. *Mus. Telsin. p. 114. t. 6. f. 2.* *Echinus ovalis.*

Leske ap. Klein echinod. p. 174. t. 49. f. 8. 9. *Echinoneus minor*, ore semilunari.

Phels. Zee-eg. p. 32. n. 2. *Spect-mond.*

Scb. mus. 3. p. 19. t. 10. f. 7.

Habitat in mari asiatico, dilute ex *cinereo flavescentis*.

scutifor- 54. E. ore pentagono, ambulacris decem striatis, areis majoribus assulatis : assulis pentagonis. *Leske ap. Klein echinod. p. 174.*

Scill. corp. mar. t. II. f. 1. 2.

Habitat - - - an hujus tribus?

††† *basi ex ovali acuta, ano ori opposito, Cassides Kleinii, Echinocoryes Leskii.*

→ *majores, Galeæ Kleinii.*

scutatus. 55. E. convexus subtus planus, areis tuberculis alternantim majoribus: majoribus futura media serrata divisis, ore transverso reniformi. *Leske ap. Klein echinod. p. 175.*

Klein echinod. ed. Lesk. p. 175. *Galea vertice scutato-*

Phels. Zee-egel. p. 37. n. 1. *Ocean-Egel, Vyblad.*

Luid. lith. brit. p. 46. n. 951-953.

Scheuchz. mus. diluv. p. 88. n. 851-854.

Breyn. ech. p. 58. t. 3. f. 1. 2.

Abildg. Stevenskl. p. 22. t. 2. f. 1-5.

Davil. catal. 3. p. 179. n. 219.

α) *Phels. Zee-eg. p. 36. n. 2.* *Gestrcepte Zont-egel.*
Walch diluv. monum. 2. p. 179. n. 4. t. E. I. a. f. 4.

Leske apud Klein echinod. t. 42. f. 4.

β) *Phels. Zee-egel p. 37.* *Getaufelde Ocean-Egel.*
Walch diluv. monum. 2. p. 176. t. E. I. f. 3. 4.

Leske apud Klein echinod. t. 42. f. 2. 3.

Habitat - - - *haecenüs modo fossilis*, *arearum tuberculis granulis minimis interspersis*, *ore tuberculis paulo majoribus triangulum formantibus cincto*, *ano subovato*, *basi marginem versus convexiuscula*, *plaga media eminentiore*, *utrinque fasciis duabus subtilissime granulatis cincta*.

Ovatus. 56. E. ovatus assulatus : *assulis hexagonis*, *vertice nudo*, *ano subovali*. *Leske apud Klein echinod.* p. 178. t. 53. f. 3.
Aldrov. mus. met. p. 455. f. 10.

Grew mus. p. 255?

Hook Works t. 2. f. 4?

c) *Leske apud Klein echinod.* t. 42. f. 5.
Walch diluv. monum. 2. p. 179. t. E. I. a. f. 5.
Aldrov. mus. met. p. 455. f. 3.

Bgtem. biblioth. app. t. 23. f. 270.

γ) *Leske apud Klein echinod.* p. 143. ic. tit. & t. 8. f. G.
Bronties favagineus.

Worm. mus. p. 77.

Encel. re metall. c. 47. p. 232.

Olig. Jacob. mus. p. 35.

Walch diluv. monum. 2. p. 177. t. E. a. f. 3.

Habitat - - - *ad huc modo inter fossilia repertus*, 20
assularum (rariorum 7. aut 5 generum) seriebus, 10
majoribus, 10 *minoribus*, *omnibus futura serrata connexis*, & *similarium duabus vicinis*, *areis 10 majoribus*, 10 *minoribus*, *in singulis his 2 punctis impressis*, *ore rotundo minori*, *ano subovali*.

Pustulo- sus. 57. E. areis obsoletis non tuberculatis, ambulacrorum punctis diobus per paria dispositis eminentibus, vertice impresso.

Leske apud Klein echinod. p. 180. t. 16. A. B.

Plot oxfordsh. §. 36. t. 2. f. 14.

Mort. northampt. p. 335. t. 10. f. 12.

List. lap. cochl. p. 225. t. 7. f. & tit. 29 - 31.

Luid. lith. brit. p. 47. n. 954.

Grew mus. p. 259.

Hook Works p. 284. t. 3. f. 7.

Hellw. lith. angerb. p. 70. t. 8. f. 12.

Mell. ech. wagr. t. 1. f. 7. 8.

Kundm. rar. nat. & art. p. 95. t. 5. f. 8. 9.

Schreb. lithogr. hal. p. 41. γ.

Frisch mus. Hoffm. p. 33.

Habitat - - - *haecenüs modo fossilis*, *figura & ambitu ore*, *anoque scutato similis*.

quadriraza- 58. E. punctorum ordinibus quatuor geminatis. *Leske apud Klein echinod. p. 182. t. 54. f. 1.*
 diatus. *Mell. de lap. fig. Lubec. p. 28. t. 2. f. 7. Echinites Nien-dropiensis.*
Habitat - - - adhuc tantummodo fossilis.

† - minores, Galeolæ Kleinii.

minor. 59. E. ovatus basi plana vel concava ambulacris biporosis
 areisque decem, ore transverso subrotundò, ano subovali.
Leske apud Klein echinod. p. 183.
 papillo- α) E. echinod. ed. *Lesk. t. 16. C. D.*
 sus. *Phelsum Zee-eg. p. 36. n. 5. Knvestagtige Zont-egel.*
Aldrov. mus. met. p. 455.
 undosus. β) E. Klein echinod. ed. *Lesk. t. 17. a. b.*
Phelsum Zee-eg. p. 36. n. 6. Gevlamde Zont-egel.
Breyn. echin. p. 58. t. f. 3. 4.
 laevis. γ) E. Klein echinod. ed. *Lesk. t. 17. c. d.*
Bromel. miner. p. 50.
Volkm. Silef. subt. t. 30. f. 7.
Habitat - - - haecenus solum inter fossilia dprehensus.

dubius. 60. E. ovatus, ambulacris denis simpliciter porosis, an-

dimidia parte marginali. *Leske apud Klein echinod. p. 184. t. 44. f. 5.*
Habitat - - - haecenus non nisi fossilis inventus, areis
5 majoribus circulis impressis insignitis.

+++++ basi irregulari, flore quasi pentapetalo it
 superficie expanso, Scuta Kleinii Echinanthi Leskii
 7 angulares peripheria per sinus angulosa.

rosaceus. 14. E. planiusculus ovato-subrotundus, ambulacris quinque
 ovalibus : superficie punctata. *Mus. Lud. Ulr. 713.*
Klein echinod. ed. Lesk. p. 185. t. 17. A. Echinanthus humilis.
Phels. Zee-eg. p. 38. n. 4. Groot Egel-roozen Stomp-blad.
Sloan. jam. t. 242. f. 6 - 11.
Rumpf. amb. 36. t. 14. C.
Petiv. amb. t. 1. f. 10.
Seb. mus. 3. t. 11. f. 2. 3.
Delic. nat. sel. 1. p. 91. t. D. I. f. 12.
Davil. cat. 1. p. 421.
) Klein echinod. ed. Lesk. t. 19, A. B.
Phels. Zee-eg. p. 38. n. 5. Kleine Egel-roozen Stomp-blad.
Seb. mus. 3. t. 15. f. 11. 12.

Gualt. test. I. t. CX. A.

γ) *Phels. Zee-eg. p. 34.* Eeglkoeken vyfhoek groote.

Klein echinod. ed. Lesk t. 18. B.

Boccon. obs. p. 324. t. f. I.

δ) *Phels. Zee-eg. p. 38. n. 6.* Egel-roozen Dikrand.

Seb. mus. 2. t. 15. f. 13. 14. 23. 24.

ε) *Phels. Zee-eg. p. 38.* Egel-roozen Scherpblad.

Klein echinod. ed. Lesk. t. 40. & 41. f. I.

*Habitat in Oceano asiatico, (ε) non nisi fossilis) ex brunneo
flavescens, interdum sordide cinereus, tuberculis arenam
granula et quantibus, multis in quicunce positis.*

altus.

61. *E. vertice elato orbiculari, ambulacris lutis apice con-
vergentibus granulatis. Leske ap. Klein echinod. p. 189.
t. 53. f. 4.*

Scill. corp. mar. t. 9. f. I. 2.

Mercat. met. p. 233. Cucurbites.

Bonann. recr. t. 36. f. I.

Dav. catal. 3. p. 153. n. 227.

Walch dil. monum. suppl. p. 215. t. IX. d. n. I.

*Habitat - - - hactenus non nisi fossilis, rosaceo altior, ut
2 pollices altitudine, diametro baseos longitudinali 6
et queat.*

77 *ovati, margine integro.*

oviformis. 62. *E. convexus subtus planas, ambulacris decem biporosis
stellae in modum expansis, verticis poris quatuor. Leske
apud Klein echinod. p. 191. t. 20. c. d.*

Rumpf. amb. t. 14. n. 3.

α) *Phelsum Zee-eg. p. 38. n. 1.* Eyronde Egelroos.

*Klein echinod. ed. Lesk. t. 18. C. D. Scutum ovatum
Chaumontianum.*

β) *Phelsum Zee-eg. p. 38. n. 2.* Hartagtige Egelroos.

*Klein echinod. ed. Lesk. t. 20. a. b. Scutum ovatum
Ilsyaviense.*

Aldrav. mus. met. p. 493. f. I. 2. Pentaphyllites.

*Mercat. metall. p. 23. Monostroites vel cryptopetræ spe-
cies altera.*

Rumpf. amb. t. 59. f. D.

Breyn. echin. p. 59. t. 2. f. 45.

Walch dil. monum. 2. p. 181. t. F. III. n. 5.

γ) *Phelsum Zee-eg. p. 37. n. 5.* Rondhart.

Seb. mus. 3. t. 10. f. 23.

*Habitat - - - supra et cinereo fuscescens, subtus ex
cinereo albidus, granulatus, granulis circulo circum-*

datis, ore transverso subreniformi flabiato, ano margini vicino, baseos linea media glabra, albidiore, ab altera testae fine ad alterum extensu.

orbicula- 63. *F. granulatus, ambulacris biporosis: poris lineola transversa impressa conjunctis, spatiisque intermediis sutura media ferrata bipartitis, reliqua superficie quinquepartita.*

Leske apud Klein echinod. p. 194. t. 41. f. 2.

Mercat. met. p. 232. Monostroites minor.

Walch monum. dil. 2. p. 181. t. 41. f. 2.

Natürl. bas. Merkw. 22. t. 22. f. 3?

Bourg. petrif. p. 77. t. 53. f. 352.

Habitat - - - haecenus non nisi fossilis; an vere distincta ab aliis, praesertim a quinquelabiatu species?

+++++ utrinque plani, ambulacris petalorum figuratiæ emulantibus, ore centrali plano deformato, verticis poris quatuor, Placentæ Klönnii, Echinodisci Leskii.

margini sinuoso.

superficie perforata; Mellitæ Kleinii.

biforis. 64. *E. basi fulcis quinque lineisque flexuosis radiatis decolorata, foraminibus oblongis ad anum duobus. apud Klein echinod. p. 169. t. 21. A. B.*

Delic. nat. sel. I. p. 92. t. D. I. f. 1. Echinodiscus.

Phels. Zee-eg. p. 35. n. 12. Onregelmatige Egelkoek. p. 34. n. 3. Stomphart met twot buisen.

Dav. I. catal. I. p. 423. n. 955.

St. Müller Linneisch. Naturf. 6. B. t. 8. f. 8.

Habitat - - - supra convexiusculus ex dilutiore flavente cinereus, subtus ochroleucus, nunc subrotundatus nunc obtuse trigonus, margine nunc sinuato, nunc ponere repando, ore obtuse pentagono, ano nunc circulare, nunc transverse ovali, foraminibus ei appositis brevioribus subovatis, nunc longioribus, angustioribus linearibus, ambulacris petala ovata mentientibus, simplici punctorum interiori serie, & striarum obliquarum testam penetrantium ordine conflatis.

Cui tribui accensendi, quos echinanthos appellat Cl. v. Phelsum, siquidem vere sint species, Vyshoekje & Sherprugge Egebloom, & Echinites oblique quinqueradiatus?

Pentapo- 65. E. ambulacris apice emarginatis, ano ori proximo: foraminibus quinque. *Leske apud Klein echinod.* p. 197. t. 21. C. D.

Phels. Zee-eg. p. 35. n. 11. Vyfhuizige Egelkock.

Syst. nat. XII. 2. p. 1105. n. 17. V.

Hugh barb. 280. t. 24. f. 3. 4.

Broxm. observ. p. 296.

Seb. mus. 3. t. 15. f. 9. 10.

Argenv. conch. 2. p. 63. t. 7. f. C.

Gualt. testac. t. 110. f. E.

Delic. nat. sel. I. p. 93. t. D. I. f. 16.

Dav. catal. I. p. 423. n. 955.

Habitat — — obtuse pentagonus, supra ex albo cinereus levissime rubescens, subtus medium versus excavatus, albus, parum flavescens, venis cœrulecentibus, testæ assulis prominentibus, ambulacris ovalibus, ore obtuse pentagono: labiis parum prominentibus foramine pertusis, ano fere tetragono: foraminibus appositis linearibus & subovalibus, vertice stella pentagona pīcto.

Hexapo- 66. E. orbicularis, ambulacris angustis, foraminibus ad anum sex angustis. *Leske apud Klein echinod.* p. 199. t. 50. f. 3. 4.

Phels. Zee-eg. p. 33. n. 2. Doorgeboorde Egelschyf.

Seb. mus. 3. t. 15. f. 7. 8.

Delic. nat. sel. I. p. 93. t. D. I. f. 17.

Davil. catal. I. p. 423. n. 955.

Habitat in Oceano indico, americano, septentrionali, vix diversus a pentaporo, cinereus vertice umbilicato, basi parum excavata: lineolis pīcturam frondosam referentibus obscuriori.

emarginata- 67. E. subpentagonus, ambulacris ovatis, ano ovali ab ore magis remoto: foraminibus sex marginem attingentibus. *Leske apud Klein echinod.* p. 200. t. 50. f. 5. 6.

Phels. Zee-eg. p. 34. n. 6. Loefwerk.

Habitat ad Insulam Bourboniæ, ex bruno cinerascens, subcordato-ovalis, leviter pulvinata, sinuosa, diametro longitudinali 4 pollices & 8 lineas, transversa 4 pollices & lineas æquante, vertice patulo, basi planiore, lineis flexuosis ramosis insculptis pīcta.

auritus. 68. E. margine undato: inferiori rotundato; superiore subquadrato bis inciso, inter singula bina ambulacra porosians. *Leske apud Klein echinod.* p. 202.

VERMES MOLLUSCA. Echinus.

Phels. Zee-eg. p. 34. n. 1. Geoorde Stomp-hart.
Seb. mus. 3. t. 15. f. 1. 2.

Habitat in sinu perfico, ex cinereo flavus, margine superiori spadiceo, basi plana, punctata, radiatim striata, ano oblongo ori proximo.

inauritus. 69. E. subcordatus assulatus: assulis hexagonis, ambulacra quinque ovalibus apice emarginatis: quinto longiore singulis binis poro intersito. Leske apud Klein echinod. p. 202.

Phels. Zee-eg. p. 34. n. 2. Ongeoerde Stomphart.

Rumpf. amboin. p. 37. t. 14. F.

B) Phels. Zee-eg. p. 34. Schyfgescheurde Egelkoek zond' buisen.

Seb. mus. 3. t. 15. f. 3. 4.

Habitat in Amboinæ fluvio Wagnitoe, 5-6 pollices longius latusque, latiore fine bis incisus, tenuis, granulis spinosis basin præbentibus dense obsitus, supra ex rufescente nereus, subtus ex violaceo ruber.

terraponius. 70. E. orbicularis leviter sinuosus, quatuor foraminibus utrinque pertusus, ano circulari. Leske apud Klein echinod. p. 204.

Phels. Zee-eg. p. 34. n. 5. Schyf gescheurde Egelkoek met buisen.

Seb. mus. 3. t. 15. f. 5. 6.

Habitat -- ex flavo dilute cinereus, vertice quinque foraminibus pertuso, ambulacris apice obtusis, fulcis 10 flexuosis apice bifidis exarata, ore rotundata, quinque-dentato.

L.I. superficie integra, Lagana Kleinii.

Laganum. 71. E. ambulacris ovalibus subtilissime striatis apice fimbriata, vertice prominente, ano circulari margini vicini. Leske apud Klein echinod. p. 204. t. 22. f. a. b. c. Rumpf. amb. p. 36. t. 14. f. E. Zeereal.

Bocc. obs. p. 296. f. 2.

Gualt. test. CX. f. C. C.

Seb. mus. 3. t. 15. f. 25. 26.

Piot. oxfordsh. p. 92. §. 53. f. 12.

Habitat -- granulatus, ochroleucus, ovatus, pentagonus, basi radiis 5 excavatis in totidem aquales divisa, ore obtuse pentagono, ano vix

latitudine a margine distante, vertice 5 foraminibus inter ambulacra pervio.

subrotundus. 72. *E. orbicularis, ambulacris radiatis. Leske apud Klein echinod. p. 206. t. 47. f. 7.*

Aldrov. mus. met. p. 458.

Scill. corp. mar. t. 8. f. 1-3.

Andreae Br. a. d. Schw. t. 5. f. g.

Davil. catal. 3. p. 184. n. 229.

Valent. mus. t. 3. f. 7. b.

Habitat - - - haecenus non nisi fossilis inventus.

reticulatus. 73. *E. ovatus, ambulacris quinis ovalibus, superficie reticulata.*

Phels. Zee-eg. p. 34. Echinoglycus ovalis.

Leske apud Klein. echinod. p. 207. t. 45. f. 8. q.

Rumpf. amboin. t. 14. C.

Gault. test. t. CX. f. D.

Seb. mus. 3. t. 15. f. 23. 24. 35. 36. 38.

β) Phels. Zee-eg. p. 34. Echinoglycus pentagonus.

*Seb. mus. 3. t. 15. f. **

Habitat in Oceano americano & indico.

orbicularis. 73. *E. circularis, ambulacris ovalibus acutis, basi radiis decem impressis porosis ano inter os & marginem medio cum ore circulari. Leske ap. Klein echinod. p. 208. t. 45. f. 6. 7.*

Rumpf. amb. p. 37. Zeeschelling.

Syst. nat. XII. 2. p. 1105. n. 17. ♂.

Gault. test. 1. CX. f. B.

Breyn. ech. t. 7. f. 1. 2..

Bocc. obs. p. 269. f. 2. 3.

Lang. lap. fig. p. 122. t. 35. f. ult.

Habitat in mari indico.

corollatus. 74. *E. orbicularis ambulacris ovalibus obtusis brevibus: Lesk. ap. Klein echinod. p. 209. t. 40. f. 4. Echinodiscus rosaceus.*

Phels. Zee-eg. p. 34. n. 8. Roose topje.

Walch dil. monum. 2. p. 180. t. E. II. f. 8.

Habitat - - - haecenus tantummodo fossilis repertus.

margine dentato, Rotulae Kleinii.

decadactylous. 75. *E. testa foraminibus quatuor oblongis pervia, marginis dentibus decem. Leske apud Klein echinod. p. 209. t. 22. A, B,*

Syst. nat. XII. 2. p. 1105. n. 17. β .

Gualt. test. t. 110. f. H.

Seb. mus. 3. t. 15. f. 17. 18.

Davil. cat. I. p. 425. n. 960.

Habitat — granulis asper, supra ex viridulo cæruleo lescente & cinereo varius, ambulacris futurisque pallidioris carneis, basi ex flavescente carnea: sulcis 10 impressis flexuosis apice bifidis, ex viridescente cinereis, ambulacris ex lanceolato ovalibus, integris, biporosis, per strias obliquas nexis, marginis dentibus alternatis brevioribus, ore rotundo, ano ovato.

•
Octodactylus. 76. E. anterius orbicularis, foraminibus duobus pervius posterius octodentatus, ambulacris lanceolatis. *Leske apud Klein echinod.* p. 211. t. 22. f. C. D.

Phels. Zee-eg. p. 33. n. 6. Agtvingerige Egelschyv,

Breyn. echin. p. 64. t. 7. f. 5. 6.

Gualt. test. t. 110. f. F.

β) *Phels. Zee-eg.* p. 33. *Echinotrochus decemdentatus.*

Seb. mus. 3. t. 15. f. 15. 16.

Habitat — rarior, ex cinereo albicans, assulatus assulis convexis, concoides, vertice umbilicato, ambulacris emarginatis.

Orbiculus. 17. E. anterius orbicularis integer, posterius inæqualiter dentatus, ambulacris lanceolatis apice fissis hinc flexuosis. *Syst. nat.* XII. 2. p. 1105. n. 17. *Echinus planus suborbicularis*; ambulacris quinis ovalibus, ano subremoto. *Leske ap. Klein echin.* p. 212. t. 22. E.F. *Echinodiscus dentatus.*

Rumpf. amb. t. 14. f. I. *Zonne-strualde Pannekoek.*

Breyn. echin. t. 7. f. 3. 4.

Bocc. obs. p. 273. f. 15.

Valent. mus. 3. p. 177. f. 2.

Argenv. conch. 2. t. 7. f. D.

Davil. catal. I. p. 425. n. 959.

β) *Leske apud Klein echinod.* t. 49. f. 6. 7.

Seb. mus. 3. t. 15. f. 19. 20.

Habitat in mari indicō, non perforatus, ex assulis planis hexagonis compactus, basi plana sulcis impressis distincta, ore rotundo, ano ovali.

+++++ *ambulacris 10 e vertice radiis rectis biporosis stellatis, ore anoque in media baseos parte vicinis, Echinocyami Phelsumii & Leskii.*

- Nucleus.* 77. E. superficie globosa, ambitu orbiculari, basi angustata medio plana, lateribus sulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice excentrico. *Phels. Zee-eg. p. 131. n. 1. t. 1. f. 1-5. Leske apud Klein echinod. p. 213. t. 48. 2a-2e.*
Habitat - - - ex flavescente cinereus, vertice 4 poris pervio, ore circulari, anum oblongiusculum superante.

- centralis.* 78. E. superficie globosa, ambitu suborbiculari, basi pulvinata, lateribus tenuissime sulcatis, ambulacris vix pulvinatis, vertice centrali. *Phels. Zee-eg. p. 131. n. 2. t. 1. f. 6-10. Leske apud Klein echinod. p. 213.*
Habitat - - - ano minimo orbiculari, an vere distinctus a nucleo?

- Eryum.* 79. E. superficie globosa, ambitu subovali, basi subangustata, lateribus sulcatis, ambulacris subpulvinatis vertice centrali. *Phels. Zee-eg. p. 131. n. 3. t. 1. f. 11-15. Leske apud Klein echinod. p. 213.*
Habitat - - - nucleo paulo major, ore anoque aquilibus.

- craniola- lis.* 80. E. superficie anterius globosa, posterius subquinquangulari pulvinata declivi, ambitu elliptico, basi subangustata, lateribus sulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice excentrico. *Phels. Zee-eg. p. 132. n. 4. t. 1. f. 16-20. Leske apud Klein echinod. p. 214. t. 48. 3a-3e.*
Pall. spicil. zool. 9. t. 1. f. 24. Echinus minutus subglobosus ex orientali India.
Habitat in India, albus, granulis circulo insculpto cinctis obfessus, verticis portis 4.

- purcicus.* 81. E. superficie basique pulvinatis, ambitu elliptico, lateribus vix sulcatis, ambulacris subpulvinatis, vertice depresso centrali. *Phels. Zee-eg. p. 35. 132. t. 1. f. 21-25. Leske ap. Klein echinod. p. 214.*
Habitat - - - an vere distinctus a craniolari?

82. E. superficie globosa, ambitu obtuse ovali, basi subangustata, lateribus sulcatis, ambulacris planiusculis, ver-

VERMES MOLLUSCA. Echinus.

centrali. Phels. Zee-eg. p. 133. t. 1. f. 26-30. Leske
apud Klein echinod. p. 215.

Habitat in mari adriatico, an vere diversus a craniolari?

Ovulum. 83. E. superficie pulvinata, ambitu obtuse ovali, basi glo-
bosa, lateralibus vix sulcatis, ventrice centrali. Phels.
Zee-eg. t. 1. f. 31-35.

Habitat - - - an revera distincta a craniolari species?

Lathyrus. 84. E. superficie basique pulvinatis ambitu ovali, lateribus
vix sulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice sere centrali.
Phels. Zee-eg. p. 133. t. 2. f. 1-5. Leske apud Klein
echinod. p. 215. t. 48. 1 a-1 c.

Habitat - - - obscurus ex flavescente cinereus, mediis
inter nucleus & craniolare magnitudinis.

equinus. 85. E. superficie basique pulvinatis ambitu elliptico,
teribus levibus, ambulacris subpulvinatis, vertice
centrali. Phels. Zee-eg. p. 134. t. 2. f. 6-10. Leske
apud Klein echinod. p. 215.

Habitat - - -

minutus. 86. E. superficie pulvinata fere plana, ambitu ovato sub-
quinquangulari, basi angustata, lateribus sulcatis
ambulacris pulvinatis, vertice centrali. Phels. Zee-eg.
p. 134. t. 2. f. 11-15. Leske apud Klein echinod. p. 215.
Pall. spic. zool. q. p. 34. t. 1. f. 25.

Aldrov. test. p. 412.

Habitat frequens, vere praesertim, in littoris Belgii
arena, ore orbiculari.

Faba. 87. E. superficie basique pulvinatis, ambitu obtuse ovali
lateribus vix sulcatis, ambulacris planis, vertice pro-
minulo centrali. Phels. Zee-eg. t. 2. f. 16-20. Leske
apud Klein echinod. p. 216. t. 37. f. 6.

Delic. nat. sel. p. 90. t. D. I. f. 10.

Habitat - - - nisi magnitudine, ochroleucus, gran-
latus.

inæqua- 88. E. superficie anterius gibba, posterius plana declivis
lis. ambitu oblongo-ovali subquinquangulari, basi globuli
subangustata, lateribus sulcatis, ambulacris subpulvi-
natis, vertice centrali. Phels. Zee-eg. t. 2. f. 21-25.
Leske apud Klein echinod. p. 216.

Habitat - - - dorso inæquali,

taninus. 89. E. superficie globosa posterius magis declivi, ambitu acute ovali, basi globosa, lateribus sulcatis, ambulacris subpulvinatis, vertice centrali. *Phels. Zee-eg.* t. 2, f. 26-30. *Leske apud Klein echinod.* p. 216.
Habitat - - - nonne varietas minutus?

bufonius. 90. E. superficie globosa, ambitu ovato-cordato subtri-gono, basi pulvinata, lateribus subsulcatis; ambulacris pulvinatis, vertice fere centrali. *Zee-eg.* p. 136, t. 2, f. 31-36. *Leske apud Klein echinod.* p. 217.
Habitat - - - nonne varietas minutus?

*** *ano lateralī, oris tentaculis penicillatis;*
Spatangi Müller.

† *Ambitu per anfractus circulari, ore centrali, ano quadrato in superficie, Arachnoides Kleinii.*

Placenta. 76. E. subconicus, areis decem: alternis angustioribus, ambulacris quinque laxis planis apice dehiscentibus.
Syst. nat. XII. 2. p. 1105 n. 16. *Mus. Lud. Ultr.* 714.
Echinus planus orbicularis, ambulacris quinis bipartitis, ano marginali.
Leske ap. Klein echinod. p. 217. t. 20. A. B. *Echinorachnius.*

Petiv. amboin t. II. f. 5.

Rumpf amb. t. 14. f. G.

Breyn. echin. p. 64. t. 7. f. 7. 8.

Gualt. testac. t. 210. f. G.

Seb. mus. 3. t. 15. f. 21. 22.

Davil. catal. I. p. 424. n. 958.

Habitat in Oceano meridionali, parum convexus, conoides, ambitu subanguloſo, basi plana, areis linea- verticali obtuse dentata bipartitis.

†† *cordati*, *Spatangi Leskii.*

† *vertice sulcato*, *Spatangi Kleinii.*

Cor an-
guinum. 91. E. supra convexus, ambulacris impressis quadrifariam porolis areisque quinque.

a) *Cor anguinum anglicum.* *Klein echinod.* ed. *Leske* p. 221. t. 23. C.

Phels. Zee-eg. p. 42. n. 3. *Pokhart.*

Mort. northampt. p. 235.

Luid. lith. brit. 17. n. 8. f. 964-967.

Hook works p. 285. t. 3. f. 8.

VVV VVV VVV

VERMES MOLLUSCA. Echinus

Breyn. *echin.* p. 62. t. 5. f. 5. 6.

R. *t. ory. sol.* fol. n. 226. t. 1. f. 7.

Davit. *catal.* 3. p. 181. n. 222.

♂) Thelt. *Zee-eg.* p. 40. n. 12. Geknotte Egelhart.

Waalc. *monum. dil.* 2. p. 176. t. F. I. f. 5. 6

γ) Phel. *Zee-eg.* p. 40. n. 14. Rooddunige Egelhart.

Waalc. *monum. eil.* 2. p. 181. t. h. III. f. 1.

δ) Phel. *Zee-eg.* p. 40. Pluimhart.

ε) Cor anguum, suicis cris. s. Leske apud Klein echinod. p. 224. t. 45. f. 12.

Phel. *Zee-eg.* p. 40. n. 15. Kruishald.

Davit. *catal.* 3. d. 81. n. 222. §. 2.

♀) Cor anguum norweg. cum. Klein echinod. cd. Lesk. p. 225. t. 23. A. B. E. F.

Phel. *Zee-eg.* p. 40. n. 7. Bandhart.

Boccon. obs. p. 219. & 304 fig. med.

Plot oxford. p. 92. §. 13. & 102. t. 2. f. 11. & t. 7 f. 9.

Lijt. *lap. cochl.* p. 224. tit. & f. 28. 29.

Luid. *lith. brit.* p. 47. n. 958. 969.

Melle *lap. fig.* Lubec. t. 2. f. 4.

Byrem. *biblioth. app.* p. 37. t. 9. f. 33. & p. 51. t. 23. f. 27.

Baier *oryctogr. Norc.* p. 35. t. 3. f. 41. 42.

Waalc. *diluv. monum. suppl.* p. 224. t. 9. h. f. 13.

Davit. *catal.* 3. p. 181. n. 222. §. 3.

Mercat. metall. p. 282? Pentexochus minor f. mespileus lapis.

Habtat - - - hadenus non nisi fossilis inventus forte protypes hujus purpureus? an earum, quas Klinius, t. 23. f. E. F. expressit Spathagus?

lacuno- 13. E. ovatus gibbus, ambulacris quinis depressis. *Mif.*
sus. L. Utr. 713.

Klein echino l. ed. Lesk. p. 221. t. 23*. A. B. t. 24. a.
t. 27. A. Spathagus lacunosus.

Phel. *Zee-eg.* p. 40. n. 8. Groote Holbad.

Rupp's amb. p. 36. t. 14. f. 2.

Guatt. *teflac.* t. 109. f. C.

Delic. nat. sel. 1. p. 96. t. D. III. f. 3.

Davit. *catal.* 1. p. 418. n. 947. & 3. p. 181. n. 222.

Aldrov. *teflac.* p. 404. f. 1. 2.

mus. met. p. 410 f. 2. 3.

Imper. hist. nat. p. 731.

Bocc. obs. p. 296. f. 1.

Bonann. *recr.* 2. p. 92. n. 16. f. 16.

Scill. cor. p. mar. t. 7. f. 1. t. 10. f. 4. t. 25. f. 2.

- Hook works* p. 285. t. 3. f. 9.
Allion. *oryct.* p. 17. n. 1.
Kundr. *rar. nat. & art.* p. 95. t. 5. f. 7.
 β) *Phels.* *Zee-eg.* p. 40. n. 9. Kleine Holblad.
 γ) *Phels.* *Zee-eg.* p. 40. n. 13. Egwyzige Steekeltonnen.
 δ) *Leske apud Klein.* *echinod.* p. 230. t. 24. f. c. d. e.
 t. 38. f. 5. *Spatagus lacunosus.*
Phels. *Zee-eg.* p. 40. n. 10. Groote Hertogs muts.
Hook works p. 285. t. 3. f. 10.
Lijt. anim. angel. *app.* p. 28. f. 3.
Breyn. *echin.* p. 61. t. 5. f. 1. 2.
Seb. mus. 3. t. 10. f. 21. a. b.
Argenv. *conch.* p. 311. t. 25. f. 1. t. 29. f. 22?
Delic. *nat. sel.* I. p. 92. t. D. I. f. 14. & p. 95. t. D. II.
 f. 6. 7.
Devil. *catal.* I. p. 418. n. 947. 2.
 ε) *Phels.* *Zee-eg.* p. 40. n. 11. Kleine Hertogs muts.
Habitat in mari indicō, americano, atlantico, adriatico &
 belgico.

— *vertice non sulcato*, *Spatangoidæ Kleinii.*

- radiatus.* 92. E. ambulacris quatuor, stiis impressis utroque latere
 porosis, verticis poris quatuor, areis decem futura
 media ferrata futurisque transversis arcuatis divisis.
Leske apud Klein echinod. p. 234. t. 25.
Phels. *Zee-eg.* p. 40. n. 1. Straalblad.
Walch diluv. mon. p. 182. t. E. IV. n. 1. 2.
Habitat — — — *haedanus no i nisi fossilis obvius*, *basí*
 plana, *ore subreniformi*; *stella pororum subpentagonal*
 circum lato, *ano subrotundo*: *margine 3 angulis promi-*
 nente, *ambulacris ex serie pororum per paia confertim*
 postiorum, *in vertice singulis convergentibus conflatis.*
purpu-
reus. 93. E. ambulacris quaternis pentaloideis lanceolatis, tuber-
 culis majoris in zigzag positis, spinis acicularibus in-
 curvis altis. *Leske ap. Klein echinod.* p. 235. t. 43.
 f. 3-5. t. 45. f. 5. *Müll. zool. dan.* I. p. 17. n. 4. t. 6.
 p. 2850. *rar.* p. 11.
Phels. *Zee-eg.* p. 40. n. 2. Dikblad.
Rondel. pise. I. p. 530. *Gesn. aquat.* p. 426. *Aldrov.*
 test. 403. *Echinus Spatagus* & *Brissus.*
Argenv. *conch.* p. 311. t. 25. f. 3. *Pas de poirlain.*
Devil. *catal.* I. p. 418. n. 947. I. *Cœur marin.*
Holl. anim. t. II. *High backed Sea-egg.*
Aldr. mus. met. p. 475. *Scolopendrites.*

VERMES MOLLUSCA. Echinus:

Scilla corp. mar. t. II. f. I.

Allion. oryctogr. p. 18. n. 2.

Habitat rario in mari norwegico, supra convexus, ad latera declivis, anterius bicollis, posterius truncatus, subitus planus, ab ore ad anum convexiusculus purpureus, subtilissime granulatus, setis subtilissimis subclavatis, spinisque spatulatis, tuberculis albis insidentibus asper, tenuia prope anum reniformi, e granis minimis albis multifariam conflata, tuberculis albis copiosissimis cincta.

pusillus 94. *E. ovalis*, ambulacris quinis, ano remoto.

Müll. prodr. zool dan. 3. p. 17. t. 91. f. 1-4. 2839.
Spatagus flavescens.

Habitat in mari Norwegico, minutus, a lacunoso distinctissimus, an hujus familiae?

compla- 95. *E. utrinque subplanus, areis ambulacrisque decem, natus.* duobus in lacuna dorsi positis. *Leske apud Klein echin nod.* p. 238. t. 51. f. 1. 2.

Lang. lap. fig. p. 119. & 121. t. 35. f. 1. 2.

Scheuchz. lith. helv. p. 61. f. 84.
mus. diluv. n. 811. 813. 815.
oryctol. p. 318. f. 135.

Breyn. echin. p. 63. t. 6. f. 1. 2.

Bourg. petr. p. 76. t. 51. f. 330. 333. 343.

Davil. catal. 3. p. 181. n. 222.

Habitat - - - haecenus modo fossilis repertus, subro tundus.

sublogo- 96. *E. utrinque convexus sibiobosus assulatus, ambulacris bosus,* denis striato-biporosis, ano ovato. *Leske apud Klein echinod.* p. 240. t. 54. f. 2. 3.

Mort. northamp. p. 233. n. 2. 3. t. 10. f. 8. 9.

Lift. lap. cochl. p. 323. tit. & f. 26.

Luid. lith. brit. p. 49. n. 983-994.

Lang. lap. fiss. 121. t. 35. f. 1. 2?

Scheuchz. mus. diluv. p. 85. n. 800. 814.
oryctol. p. 317. 318.

Breyn. echin. p. 61. t. 5. f. 3. 4.

Busal. nat. Merkw. p. 2593 t. 22. f. k.

Walch diluv. monum. I. p. 182. t. E. IV. f. 3. 4.

Habitat - - - haecenus tantum inter fossilia obvius, granulatus, verticis poris quatuor, areis satura ferrugine longitudinali divisis, lineisque transversis arcuatis

exaratis; assulis heptagonis, ore subreniformi, tuberculis stellatim dispositis cincto.

- Anan- 97. E. oblongo-cordatus subconicus, basi planiore, ambulacris arcisque decem, ore subrotundo margine elevato cincto, ano ovali inferius emarginato. *Leske apud Klein echinod.* p. 243. t. 53. f. 1. 2.
chytis. *Mercat. met.* p. 316. & *app. p. 89.* Ananchytis f. Synochitis.

Habitat - - - haecenus modo fossilis, rarer, arearum, majorum assulis heptagonis, minorum hexagonis & pentagonis, ano fascia elevata circumdato.

- bicorda- 98. E. vertice dupli. *Leske apud Klein echinod.* p. 244.
tus. t. 47. f. 6.
Andreae Br. a. d. Schw. p. 16. t. 2. f. C.
Habitat, rarer - - - haecenus modo inter fossilia reperitus.

- carina- 99. E. dorsi medio carinato. *Leske apud Klein echinod.*
tus. p. 245. t. 51. f. 2. 3.
Baier oryct. nor. t. 3. f. 43.
Valent. mus. 2. t. 3. f. 7. n. I.
Habitat - - - haecenus modo fossilis, bicordato affinis & at posterius angustior, ore reniformi, ano obsoleto.

+++ ovati.

+ *ambulacris sulcatis*, Brissi Kleinii.

- Spatag- 12. E. ovatus gibbus, ambulacris quaternis depressis. *Fn* 7
gus. *fuec.* 2117. *Mus. Lud. Ulr.* 712.
Leske apud Klein echinod. p. 246. Spathagus Brissus.
Müll. zool. dan. prodr. 2849. *Spathagus flavescens.*
Bocc. obs. p. 296.
Ginann. adv. 2. p. 41. t. 29. f. 174.

- maculo- a) E. *Leske ap. Klein echinod.* p. 247. t. 24. A. B. t. 26. A.
fus. *Phels. Zee-eg.* p. 39. n. 4. Egelnoot. smalle buyk.
Imperat. hist. nat. p. 730.
Scill. corp. mar. t. 4. f. 2. 3.
Rumpf. amb. p. 36. t. 14. n. I.
Gualt. test. t. 109. f. A.
Davil. catal. I. p. 419. n. 949.
major. b) *Phelsum Zee-eg.* p. 39. n. 5. Egelnoot breedde buyk.
nodofus. *Phels. Zee-eg.* p. 39. n. 3. Geknorte Egelnoot.
γ) *Seb. tris.* 3. t. 10. f. 19:

- orthope- ♂) *Phels. Zee-eg. p. 39. n. 6.* Egelnoot regtblad.
 talus. *Seb. mus. 3. t. 10. f. 22.*
- unicolor. ♂) *Leske apud Klein echinod. p. 240. t. 26.* B. C. Spatan^{gus} Br. f. 1. as unicolor.
Phels. Zee-eg. p. 39. n. 7. Efféne Egelnoot.
Sloan. jam. 2. p. 268. t. 242. f. 3-5.
- ovatus. ♀) *Leske apud Klein echinod. t. 38. f. 4.*
Delic. nat. sel. 1. p. 91. t. D. I. f. 33.
- carina- ♂) *Leske apud Klein echinod. p. 249. t. 43. f. 4-5.* Briss^{tus}
 late carinatus.
Phels. Zee-eg. p. 39. Breed gekielde Egelnoot.
Davil. catal. 1. p. 420. n. 420. n. 931.
Seb. mus. 3. t. 14. f. 3. 4.
Gual. testac. t. 108. f. G. G.
- grandis. ♂) *Phels. Zee-eg. p. 39. n. 8.* Groote Egelnoot.
Seb. mus. 3. t. 14. f. 5. 6.
Gual. in l. test. t. 109. f. B. B.
*Habitat in Oceano omni, recens sulphureus, colore sensim
 evanescente.*
- + - ambulacris non sulcatis, Brissoidæ Kleinii.
- brissoi- 100. E. oblongus, ambulacris quatuor biporosis ex ovali
 des. lanceolatis per sulcos transversos connexis : tuberculis
 majoribus arcuatim intersitis. *Leske ap. Klein echinod.*
p. 257. t. 27. B.
Phels. Zee-eg. p. 38. n. 1. Slingerblad Egeley.
Aldrov. mus. met. p. 455. f. II.
Scilla corp. mar. t. 10. f. 1.
Gesn. pe rif. p. 35. n. II.
Beyn. e.h. t. 4. f. 3?
Mercat. metall. p. 374?
Walch dilav. monum. II. p. 181. t. E. III. f. 5? &
Dav. catal. 3. p. 181. n. 224.
- ♀) *Phels. Zee-eg. p. 38. n. 2.* Gebogen blad Egeley.
*Habitat - - - sèpias fossilis, assulatus, gravulis aspera
 ore reniformi, pororum stella pentagona cincto.*
- teres. 101. E. convexus, ambulacris quatuor biporosis petaloideis
 non connexis. *Leske apud Klein echinod. p. 252. t. 49*
f. 12. 13.
Phels. Zee-eg. p. 39. n. 3. Peeifwyze Egeley.
Seb. mus. 3. t. 15. f. 27. 28.
*Habitat - - - brissoidæ affinis, at ore latiore, lineis
 carinata utrinque poris pertusa a vertice descendens
 dylimatus.*

Oliva. 102. E. supra convexus punctatus olivaceus, fascia duplice nuda ab ore ad anum extensa. *Leske apud Klein echinod.* p. 252. t. 14. f. f. g.

Phels. Zee-eq. p. 39. n. 1. Kleine Egelnoot.

Srb. mus. 3. t. 15. f. 31. 32?

Habitat - - - *radius supra & stellatis.*

Amygdala. 103. F. figura amygdalæ. *Klein echinod. ed.* *Lesk.* p. 253: dala. t. 24. f. h. i.

Habitat - - -

Ovalis. 104. E. assulatus, ovalis, ambulacris areisque decem, his situla media ferrata divisis. *Leske apud Klein echinod.* p. 253 t. 41. f. 5.

Phels. Zee-eq. p. 32. n. 3. Egeschuijje twee top.

d'Annon. afd. *Helv.* 4. p. 275. t. 14. f. 1-3.

Walch d luv. mon. m. 2. p. 182. t. E. III. f. 6.

Beckm. nov. afd. *Goett.* 3. p. 113.

Habitat - - - *haedenus modo inter fossilia repertus; an hujus familiæ?*

Pyrifor- 105. E. ovatus, altero sine gibbus, basi planus, ambulacris quinque subpetaloideis, obsolete porosis. *Leske apud Klein echinod.* p. 255. t. 44. f. 7. t. 51. f. 5. 6.

Walch Na urf. 9. p. 268

Habitat - - - *haedenus non nisi fossil's, ore anque rotundis, illo sub etaguno quinq. clatia o; ad quam familiam referendus?*

Lapis 106. E. obtuse ovatus, convexus, vertice excentrico poris quatuor peritrofo, a ambulacris quinque biporosis ovato-lanceolatis apice sinus. *Leske apud Klein echinod.* p. 256. t. 49. f. 10. II.

Habitat - - - *fossilis haedenus modo repertus, oris situ & strutura typi formi similis, quo supra marginem testae est in posito, rotundo, ore fini angustiori prospice basi plana, levissime excavata, medio nuda, ceterum tuberculis circulo cinctis in series digelitis apera; cui summa a scribenda?*

Pattula- 107. E. maxime depresso, ambulacris sellam imitanibus. *Leske apud Klein echinod.* p. 254. t. 53 f. 5-7.

Habitat - - - *haedenus modo fossilis obversus, a. Sizig. eviso, dorso levissime convexo, basi leniter excavatus, laevis granulatus, ore orbic. l. si.*

III. TESTACEA.

*Animalia Mollusca simplicia, domo s^æpius
calcarea propria, obtecta.*

300. CHITON. *Animal Doris.*

*Testae plures, secundum longi-
tudinem sibi appositae dorso
incumbentes.*

hispidus. 1. Ch. testa sexvalvi striata. *Schroet. Conchyl.* 3. p. 495.
t. 9. f. 18.

*Habitat in America, mediæ magnitudinis, ex atro ci-
nereus: maculis punctisque albis, subtilissime striatus:
striis subtilissime granulatis.*

*tubercu- 2. Ch. testa septemvalvi, corpore tuberculato.
latus.* *Mus. Ad. Fr. 1. p. 96. Chiton oscabriion.*

*Schroet. Conch. 3. p. 494 t. 9. f. 19. Chiton cylindricus
Sloan. jam. 2. p. 233? Patella oblongo articulata.*

*Habitat in America, oblongo-ovalis, angustus, supra
tuberculis in quincuncem positis inæqualis, ad latera
cinereus albo mixtus: fasciis undulatis fusciis dorso ri-
fessente: fascia lata nigerrima.*

aculeatus. 3. Ch. testa octovalvi striata, corpore subaculeato. *Amer.
acad. 8. t. 3. f. 1. Murr. testac. p. 40. t. 2. f. 1. Schroet.
Conchyl. p. 495.*

Rumpf mus. t. 10. f. 4. Limax marina.

Edw. glean. t. 286. f. B.

Seb. mus. 2. t. 61. f. 4.

Chemn. Conch. 10. t. 173. f. 1692.

β) Chemn. Conch. 10. t. 173. f. 1691?

*Habitat in Asia, facie tuberculati, ovalis, supra acutis
angustis subulatis rubris subcicatatis inæqualibus hispidus:
testis conchiformibus, ultima reliquis minore.*

*fascicula- 4. Ch. testa octovalvi, corpore ad valulas utrinque fasci-
culato. Schroeter Conch. 3. p. 496. Müll. zool. dan-
prodr. 3017.*

Chern. Conchyl. 8. t. 95. f. 801? 10. t. 173. f. 1688.
Chiton. t. I. f. 2. a? b?

Habitat in Barbaria, cinereus, laevis, testis leviter carinatis, juxta quarum latera animali, inclusa fasciculi pilorum totidem atque ibi.

squamatus. 5. *Ch. testa octovalvi semifistriata, corpore squamulofo.*

Mus. Lud. Ulr. 465.* *Schroet. Conchyl.* 3. p. 497.

Chern. Conchyl. 8. t. 94. f. 788-791. *Chit. t. I. f. I.*

Petiv. gazoph. t. I. f. 4. *Oscabriion.*

Seb. mus. 2. t. 61. f. 3.

Spengler Besch. berl. Naturf. I. p. 292. t. 7. f. L. M.
v. Born mus. caes. Wind. testac. t. I. f. I. 2.

β) *Chiton scaber variegatus Chern. Conchyl.* 8. t. 94.
f. 792. 793. Chit. t. I. f. 3. a. b.

γ) *Chiton laevis variegatus. Chernin. Chiton.* t. I. f. 4.

δ) *Oscabriion gallicum. Argenv. conch.* t. 25. f. M.

ε) *Chiton squamosus, testa septemvalvi Schroeter in Litter.* 4. p. 14. t. I. f. 2.

ζ) *Chern. Conch.* 10. t. 173. f. 1689.

η) *Chern. Conch.* 10. t. 173. f. 1690.

Habitat in America, aliquando sat magnus, valvis raffissime 7, in 2 partes divisis, quarum altera granulata, altera subtilissime striata, carinatus, utraque testa extrema lunulata, virescens, β) thalassinus, fasciis alternis nigris et flavis vel albicantibus pictus.

punctatus. 6. *Ch. testa octovalvi laevi, corpore punctis excavatis.*

Amæn. acad. 3. p. 256. *Chiton corpore punctato testis octo.*

Müll. zool. dan. prodr. 3021. *Chiton testa octovalvi laevi carinata.*

Eph. nat. cur. 1727. p. 63. t. I. f. I. 2. *Calva serpentis diadema.*

Osb. it. 62.

Seb. nius. 3. t. I. f. 13.

Habitat in Asia, Europa, America.

tuber.

7. *Ch. testa octovalvi arcuato substriata, corpore rubro.*

Fn. suec. 2119. *Müll. zool. dan. prodr.* 3018. *Ad.*

Nidros. 3. p. 364. t. 6. f. 14. *Chern. Conchyl.* 8.
t. 96. f. 813. Chit. t. 2. f. 8.

ε) *Chiton marmoreus. O. Fabr. Fn. groenl p. 420. n. 420.*
Chern. Conch. 8. t. 96. f. 812.

Habitat in Oceano septentrionali, patellæ more affixa ovalis, oblongiusculus dorso carinatus, ad pollicem usque longus, spadiceus: stria dorso obscuriore albo limbata, animalis margine fuscō, aut flavus maculat punctisque rubris, β) ex albo rubroque varus.

albus. 8. *Ch. testa octovalvi lævi dorsata, corpore albo. O. Faab.*
Fn. groenl. p. 422. n. 421.

Syst. nat. XII. 2. p. 1107. n. 8 Müll. zool. dan. prodit. 3019. ad. Nidros. 2. p. 54. Chiton testa octovalvi lævi, valvula prima postice emarginata.

Chemn. Conch. 8. t. 96. f. 817. Chiton. t. 2. f. 9.
Habitat in Oceano septentrionali, ovalis, lævis.

cinereus. 9. *Ch. testa octovalvi lævi carinata, corpore rubicundo: limbo subciliato. O. Faab. Fn. groenl. p. 423. n. 422.*
Syst. nat. XII. 2. p. 1107. n. 9. Müll. zool. dan. prodit. 3020. Chiton testa octovalvi ovata.

v. Born mus. Caes. Vind. testa. t. 1. f. 3.
Chemn. Conchyl. 8. t. 96. f. 818.

Habitat in Oceano Norwegico, inter radices ulvarum: 2 lineas longus, depresso, anterius angustior, sulci 2 dorso longitudinalibus, carinam medium cingentibus vivus, tum quoad testam tum quoad incolam rubicundus, mortuus & aridaeus cinereus.

bicolor. 10. *Ch. testa octovalvi crassa dorsata extus thalassina in nobis nivea marginē nigra.*

Chemn. Conchyl. 8. t. 94. f. 794.

Habitat - - - sat magnus, valvis medio repanditis anteriori radiziam striata.

cerasi- 11. *Ch. testa octovalvi cerasina lævi: marginis dentibus nubus. niveis. Chemn. Conchyl. 8. t. 94. f. 796.*
Habitat - - - incola siccaus niger.

magel- 12. *Ch. testa octovalvi crassa ex fuscō atra supra convexa fascia dorri ligata media, striis laterā ibus flavo cantibus.*

Seb. mus. 3 t. 1. f. 14. 15.

Habitat in freio magellanico, magnus, testa intus medie atra, ceterum late viridi, margine omni fuscō.

fuscus. 13. *Ch. testa octovalvi fusca glaberrima, intus magnisque dentibus nivea, dorso maculis trigonis nigris: utrinque fasciis oblique levigatis.*

Chemin. Conchyl. 8. t. 95. f. 799. 800.

Habitat in India, magellanico angustior, dentibus maginis pluribus, & utriusque valva extrema majoribus, dorso magis elevato & carinato.

maculatus. 14. Ch. testa octovalvi glaberrima intus thalassina margine, squamis ex cinereo albis vestita, valvis mediis anterius, nonnullis utrinque fusco maculatis.

Chemin. Conchyl. 8. t. 95. f. 802.

Habitat - - - - rarius.

marmoratus. 15. Ch. testa octovalvi glaberrima albo & nigricante varia, valvis mediis intus virentibus.

Chemin. Conchyl. 8. t. 95. f. 803-805.

Chiton. t. I. f. 5.

Knorr Vergn. 4. t. 17. f. 3. 4.

β) Chiton marmoratus, testa septemvalvi. *Schroeter n.*
Litterat. 4. p. 40. t. I. f. 3.

Habitat in Oceano americano, nunc magis, nunc minus angustus & convergens. fasciis, liris, venis, maculis nigricantibus & albis alternis, testa tumido squamoso: areis: ibidis, chalybeis & nigricantibus alternis.

granulatus. 16. Ch. piceus supra planus, punctis elevatis numerosis in series digestis, limbo latto coriaceo spinoso: areis nigris albisque alternis.

Chemin. Conchyl. 8. t. 96. f. 806.

Habitat in Oceano americano vivis 8, rarius 7.

piceus. 17. Ch. testa octovalvi supra glabra picea nigro albidoque varia.

Chemin. Conchyl. 8. t. 96. f. 807-810.

Chemin. Crit. t. 2. j. 6 & 6. a. b. c.

Habitat in mari ruer uno & ruito, granulata affinis, intus meato nigre, ad latera virens, maculis dorsali nigris & maculis fasciis venisque albidois aut vir. scutibus alternis, valvis rarius 7 ans 6.

indus. 18. Ch. testa octovalvi ex cinereo & bida, limbo squamoso, valvis mediis subtilissime punctatis.

Chemin. Conchyl. 8. t. 6. f. 811.

Habitat in mari americanus.

nigimus. 19. Ch. testa octovalvi, glabra nigra hinc inde farinosa.

Chemin. Conchyl. 95. j. 814.

Habitat in mari norwegico, prope Bergam repertus, minutus.

- Cimex.** 20. Ch. testa octovalvi, carinata diaphana fasciata, valvis
utraque extrema tenuissime punctata.
Chemn. Conchyl. 8. t. 96. f. 815.
*Habitat in mari norwégico, parvus, intus ex cinereo
albidus, fasciis nigricantibus & dilutioribus alternis.*
- Afellus.** 21. Ch. testa octovalvi nigerrima supra convexa, dorso
macula in singulis valvis flavicante.
Chemn. Conch. 8. t. 96. f. 816.
Habitat in mari norwegico, Mytilo Modiolo affixus.
- Gigas.** 22. Ch. testa octovalvi crassa convexa alba, valva propria
crenata, postrema dentata, mediis emarginatis.
Chemn. Conch. 8. t. 96. f. 819.
Chiton. t. 2. f. 10.
*Habitat ad Caput Bonæ Spei, 4 pollices & ultra longius
limbo tumido, coriaceo, ex atro fuscō.*
- thalassii-** 23. Ch. testa sexvalvi glabra ovali thalassina, supra linea
media dilutiori, limbo tenui hyalino.
Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 509. n. 18.
n. Litterat. 4. p. 4. t. 1. f. 1.
Habitat - - - parum convexus.
- islandi-** 24. Ch. testa octovalvi subcylindrica tenuissime punctata
nigra : limbo cinereo.
Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 509. n. 19.
*Habitat - - - veneri islandicæ adhærens, minimus
utrinque angustus.*
- erinitus.** 25. Ch. testa septemvalvi pilis brevibus dense obsita.
Brit. zool. 4. p. 60. t. 36. f. 1.
Habitat in mari scotico prope Aberdeen, $\frac{1}{2}$ pollicis longus.
- marginalis.** 26. Ch. testa octovalvi : margine ferrato reflexo laevi-
tus.
Brit. zool. 4. p. 61. t. 36. f. 2.
Habitat in mari britannico prope Scarborough.
- laevis.** 27. Ch. testa octovalvi glaberrima : fascia dorsi longitudinali
elevata.
Brit. zool. 4. p. 61. t. 36. f. 3.
Habitat in mari scotico prope Loch Broom.
- amicula-** 28. Ch. testa octovalvi reniformi fragilissima, corio extre-
mus.
scabro obducta. *Pall. nov. act. Petr.* 2. p. 241. t. 7
f. 26-30.

Habitat ad Kuriles insulas, ad 6 pollices usque longus, valvis imbricatis.

301. LEPAS. *Animal Triton.*

Testa basi affixa multivalvis : valvis inæqualibus erectis.

Balanus. I. L. testa conica sulcata, operculis acuminatis. Fn. suec. 2122.* Mus. Lud. Ulr. 466. n. 2.* It. wgoth. 170. Müll. zool. dan. prodr. 3022. O. Fabr. groenl. p. 423. n. 423. Leeuwenh. ap. 82. p. 472. t. 465. Ellis art. angl. 1758. v. 2. t. 34. f. 17. List. conch. t. 443. f. 286. v. Born mus. caes. Vind. test. t. 1. f. 4. Chemn. conch. 8. t. 97. f. 820.

β) Chemn. Conch. 8. t. 97. f. 826.
γ) Bonann. mus. Kirch 1. f. 35.

Habitat copiosissima ad littora Oceani europei, & maris mediterranei, cancris aliisque testaceis adhaerens, ut plurimum alba, satis magna, areis extrinsecus 6, quarum 3 elevatae, striatae, 3 excavatae magis glabrae, operculis rugis transversis subtiliter crenatis, 2 minoribus, 2 majoribus acuminatis.

balanoïdes. 2. L. testa conica truncata laevi operculis obtusis. Fn. suec. 2123.* Müll. zool. dan. prodr. 3023. O. Fabr. Fn. groenl. p. 424. n. 424.

Petiv. mus. 82. n. 802. Balanus parvus vulgaris. List. conchyl. t. 444. f. 287. hist. animi. t. 5. f. 41.

Leeuwenh. arc. 474. t. 465. f. 1. E. & f. 7.

Klein ostr. t. 12. f. 94. 95.

Archenv. Conch. t. 26 f. C.

Chemn. Conch. 8. t. 97. f. 821-825.

β) Chemn. Conch. 8. t. 98. f. 833.

Habitat in Oceani septentrionalis, americani, indici rupibus, non supra refluxum altius, sub fluxu dehiscens, sub æstu clausus, tentaculis ciliatis exsertis animalcula obvia capture, mytilos edules saepe arcte operiens, balano minor, albida, cinerea aut variegata, nunc depresso-convexa, nunc subcylindrica elongata, animali flavicante granulato.

Tintinna. 3. L. testa conica obtusa rugosa fixa. *Mus. Lud. Ult.* 466
bulum. n. 3.

Lanç. testac. 4. Balanus tintinnabuliformis laevis.

Lif Con hyl. t. 473. f. 285.

Rumpf mus. t. 41. f. A. B.

Gualt. test. t. 106. f. E. H. I.

Argent. Conchyl. t. 26. f. A. B.

Klein ostr. t. 12. f. 97.

Elis act. angl. 1758. vol. 2. t. 34. f. 8.

Knorr Vergn. 2. t. 2. f. 6. & 5. t. 30. f. 1.

Chenn. Conch. 8. t. 97. f. 828-851.

β) *Tulipa alba.* *Chenn. Conch.* 8. t. 98. f. 832.

Habitat in Oceano americano & indicō β) in septentrionali, balano effinis, rubro alboque varia, aut carunculatis, intus alba, nunc cylindrica, nunc paulo crassior, & paulisper incurva, areis elevatis perpendiculatiter, depresso transverse striatis, operculis equilibus.

Diadema. 4. L. testa subrotunda, sexlobata sulcata.

Walch Naturf. 8. t. 4. f. A. B. C. *Balanus polythalamus.*

Lister Conch. t. 445. f. 288.

Gualt. testac. t. 106. f. Q.

Boccon. recher. 294.

Klein ostr. t. 12. f. 98.

Schoe'er Journ. 4. t. f. 4. 5.

Born mus. ctes. Vind. test. t. 1. f. 5. 6. & p. 7. f. 2.

Chenn. Conch. 8. t. 99. f. 843. 844.

Habitat in mari mediterraneo & indicō, sordide alba, pollices circiter alba, sursum angustior, apertura periori infundibuliformi, dimidiam reliqua testa diametrum æquante, areas exteriorius 12. r. a. gulis, interrum 6 excavatae striis subtilibus transversis exaratis sex alterae elevatae 4-5-7 prominentiis arde sibi advenientibus, & striis transversis crenatis exaratis co. β).

balæna. 5. L. testa subconica, lobis sex elevatis rugosis quadripartitis, operculo membranaceo bidentato. *Mill. zool. dan. prodr.* 3024. *O. F br. Fu. groenl.* f. 425. n. 479

Rumpf mus. t. 14. f. H.

Petiv. anib. t. 1. f. 11.

Walch Naturg. 10. t. 1. f. 11. 12.

Chenn. Conch. 8. t. 99. f. 845. 846.

Habitat in Balæna boope, pedoris si cùs pinnisque cadentes, candore suo balænam prodeat & id fugim extinguitans, 15 circiter lineas alta, diametro baseos 19 lineas.

æquali, crassa lamellosa, sursum lentissime angustata,
supra truncata, obtusissima: apertura membrana lu-
tecente laxa clusa; arcis 12 transversaribus, quarum 6
elevatae sere æquales, transversim rugoso-granulatae,
& sulcis 3 longitudinalibus quadriparitiis exaratae, sex
humiliiores, striis transversis subtilissimis pectinatae;
forsitan eadem cum dadeant?

testudinaria. 6. L. testa piano - convexa, radiis sex excavatis striatis.
*Mus. Lud. Ultr. 467. n. 4.**

Rumpf mus. t. 40. f. K. Verruea testudinaria.

Bonann. mus. Kirch. 1. f. 34. 36. 37.

Gualt. test. t. 106. f. M. N. O. P.

Petiv. gazoph. t. 9. f. 9.

Planc. Conch. t. 5. f. 2. 2.

Klein t. 12. f. 99.

Ellis ad. angl. 1758. vol. 2. t. 34. f. 12. 13.

Ginz. akr. 41. :. 30. f. 175.

Knorr Vergn. 3. t. 3c. f. 3. 4.

Bk Na vñj. 2. t. 4. ,. 9. A. B.

Chemn. Conch. 8. t. 19. f. 847. 848.

Schröter Jol. n. 4. f. 355. 5. p. 518. 6. p. 305.

Habitat in pelago, s. per glaucopterus adhaerens, g'obo in
medio & styllo facie similes, alba, saevis lavis, apertura
inferiore hexagona, diametro superiore superante,
operculis 4 trigonis membranæ infertis.

Galeata. 7. L. testa galeata . apertura laterali. *Mantif. pl. 2. p. 544.*
Pull. elench. zooph. p. 158. Lepas Calceolus.
Schroet. Einl. in die Conch. 3. p. 318. n. 7. t. 9. f. 20.
a. b.

Habitat in Gorgonia verrucosa & Ventilabro, cymbiformis, lavis, apertura rhombea.

Palmipes. 8. L. testa erecta conica , valvulis basis palmatis. *Mant.*
pl. 2. p. 544.
Habitat in Oceano, alba, depressiuscula, pisti majoris
magnitudine, lavis, valvulis 4-6, basi ad medium
usque divisis: digitis 5-6, operculo quadrivalvi obliquo.

Tulipa. 9. L. testa subcubica lavi, operculis acutis transversim striatis.
Müll. zool. d. n. 3026.

An ad hoc numerus referendas testae, quas Bonanni mus. Kirch. 1. f. 14. misere
depingendas curavit?

VERMES TESTACEA. Lepasi

Olaff. ist. Ref. 901. B. a. t. 11. f. 13.

Ascan. ic. rar. natur. t. 10.

Habitat in Oceano septentrionali.

Mitella. 10. L. testa compresso erecta difformiter striata. *Mus. Lud.*
*Ulr. 467. n. 5.**

Lang. test. 4. Balanus tulipæformis striatus.

Gesn. aq. 121. Balanus Rondeletii.

Pet. gaz. t. 6. f. 10. Balanus chinensis striatus.

Rumpf mus. t. 47. f. M.

Ellis act. angl. 1758. vol. 2. t. 33. f. 4.

Klein ostr. t. 12. f. 100.

Seb. mus. 2. t. 61. f. 8. 3. t. 16. f. 3.

Chemn. Conch. 8. t. 100 f. 849. 850.

*Habitat in Oceano indico, coronæ gemmatæ simillimis
 alba, epidermide fordide lutea testa, multis valvis
 utplurimum triangularibus inæqualibus acutis constans,
 pedunculo communi nigro, coriaceo squamoso intus
 cavo insidentibus.*

Scapel- II. L. testa compressa tredecimvalvi laeviuscula, pedunculus
 squamoso insidente. *Fn. suec. 2121.**

Gualt. test. 106. f. C.

Ellis act. angl. 1758. vol. 2. t. 34. f. 4.

List. Conch. t. 439. f. 281?

Klein ostr. t. 12. f. 91?

Müll. zool. dan. 3. p. 23. t. 94. f. 1. 2.

Chemn. Conch. 8. p. 294. Vign. 7. f. a. A.

*Habitat in Oceano norwegico, parva, anatifera minor,
 valvis squamæ æmulis, utrinque senis, valva longa
 curvata reliquas complectente, pedunculo brevissimo
 rugoso annulato.*

anserife- 12. L. testa compressa quinquevalvi, striata, pedunculus
 insidente.

List. Conch. t. 440. f. 283.

exerc. anat. t. 19. f. 4. 5.

Gualt. test. 106. f. 2. 3.

Klein ostr. t. 12. f. 93.

Chemn. Conch. 8. t. 100. f. 856.

*Habitat in mari americano & atlantico, anatifera æqualis
 etiam fossilis, pedunculo subcroco, valva prima curvata
 laevi dorso carinata, reliquarum striis magis evidenter
 & distantibus, utraque majore, pedunculum versus modicè
 turgidus.*

turgida, fine cuneato divergente, utraque minore angustiore magis acuminata ab anatifera discernenda.

- anatifera.* 13. *L. testa compressa quinquevalvi lœvi pedunculo insidente. Fn. suec. 2. n. 2120. Mus. Lud. Ulr. 468. n. 6.* Fn. suec. 1. n. 1350. Lepas testa compressa basi membranacea cylindrica.*
Aldrov. orn. c. 20. f. 548. Concha anatifera.
Bonann. rear. & mus. Kirch. 2. f. 2. Tellina pedata.
Imper. hist. nat. 904. Concha pedata.
Bauh. pin. 513. Arbor ex cuius ligni putredine vermes 1. 2. 3.
Stalp. obj. 2. p. 458. t. 15. Osb. it. 82. Lepas anatifera cum Tritone.
Barth. cent. 6. p. 271.
Worm. mus. 256.
Marcgr. bras. 188.
Grew mus. 148.
Hufn. inf. 3. t. 6.
Sibb. mus. 170. n. 2.
Lift. Conch. t. 439. f. 282.
Gualt. testac. t. 106. f. A. D.
Argenv. Conch. t. 26. f. E.
zoomorph. t. 7. f. I. K.
Klein ostr. t. 12. f. 89. 90. 92.
Planck. Conch. t. 5. f. 4.
Column. phytob. 110. t. 30.
Seb. mus. 3. t. 16. f. 1. a. 2.
Needham micr. t. 7. f. 1. 2. & t. 6.
Ellis ad. angl. 1758. vol. 2. t. 34. f. 6.
Knorr Vergn. 2. t. 30. f. 4. 5.
Murr. fund. testac. t. 2. f. 2.
Chemin. Conch. 8. t. 100. f. 853 - 855.
de la Faill. ad. paris. peregr. vol. 9. p. 331. Macreuse.
β) Concha anatifera subrotunda Battolini. Lister Conch. t. 439. f. 280.
γ) Tellina cancellifera striis minimis argutissime signata cinerea. Gualt. Testac. t. 106. f. B.
Habitat in Pelago fere omni, ut plurimum lactea, rarius margaritacea, interdum ratio aut radiis binis nigro punctatis notata, pedunculo coriaceo nigro, rarius rubro, valvis tenuissime striatis, majore utraque trigona, rostro convergente, duabus aliis latioribus at duplo minoribus, quinta reliquas complectente angusta, curvata, dorso rotundata.

- aurita. 14. L. testa membranacea, ventricosa tubo insidente, ore octovalvi dentato : tubulo gemino aurita.
Ellis act. angl. 1758. t. 34. f. 1. *Lepas nuda comosa aurita*
Seb. mus. 3. t. 16. f. 5.
Edw. glean. t. 286. f. A.
Chemn. Conch. 8. t. 100. f. 857. 858.
Habitat in Oceano septentrionali, pedunculo longo.
- Pistacius. 15. L. testa posterius adunca sexvalvi rugoso. *Molin. his-
nat. Chil. p. 179.*
*Habitat ad littus Chilense, vix pollicem longitudine superans,
scopolis adhaerens, valvis 2 majoribus pistaci rostrum
æmulantibus, carne alba, tenera, sapidissima.*
- minor. 16. L. testa rubicunda sexvalvi inaequivalvi, operculo acut-
minato.
Chenin. Conch. 8. t. 97. f. 827.
*Habitat in India, lineis transversis albido - punctatis at-
cuatis picta.*
- Verruca. 17. L. testa hemisphaerica ferrata sexvalvi, valvis quatuor
exterioribus operculoque plicatis. *Spengler Schr. berl.
Naturf. I. p. 101. t. 5. f. 1 - 3.*
*Müll. zool. dan. prodr. 3025. Lepas (Stroemia) testa co-
nico convexa ferrata striata, operculo elevatili.
Schroeter Journ. 5. p. 522. Lepas dentata s. ferrata.
Stroem. act. Havn. 10. p. 6. t. 3. f. 1 - 9.
Habitat in mari, Islandiam alluente, ostreae Islandie
aliisque affixa, parva.*
- angusta. 18. L. testa elongata laevi sexvalvi, apertura angusta, operculo
minimo. *Bonann. recr. et mus. Kirch. I. f. 15.*
Chenin. Conch. 8. t. 98. f. 835.
*Habitat rario - - - valvis in puncto conjunctionis sul-
exaratis, interdum rubro alboque striatis.*
- porosa. 19. L. testa granulato-striata conica tubulosa, operculo obtuso
Schroet. Journ. 4. t. 2. f. 6. a. b.
Chenin. Conch. 8. t. 98. f. 836.
β) *Balanus major latus. Klein ostr. t. 12. f. 96.*
Lift. Conch. 1. 242. f. 284.
*Habitat rario in India, recens exterius viridis, posse
supra nigra, infra alba.*

longata. 20. L. testa cylindrica nivea pellucida sexvalvi supra fissa, operculo obtuso sulcato transversim striato.

Chemn. Conch. 8. t. 98. f. 838.

Schr. der berl. Naturf. 5. t. 5. f. 2.

Schroeter Journ. 4. t. 2. f. 2.

Habitat rarissima in Islandia, 5 lineas vix lata, et 3 pollices & ultra longa, insra hinc inde transverse annulata et nodosa.

Patellaris. 21. L. testa sexvalvi, exterius violacea albo mixta subtiliter longitudinaliter striata, intus falcata, valvis margine denticulatis.

Spengler Schr. berl. Naturf. 5. t. 5. f. 4.

Chemn. Conch. 8. t. 98. f. 839.

Habitat rarissima in Coromandel, valvarum dentibus se invicem excipientibus.

spinosa. 22. L. testa conica, areis duodecim triangularibus: sex depremissoribus minoribus albido transversim striatis, sex purpureis longitudinaliter striatis, spinisque tubulosis recurvis, armatis.

Chemn. Schr. berl. Naturf. 5. t. 5. f. 3. 4.

Conch. 8. t. 98. f. 840. et t. 99. f. 841.

Schroet. n. Literat. I. t. 2. f. 10.

Habitat in India, operculis quadrivalvibus acuminatis, undulato-striatis.

Violacea. 23. L. testa crassa glabra sexvalvi alba, radiis violaceis.

Chemn. Conch. 8. t. 99. f. 842.

Habitat in India, intus leviter sulcata.

Polluci. 24. L. testa compresso erecta multivalvi laevi, pedunculo coriaceo brevi duro squamoso insidente.

Argent. Conch. t. 26. f. D.

zoomorph. t. 7. f. G.

Knorr. Vergn. 5. t. 13. f. 7.

Chemn. Conch. 8. t. 100. f. 851. 852.

Habitat in mari mediterraneo, valvis 4 majoribus, rostris 2 viuis instar versus invicem inclinatis, & pluribus quam 20 minoribus.

Cylindrica. 25. L. cylindrica subcurva, orificio amplissimo obliquo, operculis cornutis.

Gronov. zooph. t. 19. f. 3. 4. Balanus maxillaris.

Ellis act. angl. vol. 50. f. 15. *Lepas sessilis capensis ore obliquo cum operculis cornatis.*
Habitat ad Africæ littora sub zona torrida.

crispata. 26. *L. testa ovali truncato conica, areis sex cæruleoscentibus albo obumbratis, sex aliis elevatis rubellis spinosis perpendiculariter striatis.*

Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 534. n. 22. t. 9. f. 21.
Habitat - - - afferi affixa, a teredine perforato, pollucem fere alta, operculis obtusis.

cariosa. 27. *L. testa solida alba depresso sulcato cariosa intus inæquali lævi.*

Pallas nov. act. Petrop. 2. p. 240. t. 6. f. 24. A. B.
Habitat ad insulas Kuriles.

Stroemia. 28. *L. conico - convexa, valvis quatuor ferrato - striatis operculo bivalvi.* *Müll. zool. dan. 3. p. 21. t. 94. f. I - 4. prodr. n. 3025.*
Habitat in mari septentrionali.

302. PHOLAS. *Animal Ascidia.*

Testa bivalvis divaricata cum minoribus accessoriis difformibus.
Cardo recurvatus cartilagine conexus.

Dactylus. 1. *Ph. testa oblonga hinc reticulato - striata.* *Fn. suec. 2124*
Müll. zool. dan. prodr. 3031.

Rondel. testac. 23. f. 2.

Bell. aq. 414.

Lijt. hist. Conch. t. 433. f. 276.
exerc. anat. t. 19. f. 1. 2.
an. angl. app. t. 2. f. 3.

Bonann. recr. ment. 2. f. 25. 26.
mus. Kirch. 2. f. 23. 24.

Gualt. testac. 105. f. A. B. C. D.

Argenv. Conch. t. 26. f. H. I.

zoomorph. t. 7. f. Q. R.

Ginann. adr. 44. t. 31. f. 184.

Seb. mus. 3. t. 16. f. 6. a. b. c. d.

Reaum. act. Paris. 1712. p. 163.

Planc. Conch. 33. n. 3.

Murray fund. test. t. 2. f. 3.

v. Born mus. caes. Vind. test. t. 1. f. 7.

Chemn. Conch. 8. t. 101. f. 859.

Habitat intra Europæ scopulos, saxa, ut perhibent, perterebrans, noctu lucens, ad 5 pollices longa, tota, alba, interdum ochroleuca, tenuis, fragilis, antrorsum elongata cuneata, posterius magis convexa, margine inflexa et repanda, striis subspinosis antrorsum sensim minoribus, tandem evanescenibus, cardine cochlear forma sua mentiente, testis accessorius 4.

costata. 2. *Ph. testa ovata, costis elevatis striata.*

Lift. Conch. t. 434. f. 277.

Bonann. recr. 3. f. 351.

mus. Kirch. 2. f. 105.

Gualt. test. t. 105. f. G.

Knorr Vergn. 2. t. 25. f. 4.

Chomn. Conch. 8. t. 101. f. 863.

Habitat in mari americano, alba, 6 fere pollices longa, costis obliquis squamis elevatis aut spinis obtusis armatis.

striata. 3. *Ph. testa ovata multifariam striata.*

Gualt. test. 105. f. E.

Chemn. Conch. 8. t. 102. f. 864–866.

Habitat in Europa australi et India, ad Barbariae quoque littora, striis hinc inde decussatis, area margini propinqua glaberrima.

candida. 4. *Ph. testa oblonga undique striis decussatis muricata. Mus.*

Lud. Ulr. 469. n. 7. & Müll. zool. dan. prodr. 3933.*

Bonann. mus. Kircher. 2. t. 24.

Lift. an. angl. 193. t. 5. f. 39.

app. t. 2. f. 4. 6.

Conch. t. 435. f. 278.

Gualt. testac. t. 105. f. E.

Habitat in mari europæo & americano, tenuissima, intus argentea magis glabra, utroque fine rotundato, cardinale dente fiso.

Pholades intrant & inhabitant rupes marinas calcareas, imo arenarias, intra quas latet phosphorus. Reaum. ad. paris. 1712. p. 126. His natura in tenebris, remoto lumine, alia fulgore clarere, & quanto magis humorem habeant, ludere in ore mandentium, lucere in manibus, atque etiam in solo & veste decidentibus guttis. Plin. IX. 61. An. quam Lister hist. conch. t. 437, f. a. depingendam curavit, distincta species?

- pusilla.* 5. Ph. testa oblonga rotundata arcuato-striata.
Rumpf mus. t. 46. f. H.
Petiv. amboin. t. 19. f. 8.
Adans. hist. Seneg. t. 19. f. 1. 2?
Brown jam. 417. t. 40. f. 11.
Martin. Besch. berl. Naturf. 2. t. 12. f. 6 - 9.
Spengl. Besch. berl. Naturf. 4. t. 5. f. 1 - 5.
Chemin. Conch. 8. t. 102. f. 867 - 871. a. b.
Habitat in America & India (in hac utplurimum major)
mediae magnitudinis, alba, fuscescens, navium lignum
perterebrans, antrorsum rostri instar hians, sub vertice
globosa, nodosa-reticulata.
- crispata.* 6. Ph. testa ovali hinc obtusiore crispato-striata, cardinis dente
 curvo. *Muf. Lud. Ulr.* 469. n. 8.* *Müll. zool. dan-*
prodr. 2032.
Fn. suec. 2125.* *Mya crispata.*
Lift. hist. anim. angl. s. 5. f. 38.
 app. t. 2. f. 7.
hist. Conch. t. 436 f. 279.
exerc. anat. t. 19. f. 3.
Chemin. Conch. 8. t. 102. f. 872 - 874.
Habitat in Oceano septentrionali, ultra pollicem longioris
testis primariis sulco medio transverso rugoso bipartitiis,
testa tertia parva.
- orientalis.* 7. Ph. testa oblonga margine recto : altera parte glaberrima,
 altera reticulata-striata.
Lift. hist. Conch. t. 431. f. 274.
Chemin. Conch. 8. t. 101. f. 860.
Walch Naturf. 13. p. 86. t. 3. f. 15.
Habitat in sinu Siamensi & Tranquebariae satis magna, testis
tenuioribus, margine tantum antico hiantibus, striis
reticulatis intus quoque conspicuis, testa satis magna &
altera dente armata minore cardinem tegente.
- campechi.* 8. Ph. testa angusta alba, tenuiter striata.
 ensis. *Lift. Conch.* t. 432. f. 275.
Habitat in sinu Campechiensi, an distincta species?
- cordata.* 9. Ph. testa brevi turgida posterius striis elevatis transversis
 subtilibus exarata: hiatu cordato. *Schroet. Einl. in Conch.*
 3. p. 544. n. 4. t. 9. f. 22 - 24.
Habitat --- carillio affixa, tenuissima, fragilis, sor-
dide alba, testa anteriorius praeter rugas aliquot arcuata.

*lævi, rostrum testarum anterioris hiatu testa minori ovali,
convexa, dente munita occluso.*

chiloensis. IO. Ph. testa oblonga depressiuscula : striis longitudinalibus
distantibus. *Molin. hist. nat. Chil.* p. 179.

*Habitat in scopulis archipelagi Chiloensis, ad 5 pollices
longa, appendicibus minutis cuncta.*

Teredula. II. Ph. testa oblonga alba : sutura granulata fusca longitudinali.

Pall. nov. act. Petrop. 2. p. 240. t. 6. f. 26. A. D.

*Habitat ad Belgii littora, ligni incorrupti fertulariis
obducto, frusta tenuia perterebrans.*

hians. 12. Ph. testa bivalvi alba transverse arcuatim striata supra
connivente, medio convexa, subtus cuneiformi : aper-
tura ovali potentissima. *Chemn. Conch. 10. p. 364. t.
172. f. 1678-1681.*

Spengl. nov. act. soc. dan. 2. f. 8-11.

*Habitat ad insulas Americæ mediæ oppositas, lapides
calcareos & corallia perterebrans.*

303. MYA. Animal Ascidia.

*Testa bivalvis hians ut plurimum alte-
ra extremitate.*

*Cardo dente (plerisque uno) solido
crasso patulo vacuo (nec inserto
testæ oppositæ.)*

truncata. I. M. testa ovata posterius truncata, cardinis dente antro-
sum puncto obtusissimo. *Fn. suec. 2126. Müll. zool. dan.
prod. 2959.*

*O. Fabr. groenl. p. 404. n. 406. Mya testa subovata
convexa antice truncata, cardinis dente solitario an-
trorum porrecto obtusissima.*

*It. wgoth. 199. n. 3. t. 5. f. 3. Concha lævis altera tan-
tum parte clausilis.*

*Lift. Conch. t. 428. f. 269.
an. angl. t. 5. f. 36.*

Gualt. test. t. 91. f. D.

Olass. ist. Ref. p. 69. 716. 1009. t. II. f. 7.

Chern. Conch. 6. t. 1. f. 1. 2.

?) Lift. Conch. t. 429. f. 270.

Habitat in Oceano europæo, ad 2½ pollices longa, sordida alba, epidermide ex luteo fusca vestita, crassa, convexa edulis, rosmari, lugupodis, coracis, anatis speciebus, striis transversis irregularibus in rugas abeuntibus exarata, intus glaberrima.

arenaria. 2. M. testa ovata posterius rotundata, cardinis dente antrosum porrecto rotundato denticuloque laterali. Fn. suec. 2127. Müll. zool. dan. prod. 2960.

O. Fabr. Fn. groenl. p. 405. n. 407. Mya ovata compressa antice rotundata, cardinis dente antrosum porrecto rotundato denticuloque laterali postico.

It. wgoth. 187. Concha subarenacea marina.

Bast. opusc. subs. 2. p. 69. t. 7. f. 1 - 3. Mya arenaria. List. hist. Conch. p. 418. f. 262.

Argenv. zoom. t. 5. f. 10.

Lesser teftaceoth. f. 106.

Born. mus. caes. Vindob. test. p. 19. t. 7. f. A.

Chemn. Conch. 6. p. 3. Vign. & t. 1. f. 3. 4.

β) List. Conch. t. 419. f. 263.

Habitat in Oceano Europæ septentrionalis sub arena, quæ excavat, foraninibus 2 dignoscenda, slavecens, ex fusca rubella, ant sordide alba, 2½ pollices longa, cardinis dente longiore & magis obtuso, quam in mya truncata, striis transversis in rugas abeuntibus.

pictorum. 3. M. testa ovata, cardinis dente primario crenulato: rali longitudinali, alterius duplicato. Fn. suec. 2129. List. Conch. t. 146. f. 1. 147. f. 2. 3. anim. angl. t. 2. f. 30. app. t. 1. f. 4.

Bonann. recr. 2. f. 40. 41.

mus. Kirch. 2. f. 39. 40.

Valent. mus. t. 14. f. 15.

Gault. test. t. 7. f. E.

Argenv. Conch. t. 27. f. 10.

zoomorph. t. 8. f. 11.

Murr. sund. testac. t. 2. f. 6.

Schroet. Flusconch. t. 2. f. 2. t. 3. f. 2 - 5. t. 4. f. 6.

Chemn. Conch. 6. t. 1. f. 6.

Besch. berl. Nat. I. p. 344.

ε) Mya maroccana. Chemn. Conch. 6. t. 3. f. 23. 24.

Myæsæpius tenebrant fundum, & in eundem se defodiunt vel tornæ vel propriæ

γ) *Lift. Conch.* t. 148.

δ) *Argenv. Conch.* t. 29. f. 18.

ε) *Schroet. Flusconch.* t. 3. f. 3.

ζ) *Schroet. Flusconch.* t. 9. f. 1.

Habitat β) in Barbariæ, ζ) in Tranquebariæ, in Europæ aquis dulcibus, $1\frac{1}{4}$ pollicis longa, $3\frac{1}{2}$ lata, epidermide fuscescente aut nigricante vestita, sub hac flavicans aut virescens: radiis viridibus, intus lævis margaritacea, non hians, tenuis.

margariti- 4. M. testa ovata anterius coarctata, cardinis dente primario fera.

*conico, natibus decorticatis. Fn. suec. 2130.**

Müll. zool. dan. prodr. 2961. Mya testa ovali-oblonga, apertura sinuata, natibus decorticatis.

Lift. Conch. t. 149. f. 4.

animi. angl. app. I5. t. 1. f. 1.

Gualt. testac. t. 102. f. C.

Klein ojstr. t. 10. f. 47.

Mylius saxon. subt. 2. p. 20.

Knorr Vergn. 4. t. 25. f. 2.

Schroet. Flusconch. t. 4. f. 1.

Mayer Abh. der boehm. Ges. 4.

Chemn. Conch. 6. t. 1. f. 5.

Habitat in totius orbis arctie ad Bohemiam & Franconiam usque cataractis, in Barbariæ quoque lacubus, matricem perlarum exhibens & margaritas, in animalis corpore ipso natas, spuriæ ex perforatione testæ genitas, ad $5\frac{1}{4}$ pollices lata, & $2\frac{1}{2}$ pollices longa, valida, transverse rugosa, extus atra, vermbus sœpe corrofa, cardinis dente laterali nullo, primario in alterius testæ dentem latum fissumque recepto.

Perna.

5. *M. testa oblonga dilatata, basi angustiore compressa:*

Mus. Lud. Ulr. 470. n. 10?

Argenv. Conch. t. 22. f. N?

Knorr Vergn. 4. t. 15. f. 2. 4. 5.

Chemn. Conch. 8. t. 83. f. 738. 739. & t. 84. f. 748.

Schroet Einl. in Conch. 2. p. 608. n. 5. t. 7. f. 4.

Habitat in freto magellanico & Barbariæ littore, perna figura, lævis cœrulea & alba, altero latere hians, cardinis loco fovea profunda transversa, in cuius medio dens acutus in utraque valva, an hujus generis?

Vulsellæ.

6. *M. testa linguiformi, cardine terminali depresso semiorbiculato.*

Mus. Lud. Ulr. 471. n. 11. Mus. Theissin. t. 6. f. 3.*

List. Conch. t. 1055. f 10.

Rumpf mus. t. 46. f. A.

Valent. nius. t. 16. f. 28.

Gualt. test. t. 90. f. H.

Knorr Vergn. 5. t. 2. f. 1-3.

Chemn. Conch. 6. t. 2. f. 8-11.

Hermann Naturf. 17. p. 126. t. 3. f. 1-4.

Habitat in mari americano, indicō, rubro, rarior, $\frac{1}{4}$ pollicis
4-5 pollices longa, formæ pro ætate variabilis, valvis
satis planis, subtiliter transversim striatis, exirinsecu-
flavescens nigricante & flavicante radiatis, hiantibus,
dente longo lato, in medio & profundius adhuc ad la-
tera canaliculato; an hujus generis?

arctica. 7. *M. testa striata*: valvis carinis duabus spinulosis, cardine
edentulo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2962.

O. Fabr. Fn. groenl. p. 407. n. 408. *Mya testa striata*,
valvulis carinis duabus spinulosis saepe obsoletis, ca-
dine obsoleto dentato.

Habitat libera in Oceano septentrionali inter algas, mycie
los & alia marina, fabæ magnitudine, $1\frac{1}{2}$ -7 lineas lon-
ga, pallide flava, intus laetea, forma arcæ, anteris
impressa planiscula, parte anteriore obtusissima, posse
riore breviore acutiscula; pars anterior a natibus ex-
currit angulis 2 remotis antrorum subaculeatis.

edentula. 8. *M. testa striata* ovali æquivalvi ample hiante, cardine
edentulo.

Pall. it. 2. p. 700.

Habitat rario in arena littorea maris caspii, pollicaris,
tenuis, subantiquata, alba, striis in utraque valva cir-
citer 33, in breviore fine distantibus, in producio-
nem confertis, cardinis labio crassiusculo inflexo.

radiata. 9. *M. testa acquivalvi* pellucida tenuissime transversim
striata viridi flavicante livido-radiata: valvis altero
latere latissimis, altero angustissimis.

Chemn. Conch. 6. t. 2. f. 7.

§) *List. Conch.* t. 152. f. 7. Musculus latior subfuscus
cæruleis lineis radiatus.

Habitat in Malabaricæ fluviis, m. piclorum tenuior, frig-
ilior, latior & magis complanata, intus margaritacea,
cardinis dente primario crenato.

~~oblonga.~~ 10. M. ovato-oblunga, valva altera dente valido lato, valvae alterius foveæ inserto, denteque minore inter duos minores alterius valvae posito.

Chenn. Conch. 6. t. 2. f. 12.

Habitat - - - $1\frac{1}{2}$ pollicem longa, 3 pollices lata, macra lutraria magis ventricosa, arenariæ valde affinis, an mera varietas?

~~anatina.~~ 11. M. testa globosa nivea pellucida, cardinis dente primario prominente rotundato.

Adans. Seneg. t. 19. f. 2. Tugon.

Chenn. Conch. 6. t. 2. f. 13.

Habitat rarius in Guinea, frequentius in littore africano, præserium ad ostium Nigri, soleni anatino valde affinis, testarum striis decussatis, valva utraque altero latere repanda.

~~Nicobarica.~~ 12. M. testa æquivalvi nivea ovato-oblunga decussatim stria-
ta, cardinis dente solitario lato perpendiculari co-
chleariformi.

Chenn. Conch. 6. t. 3. f. 17. 18.

Habitat ad insulas Nicobaricas, valvis altero latere con-
vexis, latis margine rotundatis, altero magis angulosis,
angustis, planis, hiantibus.

~~australis.~~ 13. M. testa ovata compressa clausa, cardinis dentibus duo-
bus lateralibus.

Chenn. Conch. 6. t. 3. f. 19. 20.

Habitat in nova Seelandia, sordide ochroleuca, an hujus generis?

~~Gaditana.~~ 14. M. testa rotundata, planiuscula, transversim striata
ochroleuca, intus alba.

Chenn. Conch. 6. t. 3. f. 22.

Habitat ad littus Gaditanum.

~~corruga-~~
~~ta.~~ 15. M. testa rhombea viridi, natibus rugosis. Müll. hist.
verm. terr. & fluv. 2. p. 214. n. 384. Besch. der berl.
Naturf. 4. p. 58. t. 3. f. 7. 8.

Schroet Flusconch. t. 9. f. 3.

Chenn. Conch. 6. t. 3. f. 22. a. b.

Habitat in fluviis littoris Coromandel, epidermide remota
margaritaceus, tenera, pellucida, ab utraque cardinis
parte striis rugosis notata, intus striis radiatis subti-
lissimis piæa, 11 - 16 lineas longa.

- rugosa.** 32. M. testa ovali rugosa extrinsecus virescente intus marginata : cardinis dente primario crenulato ; late ^{lati} gitudinali , alterius duplicito. *Chemn. Conch.* 10. p. 346. t. 170. f. 1649.
Habitat in Coromandeli fluvii.
- nodosa.** 23. M. testa ovali tenera virescente : natibus nodulatis .
Chemn. Conch. 10. p. 347. t. 170. f. 1650.
Habitat - - -
- norwegi-** 24. M. testa ovali longitudinaliter dense striata, altero rotundata , altero truncata , natibus decorticatis .
Chemn. Conch. 10. p. 345. t. 170. f. 1647. 1648.
- spuria.** 16. M. testa rhombea viridi , natibus glabris.
Schröet. Einl. in Conch. 2. 617. n. 9. t. 7. f. 5.
Habitat in Tranquebariae fluvii, corrugatae similis, atque fere major, & præter vulvæ regionem tota glabra.
- glycyme-** 17. M. testa utrinque hiante crassissima lamellata oblonga .
 ris. ovata transverse striato rugosa , cardinis dente primo crassissimo.
List. Conch. t. 414. f. 258.
Bonann. recr. 2. f. 59 ?
muf. Kirch. 2. f. 56 ?
Klein ostrac. t. 11. f. 72.
Gualt. test. t. 90. f. A.
v. Born muf. Caes. Vind. test. t. 1. f. 8.
Chemn. Conch. 6. t. 3. f. 25.
Habitat in Oceano europeo , mari præsertim hispanico mediterraneo , ad 5 pollices longa & 10 pollices lata, nerea velochroleuca, intus cretacea, cardinis dente adhuc minore serieque plicarum , inter myas & solenes ambiguas.
- syrmato-** 18. M. testa ovata depressa , cardinis margine ad denticulata primarium mucrone subulato , altero dilatato. *Gronov. zooph.* t. 18. f. 1. 2.
Habitat in Guineæ fluvii, dentibus marginalibus utrinque parallele duplicatis.
- nitida.** 19. M. testa ovali alba lævi, cardinis utriusque dente obtuso .
Müll. zool. dan prodr. 2963.
Habitat in Norvegia.
- membra-** 20. M. testa ovata membranacea candida, margine ad proboscis nacca. cidem protracto reflexo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2964

*Olafs. Isl. res. 901. t. II. f. 10.
Habitat - - -*

byssifera. 21. M. testa rudi oblonga striata convexa, cardine edentulo.

O. Fabr. Fn. groenl. p. 408. n. 409.

It. Wgoth. 198. t. 5. f. 2.

*Habitat in rupium marinorum Groenlandiae fissuris, libera
byssos affigens, 3-17½ lineas longa.*

304. SOLEN. *Animal Ascidia.*

*Testa bivalvis oblonga, utroque la-
tere hians.*

*Cardo Dens subulatus reflexus sæpe
duplex, non insertus testæ op-
positæ, margo lateralis magis
obsoletus.*

*Vagina, 1. S. testa linearis recta: fine altero marginato, cardinibus
unidentatis. Mus. Lud. Ulr. 472. n. 12.**

*Lift. Conch. t. 409. f. 255. t. 418. f. 256. t. 412. f. 1. t.
1056. f. 5.*

Bonann. recr. 2. f. 57.

mus. Kircher. 2. f. 56.

Rumpf mus. t. 45. f. M.

Gualt. test. t. 95. f. C. D. E.

Argenv. Conch. t. 24. f. K. M. M.

zoom. t. 6. f. G. H.

Klein. ostr. t. II. f. 65.

Lesser. testaceoth. f. 120.

Bytem. app. t. II. f. 52. b.

Knorr Vergn. I. t. 28. f. 3.

*Chemin. Conch. 6. p. 36. vign. 3. f. G. H. t. 4. f. 26-28.
& lit. a - c.*

β) Lift. Conch. t. 412. f. 6.

*Habitat frequens in mari europæo, americano, indico, 6-7
pollices latus, 1 longus, virescens, sub epidermide trian-
gulo rubello altero transverse striato, altero fasciis arcua-
tis pido, valvis canalem referentibus.*

*Siliqua, 2. S. testa linearis recta, cardine altero bidentato. Fn. suec.
2131. Mus. Lud. Ulr. 473. n. 13.**

Lift. Conch. t. 413?

an. angl. t. 5. f. 37.

Rond. test. 93.

Bell. aq. t. 414. f. 2.

Planc. Conch. t. 3. f. 6.

Ginan. adr. 2. p. 37. t. 27. f. 170.

Knorr Vergn. 6. t. 7. f. 1.

Chemin. Conch. 6. t. 4. f. 29. & d.

8) *Solen indicus lunulis roseis pictus. Schroeter Einl.*

Conch. 2. t. 7. f. 6.

Habitat frequens in Oceano europæo, ad 8 pollices ^{lb'}
tus, 1 $\frac{1}{4}$ pollicis longus.

Ensis.

3. *S. testa linearis subarcuata, cardine altero bidentato. Mus.*

Lud. Ulr. 473. n. 14.*

Lift. Conch. t. 411. f. 257.

an. angl. app. t. 2. f. 9.

Argenv. Conch. t. 24. f. L.

Chemin. Conch. 6. t. 4. f. 30. & c.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 626. n. 7. 3. t. 7. f. 7.

*Habitat in mari mediterraneo, anglico, belgico, rario, utroque sine rotundatus, præcedentibus speciebus uplo-
rimum minor, dentibus duobus alterius valvæ for-
triangulari alterius insertis.*

Legumen. 4. *S. testa lineati-ovali recta, cardinibus mediis bidentati, alterius bifido.*

Adans. seneg. t. 19. f. 3. *Molen.*

Lift. Conch. t. 420. f. 264.

Planc. Conch. t. 3. f. 5.

Gualt. test. t. 91. f. A.

Klein ostr. t. 11. f. 66.

v. *Born. mus. caes. Vind. test.* t. 2. f. 1. 2.

Chemin. Conch. 6. t. 5. f. 32-34.

*Habitat rarissimus in mari mediterraneo, & atlantico, præ-
cedentibus brevior, utrinque rotundatus, epidermide ful-
vicante, triangulo sub hac arcuato striato cæruleo lescente,
cardine in teste medio fusito.*

Cultellus. 5. *S. testa ovali-oblonga subarcuata. Mus. Lud. Ulr.* ⁴⁷³

n. 15.*

Lesser testaceoth. f. 126.

Rumpf mus. t. 45. f. F.

Gualt. test. t. 90. f. E.

Chemin. Conch. 6. t. 5. f. 36. 37.

Habitat in Amboinæ & Tranquebariæ arena littorea, tenuis, fragilis, 8 circiter lineas longa, & 3 ultra 2 pollices lata, sub epidermide flavicante sordide alba: maculis spadiceis & violaceis varia, utroque fine rotundata, altera valva unidentata, altera bidentata.

radiatus. 6. S. testa ovali recta lævi: costa transversali adnata depresso.

*Mus. Lud. Ulr. 474. n. 16.**

Lift. Conch. t. 422. f. 266.

Rumpf mus. t. 45. f. E.

Gualt. test. t. 91. f. B.

Argenv. Conch. t. 22. f. P.

Knorr delic. t. B. III. f. 9.

Vergn. I. t. 6. f. 5.

Chemin. Conch. 6. t. 5. f. 38-40.

Habitat in Oceano indico, violaceus, radiis 4, rarius 2 albis, tenuis, fragilis, costa nivea, satis valida, totam fere testam percurrente, cardine virinque calloso & intraque testa bidentato.

Urigilatus.

*7. S. testa ovali oblique striata. Mus. Lud. Ulr. 475. n. 17.**

Rondel. test. 14. Concha nigra.

Lift. Conch. t. 416. f. 260.

Bonann. recr. 2. f. 77.

mus. Kircher 2. f. 76.

Rumpf mus. t. 45. f. N.

Guale. test. t. 91. f. C.

Knorr Verg. 6. t. 5. f. 4.

Adans. seneg. I. t. 19. f. 2.

Murr. fund. test. t. 2. f. 7.

Chemin. Conch. 6. t. 6. f. 41. 42.

8) Lift. Conch. t. 421. f. 265.

Bonann. recr. 3. f. 353.

mus. Kirch. 2. f. 107.

Klein ostr. t. 11. f. 68.

Adans. seneg. I. t. 19. f. 1.

Chemin. Conch. 6. t. 6. f. 43. 44.

Habitat in mari mediterraneo, atlantico, indico, roseus radiis 2 albis, aut β) albus, satis robustus ventricosus, cardinis margine prominente, dente tenero retroflexo.

unatinus.

8. S. testa ovata membranacea pilosa, cardinis costa falcata.

*Mus. Lud. Ulr. 475. n. 18.**

Rumpf mus. t. 75. f. O. Rostrum anatis.

Argenv. Conch. t. 22. f. R.

v. Born. mus. caes. Vind. test. p. 23. vign. f. supr. & inf.
Chemn. Conch. 6. t. 6. f. 46-48.

Habitat rario in Oceani indici fundo arenoso, pellucidus,
albus, chartæ instar tenuis, altero fine rotundato clausi;
altero rostri æmulo hiante, utriusque valvæ dente cardito-
nuli figura auriscalpi.

Macha. 9. S. testa ovali oblonga anterius truncata, cardine altero
bidentato.

Molin. hist. nat. Chil. p. 178.

Habitat in mari pacifico, Chili alluente, in fundo arenoso
se abscondens margaritifer, 6-7 pollices longus, fuscus
cæruleo-varius.

bullatus. 10. S. testa subrotunda inflata substriata, anterius crenato-
hiante.

Lift. Conch. t. 342. f. 179.

Rumpf mus. t. 44. f. N?

Gualt. test. t. 85. f. H.

Knorr Vergn. 4. t. 3. f. 3?

Chemn. Conch. 6. t. 6. f. 49. 50

Habitat in mari indico (?) & americano, satis tenuis, sub-
pellucidus longitudinaliter striatus, albus, purpureo-mo-
culatus aut nebulosus, cardinis dente unico, marginali-
bus remotis compressis foveæ oppositæ insertis.

minutus. 11. S. testa ovali, valvularum angulis utrisque ferratis.

Lift. Conch. t. 426. f. 267?

Spengl. catal. raif. t. 6. f. 6-8.

Chemn. Conch. 6. t. 6. f. 51. 52.

Habitat in Oceano Europæ septentrionali inter zoophytæ
seminis cucumeris magnitudine, longitudinaliter striatus
apice truncatus, carinis a cardine apicem versus diver-
gentibus, acutis, ferratis.

virens. 12. S. testa ovato-oblonga, unibonibus tumidis.

Habitat in Java, testa fragilissima, diephana, alba, ex-
tus virente, inæquivalvi, forma myæ pictorum, apicem
& basi vix clausa: utraque valva callosa, cardine illi-
rius dentibus & approximatis sine oppositis.

siphos. 13. S. testa ovali recta lævi, nymphis prominentibus. Min-
2. p. 544.

Valent. mus. t. 13. f. 3.

Chern. Conch. 6. t. 7. f. 53. 54.

*Habitat in Oceano indicō, radiato affinis, epidermide
virente, violaceus, radiis pluribus, 2 magis evidētibus,
2½ pollices longus, 5 pollices latus, alterius valvæ
cardine unidentato, alterius bidentato.*

minimus. 14. S. testa linearī-ovali recta, cardinibus lateralibus bidentatis : alterius bifido.

Chern. Conch. 6. t. 5. f. 31. a. b.

*Habitat in sinu tranquebarico, legumini proximus, at
longe minor, sub epidermide flavicante totus niveus,
costa interiori totam testam percurrente.*

maximus. 15. S. testa linearī-ovali recta arcuato-friata, cardinibus lateralibus bidentatis.

Chern. Conch. 6. t. 5. f. 35.

*Habitat rarissimus ad littorā Nicobariæ, testa tenui,
pellucida, sub epidermide flavicante alba, 4 pollices
lata, 1 pollicem & 5 lineas longa, utrinque hianie,
cardinis dentibus sese non excipientibus.*

coarcta-
tus. 16. S. testa transverse rugosa, medio coarctata, utrinque rotundata, cardine medio in alterutra valva nunc unidentato nunc bidentato.

Chern. Conch. 6. f. 45.

Schroeter Flusconch. t. 9. f. 17.

Habitat ad insulas nicobaricas, testa sordide alba, utrinque hiante, $\frac{3}{4}$ pollicis longa $2\frac{3}{4}$ lata.

roseus. 17. S. testa rosea æquivalvi, cardinis dente subbifido foveæ alterius valvæ inserto.

Chern. Conch. 6. t. 7. f. 55.

Habitat in mari rubro, tellinæ radiatæ affinis, at testa utrinque hiante.

Ganguino-
lentus. 18. S. testa ovali glaberrima, cardine calloso bidentato.

List. Conch. t. 397. f. 236.

Knorr Vergn. 4. t. 3. f. 4.

Chern. Conch. t. 7. f. 56.

Habitat ad Jamaicam, natibus extrinfecus & intus roseis.

striatus. 19. S. testa æquivalvi transversim striata, cardinis dente unico.

Chern. Conch. 6. t. 7. f. 57. 58.

*Habitat ad insulas nicobaricas, mediæ magnitudinis,
tenuis, roseus : radiis albis.*

X yy yyy yyy

- vespertini- 20. *S. testa ovali oblonga spadiceo-radiata, cardinis sinistri nus.* valvae dente solitario duplice alterius inferto.
Adans. Seneg. I. t. 17. f. 20. Gatan.
Lift. Conch. t. 417. f. 261.
Argenv. Conch. t. 22. f. I.
v. Born mus. caes. Wind. test. t. 2. f. 6. 7.
Chenn. Conch. 6. t. 7. f. 59. 60. a. b.
Habitat in mari mediterraneo & atlantico, tellinæ gari similis, at testa utrinque hiantere, neque ad alterum latus flexa, intus cœruleo alboque varia, nunc lœvi, nunc striis transversis aspera.
- occidens. 21. *S. testa transverse striata ad nates glabra albo rubelloque radiata, cardine utroque bidentato: foveola intermedia.*
Chenn. Conch. 6. t. 7. f. 61.
Habitat rarissima - - - testa hinc inde albis rubellisque maculis varia, intus alba, 3 lineas ultra 2 pollices longa, & ultra 4 pollices lata, utrinque hiantere, cardine laterali.
- crispus. 22. *S. testa partim lœvi, partim striis undatim crispis aspera, cardinis dente longissimo angusto.*
Lift. an. angl. t. 5. f. 38.
Habitat frequens in fluvio Teers Angliae, anatino affinis an distincta satis hujus generis species?
- Spengle- 23. *S. testæ natibus bipartitis, cardinis dente primario rotundo, accessoriis longis angustis: altero curvato.*
Spengl. catal. rais. t. 1. f. 8. 9.
Habitat - - - testa vix pollicem longa, $2\frac{1}{2}$ pollices latiss. utrinque rotundata.

305. TELLINA.

Animal Tethys.

Testa bivalvis, anterius hinc ad alterum latus flexa, Cardinis dentes (ut plurimum) tres: laterales plati alterius testæ.

* *ovatæ crassifuscæ.*

gargadìa. I.T. testa subrotunda compressa anterius rugosa, rima dentalis.
*Mus. Lud. Ulr. 476. n. 19.**

Rumpf. mus. t. 43. f. N. Remies gargadica.

Klein ostr. t. 10. f. 55.

Lesser testaceoth. f. 119.

Chemin. Conch. 6. t. 8. f. 63. 64. a. b.

Habitat rarissima in Oceano indico, testa alba, apice & intus flavicante, cardinis dente medio fisco.

Lingua 2. T. testa subovata scabra : squamulis lunatis quincuncialibus, felis.

Mus. Lud. Ulr. 476. n. 20.*

Rumpf. mus. t. 45. f. G.

Gault. test. 76. f. B.

Klein ostrac. t. 11. f. 62.

Knorr Vergn. 2. t. 2. f. I.

Chemin. Conch. 6. t. 8. f. 65.

Habitat rario in Oceano indico, testa duplo fere latiori, quam longa, vertice radiisque dilute roseis picta.

virgata. 3. T. testa ovali striis transversis recurvatis anterius angulata, dentibus lateralibus prominulis. Mus. Lud. Ulr. 477. n. 21.*

Rumpf. mus. t. 45. f. H. Tellina virgata.

Argenv. Conch. t. 25. f. G.

Knorr Vergn. 2. t. 21. f. 4. & 4. t. 25. f. I.

Chemin. Conch. 6. t. 8. f. 66-72.

♂) Gault. test. t. 89. f. E.

♀) Gault. test. t. 86. f. G.

Habitat in Oceano indico & atlantico, testa ad $1\frac{3}{4}$ pollices longa, $2\frac{1}{2}$ lata, alba vel flavicante, radiis ut plurimum roseis picta, cardinis dente medio fisco, lateralibus triangularibus, altero ante vulvam, altero pone anum posito.

angulata. 4. T. testa subovata striis transversis recurvatis anterius angulata, dentibus lateralibus nullis.

Liser Conch. t. 388. f. 235. t. 406. f. 252.

Chemin. Conch. 6. t. 9. f. 74. 75.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 643. n. 4. t. 7. f. 8.

Habitat in Oceano indico, ultra sesquipolligem longa, 2 pollices lata, virgatae affinis, ac minus oblonga, tota alba, angulo anteriori magis extrorsum sita, ano ovali, nec solis marginibus inflexis distincta.

Gari. 5. T. testa ovalis striis transversis recurvatis, dentibus laterali- bus obsoletis. Mus. Lud. Ulr. 478. n. 22.*

Rumpf. mus. t. 45. f. D. Tellina gari.

Knorr Vergn. 6. t. 12. f. 2.

VERMES TESTACEA: Tellinae

Chemn. Conch. 6. t. 10. f. 92. 93.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 644. n. 5. t. 7. f. 9.

β) *Chemn. Conch.* 6. t. 10. f. 94.

Habitat in Oceano indico, virgata facie, & testa minore magis angusta, anterius inflexa rugosissima, rugis transversis in medio testae per strias perpendicularares decussatis, nyniphis exterius prominentibus, nunc cinerea radiis fissicis, nunc alba radiis cæruleis, nunc cæruleoscens albo-maculata radiis rubris, nunc albo-rubella radiis rubris, β) ex cinereo alba, radiis rubro variis, & ex cinereo albidis.

fragilis. 6. T. testa ovata albâ gibba: striis transversis recurvatis, natibus flavescensibus.

Chemn. Conch. 6. t. 9. f. 84.

Habitat in Oceano europæo, mari caspio, testa magnitudine extimi pollicis, sotû tenui, striis transversis per alias decussatis, cardinis in altera valva dente unico fiso, in altera duobus, in utraque lateralibus nullis.

rugosa. 7. T. testa ovata: rugis transversis undulatis, cardinis dentibus lateralibus duobus, primario in sinistra valva uno fiso, in altero duobus.

v. *Born mus. caes. Vind. test. t. 2. f. 3. 4.*

Chemn. Conch. 6. t. 8. f. 62.

Habitat minus frequens in mari indico & americano, teff paulisper latiori quam longa intus glabra, alba, aut flavige vicante, angulata affinis.

inflata. 8. T. testa rotundata crassa tota nivea gibba: striis longitudinalibus subtilissimis.

Chemn. Conch. 6. t. 9. f. 76.

Habitat rarer - - -

multangularis. 9. T. testa ovata subventricosa inæquivalvi decussatum striatum anterius sinuata, cardinis dente primario in sinistra valva solitario fiso, in altera duobus.

Chemn. Conch. 6. t. 9. f. 77.

Habitat ad Tranquebariæ littus, testa satis magna ex cibis nerascente alba: rima ampla.

Tellinarum testæ anterius inflexæ, ut altera testa plicam convexam, altera vero cibam effundat, in subericulatis autem plica vix manifesta, sed striæ in eodam loco divergentes genus produnt.

- Papyra- cea. 10. T. testa tenui ovata ventricosa transversim striata, anterius plicato-rugosa, cardinis dentibus lateralibus nullis, primariis duobus.
Chemn. Conch. 6. t. 9. f. 78.
Habitat rario ad Guineam, testa 3 lineas longa, & 6 ultra pollicem lata, fragili, medio excavata, intus laevi, alba.
- gibbosa. 11. T. testa subtrigona ventricosa subtiliter transversim striata, cardinis dente laterali valido.
Gualt. test. t. 77. f. Q.
Habitat - - testa ex viridi albicante utrinque inflexa: altero latere breviori, cardinis dente primario unico.
- inæquila- tera. 12. T. testa æquivalvi subrotunda alba: striis versus marginem nonnullis transversis.
Gualt. test. t. 88. f. C.
Habitat - - -
- Knorrii. 13. T. testa splendide rubra margine violacea.
Knorr Vergn. 5. t. 21. f. 5.
Habitat - - testa 1½ pollicis longa, ultra 2 pollices lata.
- candidif- sima. 14. T. testa alba.
Knorr Vergn. 6. t. 38. f. 4.
Habitat - - testa 1½ pollicis longa, 2½ pollicis lata, an distincta species?
- Bornii. 15. T. testa transversim striata, altero latere flexa rubefcente: radiis rubris.
v. Born mus. caes. Vind. test. t. 2. f. 5.
Habitat - - testa ¾ pollicis longa, & 2 lata.
- pugilla. 16. T. testa ovata ventricosa, tenui transverse striata, cardine in altera valva edentulo, in altera dente primario duplicit.
Schroet. Flusconch. p. 194. t. 4. f. 7. a. b.
Habitat in Europæ fluviis, testa minima sordide alba, intus nivea, tenera.
- albida. ** ovatæ compressæ.
17. T. testa ovali laevi, nymphis prominentibus. *Mus. Lud.*
*Ulr. 479. n. 23. **
Habitat in Oceano europæ, testa ovi magnitudine, ex rubesciente alba, obsolete transversim striato, intus candida.

nymphis albis, cardine utrinque sutura distincto, striis minimis transversis rubris notata: dentibus in utraque valva 3.

foliacea. 18. T. testa ovali, pube scabra, rima serrata. *Mus. Lud.* *Ulr. 479. n. 24.**

Rumpf. mus. t. 45. f. K.

Argenv. Conch. t. 22. f. E.

Klein ostr. t. II. f. 64.

Knorr Vergn. 5. t. 29. f. 2.

Chemn. Conch. 6. t. 10. f. 95.

Habitat rarissima in Oceano indicō, testa tenera, pellucida aurea, $\frac{1}{2}$ pollicem longa, 3 pollices lata, cardinis denti primario fixo, laterali elongato.

planata. 19. T. testa ovata compressa transversim substriata lăvi marginibus acutis, pube subtomentosa. *Mus. Lud.* *Ulr. 480. n. 24.*

Guelt. test. t. 89. f. G?

Regenf. Conch. 1. t. 3. f. 28?

Chemn. Conch. 6. t. II. f. 100.

Habitat in Oceano europæo, mari mediterraneo, maxime plana, pellucida, incarnata, minus flexu quani in congeneribus: margine acutissimo.

lævigata. 20. T. testa ovata lævigata: dentibus lateralibus marginatis pube striatio-scabra, nymphis inflexis. *Mus. Lud.* *Ulr. 480. n. 26.**

Rumpf. mus. t. 45. f. I? Tellina lavis.

Chemn. Conch. 6. t. 12. f. III.

Schroet. Eml. in Conch. 2. p. 649. t. 7. f. 10.

β.) Līst. Conch., t. 387. f. 234?

Habitat in Oceano europæo & indicō, testa alba: radii rubellis, intus rubella, flavicante aut alba.

radiata. 21. T. testa oblonga longitudinaliter subtilissime substriata nitida, futura anali canaliculata. *Mus. Lud.* *Ulr. 481. n. 27.* Fn. suec. 2132.* Müll. zool. dan. prodr. 296.*

Līst. Conch. t. 393. f. 240.

Guelt. test. t. 89. f. I.

Argenv. Conch. 22. f. A.

Klein ostr. t. II. f. 60.

Knorr delic. t. B. III. f. 8.

Vergn. 1. t. 19. f. 1-4 t. 2. f. 4. & 4 t. 2. f. 2?

Regenf. Conch. 1. t. 8. f. 22.

Chemn. Conch. 6. t. II. f. 102.

β) *Tellina inaequilatera maxima rugosa candida intus argentea.* *Gualt. test.* t. 88. f. P?

γ) *Tellina inaequilatera aliquantulum rugosa prope marginem fusca, in medio fascia subalbida cincta, ad cardinem purpurascens.* *Gualt. test.* t. 89. f. A?

δ) *Tellina flavata.* *Knorr Vergn.* 4. t. 2. f. 2.

ε) v. *Born mus. caes. Vind. test.* t. 2. f. 10?

Habitat in Oceano europeo & americano frequens, testa ut plurimum alba, radiis rubris picta.

rostrata. 22. *T. testa oblonga anterius angulato-rostrata: angulis subdentatis.* *Mus. Lud. Ulr.* 481. n. 28.*

Lift. Conch. t. 382. f. 225. t. 395. f. 242?

Rumpf. mus. t. 45. f. L.

Gualt. test. t. 86. f. D? t. 88. f. T.

Argenv. Conch. t. 22. f. O.

Klein ostr. t. II. f. 63.

Knorr Vergn. 4. t. 2. f. 3. 5.

v. *Born mus. caes. Vind. t. 2. f. 12.*

Chenin. Conch. 6. t. 10. f. 96. & t. II. f. 104.

Habitat rario in Oceano indico, testa nunc alba, radiis interdum roseis picta, nunc rubra, radiis interdum albis, nunc flava.

*inaequi-
valvis.*

23. *T. testa oblongo-rostrata, valva altera plana.*

Gronov. zooph. t. 18. f. 3.

Brünniche Besch. berl. Naturf. 3. p. 313. t. 7. f. 25-28.

Chemn. Conch. 6. t. II. f. 106. a. b. c. d.

Habitat in mari mediterraneo & norwegico, testa laetea, laevi, pellucida, pollicis transversi longitudine, sutura dorsali recta in rostrum obtusum patulum excurrente, valvula altera leviter convexa, cardinis dentibus 2 primariis, lateralibus nullis.

*trifascia-
ta.*

24. *T. testa ovata laeviuscula sanguineo-triradiata, pubes rugosa.* *Fn. suec.* 2133. *Müll. zool. dan. prodr.* 2969.

Lift. æn. engl. app. 32. f. 8.

Chemn. Conch. 6. t. 12. f. 114. a. b.

β) *Chemn. Conch.* 6. t. 12. f. 115. 116.

Habitat minus frequens in Oceano europeo, testa unguis magnitudine, alba aut pallida: radiis 3 sanguineis (2. violaceis, interdum 6) a cardine ortis, anterius magis obtusa, vulva ovata.

- incarnata. 25. T. testa ovata anterius compressio planiuscula, natibus submucronatis. *Fn. suec.* 2134.
Lift. an. angl. 32. t. 1. f. 8.
Gualt. test. t. 88. f. M.
v. Born nuf. Caes. Vind. test. t. 2. f. 13.
Chenn. Conch. 6. t. 12. f. 110.
β) Chemn. Conch. 6. t. 12. f. 117.
γ) Lift. Conch. t. 405. f. 251.
δ) Lift. Conch. t. 405. f. 250.
Habitat in Oceano europæo, mari mediterraneo, teſſe extimi pollicis magnitudine, planatae ſiniillima, ſed roſea, radio non alterove pallido, β) margine albo, vertice roſeo; γ) tota rubra, natibus acutiusculis; δ) intus rubra.
- donacina. 26. T. testa ovata compressio-planiuscula laeviuscula, anterius obtuſiſſima.
Gualt. test. t. 88. f. N?
Chenn. Conch. 6. t. 12. f. 219?
Habitat in mari mediterraneo, incarnatae ſiniillima, ſed testa minore purpuracente: radix plurimis rubris, reione vulvæ obtuſiſſima, &, ut in donace, truncata.
- truncata. 27. T. testa ovali compressa ſubſtriata: parte antica truncata futuraque diſtincta.
Habitat in Java, incarnatae ſimiſis, at testa violacea, magis fragili, anterius fere truncata, cardinis dentibus omnibus emarginatis.
- trilatera. 28. T. testa plana anterius truncata flava: vertice albo, cardinis dente primario & laterali ſolitariis.
Chenn. Conch. 6. t. 10. f. 85.
Habitat - - - testa triangulo inæquilatero ſimiſi, pollicenti & 7 lineas longa, 2 pollices 2 lineas lata.
- oblonga. 29. T. testa oblonga fragili flavicante, cardinis dente primario in altera valva ſolitario, in altera dupliſi.
Chenn. Conch. 6. t. 10. f. 87.
Habitat in Oceano europæo, mediæ magnitudinis, altero latere rotundata.
- Spengleri. 30. T. testa alba transversim ſtriata utrinque bifariam uncinata: valva altera extrorſum, altera introrſum arcuatim flexa.
Spengl. Besch. Bel. Naturf. I. p. 387. t. 9. f. 1-3.
Catal. raif. t. 4. f. 3-5.
Chenn. Conch. 6. t. 10. f. 88-90.

β) *Lift. Conch.* t. 398. f. 237.

Habitat ad insulas nicobaricas, testa crassa 11 lineas longa, & 2 pollices cum 8 lineis lata alba, vertice roseo; β) uncinis caret.

^{fervens.} 31. T. testa oblongo-ovata compressa albo rubelloque radiata subtiliter transversim striata, cardinis dentibus lateralibus nullis.

Lift. Conch. t. 394. f. 241.

Chemin. Conch. 6. t. 10. f. 91.

Habitat in Oceano septentrionali, testa pollicem longa, & 2 lata.

^{opercularis.}

32. T. testa purpurea albido fasciata decussatim striata altero fine productiore, valva altera convexa, altera plana.

Chemin. Conch. 6. t. 11. f. 97.

Knorr Vergn. 6. t. 12. f. 1?

β) *Tellina operculata ochroleuca. Chemin. Conch.* 6. t. 11. f. 98.

Habitat in India? rarer, testa 1 $\frac{3}{4}$ pollicis longa, 2 $\frac{3}{4}$ pollicis lata, denibus cardinis lateralibus nullis, primario alterius valvae solitario, alterius dupliciti, striis transversis subtilioribus; β) striis transversis crassioribus, cardinis dente laterali, primario fisso, sinistræ valvae solitario, dextræ dupliciti; an ad inaequivalven forsan referenda?

^{hyalina.}

33. T. testa ovali inaequivalvi plana pellucida subtilissima decussatim striata, cardinis dentibus lateralibus nullis.

Chemin. Conch. 6. t. 11. f. 99.

β) *Tellina excavata Spengleri. Schroet. Einl. in Conch.* 3. p. 6. n. 14.

Habitat ad Guineæ littora, β) in India, testa nivea, tenui, 6 lineas ultra pollicem longa, 9 lineas ultra 2 pollices lata, margine acutissimo, cardinis dente primario in sinistra valva solitario, in dextra dupliciti.

^{Vitreæ.}

34. T. testa flavicante tenuissima perpendiculariter striata anterius rostrata, cardinis dentibus lateralibus nullis.

Chemin. Conch. 6. t. 11. f. 101.

Habitat in mari septentrionali & balthico, testa fragilima posterius rotundata, cardinis dente in valva sinistra primario solitario, in dextra 2 minimis.

- lanceola-* 35. T. testa ovali tenuissima pellucida albida transversim striata anterius acuminata, cardinis dentibus lateribus in altera valva nullis.
Chemn. Conch. 6. t. 11. f. 102.
Habitat rarissima in India, testa 10 lineas longa, pollicem cum 8 lineis lata, rubello obumbrata, cardinis dente primario simplicii subfusso.
- apelina.* 36. T. testa ovali pellucida lucis reflexione & refractione variante costa in utraque valva alba a cardine marginem exteriorem procedente.
Chemn. Conch. 6. t. 12. f. 107.
β) Tellina papyracea alba Splengeri. Schroet. Einl. Conch. 3. p. 8. n. 18.
Habitat in sinu nicobarico, testa tenui.
- coccinea.* 37. T. testa ovali pellucida coccinea subtiliter transversim striata.
Chemn. Conch. 6. t. 12. f. 109.
Habitat in mari mediterraneo, callo prope cardinem testae, instar solenis instruenda.
- calcarea.* 38. T. testa ovali tenui alba, cardinis dente primario in altera valva fissio, alterius foveæ inserto.
Chemn. Conch. 6. t. 13. f. 136.
Habitat frequentissima in mari islandiam circumfluentem testa tenui.
- virginica.* 39. T. testa subtiliter transversim striata anterius rostrata
Lift. Conch. t. 159. f. 15.
Habitat in Virginiae fluviis, testa minima rotundata.
- alata.* 40. T. testa viridi subtriquetra: margine dilatato.
Lift. Conch. t. 160. f. 16.
*Klein ostr. t. 9. f. 36.
Habitat - - - testa 2 fere pollices lata, $\frac{1}{4}$ longior!
an hujus tribus & generis?*
- pectinata.* 41. T. rotundata plana tenui subfuscata longitudinaliter striata.
Lift. Conch. t. 300. f. 137.
Habitat - - -
- angusta.* 42. T. testa planiuscula rubra albo-radiata altero fine acuminata, altero rotundata.
Lift. Conch. t. 383. f. 26.

Habitat - - - testa mediæ magnitudinis latitudine longitudinem duplo superante.

variegata. 43. T. testa ovali utroque fine rotundata variegata, radio ad verticem albido.

Lift. Conch. t. 384. f. 27.

β) Tellina lata albida ex rubro radiata. *Lift. Conch. t. 385. f. 232.*

γ) Tellina parva albida, ex purpura maculata sive radiata. *Lift. Conch. t. 389. f. 228.*

Habitat - - -

madagaf. carien- sis. 44. T. testa ovali altero fine subacuminata - - - *Lift. Conch. t. 386. f. 233.*

Habitat in Madascar, testa 2 $\frac{1}{4}$ pollices longa, 3 $\frac{1}{2}$ lata.

purpuraf. cens. 45. T. testa utriusque purpurascente. *Lift. Conch. t. 391. f. 230.*

β) Gualt. test. t. 77. f. L?

γ) Gualt. test. t. 77. f. M? *Habitat* - - - testa sesquipollis longa, aut paulo latiori.

aspera. 46. T. testa altero fine acuminata intus lutescente, exteriorus radiata ex striis transversis aspera. *Habitat* - - - testa 1 $\frac{3}{4}$ pollicis longa, 3 pollices lata.

triangu- laris. 47. T. testa subcuneata albida transverse striata. *Lift. Conch. t. 401. f. 244.*

β) Tellina triangularis admodum crassa fere levior. *Lift. Conch. t. 401. f. 245.*

Habitat - - - testa ultra pollicem longa, 1 $\frac{1}{2}$ lata.

48. T. testa inaequilatera; altero fine subacuminata. *Lift. Conch. t. 407. f. 253.*

Habitat in Oceano Norwegico, testa 1 $\frac{1}{4}$ pollicis longa; 1 $\frac{3}{4}$ lata.

jamaicens- sis. 49. T. testa crassa rostro extus purpurascente. *Lift. Conch. t. 408. f. 254.*

Habitat in Jamaica, testa pollicem longa, sesquipollis lata.

rhomboi- des. 50. T. testa exterius alba, striis transversis aspera intus cærulescente. *Lift. an. Angl. p. 171. t. 4. f. 20.*

β) Bonann. recr. 2. f. 48.

muf. Kirch. 2. f. 47.

Habitat ad fluvium Angliae Tees, testa 2 pollicem lata, & ultra pollicem longa.

vinacea. 51. T. testa spadiceo-vinacea: radio albo.

Bonann. recr. 2. f. 42.

mus. Kirch. 2. f. 41.

Habitat in mari britannico & balthico, testa pollicem longa, & ultra 1½ lata.

zonata. 52. T. testa rosea: fascia candida.

Bonann. recr. 2. f. 44.

mus. Kirch. 2. f. 43.

Habitat in littore latino, testa interdum lactea, umbonilis macula balauistica, vix propria species.

albicans. 53. T. testa albida: fascia candida, intus flava.

Gualt. test. t. 77. f. H?

β) Gualt. test. t. 77. f. M?

Habitat - - - β) cardine purpurascente.

rufescens. 54. T. testa rufescente luteo maculata, decussatim striata.

Gualt. test. t. 85. f. C.

Habitat - - - testa ¾ pollicis longa, 1¼ lata.

depressa. 55. T. testa inaequilatera depressa minutissime striata.

Gualt. test. t. 88. f. H. I. L.

Habitat - - - testa nunc candida, nunc purpurascens, nunc subrosea.

fasciata. 56. T. testa inaequilatera subtilissime transversim striata, candido & subalbido alternatim fasciata.

Gualt. test. t. 89. f. B.

Habitat - - - testa ultra pollicem longa, & 1½ fere lata, altero fine subacuminata.

striata. 57. T. testa inaequilatera utrinque rotundata ex roseo albido pellucida.

Gualt. test. t. 89. f. C.

Habitat - - - testa 2 pollices lata, 1¼ longa.

rosea. 58. T. testa rosea: costis tenuibus a cardine ad marginem decurrentibus.

Knorr Verzg. 5. t. 9. f. 3.

Habitat - - - testa pollicem longa, 1½ lata.

- punicea.* 59. T. testa ovali plana æquilatera punicea densissime transversim striata.
v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 2. f. 8.
Habitat — — testa pollicem longa, pollicem & 8 linearis lata.
- complanata.* 60. T. testa obovata complanata obsolete striata rubella: margine aucto, rima hiante subtomentosa. *v.* Born mus. Caes. Vind. test. t. 2. f. 9.
Habitat — — testa $1\frac{3}{4}$ pollicis longa, $2\frac{1}{4}$ lata.
- Fabula.* 61. T. testa ovata compressa inflexa anterius subrostrata: valva altera lævi, altera oblique substriata: striis reflexis. Gronov. zooph. t. 18. f. 9.
Habitat in mari norwegico, mediterraneo, americano, testa alba, magnitudine seminis lupini albi.
- Adansonii.* 62. T. testa albida: cardine violaceo.
Adans. Seneg. t. 17. f. 9. Poron.
Habitat frequens in antris scopulorum aqua marina repletis ad littus Africæ occidentalis, diametri 2 linearum.
- cancellata.* 63. T. testa tenui sordide alba: fulcis nemorosis tenuissimis longitudinalibus rugas transverfas decussantibus.
Adans. Seneg. t. 17. f. 10. Pirel.
Habitat in mari Atlantico, testa opaca, pollicem lata pauloque breviori.
- Rugosa.* 64. T. testa albicante fasciata, glabra ad marginem rugosa, cardinis dentibus in valva dextra duobus, in sinistra tribus.
Adans. Seneg. t. 17. f. 19. Vagal.
Habitat ad littus Africæ occidentale, testa duplo saepissime latiori, quam longa, fasciis juniorum flavicanis, aduliorum ex griseo violaceis.
- *** suborbiculatae.
- balaustina.* 65. T. testa dilatato-orbiculata: valvula altera dentibus lateralibus.
Habitat in mari mediterraneo, testa albida: radiis obsoletis rufis, magnitudine seminis lupini albi.
- Remies.* 66. T. testa suborbiculata compressa rugosa. *Mus. Lud.* Ulr. 482. n. 29.*
Rumpf. mus. t. 42. f. I. Remies.
Lit. Conch. t. 266. f. 102.

Murr. fund. testac. t. 2. f. 8.

v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 2. f. 11.

Chemin. Conch. 6. t. 12. f. 112. 113.

*Habitat in Oceano indico & americano, testa interdum
3 pollices longa & $3\frac{1}{2}$ lata alba, in americanis flavedint
internista, rugis minus evidentibus.*

reticulata. 67. T. testa lentiformi compressa reticulata.

*Habitat in India, testa alba, intus flavicante 2 pollicib;
longa, & $1\frac{3}{4}$ pollices lata, striis transversis crispis,
subtilissimis elevatis longitudinalibus exarata; ano cor-
dato impresso, brevissimo; cardinis dentibus primariis
2 subtilibus, laterali utrinque uno.*

scobinata. 68. T. testa lenticulari scabra: squamis lunatis quincuncia-
libus. *Muf. Lud. Ulr. 482, n. 30.**

Rumpf. mus. t. 43 f. E.

Gualt. test. t. 76. f. E.

Knoell Vergn. 6. t. 37. f. 3.

Chenin. Conch. 6. t. 13. f. 122-124.

*Habitat rario in Oceano indico, testa alba, maculis se-
rugineis varia, $2\frac{1}{2}$ pollices longa, $2\frac{3}{4}$ lata: ani fossili
oblunga, labiis non canaliculatis.*

lactea. 69. T. testa lentiformi gibba alba pellucida lævi.

Gualt. test. t. 71. f. D.

Chemin. Conch. 6. t. 13. f. 125.

*Habitat in mari mediterraneo, testa semine lupini albi paulo
majore, obsolete transversini striata; cardine edentulo.*

carnaria. 70. T. testa suborbiculata lævi utrinque incarnata oblique
striata: striis hinc reflexis.

Lift. Conch. t. 339. f. 176.

en. angl. t. 4. f. 25.

v. Born mus. caes. Vind. test. t. 2. f. 14.

Chemin. Conch. 6. t. 13. f. 126.

β) Gualt. test. t. 77. f. I.

*Habitat copiosissima in Angliae sinibus, & insularum Oce-
ni americani littore, seminis lupini albi magnitudine.*

bimacula- 71. T. testa triangulo subrotunda latiore lævi albida: intas-
ta. maculis duabus sanguineis subrotundis. *Fn. suec. 213**

Chenin. Conch. 6. t. 13. f. 127.

β) Chemin. Conch. 6. t. 13. f. 132. a. b.

Habitat rario in Oceano europæo & americano, testa vix extimi pollicis magnitudine, extus alba, rarius flavicante, præter strias aliquot obsoletas lœvi, flexura parum manifesta.

balthica. 72. T. testa subrotunda lœvi extrinsecus incarnata. *Fn. suec.* 2136.* *it. oel.* 43. *Müll. zool. dan. prodr.* 2970.

Chenin. Conch. 6. t. 13. f. 128.

Habitat in mari balthico, testa fabam minorem vix unquam superante, tenuissima, pellucida, fragili, intus alba, a triangulo rotundata.

piliformis. 73. T. testa subglobosa lœvi intus incarnata oblique substriata : striis anterius angulo acuto reflexis. *Fn. suec.* 2137. *Habitat ad Oceani europæi ostia fluviorum, testa pilis magnitudine, alba, fundo purpureo, rarius tota alba; striis oculo nudo vix conspicuis, cardinis dente primario simplici, lateralibus prominulis.*

divaricata. 74. T. testa subglobosa alba bifariam oblique striata; *List. Conch.* 1. 301. f. 142. *Bonann. recr.* 3. f. 349. *mus. Kirch.* 2. f. 104. *Klein ostr.* 1. 9. f. 28.

Chemn. Conch. 6. t. 13. f. 129. 130.

Habitat in mari mediterraneo & americano, testa pilis magnitudine ad pollicis longitudinem subcompressa, rarius cærulecente aut cinerea, intus alba, striis tenuissimis undulatis divergentibus exarata; margine crenato, s. xuræ nulla, cardinis dente primario duplice, lateralibus nullis ; an hujus generis ? Logie.

digitaria. 75. T. testa subglobosa pallida, cincta striis obliquis uniformibus.

Chemn. Conch. 6. t. 12. f. 120. 121.

Habitat in mari mediterraneo, americano & rarissime indico, testa pilis magnitudine, in indica majore, intus ut plurimum glabra, nonnunquam ex rufo aurantia, maculis interdum undulatis rufis picta, striis eleganter obliquis ad marginem exteriorem sensim, instar striarum in apice digitorum, desinentibus, unde apparet spiraliter striata.

cornea. 76. T. testa globosa glabra cornei coloris : sulco transversali. *Fn. suec.* 2138.

Müll. *verm. terr. & fluv.* 2. p. 202. n. 387. zool. ^{de}
prodr. 2965. *Tellina (rivalis) testa globosa gibba glabra*
umbone obtuso.

Lift. *Conch. t.* 159. *f. 14.*

animi. angl. t. 2. f. 31. app. 22. t. 1. f. 5.

Gualt. *test. t. 7. f. B. C. C. C.*

Argenv. *Conch. t. 27. f. 9.*

zoonorph. t. 8. f. 10.

Schroet. *Flusconch. t. 4. f. 3-5.*

Chenin. *Conch. 6. t. 13. f. 133. a. b.*

*Habitat vulgaris in Europæ amnibus & fossis, testa palea
lucida nitida, oculis armatis, subtilissimè transversè
striata, intus alba subcærulescente, extus alba, pallida,
ex cæruleo cinerea, cærulea albo mixta, arcubus trans-
versis nigris, uno evidenter, pisi saepius magnitudine
non raro quadruplo majore, cardinis dentibus laterali-
bus elongatis obsoletis utrinque cum fossulis excipienti-
bus, mediis vix ullis.*

lacustris. 77. T. *testa rhumbea planiuscula glabra, umbone acuto.*
Müll. *zool. dan. prodr. 2966. verm. terr. & fluv.* 2. ¹
204. n. 388.

Chenin. *Conch. 6. t. 13. f. 135.*

*Habitat in Europæ lacubus & paludibus, vivipara, testa palea
6 lineas longa 4 lata, subfuscæ, valvarum dorso cinereæ
marginè albido, intus alba, juniore tota alba diaphana,
tenuiore & fragiliore, quam cornea, cardinis dentibus
mediis nullis, lateralibus obsoletis 6.*

amnica. 78. T. *testa subcordiformi transversim sulcata, umbone obtuso.*
Müll. *zool. dan. prodr. 2967. verm. terr. & fluv.* 2. ¹
205. n. 389.

Chenin. *Conch. 6. t. 13. f. 134.*

*Habitat in Europæ amnibus & fossis, testa cornea minima
globosa, 1-5 lineas diametro æquante, intus glabra sub-
cærulea, exterius alba, fusca, aut lutea, costa interdum
nigricante simplici aut duplice, junioribus tota candida
pellucida, cardinis dentibus mediis in utraque valva
lateralis utrinque 1.*

luminaria- 79. T. *testa triangulari gibba transversim striata.* Müll. *verm.
terr. & fluv.* 2. p. 205. n. 390.

*Habitat in Asie fluvio Euphrat, testa crassa, dura, opaca
cardinem versus antrorūni luteiori, exterius viridi, striis
imbricatis aperturæ parallelis, exarata, intus cyanea, cardis*

cardinis dentibus mediis sex, lateralibus utrinque elongatis & cum sulcis excipientibus crenula. is.

fluminea. 80. T. testa trianguli gibba transversim costata. Müll.
verm. terr. & fluv. 2. p. 206. n. 391.

Habitat in Sinæ arena fluvialili, testa 6-8 lineas longa & lata, opaca, antrosum & retrorsum fere æquali, exterior viridi, intus semicirculo nigro notata, albida, caridine testam fluminalis referente.

fluvialilis. 81. T. testa trianguli transversim rugosa. Müll. *verm. terr. & fluv. 2. p. 206. n. 392.*

Habitat in fluvio, emporium Sinense Canton præterlabente, cum fluminali & fluminea ad Venerem accedens, cardine his etiam similis, at testa latiore & tenuiore, 8 lineas longa, 9 lata, ex fusco vidente variolosa distincta.

Iberica. 82. T. testa globosa lævi nitida, margine dentata.

Bonann. recr. 2. f. 33.

mus. Kirch. 2. f. 32.

Habitat copiosa in littore Iberico, testa parva, pulla, interdum ex luteo fusca, atro intermixta.

adriatica. 83. T. testa subglobosa extrinsecus alba intus margaritacea margine denticulata.

Bonann. recr. 2. f. 34.

mus. Kirch. 2. f. 33.

Habitat in adriatici littoris arena, testa parva.

lunosa. 84. T. testa subglobosa æquivalvi æquilatera: striis transversis rarioribus.

Gualt. test. t. 77. f. D. E.

Habitat - - - testa mediae magnitudinis albida, aut rubella.

purpura-
ta. 86. T. testa æquilatera lævi tota lucidissime purpurea.

Gualt. test. t. 77. f. L.

Habitat - - - testa pollicem longa, sesquipollicem lata.

Tellinarum species multæ imperficius justo ab auctoribus scriptæ, difficultime definitæ; multæ certe videntur meræ varietates; an hujus generis est concha ab Argenvillio zoomorph. t. 8. f. 9. delineata? an distincta species atra, quam Ill. Pallas in mari glaciali reperit?

- candida. 87. T. testa suborbiculata subtiliter transversim striata candida
Gualt. test. t. 77. f. O.
 β) *Gualt. test. t. 77. f. P.*
Habitat -- testa β) minore lævi.
- gallica. 88. T. testa trigona pectinata.
Argenv. Conch. t. 27 f. II.
Habitat frequens in Galliæ fluvio Marne, mediae magnitudinis, cardinis dente solitario.
- Senegalen- 89. T. testa trigono-globosa, crassa, dura, lævi, sulcata.
Adans. Seneg. t. 17. f. 14. Tosar.
Habitat in Africa, testa alba, incarnata, aut lini floridæ colorè tincta, interdum rubella albo radiata.
- angulosa. 90. T. testa ovali planiuscula transversim striata antrofusca inflexo-angulata; cardinis dente primario bifido lateralibus remotis.
Chenin. Conch. 10. p. 349. t. 170. f. 1654. 1655.
Habitat ad insulas Americæ medice obversas.
- polygona. 91. T. testa alba transversim striata orbiculari angulato: cardinis dentibus lateralibus nullis; primario exorreto duplicato, alterius duobus. *Chenin. Conch. 10. p. 348. t. 170. f. 1651 - 1653.*
Habitat in Oceano Indico.

306. CARDIUM. *Animal Tethys.*

Testa bivalvis subæquilateræ æquivalvis (plerumque convexa, longitudinaliter costata striata aut sulcata, margine dentata.
Cardo dentibus mediis his alternatis: altero ut plurimum incurvo; lateralibus remotis insertis.

*costatum. 1. C. testa gibba æquivalvi: costis elevatis carinatis costatis membranaceis. Mus. Lud. Ulr. 483. n. 31.**

Argenv. Conch. t. 26. f. A. *Concha exotica.*
Adans. Seneg. t. 18. f. 2. *Kaman.*
Column. purp. 26. t. 27.
Major testac. t. 10.
Rumpf mus. t. 48. f. 6.
Lift. Conch. I. t. 327. f. 164.
Gualt. test. t. 72. f. D.
Knorr Vergn. I. t. 28. f. 2.
Chenn. Conch. 6. t. 15. f. 151.
Habitat in Oceano africano, testa (integra rarissima)
ad 3 pollices longa, 3½ lata, & ultra 3 pollices alta,
alba: sulcis latis fuscis.

Cardissa. 2. C. testa cordata: valvis compressis dentato-carinatis,
 natibus approximatis. *Mus. Lud. Vir.* 484. n. 32. ²
Rumpf mus. t. 42. f. E. *Cardissa.*
Argenu. Conch. t. 26. f. I. *Cor veneris.*
zoomorph. t. 12. f. K.
Column. ag. 16.
Lift. Conch. t. 318. f. 155. t. 319. f. 156.
Bonann. recr. 2. f. 49.
mus. Kirch. 2. f. 48.
Gualt. test. t. 84. f. B. C. D.
Klein ostrac. t. 10. f. 39.
Knorr Vergn. I. t. 18. f. 3. & 4. b. t. 11. f. I.
v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 2. f. 15-18.
Chenn. Corch. 6. t. 14. f. 143-146.
 3) *Lift. Conch.* t. 320. f. 157.
Habitat rario in Oceano indico, testa ad 2½ pollices
longa, & ultra 2 pollices lata, cordata manu simillima,
costis obliquis, vulvæ coriata conspicua; sanguineis
guttis interdum varia, nunc utrinque plana, nunc altero
latere concava.

roseum. 3. C. testa cordata anterius lineis, posterius striis paulo
 latioribus conjunctione cordis figuram æmulantibus exa-
 rata, hinc convexa, illinc concava.
Argenv. Conch. t. 23. f. D.
Chenn. Conch. 6. t. 14. f. 147.
Habitat ad insulas Nicobaricas, cardissæ affine, testa ex
albido & roseo varia: vulva cordata.
retusum. 4. C. testa cordata: valvis striatis crenulatis subcarinatis,
 anno lunato cordiformi intus.
v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 3. f. I. 2.

Chemn. Conch. 6. t. 14. f. 139-142.

Habitat in India, Arabia, Aegypto, inter hemicardium & fragum medium, testa interdum ultra 2 pollices longa, & 2 fere pollices lata, crassa laetea, anterius convexa, posterius angustata, plana, quasi truncata: margine plicato-dentato.

Hemicardium. 5. C. testa subquadrilatera: valvulis carinatis, natibus distantibus. *Mus. Lud. Ulr.* 484. n. 33.*

Rumpf mus. t. 44. f. H.

Petiv. aq. amb. t. 17. f. 4.

Gualt. test. t. 83. f. C.

Knorr Vergn. 6. t. 3. f. 2.

Chemn. Conch. 6. t. 16. f. 159-161.

Habitat rarissimum in Oceano indico, cardissæ affine, testa extrinsecus ochroleuca, intus nivea, costarum paucioribus glabris, reliquis nudulosis: fulcis intermediis rugosis excavato-punctatis.

Lithocardium. 50. C. testa cordata subtrilatera, valvis transverse sulcata: anterius longitudinaliter striata. *Mant.* 2. p. 544.

Habitat - - - haecen modo fossile inventum, hemicardio affine, valvis anterius carinatis: carinis crenulatis natibus approximatis, vulva ovata, monte veneris plus niuscule longitudinaliter crenulato striato cum carinali altiore.

lineatum. 51. C. testa cordata carinata, anterius oblique truncata, tenui, glaberrima nivea, aureo striata. margine denticulata. *Kaemm. lab. Rudolst.* p. 210. n. 2. t. 12 f. 4.

Habitat - - - testa ultra pollicem longa.

medium. 6. C. testa subcordata subangulata: valvis angulatis sulcatis laevibus. *Mus. Lud. Ulr.* 485. n. 34.

Cardiorum cardines dentibus lateralibus remotis instruuntur, scorbiculo operculo valvae insertis, dum testa clauditur, multæ species adhuc ignotæ, aut obscuræ: an hoc spectant conchæ à Valentyn *Abh.* t. 16. f. 27. ab Argenville *conch.* 24. f. B. t. 29. f. 20. b. & zoom. t. 6. f. U. deficitæ? ineola ocreæ figuræ apertura duplice laterali tentaculis cincta conspicuum pedem falcatiformem, intus se domumque mouet, testæ valvas tertia (ui parte aperiendo protrudit, intus titio membrana stavo fuscoque undulata clauso).

Antiquata testa nobis, quæ longitudinaliter sulcata, sed transversis sitionibus annulariis intercepta, pedinata, quæ longitudinalis sulcata, vel striata at anterius striis, vel fulcis ad angulum acutum divergentibus, longitudinalis testa a natibus ad marginem, transversalis a natibus ad nates, a margine parallela.

Lift. Conch. t. 316. f. 153.

Bonann. recr. 2. f. 94.

mus. Kirch. 2. f. 91.

Gualt. testac. t. 83. f. B.

Knorr Vergn. I. t. 29. f. 5. 6. t. 20. f. 5.

Spengler. Selt. Conch. t. I. f. k.

Chemin. Conch. 6. t. 16. f. 162-164.

ε) Cardium donaciforme. Schroet. Einl. in Conch. 2.t. 7. f. II.

Chemn. Conch. 6. t. 16. f. 165.?

Habitat in Oceano americano, testa testæ hemicardii satis simili, at maculis spadiceis aut fuscis varia, costis pluribus cum intermediis sulcis laevibus; valvis altero latere, quasi truncatis medio tamen prominentibus, cardinis dente primario unico.

aculea-
tum.

7. C. testa subcordata : fulcis convexis linea exaratis : exterius aculeato ciliatis.

Mus. Lud. Ulr. 485. n. 35. * Cardium muricatum.

Argenv. Conch. t. 23. f. B. Cor bovis.

Lift. Conch. t. 321. f. 158.

Bonann. recr. 2. f. 96. 97.

mus. Kirch. 2. f. 95. 97. 98.

Gualt. test. t. 72. f. A.

Seb. mus. 3. t. 86. f. 4.

Knorr Vergn. 6. t. 3. f. I.

Murr. fund. testac. t. 2. f. 9.

Chemin. Conch. 6. t. 15. f. 155-157.

β) Seb. mus. 3. t. 86. f. 5.

β) Seb. mus. 3. t. 86. f. 8.

δ) v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 3. f. 5.

ε) Bonann. recr. 2. Fn. 93. mus. Kirch. 2. f. 94.

Habitat in mari mediterraneo, echinato proxime affine, testa tamen longe majore, magis convexa, altero latere quasi truncata, marginem versus tamen elevata, ex fusco flava : fasciis interdum obscurioribus pista, cardinidentibus in utraque valva 2, lateralibus in altera valva 2, in altera 3.

echina-
tum.

8. C. testa subcordata sulcata : costis carnitatis aculeatis.

Müll. zool. dan. I. p. 46. t. 13. f. I. 2. t. 14. f. I-4. rar. I. p. 28.

Syst. nat XII. 2. p. 1122. n. 79. Fn. suec. 2139.* Mus.

Lud. Ulr. 486. n. 36. * Müll. zool. dan. prodr. 2971.

Brit. zool. 4. n. 38.

Fabr. Fn. groenl. p. 409. n. 410. Cardium testa subcordata : fulcis exaratis linea ciliari, aculeis in flexis plurimis.

Rondel. test. 22. Worm. mus. p. 253. Aldrov. test. l. 3. c. 4⁵
Concha echinata.

Gesn. musch. p. 43. Concha echinata prima.
Lst. Conch. t. 324. f. 161.

an. angl. t. 5. f. 33.

Bonann. recr. 2. f. 90.

muf. Kirch. 2. f. 88.

Gualt. test. t. 72. f. B.

Klein ostr. t. 10. f. 40.

Seb. mus. 3. t. 86. f. 3.

Coste brit. Conch. p. 167. t. 14. f. 2.

Murr. testac. t. 2. f. 19.

Lesk. Naturg. 3. t. 10. f. 8.

Chemin. Conch. 6. t. 15. f. 158.

β) Seb. mus. 3. t. 86. f. 13.

γ) Bonann. recr. 2. f. 72.
muf. Kirch. 2. f. 71.

Habitat in Oceano septentrionali, testa spadicea : fasciis albis, intus alba, sulcis profundis 20, versus cardinem rugosis, costarum aculeis à medio versus marginem in crescentibus versus cardinem nullis.

ciliare. 9. C. testa subcordata : sulcis elevatis triquetris ; extimis acu-

leato-ciliatis.

Lst. Conch. t. 325. f. 162.

Gualt. test. t. 72. f. C.

Knorr Vergn. 6. t. 5. f. 5.

Chemin. Conch. 6. t. 17. f. 171. 172.

Habitat ad littus Africæ occidentale, costato affine, testis echinata & aculeati minore, tenuiore, fragiliore & magis pellucida, nivea, sulcis transversis rugosis, costis trigonis aculeatis.

ciliatum. 10. C. testa subcordata : sulcis elevatis subtriquetris ciliatis,

O. Fabr. Fn. groenl. p. 410. n. 411.

Habitat sat copiosum in fundo mariis septentrionalis arenoso vel argilloso, echinato affine, testa crassa obliquata, convexa, 19 lineas late, 18 longa, sub epidermide cinerea vel grisea albida, intus alba glabra, sulcis 32-38, undulatim striatis, costis ad carinas ciliatis, medianis convexiusculis lateralibus triquetris.

tuberculata. 11: C. testa subcordata : sulcis obtusis nodosis transversim striatis. Mus. Lud. Ulr. 486. n. 37. *

- Lift. Conch. t. 329. f. 166.
 Bonann. recr. & mus. Kirch. 2. f. 100.
 Rumpf. mus. t. 48. f. 11.
 Gualt. test. 71. f. M.
 Argenv. zoom. t. 6. f. C. D.
 Bytem. app. t. II. f. 39. a?
 Seb. mus. 3. t. 86. f. 7.
 Knorr Vergn. 5. t. 30. f. 2. & 6. t. 8. f. 3.
 Regenf. Conch. I. t. 8. f. 23. 24.
 Chemn. Conch. 6. t. 17. f. 173.
 β) Seb. nius. 3. t. 86. f. 2.
 γ) Seb. mus. 3. t. 86. f. 6.
 δ) Seb. mus. 3. t. 86. f. 14.
 ε) Knorr Vergn. 2. t. 29. f. 4.
 η) Knorr Vergn. 3. t. 4. f. 5.

Habitat in mari mediterraneo, testa varie pīca, utplurimum fusca fasciis obscurioribus, aut alba: fasciis fuscis, valde convexa transverse rugosa: costis 20-23 convexis interdum planiusculis, hinc inde nodosis; altero latere majoribus.

- Iocardia. 12. C. testa cordata: sulcis squamis fornicatis imbricatis.
 Mus. Lud. Ulr. 487. n. 38.*
 Lift. Conch. t. 323. f. 160.
 Bonann. recr. 2. f. 95.
 mus. Kirch. 2. f. 93.
 Rumpf mus. t. 48. f. 9.
 Argenv. Conch. t. 23. f. M.
 Olear. goth. t. 29. f. 3.
 Regenf. Conch. I. t. 5. f. 56.
 v. Born. nius. Cæs. Vindob. test. p. 39. vign.
 Chemn. Conch. 6. t. 17. f. 174-176.
 Habitat in mari americano, testa $2\frac{1}{2}$ pollices longa, $2\frac{1}{4}$ lateris ex cinereo alba, hinc inde rubro maculata aut nebulosa, intus alba, medio purpurea, cardinis dente primario in altera valva unico.

- Fragum. 13. C. testa subcordata subangulata: sulcis notatis lunulis elevatis. Mus. Lud. Ulr. 488. n. 39.
 Rumpf mus. t. 44. f. G. Fragum album.
 Lift. Conch. t. 315. f. 152.
 Bonann. recr. 3. f. 374.
 mus. Kirch. 2. f. 110.
 Petiv. amb. aq. t. 18. f. 21.

- Gault. test. t. 83. f. E.*
v. Born. mus. Caes. Vind. test. t. 3 f. 3. 4.
Schroet. Journ. Naturg. 3. t. 2. f. 6.
Cheinn. Conch. 6. t. 16. f. 166. 167.
 β) *Knorr Vergn. 4. t. 14. f. 5.*
 γ) *Gault test. t. 71. f. N.*
*Habitat in India, medio affine, at testa magis trigona,
 alba, squamis sulphureis, intus nivea, costis planiusculis,
 an mera unedinis varietas?*

- unedo 14. C. testa subcordata : fulcis lunatis coloratis *Mus. Lud.*
Ulr. 488. n. 40.
Argeny. Conch. t. 23. f. N. Fragum.
List. Conch. t. 315. 151.
Bonann. recr. 3. f. 375.
muf. Kirch. 2. f. 109.
Rumpf mus. t. 44. f. F.
Petiv. amb. aq. t. 17. f. 4.
Kalent. abb. t. 16. f. 23.
Gault. test. t. 83. f. A.
Seb. mus. 3. t. 86. f. 12.
Knorr Vergn. 2. t. 29. f. 2.
Regenf. Conch. I. t. 3. f. 25.
Chenn. Conch. 6. t. 16. f. 168. 169.
 β) *Knorr Vergn. 2. t. 29. f. 3?*
*Habitat rario in India. frago valde affine, at testa dupl.
 majore, sulcorum squamis rubris rarioibus, vulvaque
 labio altero alteri incunibente distinctum.*

- murica- 15. C. testa subcordata sulcata lateribus muricata. *Mus.*
 tum. *Lud. Ulr. 489. n. 41.**
List. Conch. t. 322. f. 159. & t. 326. f. 163.
Knorr Vergn. 4. t. 14. f. 5.
Chenn. Conch. 6. t. 17. f. 177. 178.
*Habitat in Oceano americano, praesertim ad sinum
 Campechiensem, testa margine ferrata, cinerea, alba
 aut flavicante spadiceo mixta aut maculata, cardine
 intus virgis 2 rubris.*

- magnum. 16. C. testa oblonga : fulcis angulatis latere ferratis. *Mus.*
*Lud. Ulr. 489. n. 42.**
Chenn. Conch. 6. t. 19. f. 191.
 β) *List. Conch. t. 331. f. 168.*
Bonann. recr. 2. f. 92.
muf. Kirch. 2. f. 90.

- v. Born. mus. Caes. Vind. test. t. 3. f. 6. 7.
Chemn. Conch. t. 17. f. 176.
- γ) Gault. test. t. 71. f. H.
 v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 3. f. 10.
Chemn. Conch. 6. t. 17. f. 180.
- δ) Basket Cockle. Martyn univ. conchol. 2. t. 80.
Habitat in India, β) in Jamaica & insulis Antillis, testa
margine serrata, sulcis 19, 27, 30 transverse rugosis as-
pера, flavescens, intus alba, β) ochroleuca maculis spa-
diceis varia, γ) cinerea maculis nigricantibus conspersa.
- flavum. 17. C. testa subovata sulcata: latere anteriore scabro, pos-
 teriore dentato. *Mus. Lud. Ulr. 490. n. 43.*
Bonann. recr. 2. f. 72.
 mus. Kirch. 2. f. 79.
Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 7. f. II. a. b.
- β) Knorr Vergn. 6. t. 3. f. 5.
 γ) Gault. test. t. 71. f. G.
 δ) Bonann. recr. 2. f. 89.
 mus. Kirch. 2. f. 87.
 ε) Rumpf mus. t. 44. f. E.
Petiv. amb. aq. t. 8. f. 3.
Habitat in India, testa dorso & posterius ut plurimum flava,
interdum maculata, ceterum, intus quoque, alba; costis
circiter 27 convexis, quarum 5-6 anterius spinis acutis,
12-13 posterius tuberculis planis scabre, reliquæ laves.
- læviga-
tum. 18. C. testa obovata: striis obsoletis longitudinalibus. *Mus.*
*Lud. Ulr. 490. n. 44.**
Lift. Conch. t. 249. f. 83.
Gault. test. t. 82. f. A.
Knorr Vergn. 2. t. 20. f. 4. 5. t. 10. f. 7. & 6. t. 6. f. 1.
Chemn. Conch. 6. t. 18. f. 189.
 β) Kaenmer Conch. Rudolst. p. 210. t. 12. f. 4?
 γ?) Eggeockle. Mart. univ. conch. 2. t. 79.
Habitat in mari atlantico, & americano, flavo affine;
testa glabra, margine intus serrata, ultra 2 pollices
longa, 1½ lata, sulphurea, aurantia, rubra, variegata,
alba, alba flavo, aut rubro mixta, aut fasciis transversis
flavis picta; β) nivea anterius rubella, intus a cardine
deorsum maculis duabus purpureis oblongis, exterius
lineis auricis picta, tenui utrinque glabra.
- ferratum. 19. C. testa obovata lævi: striis obsoletis, margine interiore
 ferrato. *Mus. Lud. Ulr. 491. n. 45.**

Chemn. Conch. 6. t. 18. f. 185. 186.

Habitat in mari mediterraneo & indicō, lēvigate minō testa flava minus convexa, & obsoletius striata, marginali exteriore crenulato, natibus regularibus.

edule. 20. *C. testa antiquata* : fulcis viginti sex obsolete recurvatis imbricatis. *Fn. succ. 2141. It. oel. 42. Müll. Zool. dan. prodr. 2972.*

Bast. op. subs. 2. p. 72. t. 8. f. 3. 4.

List. Conch. t. 333. f. 170. & t. 334. f. 171.

an. angl. t. 5. f. 34.

Gualt. test. t. 71. f. F.

Knorr Vergn. 6. t. 8. f. 2. 4.

Chenin. Conch. 6. p. 141. Vign. 4. f. C. & t. 19. f. 195.

Habitat frequentissimum in Oceano europaeo, mari baltico, caspio, mediterraneo, testa non admodum convexa, sordide alba, rarius cærulea, aut flava, fulcis ad transverse striatis rugosisque; incola esculentus.

islandicum. 21. *C. testa fulcata* : costis ad triginta sex triquetris lævibus.

Chenin. Conch. 6. t. 19. f. 195.

Habitat in Islandia & Groenlandia, eduli perquam affinitat fulcis testæ pluribus & profundioribus, striis transversis, præter marginem exteriorem, nullis distinctum; testa sordida nigricante, nonnunquam fasciata.

groenlan- dicum. 22. *C. testa antiqua glabra tenui murina* : lineis angulis ferrugineis picta, margine glabra : striis longitudinalibus obsoletis.

Chenin. Conch. 6. t. 19. f. 198.

Habitat in Groenlandia & Islandia, testa ad $2\frac{1}{2}$ pollicis longa & ad $3\frac{1}{2}$ pollices lata, fasciis interdum fusco centibus picta; an mera edulis varietas?

rusticum. 23. *C. testa antiquata* : fulcis viginti remotis ; interstiti rugosis.

Regenf. Conch. 1. t. 12. f. 77. 78.

Chenin. Conch. 6. t. 19. f. 197.

Habitat in maribus europeis, præcipue mediterraneis etiam caspio, eduli affine, at testa anterius valvis clavis carinata, ano evidente, sed angusto, fulcis profundioribus, costis paucioribus magis convexis distinatum, testa nunc ferruginea fasciis lividis, alba, anterius fusca intus cærulecente, nunc nigris fasciis ferrugineis flavicantibus aut cærulecentibus.

- glaucum.* 52. C. testa subantiquata anterius glauca : fulcis viginti posterius retrorsum imbricatis, natibus violaceis. *Poiret* *voyag. en barbar. 2. p. 13.*
Habitat ad Barbariae littora, ad 10 lineas altum, 11 $\frac{1}{3}$ latum, & 8 profundum.
- pectina-* 24. C. testa subcordata pectinata. *Mus. Lud. Ulr. 492. n. 47.**
Murr. fund. testac. t. 2. f. 18.
Habitat in mari mediterraneo, testae albæ striis distantibus sursum scabris, cavitate sub umbone flava, anō ovato impresso : marginibus prominulis.
- virginea-* 25. C. testa triangulo rotundata æquilatera : rugis transversis membranaceo recurvatis, cardinibus cæruleis.
β) Chemn. Conch. 6. t. 18. f. 181.
Gronov. zooph. t. 18. f. 5.
Habitat in mari mediterraneo, β) in indicō & americano, cardinis dentibus lateralibus ad macras accedens, testa pulchella, fasciata, epidermide glauca obtecta, intus, alba, β) testa tenui fragili longitudinaliter striata, anterius & ad vulvam purpurea, ad umbonem rubra.
- trilobite-* 26. C. testa trianguli gibba striata.
Habitat in mari caspio, an distincta species?
- Auricula.* 27. C. testa cordata subrhombaea : costis utrinque viginti quatuor; fulcis subtilissime crenulatis, natibus distantibus.
Forsk. Fn. arab. p. 122. n. 52.
Regenf. Connh. 2. (ined.) t. 9.
Habitat in Arabia & Ægypto, testa, alba pellucida 2 $\frac{1}{4}$ pollicem longa, 1 $\frac{1}{4}$ lata, dorſi margine revoluto dentato.
- trile.* 28. C. testa ovata laevi ; rima anoque striatis. *Syst. nat. X.*
I. p. 680. n. 74. Mus. Lud. Ulr. p. 491. n. 46.
Habitat - - - testa laevi exolete cinerea, albo radiata, natibus reflexis.
- monstro-* 29. C. testa gibba altero latere impressa ochroleuca, altero convexa cordata albida flavo maculata, valvis dentato carinatis.
Chemn. Conch. 6. t. 14. f. 149. 150.
Habitat rarissimum ad insulas Nicobaricas.
- Lima,* 30. C. testæ gibbae costis acculeatis : anterioribus tuberculis membranaceis recurvatis ad latera crenatis, fulcis intermediis granulatis.

Chemn. Conch. 6. t. 15. f. 153. 154.

§) *Chemn. Conch.* 6. p. 161.

Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 7. f. 13. a. b. *Cardium coronatum.*

Habitat ad insulas Nicobaricas, testa ochroleuca: margini anteriori incarnato, umbone rubello; in β) copio magis rotundatis, non aculeatis, sed granulatis.

ringens. 31. *C. testa rotunda ventricosa alba: marginis dentibus profundis: anterioris roseis.*

Lift. Conch. t. 330. f. 167.

Adans. Seneg. t. 18. f. 1.

Knorr Vergn. 4. t. 14. f. 3. & 6. t. 3. f. 4.

Chemn. Conch. 6. t. 16. f. 170.

Habitat ad Africæ littus, & in mari americano.

papyra- 32. *C. testa pellucida cinerea: striis longitudinalibus tenuibus.*

Chemn. Conch. 6. t. 18. f. 184.

Habitat in India, testa fragillima, intus alba & purpurascenti maculata.

æolicum. 33. *C. testa crassa: striis anterioribus longitudinalibus posterioribus transversis.*

Lift. Conch. t. 314. f. 150.

Bonann. recr. 2. f. 91.

mus. Kirch. 2. f. 89.

Argenv. Conch. t. 21. f. A.

Knorr Vergn. 5. t. 26. f. 1. 2. t. 27. f. 3.

Chemn. Conch. 6. t. 18. f. 187. 188.

Habitat ad Guineæ & insularum Antillarum littore, valde convexa, ex albo & rubello varia.

oblon- 34. *C. testa flavicante oblonga turgida costata anterius glabra cordata margine crenata.*

Chemn. Conch. 6. t. 19. f. 190.

v. *Born. mus. Caes. Vind. test.* t. 3. f. 8.

Habitat in mari mediterraneo, testa ad 3 pollices longa & 2½ fere lata; costis 30.

crassum. 35. *C. testa subfuscata oblongiuscula crassa antiquata: marginis dentibus profundioribus.*

Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 7. f. 12.

§) *Lift. Conch.* t. 332. f. 169.

Habitat in mari mediterraneo & septentrionali, oblonga, affine, at testa multo majore, minus angusta, crassi, costis planioribus circiter 23 distinctum.

- latum. 36. C. testa lata inaequilatera intus alba : costis magnis planis spinulosis.
Chemin. Conch. 6. t. 19. f. 192. 193.
Knorr Vergn. 6. t. 7. f. 6.
v. Born mus. Caes. Windob. test. t. 3. f. 9.
Habitat rarius Tranquebariae & ad insulas Nicobaricas,
testa 2 pollices longa, 2½ lata, nunc vertice alba,
medio flavicante, margine flava, nunc vertice fusco-
varia, ceterum flavicante : fasciis nonnullis fasciis.
- riguum. 37. C. testa oblongiuscula inaequaliter costata subfuscata.
List. Conch. t. 317. f. 154.
Habitat - - - minutum, an distincta species?
- macula-
tum. 38. C. testa maculata confertim undulato-rugosa : costis
latis sulcis angustissimis intus dilute rubella.
List. Conch. t. 328. f. 165.
Habitat in sinu Campechiensi, testa 3 fere pollices longa,
3⅔ lata.
- flexuo-
sum. 39. C. testa rotundata fusca : costis flexuosis, sulcis rugosis,
List. Conch. t. 343. f. 180.
Habitat - - - testa 1¼ pollices longa, & fere æque lata.
- fluviatile. 40. C. testa planiuscula crassa alba : costa planioribus.
List. an. angl. p. 187. t. 5. f. 32.
Habitat rarissimum ad ostium fluvii Angliae Tees.
- gadita-
num. 41. C. testa rotundata flavicante albo, rubro viridi fusco-
que varia decussatim striata.
Bonann. recr. 2. f. 63.
muf. Kirch. 2. f. 62.
Habitat in mari Gaditano, utrum hujus generis, an arcae?
- brasilien-
se. 42. C. testa rotundata : costis latis planis minutissime cre-
natis.
Bonann. recr. 3. f. 395.
muf. Kirch. 2. f. 117.
Habitat frequens ad Brasiliæ littora.
- amboi-
nense. 43. C. testa oblongiuscula alba nigricante-maculata : costis
valde convexis.
Bonann. muf. Kirch. 2. f. 129.
Habitat ad Amboinæ littora, testa 1½ pollices longa :
costis circiter 12.

- squamo- 44. C. testa cordata æquilatera ex albo fulvida intus purp^{ur}sum.
Gualt. test. t. 71. f. N.
Habitat - - - frago affine, at dentibus ad margin^m testæ anteriorem nullis.
- cancella- 45. C. testa subrubra tenui rotundata decussatim striat^atum.
Gualt. test. t. 75. f. B.
Habitat - - - exiguum.
- rubigino- 46. C. testa rubella inæquilatera : costis convexis trist^{ri}sum.
Gualt. test. t. 83. f. D.
Habitat - - -
- albidum. 47. C. testa inæquilatera costata subalbida intus purp^{ur}sum.
Gualt. test. t. 83. f. H.
Habitat - - - pusillum.
- virescens. 48. C. testa inæquilatera oblonga : costis subtilibus; fusi^fduplicatis.
Gualt. test. t. 84. f. A.
*Habitat - - - testa fragili pellucida, ex albido viride
cente, maculis roseis interdum varia, intus argenteo.*
- fasciatum. 49. C. testa rotundata albida : fascia fusca, costis acutis.
Knorr Vergn. 6. t. 8. f. 3.
Habitat - - - cardine exterius fusco & cinereo.

307. MACTRA. *Animal Tethys.*

*Testa bivalvis, inæquilatera
æquivalvis.*

*Cardo dente medio complicatus
cum adjecta foveola, lateris
libus remotis insertis.*

- Spengle- 1. M. testa lævi : vulva plana, rima lunula hiantem.
Chemn. Conch. 6. t. 20. f. 199-201.
Spengl. catal. t. 3. f. 1-3.
Schroet. Litter. I. f. 4-6.
*Habitat ad Caput Bonae Spei, testa manus fere magnitudine
subhante, pallida, subdiaphana, subtriangulari, 2½ pol.*

lices longa, 3½ lata, latere anteriori subcarinata a limbis distincta, posteriori planiuscula striata, vulva ad nates incurvas lunata, acuta, tota hiante in fossulam cardinis, cuius dentes laterales trianguli. L. Spengler.

plicataria. 2. M. testa transverse rugosa plicata diaphana, vulva planiuscula, ano compresso oblongo.

Chemin. Conch. 6. t. 20. f. 202 - 204.

Habitat in Oceano indico, testa ovi latitudine, 1-1¼ pollices longa, 1½ - 2½ pollices lata, alba, papyri instar tenui, vulva anoque levibus lanceolatis, illa planiuscula, carina ab umbonibus distincta, hoc magis impresso, magis ovato, natibus incurvis recurvatis, cardinis dentibus lateralibus ex membranis 2 parallelis.

papyracea. 3. M. testa pellucidissima alba convexa anterius subhiante subtiliter striata & costata.

Chemin. Conch. 6. t. 23. f. 231.

Habitat rarissima ad insulas Nicobaricas, plicatariæ affinis, at testa magis convexa & inaequilatera, ad tellinas accedens, sed cardine maëtræ.

striatula. 4. M. testa levi diaphana : umbonibus substriatis, vulva levi impressa carina circumscripta.

Gualt. test. t. 85. f. F.

Knorr Vergn. 6. t. 34. f. I.

Chemin. Conch. 6. t. 21. f. 205. 206.

Habitat in mari mediterraneo, & ad littus Coromandel, testa alba, ad 2½ pollices longa, & 3 lata, subtriangularis, satis convessa, anterius subhiante : vulva lanceolata, umbonibus striatis.

striata. 5. M. testa crassa triangulari striis validis levibus confertis arcuatis exarata.

Chemin. Conch. 6. t. 22. f. 222.

Habitat --- testa alba, intus & ad umbones glabra

rotunda- ta. 6. M. testa obtuse trigona albida, umbone lacteo-fasciato, natibus vulva & margine interiore atque anteriore subviolaceis.

Lift. Conch. t. 263. f. 99.

Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 8. f. I.

β) *Lift. Conch. t. 264 f. 100?*

Habuit --- glabratae affinis, at testa 1½ pollicis lon-

ga & $1\frac{1}{2}$ pollicis lata, anterius angustiori striis subtilioribus exarata: margine tamen glaberrimo.

glabrata. 7. M. testa lœvi diaphana striata, umbonibus lœvissimis vulva quoque striatis.

Gualt. test. t. 71. f. A.

Chenin. Conch. 6. t. 22. f. 216. 217.

Habitat in Oceano africano & indico, testa alba, $1\frac{1}{2}$ pollicem longa, & 2 pollices lata, natibus levibus; linibo striato, vulva nulla carina distincta.

nitida 8. M. testa nivea nitente crassa diaphana lœvi, vulva carinata distincta quoque convexiusculis striatis.

Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 8. f. 2. 3. p. 88.

Habitat — — glabratae affinis, at testae natibus levibus magis distantibus, rimaque triangulari distincta testa triangulari.

corallina. 9. M. testa lœvi subdiaphana alba: fasciis lacteis.

Bonann. recr. 2. f. 53.

nus. Kirch. 2. f. 52.

Rondel. test. I. p. 32. l. 33.

Klein ostr. t. 12. f. 80.

Gualt. test. t. 71. f. B.

Planc. Conch. t. 3. f. 4?

Chenin. Conch. 6. t. 22. f. 218. 219.

Habitat in mari mediterraneo, & ad Guineæ littore testa 2 pollices lata, $1\frac{1}{2}$ longa, triangulari, anno vulva que obusis, natibus non antiquis, rinia triangulari.

lactea. 10. M. testa tenui turgida pellucida alba anterius subtiliter sime striata: fasciis lacteis.

Chenin. Conch. 6. t. 22. f. 220.

Habitat rario in Oceano indico, corallinæ affinis, testa tenuiore, magis convexa, anteriori planiuscula: margine obtuso.

stultorum. 11. M. testa subdiaphana lœvi obsolete radiata intus purpurea, rascente, vulva gibba.

Syst. nat. X. p. 681. n. 8. Cardium stultorum.

Adans. seneg. t. 17. f. 16. Lisor.

List. Conch. t. 251. f. 85.

Gualt. test. t. 71. f. C.

Knorr Vergn. 6. t. 5. f. 1.

Murr. fund. testac. t. 2. f. 10.

v. Born. mus. Caes. Vind. test. p. 50. vign.

Chemin. Conch. 6. t. 23. f. 224 - 227.

Habitat in mari mediterraneo, atlantico & americano,
testa valde convexa, ceterum satis trigona, fusca, tes-
tacea, cinerea, (ut plurimum obsolete) radiata.

grandis.

12. M. testa subdiaphana laevi cervina pallide radiata :
umbone & cardine extra medium positis.

Chemin. Conch. 6. t. 23. f. 228.

Habitat rarissima - - - m. flultorum affinis, at testa
majore $2\frac{1}{4}$ pollicis longa, $3\frac{1}{4}$ lata, angulo extremo sub-
hiante, latere anteriore productiori.

folida.

13. M. testa opaca laeviuscula subantiquata. Müll. zool.
dan. prodr. 2973.

Fn. suec. 2140. Cardium solidum.

Lift. Conch. t. 253. f. 87. 88.

an. angl. t. 4. f. 24.

Bonann. recr. 2. f. 51. 52.

mus. Kirch. 2. f. 50. 51.

Klein ostr. t. 10. f. 42.

Rondel. test. 1. c. 7.

Knorr Vergn. 6. t. 8. f. 5.

Chemin. Conch. 6. t. 23. f. 229. 230.

β) Chemin. Conch. 10. t. 170. f. 1656.

Habitat frequentissima in Oceano europeo, testa crassa, alba,
flavescente, cinerea aut fusca, subantiquata, non raro
cingulis lacteis aut fasciis cæruleis aliisve picta, cardi-
nis dentibus lateralibus minus, quam in congeneribus,
elongatis, faveola majore, & dente intermedio minore.

lutraria.

14. M. testa ovali oblonga laevi, dentibus lateralibus nullis.
Mya lutaria. Fn. suec. 2128. Mus. Lud. Ulr. 470. n. 9.

Lift. Conch. t. 415. f. 259.

an. angl. p. 170. t. 4. f. 19.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 2. f. 19.

Rumpf mus. t. 45. f. M.

Gault. test. t. 90. f. A. 2?

Chemin. Conch. 6. t. 24. f. 240. 241.

Habitat ad ostia fluviorum Oceani europæi, testa utrinque
hincante, $2\frac{1}{4}$ pollices longa, $4\frac{1}{4}$ lata, robusta, sordida
alba, antiquata, natibus convergentibus

Cygnus. 15. M. testa nivea crassa trilatera subtiliter transversim striata, anterius planiuscula subtiliter rugosa, ano lato impresso cordato tenuiter striato.

Chenn. Conch. 6. t. 21. f. 207.

Habitat rarissima ad Tranquebariae littora, testa pollicem longa, & ultra pollicem lata.

maculata. 16. M. testa obtuse trigona laevitenui pellucide spadiceo maculata, intus alba tenuissime striata; ano cordato impresso.

Chenn. Conch. 6. t. 21. f. 208.

Habitat rarissima in Oceano indicō, testa circiter 1½ pollicem longa, & 1¼ lata.

turgida. 17. M. testa inflata obsolete striata ochroleuca intus alba natibus distantibus purpurascentibus, cardinis dente supernumerario triangulari dupliciti.

Chenn. Conch. 6. t. 21. 210. 211.

Habitat ad Tranquebariae littus, testa ad 2½ pollices longa, 3½ lata tenui, subpellucida, anterius & posterius subtiliter striata & rugosa.

violacea. 18. M. testa tenui obsolete radiata subtiliter transversim striata, vulva anque albidis, cardinis dente supernumerario dupliciti triangulari.

Chenn. Conch. 6. t. 22. f. 213. 214.

Knorr Vergn. 6. t. 5. f. 2?

Habitat ad Tranquebariae littus, testa 2 fere pollices longa, 3 lata, tenera, fragili, hinc inde hianie, vulva oblongae margine elevato rugoso.

cuneata. 19. M. testa cuneata cærulea subtiliter transversim striata marginē intus crenulato.

Chenn. Conch. 6. t. 22. f. 215.

Habitat - - - violacea proxime effinis, at testa minor pollicem lata, vix pollicem longa, rarius nivea.

glaуca. 20. M. testa ovata sordide alba glauco radiata subtilissime transversim striata anterius rugosa.

v. Born mus. Caes. Wind. test. t. 3. f. 11. 12.

Chenn. Conch. 6. t. 23. f. 232. 233.

Habitat in mari mediterraneo, testa 2½ pollices longa, 3½ lata: natibus retrorsum versis; rima intermedia angusta,

pellucida. 21. M. testa ovata tenui pellucida alba inæqualiter rotundata, versim striata.

Chern. Conch. 6. t. 24. f. 234.

Habitat ad Guineæ littus, testa fragili, 1½ pollicem longa, 2 lata, antrorsum produciore & paulisper hiante.

fragilis.

22. M. testa ovata tenui lævi pellucida planiuscula, vulva transversim striata rugosaque.

Chern. Conch. 6. t. 24. f. 235.

Habitat ad insulas Nicobaricas, pellucidæ affinis, testa anterius hiante subplicata: margine acuto antrorsum subangulato posterius rotundato.

rugosa.

23. M. testa ovata sordide alba, striis elevatis longitudinalibus transversas magis elevatas decussantibus.

Chern. Conch. 6. t. 24. f. 236.

Habitat in Oceano europæo, testa 2½ pollicis longa, 2½ lata, crassa, intus magis albæ.

nicobari-

24. M. testa ovata tenui pellucida anterius lævi, posterius cancellatim striata.

Chern. Conch. 6. t. 24. f. 237.

Habitat ad insulas Nicobaricas.

compla-

25. M. testa ovata tenui arcuatim plicata: plicis transversim striatis, dentibus lateralibus nullis.

Chern. Conch. 6. t. 24. f. 238.

Habitat in Oceano indico, testa alba aut cærulecente pollicem longa, 2½ lata.

Listeri.

26. M. testa tenerima subrotunda albida: foveola dentis cardinis triangularis ampla pyriformi.

List. an. angl. t. 4. f. 23.

Habitat ad ostium fluvii Angliae Tees, testa 1½ pollicem longa, 2 lata.

piperata.

27. M. testa ovata compressa transverse striata: dentibus minimis; foveola magna obliquata. *Poiret voyage en Barbar. 2. p. 15.*

Bellon. aq. p. 404. Piperata chama latinis.

Aldrov. exang. p. 421. Chama piperata Bellonii.

Planc. Conch. p. 32. Tellina vilior.

Adans. Conch. p. 232. t. 17. f. 18. Calcinella.

Chern. Conch. 6. t. 3. f. 21. Mya hispanica.

Petiv. gazoph. t. 9. f. 3.

Habitat in mari mediterraneo, 21 circiter lineas lata, 17 alta, 7 profunda.

308. DONAX. *Animal Tethys.*

Testa bivalvis: margine (sæpe) crenulato; antico obtusissimo.

Cardo dentibus duobus; margina lique solitario (rarius duplice, triplici aut nullo) subremoto sub ano.

Scortum. 1. D. testa triangulo - cordata, vulva plana. *Mus. Lud.*
*Ulr. 493. n. 48.**

Lift. Conch. t. 377. f. 220.

Argenv. Conch. t. 21. f. L.

Knorr Vergn. 6. t. 7. f. 7?

v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 4. f. I. 2..

Chemin. Conch. 6. t. 25. f. 242 - 247.

Habitat in Oceano indico, testa cinerea hinc inde violacea mixta, intus præter umbonem violaceum nivea, cardinis dente marginali altero sub valva posito, in alterutra valva dupliciti: foveola intermedia.

pubescens. 2. D. testa anterius spinis ciliata.

Rumpf mus. t. 42. f. F?

Chemin. Conch. t. 25. f. 248.

Habitat rario in Oceano indico, testæ colore interno cædiniisque structura scorto similis, at testa extrinsecus cinerea aut cinereo albida argute decussatim striata, anterius plana: laterum angulo carinata, valva hianit ovata: nymphis nudis ano ovato - oblonga.

rugosa. 3. D. testa anterius rugosa gibba: marginibus crenatis. *Mus.*

*Lud. Ulr. 494. n. 50.**

Adanson Seneg. t. 18. f. I. Paman.

Lift. Conch. t. 375. f. 216.

Bonann. recr. 2. f. 37. 38.

muf. Kirch. 2. f. 36. 37.

Gualt. test. t. 89. f. F.

Argenv. Conch. t. 22. f. L.

Klein ostrac. t. 11. f. 61.

Seba mus. 3. t. 86. f. 10. 11.

Chemin. Conch. 6. t. 25. f. 250-252. & p. 242. Vign.

Schruct. Journ. 3. t. 2. f. 9.

Habitat in mari mediterraneo, atlantico, americano, varietas rarissima major in indico, testa ut plurimum $\frac{3}{4}$ pollicis longa, $1\frac{3}{4}$ lata, vario colore conspicua, frequenter fasciata, intus violacea & alba, dente marginali nullo.

Trunculus. 4. D. testa anterius laevi intus violacea: marginibus crenatis. *Fn. suec 2142. Mus. Lud. Ulr. 494. n. 51. Müll. zool. dan. prodr. 2974.*

Adans. Seneg. t. 18. f. 2. Gafet.

Lift. Conch. t. 376. f. 217.

an. angl. t. 5. f. 35.

Bonann. recr. 2. f. 47.

mus. Kirch. 2. f. 48.

Gualt. test. t. 88. f. O.

Bytem. app. t. 11. f. 39. b.

Knorr Vergn. 1. t. 7. f. 7.

v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 4. f. 3. 4.

Chemn. Conch. 6. t. 26. f. 253. 254.

Habitat frequens in mariibus europæis, etiam atlantico & europæo, testæ colore externo vario, striis perpendiculariibus subtilissimis.

Atria. 5. D. testa anterius obtusissima: undique striata: margine dentieulato, vulva ovata.

Knorr Vergn. 6. t. 28. f. 8.

Habitat in europæ australis Oceano, testa alba, & tota, exceptis natibus, gibba, magis, quam in congeneribus.

denticula- ta. 6. D. testa anterius obtusissima: labiis transverse rugosis margine denticulato, nymphis dentiformibus.

Adans. Seneg. t. 18. f. 3. Nafar.

Lift Conch. t. 376. f. 218. 219.

Gualt. test. t. 89. f. D.

Knorr Vergn. 2. t. 23. f. 2. 3.

Chenin. Conch. 6. t. 26. f. 256. 257.

β) Knorr Vergn. 2. t. 23. f. 4. 5.

Habitat frequens in mari mediterraneo, atlantico, americano, testa cuneiformi, laevi, longitudinaliter punctato-striata, alba albida, aut cærulesciente, (λ. framinea, vulva centro cæruleo, intus violacea) radiis fasciisve cærulescensibus interdum picta, intus albicante, vulva subrotunda minima, dente cardinis marginali. altero sub vulva.

cuneata. 7. D. testa cuneiformi: marginibus integerrimis. Mus. Lud. Ulr. 495. n. p. 52.

Lift. Conch. t. 392. f. 231?

Knorr Vergn. 6. t. 7. f. 3.

v. *Born mus. Caes. Vind. test.* p. 52. vign.

Chemn. Conch. 6. t. 26. f. 260.

β) *Knorr Vergn.* 6. t. 7. f. 7.

γ) *Chemn. Conch.* 6. t. 26 f. 267?

Habitat in Tranquebariae littore, testa alba interdum cæruleo radiata (β flava aut rufa margine violacea) complanata, pollicem longa, & $1\frac{1}{4}$ lata, anterius transversim rugosa: lineis perpendicularibus rugas decussantibus, ceterum subtiliter decussatim striata, intus vittacea & alba.

Faba. 8. D. testa gibba subtiliter transversim striata, flavicante maculata: umbonis apice & fascia ad marginem externum integerrimum cærulecentem, hac radio albo intercepta.

Chemn. Conch. 6. t. 26. f. 266.

Habitat --- scriptæ affinis, at testa crassiore, natibus versus vulvam flexis, rima nulla, labiis clausis distincta.

Scripta. 9. D. testa ovata compressa lævi, scripta lineis purpureis undatis: rima acuta, marginibus crenulatis. *Mus. Lud.* Ulr. 495. n. 53. *

Adans. Seneg. t. 17. f. 31. Sunet.

Lift. Conch. t. 379. f. 222. & t. 380. f. 223.

Bonann. recr. 2. f. 43.

mus. Kirch. 2. f. 42.

Rumpf mus. t. 43. f. L. M.

Petiv. amb. aq. t. 2. f. 7. & t. 18. f. 5.

Gualt. test. t. 88. f. Q.

Klein ostr. t. 11. f. 59.

Knorr Vergn. 6. t. 7. f. 4. 5.

Murr. fund. test. t. 2. f. 5.

Chemn. Conch. 6. t. 26. f. 261-265.

β) *Lift. Conch.* t. 381. f. 224.

Habitat frequens ad littora Malabariæ & insularum Xylæ nearum, testæ lineis angulatis, rubellis, cærulecentibus aut fusco-pictæ cardine ad veneres propius accedens.

Au distinda hujus generis species est, quam Argenville zoomorph. t. 5. f. M. depingendam curavit? Ad hoc genus referas quoque testas a Chemizio. *Conch.* 10. t. 172. 1668. 1669. depicatas.

- muricata.* 10. D. testa ovata : striis muricatis, margine denticulato.
Mus. Lud. Ulr. 496. n. 54.*
Habitat in Oceano indicō, testa gibba rufescēte : rimā hiante antropsum utrinque dente compressō terminata, ano nullo.
- Irus.*
11. D. testa ovali rugis membranaceis erēctis striatis cincta.
Gualt. test. t. 95. f. A.
Chemn. Conch. 6. t. 26. f. 268 - 270.
Habitat in mari mediterraneo, cardine veneribus propior, testa phaseoli magnitudine alba, anterius obtusissima rugosa : rugis arcuatis, reflexo-erēctis sere crīspis ; exterioribus sensim anterioribus majoribus.
- lævigata.* 12. D. testa anterius obtusa ad latera obsolete striata, ex vidi flavicante intus & ad nates violacea, margine integerrimo, cardinis dente marginali nullo.
Chemn. Conch. 6. t. 25. f. 249.
Habitat rarior ad Tranquebar, testa 6 lineas ultra pollicem longa, & 3 ultra 2 pollices lata, vulva anique labiis subincumbentibus.
- spinosa.* 13. D. testa nivea intus cærulescente posterius lævi perpendicularly striata, anterius truncata tenerime cancellata, angulis subspinosis.
Chemn. Conch. 6. t. 26. f. 258.
Habitat rarissima ad Tranquebariae littus, natibus glabris, cardine rugosam referens.
- incarna-*
ta. 14. D. testa incarnata anterius truncata reticulatim striata rugosaque, posterius cuncta striis tenerimis perpendicularibus exarata.
Chemn. Conch. 6. t. 26. f. 259.
Habitat Tranquebariae, testa interdum fasciis transversis flavicantibus hinc inde picta.
- argentea.* 15. D. testa ovali lævi oleaginea intus argentea : marginis dentibus prope cardinem elationibus acutis.
Gualt. test. t. 86. f. R.
Habitat - - -
- bicolor.* 16. D. testa ovata striis elevatis, pauciores transversas decusfantibus exarata rufa : radio in altero latere albo.
Gualt. test. t. 88. f. S.
Habitat - - -

- radiata. 17. D. testa striis consertis arcuatis transversis extrinsecus perpendicolaribus intus, rugis anterius inæquali fuscus hyalino maculata.
Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 104. t. 8. f. 3.
Habitat Tranquebariae, testa pollicem fere lata, & ultra longa, anterius minus obtusa radiis 2 albis picta, posterius rotundata: limbo albo, intus nivea luceo & ceras lescente maculata, cardinis dente medio in altera valva unico obtuso, marginali in utroque duplice, margine integerrimo.
- straminea. 18. D. testa striis tenerimis perpendicolaribus anterius costatas transversas decussantibus exarata straminea: fasciis transversis obscurioribus: margine spadiceo posterius integerrimo.
Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 105. t. 8. f. 4. a. b.
Habitat - - - testa ultra pollicem longa & $\frac{3}{4}$ lata intus incarnata, antrorum violacea: parte anteriori limbo lato subconvexo distincta, natibus rubellis, cardinis dentibus marginalibus in utraque valva 2.
- candida. 19. D. testa tota candida striis teneris rarioribus arcuatis transversis antrorum obliquis, cardinis dentibus mediis tribus obliquis, margine integerrimo.
Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 105. t. 8. f. 5.
Habitat Tranquebariae, testa $\frac{3}{4}$ fere pollicis longa, & paulo latiore, tenui, fragili, inter ovatam & cuneatam quasi media, anterius medio elevatori, striis marginem versus in rugas abeuntibus.

309 VENUS. Animal Tethys.

Testa bivalvis; labiis margine antico incumbentibus.

Cardo dentibus tribus: omnibus approximatis; lateralibus apice divergentibus.

Vulva & Anus distincta.

* *Pubentes.*

- Dione. 1. V. testa subcordata transverse sulcata, pube spinosa, *Muj.*
*Lud. Ulr. 497. n. 55.**
Lift. Conch. t. 307. f. 140.

Bonann. mus. Kirch. 2. f. 121.
Rumpf mus. t. 48. f. 4.
Olear. mus. 29. f. 4.
Pet. gaz. t. 31. f. 9.
Lochner mus. Besler. t. 21. f. 11.
Gualt. test. t. 76. f. D.
Lesser testaceoth. f. 134.
Argenv. Conch. t. 21. f. I.
Murray fund. testac. t. 2. f. 11. 16. 17.
Knorr Vergn. I. t. 4. f. 3. 4.
 delic. nat sel. t. B. V. f. 9.

v. *Born. mus. Caes. Vind. test. p.* 57. *vign. f. a.*
Chemin. Conch. 6. t. 27. f. 271-273.
Schroet. Litterat. I. f. I. 2.
Habitat rarioꝝ & pretiosa in Oceano americano.

Venerem filiam Dionis s. e concha maris natam finxere poëtæ; hujus typus præcipue determinabit concharum partium metaphoricam denominationem.

TESTA bivalvis, æquivalvis, semicordata, rotundata, subincarnata, posterius & anteriorius magis gibba umbonibus undique exaratis striis transversis, distantibus, parallelis, marginatis, subrecurvatis æqualibus: exterioribus obtusisribus, posterius alternis acutioribus acutioribusque & abbreviatis minoribus. INTUS lævis, alba, subumbonibus fornicate. CARDI SINISTRÆ tridentatus: dentibus approximatis scrobiculo distinctis; denticulo intermedio compresso, angustiore: lateralibus divergentibus crassiusculis obtusis. Dextræ cardo denticulis duobus approximatis compressis inter scrobiculos duos. MARGO ambitus obtusissimus integerrimus. NATES recurvatae, obtusisculæ, apice glabrae. ANUS impressus, ovatus, lævis, incarnatus. Anteriorius Pubesciliaris, utrinque, e natibus ad summum montis veneris, cingens vulvam spinis e striis alternis tertiiſve testæ oriis, subulatis, depressoſ, ascendiſtibus, antrorsum arcuatis, subtus canalicularis, superioribus sensim longioribus, longissimis longitudine ipsius rimæ. VULVÆ regio incarnata, oblique striata sursum a rimæ ad pubem. Labia læviora, incarnata, inclusa fascia pallida, armata, a natibus ad medium rimæ aculeis utrinque quinque brevissimis; margo vulvæ supra rimam connivet fulco longitudinali, intra quem sinistræ margo gibbosor se insinuat. Rima lanceolata, hians labris prominulis, clausa hymene. NYMPHÆ cartilagineæ, retractiores, longitudine rimæ.

- Paphia. 2. V. testa subcordata : rugis incrassatis , pube rugis
nuatis , labris complicatis.
Lift. Conch. t. 279. f. 116.
Bonann. recr. 2. f. 75.
mus. Kirch. 2. f. 72.
Rumpf mus. t. 48. f. 5.
Valent. Abh. t. 16. f. 29?
Spengl. selt. Conch. t. I. f. I.
Gualt. test. t. 85. f. A.
Argenv. Conch. t. 21. f. B.
Knorr Vergn. 2. t. 28. f. 2. & 6. t. 3. f. 6. & t. 6. f.
Regenf. Conch. I. t. 7. f. II.
Chemn. Conch. 6. t. 27. f. 274-276.
 $\beta)$ *Chemn. Conch.* 6. t. 27. f. 277.
 $\gamma)$ *Knorr Vergn.* 6. t. 5. f. 6.
Habitat ad insulas Americae oppositas , testa alba : marginis striis , nebulis , anterius lineis angulatis subfuscis , ultra 2 pollices longa , 1 $\frac{3}{4}$ lata , ano fuso , costis versus latis convexis.

- Marica. 3. V. testa subcordata decussatim striata , pube lanceolata.
Mus. Lud. Ulr. 497. n. 56.*
Lift. Conch. t. 280. f. 118?
Argenv. zoom. t. 12. f. C.
Chemn. Conch. 6. t. 27. f. 282-286.
Habitat rarissima in Oceano americano , testa albescens radiis maculis venisque ex fusco rubelli in margine crenulato.

- Dyfera. 4. V. testa subcordata : sulcis transversis remotis ,
margin'e crenulato. *Mus. Lud. Ulr.* 498. n. 57.*
Lift. Conch. t. 277. f. 114. t. 278. f. 115. t. 285. f.
Bonann. recr. 3. f. 348?
mus. Kirch. 2. f. 103.
Gualt. test. t. 88. f. D.
Klein ofrac. t. 10. f. 48. 49.
Knorr Vergn. 4. t. 24. f. 3? 6. t. 10. f. 2? 21. f.
Gronov. zooph. t. 18. f. 8.
Born. mus. Caes. Vind. test. t. 4. f. 9?
Chemn. Conch. 6. t. 27. f. 279? 280? 281? 282?
 $287-294.$
 $\beta)$ *Lift. Conch.* t. 280. f. 117?
Habitat in Oceano americano , rarer & speciosior in testa colore & pictura varia costis tenuibus saepius inaequali.

- Bajana. 5. V. testa fragili glabra : striis transversis rarioribus.
Bonann. mus. Kirch. 2. f. 124. 125.
Habitat in Brasiliæ littore, testa ochroleuca nigro-varia.
- excavata. 83. V. testa lentiformi transversim striata : anō profunde impresso cordato, vulva lata.
Schröet. Einl. in Conch. 3. p. 167. n. 34. t. 8. f. 10.
Habitat - - - sinuatæ similis, at striis testæ acutis subtilioribus, anterius & posterius in rugas aequalibus, colore ex fusco luteo aut ex albo cinereo, pube squamoso-spinosa distincta.
- Verrucosa. 6. V. testæ sulcis membranaceis striatis antrorum inprimis verrucosis, margine crenulato.
Adans. Seneg. t. 16. f. 1. Clonisse.
Lift. Conch. t. 284. f. 122.
Gualt. test. t. 75. f. II.
Argenv. Conch. t. 21. f. 60.
v. Born. mus. Caes. Vind. test. t. 4. f. 7.
Chemn. Conch. 6. t. 29. f. 299. a. 299. b. 300.
Habitat in mari mediterraneo, ad Anglia, Antillarumque littorū, paphicæ affinis, testa crassa, 2 pollices longa & æque lata flavigente, maculis radiisque paucis fuscis varia.
- Lapicida. 148. V. testa alba, antrorum longitudinaliter, posterius transversim striata. *Chenin. Conch. 10. p. 356. t. 172. f. 1664. 1665.*
Habitat ad insulas Americæ mediæ obversas, corallia lapidesque calcareos rodere perhibita.
- divergens. 147. V. testa alba: striis subtilissimis divergentibus densissimis.
Chemn. Conch. 10. p. 357. t. 172. f. 1666. 1667.
Habita: ad insulas Americæ mediæ obversas.
- Casina. 7. V. testæ sulcis transversis recurvis acutis, margine posteriori crenulato: pone anum canalicalato.
Lift. Conch. t. 286. f. 123.
Chemn. Conch. 6. t. 29. f. 301 ? 302 ?
Schröet. Einl. in Conch. 3. p. 115. t. 8. f. 6.
Habitat rara in Oceano europeo, frequentius fossiliis, testa alba maculis striis, vibicibus subfuscis varia, anulo fuso, umbonibus rubellis.

- cancella- 8. V. testæ striis transversis membranaceis remotis , anno
ta. dato. *Mus. Lud. Ulr.* 506. n. 71.
Knorr Vergn. 6. t. 39. f. 4.
Chemin. Conch. 6. t. 13. f. 137. 138. t. 29. f. 30.
Habitat rara in Oceano indicō , testa ultra pollicem longa
& ultra 1- $\frac{1}{2}$ lata cinerea : radiis nonnullis exoletis fuligineis
intus rubra aut subfuscā , striis interdum quoque longe
dinalibus exarata , margine crenulato.
- Gallina. 9. V. testa radiata : striis transversis obtusis , cardinis de
posteriore minime , margine crenulato. *Fn. suec.* 21.
Müll. zool. dan. prodr. 2975.
List. Conch. t. 281. f. 119. t. 282. f. 120. t. 295. f. 131.
Klein. oſtr. t. 10. f. 54.
Bytem. app. t. 11. f. 39. C ?
Knorr Vergn. 5. t. 14. f. 2-5.
v. Born. mus. Caes. Vind. test. p. 57. vign. f. b.
Chemin. Conch. 6. t. 30. f. 308-310.
β) List. Conch. t. 295. f. 132 ?
Habitat in Oceano americano & maribus europæis ,
crassa , planiuscula , pollicem longa & 1- $\frac{1}{4}$ lata , glaberrima
colore varia , radiis utplurimuni 3 subfuscis aut rubellis
intermediis interdum lineis angulatis , ano cordato ,
vulva lineis maculisque fuscis varia.
- guineen- 10. V. testa cinerea intus nivea : striis transversis acutis
vis. vœ marginē albo labiisque subtiliter striatis rotundatis
marginē integerrimo.
Chemin. Conch. 6. t. 30. f. 311.
Born mus. Caes. Vind. test. t. 4. f. 8.
β) Chemin. Conch. 6. t. 34. f. 312.
Habitat in Africæ littore occidentali , gallinæ affinis
hinc inde dilute rubello mista : striis elevatis validis
ramosis , ano cordato.
- Petulca. 11. V. testa subsulcata : margine crenulato , rima subovata
hiante , nymphis acutis.
Habitat in Oceano Europæ australioris , testa avellanea
magnitudine albo fuscoque nebulosa : ano oblongo.
- flexuosa. 12. V. testæ sulcis transversis obtusis , vulvæ labiis angulo
vato distinctis.
Rumpf mus. t. 43. f. A ? O ?
Gualt. test. t. 83. f. I.
Born mus. Caes. Vind. test. t. 4. f. 10.

Chemn. Conch. 6. t. 31. f. 333. 334.

Habitat in Oceano americano & indico, *testa pollicem longa*, & $1\frac{1}{4}$ lata, albida rufa-punctata, aut radiata, aut cinerascente maculis striisque subfuscis, (rarius nivea vulva anoque nigra, cardine cæruleo,) striis transversis vix crenatis vulvam versus bifidis, vulva retusa, rufa, oblique striata: angulis lateralibus elevatis & gibbis, margine vix manifeste crenulato. Solander.

Erycina. 13. V. testa transversim parallele sulcata: fulcis obtusissimis, vulva glabra, ano ovato.

List. Conch. t. 268. f. 104.

Knorr Vergn. 4. t. 3. f. 5.

Chemn. Conch. 6. t. 32. f. 337-339.

Habitat in India, *Chionæ affinis*, *testa crassa planiuscula*, $2\frac{1}{4}$ pollicis longa & $2\frac{1}{4}$ lata & majore, incarnata; radiis pluribus fuscis & marginem versus fascia aurantia picta, ano aurantio, vulvæ rinia angusta longa hiante, cardinis dentibus mediis 4. J. Th. Fagraeus.

mercena- 14. V. testa solida transverse substriata lœvi: margine crenulato, intus violacea, ano ovato. *Fn. suec.* 2144. *Müll. zool. dan. prodr.* 2976.

List. Conch. t. 271. f. 107.

Spengl. Schr. der berl. Naturf. 6. p. 307. t. 6. f. 1-3.

Chemn. Conch. 10. t. 171. f. 1659. 1660.

Habitat in Europæ & Americæ Oceano septentrionali (in Sueciæ montibus fossilis,) *testa ultra 3 pollices longa*, & perinde fere lata, ovata, anterius angustata, sub epidermide fusca straminea subitus & antrorsum radiis violaceis picta, striis semicircularibus elevatis transversis fuscisque longitudinalibus subaspera: ano cordato impresso longitudinaliter striato, vulva glabra: *Pensylvaniæ insolis olim instar numi.*

islandica. 15. V. testa transversim striata rudi, nymphis hiantibus ano nullo. *Müll. zool. dan.* 1. p. 95. t. 28. f. 1-5. *prodr. 2977. rar.* 1. p. 58. *O. Fabr. Fn. groenl.* p. 411. n. 412.

Brit. zool. 4. p. 80. t. 53. f. 47.
List. Conch. t. 272. f. 108.

anim. angl. p. 173. t. 4. f. 22.

Petiv. mus. n. 832.

Gualt. test. t. 58 f. B.

Costa britt. *Conch.* p. 183. t. 14. f. 5.

Olaus. ist. R. 1. §. 98 t. 11. f. 8. §. 239. 577. 901. f. 2.

Stroem. sondm. I. p. 201. n. 9.

Born. mus. Caes. *Vind. test.* t. 4. f. 11.

Chemn. Conch. 6. t. 32 f. 341.

β) *Lift. Conch.* t. 1057. f. 3.

γ) *Chemn. Conch.* t. 32. f. 342.

Adans. Seneg. t. 16. f. 7. Pitar.

Habitat in Oceano Europæ septentrionali, β) in mari calido
 γ) in africano, testa $3\frac{1}{2}$ pollices longa, & 4 fere leviter
 crassa epidermide tenui splendente transversim striata
 junioribus flavo, adultioribus fusca obiecta, alba fere
 rubellis transversis picta, intus tota alba: margine
 integerrimo, vulva longa angusta clausa; animal
 dis esculentum pisciumque esca fulvum subquadrum
 pallio pallido, apertura utraque tentaculis cincto.

Chione. 16. V. testa transverse subrugosa laevi, cardinis dentes
 anteriori lanceolato. *Mus. Lud. Ulr.* 500. n. 58⁺

Lift. Conch. t. 269. f. 105.

Bonann. recr. 2. f. 64. 65.

mus. Kirch. f. 63. 64.

Gualt. test. t. 86. f. A.

Argenv. Conch. t. 21. f. C.

Regenf. Conch. I. t. 8. f. 17.

Knorr Vergn. 6. t. 4. f. I.

Chemin. Conch. 6. t. 32. f. 343.

β) *Rumpf mus.* t. 42. f. G.

Pet. aq. amb. t. 18. f. 20.

Chemin. Conch. 6. t. 32. f. 340.

γ) *Chemn. Conch.* 6. t. 33. f. 344.

Habitat in mari britannico, mediterraneo, atlantico
 ad Sinæ & Japoniæ littora, γ) in India testa $2\frac{1}{2}$ pollici
 longa, & $3\frac{1}{4}$ lata subfuscata cervina radiis ut plurimi
 obscurioribus picta: margine integerrimo; γ) testa
 berrima nivea: lineis angularibus obscure rubellis.

maculata. 17. V. testa laevi: maculis exoletis sparsis. *Mus. Lud.*
 500. n. 59.*

Adans. Seneg. I. t. 17. f. 15. Jouret.

Lift. Conch. t. 270. f. 106.

Gualt. test. t. 86. f. J.

Argenv. Conch. t. 21. f. H.

Knorr Vergn. 2. t. 28. f. 5. & 5. t. 20. f. 3.

Regenf. Conch. I. t. 8. f. 16.

Chemin. Conch. 6. t. 33. f. 345.

Habitat frequens in Oceano americano, Chionæ affinis, at testa minore $1\frac{1}{2}$ pollicem longa, $2\frac{1}{4}$ lata, alba, subfuscata, aut ex fusco viridi, maculis fuscis aut spadiceis, interdum radiis 2 interruptis varia, cardinis dente posteriori brevi, crasso, obtuso.

- Meretrix. 18. V. testa glabra: vulva fusca gibba; nymphis hiantibus.
*Mus. Lud. Ulr. 501. n. 60.**
Gualt. test. t. 76. f. C.
Argenv. Conch. t. 21. f. F.
Knorr Vergn. 6. t. 6. f. 3.
Schroet. Journ. 3. t. 2. f. 7.
Chemn. Conch. 6. t. 33. f. 347-352.
 ♂) Venus paradoxa. *Born mus. Caes. Vind. test. t. 4. f. 12.*
 13.

Habitat rarius in Oceano indico, præsertim ad ostia fluviorum, sat spectabilis, testa crassa, convexa, glaberrima, nunc alba, nunc fusca radiis nunc picta, nunc nullis intus alba: margine anteriore cæruleo-que varia, ano non distincto, margine testæ integerrimo.

19. V. tumida glaberrima albo-radiata: labris subviolaceis.
Gualt. test. t. 88. f. V.
Knorr Vergn. 4. t. 24. f. 2. & 6. t. 10. f. 5.
Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 127. t. 8. f. 7.
Habitat in mari mediterraneo & indico, testæ pene $1\frac{1}{4}$ pollicem longa, $1\frac{1}{2}$ lata, nitente, flavicante, radiis nunc albis, nunc cæruleo-que varia, acuminata, impressa, glabra, albo cæruleo-que varia, ano subcordato impresso albo.

20. V. testa triangulo-rotundata gibba glaberrima characteribus angularibus inscripta. *Mus. Lud. Ulr. 501. n. 61.**
Lift. Conch. t. 257. f. 92. 93. t. 258. f. 94. t. 259. f. 95.
t. 262. f. 98. t. 287. f. 123. a.
Bonann. recr. 3. f. 376. 378.

muf. Kirch. 2. f. 126. 311. 312.
Rumpf muf. t. 42. f. K.

Valent. Abh. t. 15. f. 16.

Petiv. amb. eq. t. 5. f. 2.

Gualt. testac. t. 82. f. G. H.

Argenv. Conch. t. 21. f. M.

Lesser testaceoth. f. 108. 109.

Knorr Vergn. 1. t. 21. f. 5. 2. t. 20. f. 2. 3. t. 4. f. 4. & 6. t. 6. f. 5. 6.

Regenf. Conch. I. t. I. f. 3. 4. t. 4. f. 41.

Chemin. Conch. 6. t. 35. f. 367-381.

*Habitat in Oceano indicō & mari rubro, testa ad $1\frac{1}{2}$ pollicē
ceni longa, $1\frac{1}{4}$ lata, striis transversis arcuatis subtilē
mis exarata alba lineis fuscis, spadiceis, luteis, tri-*

*Phyrne. 21. V. testa lāvi anterius posteriusque transverse striata
ano obcordato; venis violaceis.
Habitat in Oceano magis australi.*

*Meroë. 22. V. testa ovata compressa transverse striata: sutura p̄
terius hiantē. Mus. Lud. Ulr. 502. n. 62.**

Lift. Conch. t. 378. f. 221.

Argenv. zoomorph. t. 12. f. B.

Knorr Vergn. 6. t. 7. f. 2. 4. 6. 5. 6.

Chemin. Conch. 6. t. 43. f. 450-454.

*Habitat in Oceano americano & indicō, testa $1\frac{1}{2}$ pollicē
longa, $2\frac{1}{4}$ lata, aut alba lineis maculisque angulatis
cærulescentibus, fuscis vel roseis aut violacea, aut fulvi
alternis cæruleis & flammis pīcta, intus alba, striis tra-
versis exarata, natibus distantiibus, vulva excisa, ma-
gine denticulata.*

*minuta. 23. V. testa subovata transversim striata subpellucida, p̄y-
phis clausis. O. Fabr. Fn. groenl. p. 412. n. 413.**
*Habitat frequens in ulvis foliaceis maris Islandiam allue-
islandicæ affinis, testa 1-2 lineas lata, $\frac{3}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ lineas lon-
tenera, fragili, oblonga exterius ex fusco violacea: p̄y-
albante, intus alba, striis longitudinalibus nullis.*

*deflorata. 24. V. testa ovali longitudinaliter rugosa anterius viola-
nymphis atris.*

Lift. Conch. t. 245. f. 273.

Seb. mus. 3. t. 86. f. 17?

*Knorr Vergn. 2. t. 20. f. 5. & 5. t. 11. f. 2. & t. 21. f. 1**

Chemin. Conch. 6. t. 9. f. 79-82.

β) Tellina arenosa. Chemn. Conch. 6. t. 9. f. 83.

Rum pf. mus. t. 45. f. C.

Petiv. crab. ag. t. 17. f. 9.!

Gualt. test. t. 85. f. G.

*Habitat in mari atlantico & americano, β) in indicō, th-
solida ad 2 pollices longa, & 3 lata, magis longitudinis
libus (in β) medio bifidis) stria transversas teneras,*

cuffantibus inæquali, intus violacea (β. albida) exteriū alba, cinerea, flavicante, rubella, vel cærulescente, aut radiis cærulescentibus rubellisve picta, cardinis dentibus in altera valva 2, in altera 1 fissa.

fimbriata. 25. V. testa ovali gibba longitudinaliter striata transverse sulcata: margine crenulato. *Mus. Lud. Ulr. 502. n. 63**.

Argenv. *Conch. t. 21. f. G.* Chama scobinata.

Lijt. *Conch. t. 355. t. 172. & t. 1056. f. 1!*

Rumpf *muf. t. 43. f. F.*

Petiv. *amb. aq. t. 18. f. 8.*

Gualt. *test. t. 75. f. C.*

Klein *ostr. t. 10. f. 52.*

v. Born *muf. Caes. Vind. test. t. 5. f. 4.*

Chemin. *Conch. 7. p. 3. vign. 8. & t. 43. f. 448. 449.*

β) Rumpf *muf. t. 43. f. G.* Tygers tong.

Petiv. *amb. ab. t. 18. f. 10.*

Habitat in Oceano indicō, testa salida, 2 pollices longa, 3 lata, alba (β. sordide rubella margine nigricante, striis longitudinalibus nullis) rima oblonga hiante, ano impresso, cardinis dentibus 2 mediis, & 2 lateralibus.

reticulata. 26. V. teste striis elevatis decussatis, ano cordato margine integro. *Mus. Lud. Ulr. 503. n. 64**.

Lijt. *Conch. t. 836. f. 173.*

Gualt. *test. t. 83. f. L.*

Knorr *Vergn. 6. t. 10. f. 3.*

Chemin. *Conch. 6. t. 36. f. 382-384.*

β) Gualt. *test. t. 83. f. A.*

Habitat in India, fimbriata affinis, at testa magis cordata, ut 2 pollices longa, 2½ lata sit, minus gibba, alba subfuscō aut rubello nebuloso, interdum radiata aut maculata, striis tenerioribus, transversis magis orciatis, ano cordato gibbo, cardinis dentibus 3; β) nunc fuscō, nunc rubro maculata.

squamosa. 27. V. testa reticulato-striata retrosum squamosa.

Rumpf *muf. t. 44. f. M.*

Petiv. *amb. aq. t. 18. f. 17.*

Gualt. *test. t. 83. f. G.*

Chemin. *Conch. 6. t. 31. f. 335.*

Habitat in India, flexuosa affinis, testa flavicante aut ferruginea, vulva subglabra impressa oblongo-ovata venis lineisque cæruleis varia, ano fuscō, intus albo, margine crenato.

- Puerpera. 28. V. testa subruronda : striis membranaceis decussatis, ¹²
biis flexuosis. Mant. 2. p. 540.
Gualt. testac. t. 76. f. G.
Argenv. Conch. t. 23. f. F.
Knorr Vergn. 6. t. 10. f. I.
Chemn. Conch. 6. t. 36. f. 388. 389.
γ) List. Conch. t. 141. f. 178.
Habitat rario in India, reticulatae affinis, at testa magis
rudi, solida, convexaque, anō plano vix impresso, exer-
tius maculis, lineis, vibicibus fusca varia, antorſis
fusca, intus cærulea.
- tripla. 29. V. testa subtriangulari lævi, anterius & posterius ¹³
tusa. Mant. 2. p. 545.
Adans. Seneg. I. t. 108. f. 4. Tivel.
List. Conch. t. 252. f. 86.
Gualt. test. t. 75. f. Q.
Chemn. Conch. 6. t. 31. f. 330-332.
β) Knorr Vergn. 6. t. 6. f. 4.
Habitat in Africæ littore occidentali, β) in mari mediterraneo,
testa circiter pollicem longa, $1\frac{1}{4}$ lata, ¹⁴ alba, aut cinerea : radiis interdum 2 fuscis, β) ex fuso
lutea, labiis cærulecentibus, ani striis magis obsoletis
quam vulva.
- plicata. 30. V. testæ striis transversis membranaceis arcuatiss., ¹⁵
rubello cordato : labiis obliquis.
Argenv. Conch. t. 21. f. k.
Valent. Abh. t. 15. f. 21.
Chemn. Conch. 6. t. 28. f. 295-297.
Habitat rara & pretiosa in mari indicō, β) in mediterraneo,
testa dilute incarnata : umbone albido, vulva
turatius rubra, glabra, profunda ; rima ampla oblonga
hiante.
- rugosa. 31. testæ gibbæ striis transversis membranaceis arcuatiss.
ano cordato, marginē crenulato. Mant. 2. p. 547.
Chemn. Conch. 6. t. 29. f. 303.
Habitat rario in India, testa crassa ultra 2 pollices longa
& lata, ex cinereo alba, maculis oblongis spadiceis
varia : vulva oblonga subimpressa, in sinistra valvo gla-
bra fusco alboque varia : rima oblonga ampla hirsuta.

Caliste.

32. V. testæ striis transversis acutis anterius membranaceis, vulva breviore, ano inconspicuo.

Schoet. Einl. in Conch. 3. p. 156. t. 8. f. 8. 9.

Habitat in mari rubro, guineensi affinis, testæ anterius exterius cœrulecente intus saturatus tincta, posterius plurimum sordide alba.

- Granulata. 33. V. testa rotundata decussatim striata anterius & margine crenulato violacea.

Born. mus. Caes. Wind. test. t. 4. f. 5. 6.

Chemn. Conch. 6. t. 30. f. 313.

Habitat in Oceano americano, maricæ affinis, at vulva glabra nunc livida nunc albo & cœrulecente varia, testa ipsa alba masculis lineisque angularibus lividis aut nigris varia, ano cordato impresso nigricante aut cœrulecente.

- imbricata. 34. V. testæ costis perpendicularibus imbricatis transversim striatis, margine crenato.

Lift. Conch. t. 497. f. 52.

Chemn. Conch. 6. t. 30. f. 314. 315.

Habitat in Campania Gallorum fossilis, cardine venerem, reliquo habitu cardium referens.

- divaricata. 35. V. testæ striis transversis teneris longitudinales marginem versus divergentes decussantibus, ano ovato, margine crenato.

Lift. Conch. t. 310. f. 146.

Chemn. Conch. 6. t. 30. f. 316.

Habitat — — testa alba, lineis, venis maculisque fuscis varia, vulva oblonga hiant, venosa, ex atro subfuscâ, cardinis dentibus 4.

- contraria. 36. V. testa oblonga planiuscula : striis transversis posterius contrariis, margine crenato.

Chemn. Conch. 6. t. 30. f. 317-319.

Habitat ad Guineæ littora, cardio æolico affinis, testa versicolor, vulvæ anique margine interiori nigro maculato.

- Gallus. 37. V. testa oblongo-ovata radiata : striis transversis confertis crassis, vulva lata ovata, ano cordato.

Chemn. Conch. 6. t. 31. f. 324. 325.

Habitat ad Malabariæ littus, testa $1\frac{1}{2}$ pollicem longa & ultra 2 lata, in junioribus cinerea, in adultioribus flavicanse : radiis 4 obscurioribus.

- flammea. 38. V. testa transversim striata dorso glabra : vulva latissima
anoque cordato fusco-lineatis.
Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 200. t. 8. f. 12.
39) Gallus radiatus. *Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 200. n. 146.*
*Habitat in mari rubro, gallo affinis, at testa umbonem
cærulescentem versus magis gibba alba vibicibus, lineis
maculisque cinereis varia, in 3) radiis 3 subfuscis pīca.*
- Corbicula. 39. V. testa triangulari lœvi utrinque truncata flavicante
rādiata, vulva anoque cordatis, margine integerrimo.
Knorr Vergn. 5. t. 15. f. 2. & 6. t. 10. f. 5.
Chenn. Conch. 6. t. 31. f. 326.
*Habitat rara in mari atlantico & americano, vulva sub
spadicea rima ampla hante.*
- herma- 40. V. testa triangulari glaberrima olivacea obscure fasciata
phrodita. intus alba vel cærulescente, vulva cordata, ano ovato.
Martin. I. Marigf. I. p. 402. t. 1. f. 1. 2.
Chenn. Conch. 6. t. 31. f. 327-329.
*Habitat rarissima in Guineæ flaviis, testa crassa rudi,
tibus convergentibus, cardinis dentibus crenatis.*
- coaxaxs. 41. V. testa viridi intus alba : striis transversis inæquali-
libus membranaceis, margine acuto.
Rumpf mus. t. 42. f. H?
Chenn. Conch. 6. t. 32. f. 236.
*Habitat in Zeylonæ flaviis, testa $2\frac{1}{2}$ pollices longa &
lata : rima oblonga hante, 2 ex cardinis dentibus fissi.*
- casta. 42. V. testa gibba nivea anterius convexa intusque sub
violacea ; vulva subrotunda, ano ovato violaceo-um-
brosa, margine integerrima.
Chenn. Conch. 6. t. 33. f. 346.
*Habitat in India, rima ampla, oblonga, hante, cardinis
dente anteriori intraque valva crenulata.*
- affinis. 43. V. testa tenui glabra convexa alba fusco varia : abso-
elangata ; labiis obliquis tumidis, cardinis dentibus
quatuor.
Galt. test. t. 75. f. M.
Knorr Vergn. 4. t. 24. f. 2.
Chenn. Conch. t. 33. f. 353. 354.
*Habitat in insula S. Mauritii, lœwe affinis testa radiis
maculis, lineis angularibus fuscis pīca, fragili, rugosa,
excavata rima oblonga hante.*

opima

44. V. testa crassa convexa : vulva ovata, ano cordato-ovato, cardinis dentibus tantum tribus.

Chenn. Conch. 6. t. 34. f. 355-357.

Habitat in India, testa nunc pallida obscurius radiata, nunc alba cærulecente maculata & nebulosa, nunc grisea maculis nebulisque obscurioribus varia.

- tritadiata. 45. V. testa convexa grisea : radiis tribus ex nigricante cærulecentibus, anoque elongato, labiis tumidis.

Chenn. Conch. 6. t. 34. f. 358.

Habitat ad Tranquebariae littus.

- nebulosa. 46. V. testa ochroleuca cinereo & cærulecenti maculata : vulvae ovalis labiis anoque ovato cærulecentibus.

Chenn. Conch. 6. t. 34. f. 359-361.

Habitat ad Tranquebariae littus, testa plurimum 4 ex albo & cinereo variis pida.

- contemta. 47. V. testa crassa trigona æquilatera glabra : natibus convergentibus, cardinis dente primario crenulato.

Chenn. Conch. 6. t. 34. f. 362. 363.

Habitat ad Malabariae littus, testa minuta natibus nunc albis, nunc rubellis, nunc obscurioribus, interdum littera sanguinea M notatis.

- japonica. 48. V. testa oblongo-ovata inæquilatera ad latera confertim transverse striata, ano oblongo-ovato.

Bonann. mus. Kirch. 2. f. 134?

Chenn. Conch. 6. t. 34. f. 364.

Habitat — — testa fulvescente aut lâtea characteribus purpureis triangularibus & angulatis inscripta : an hujus familie ?

49. V. testa ventricosa anterius angulosa : striis transversis crassibus levibus subarcuatis, ano ovato.

Chenn. Conch. 6. t. 34. f. 365. 366.

Habitat rara ad insulas Nicobaricas, testa ex cinereo alba intus sub umbonibus levigante, rima oblonga hiante, vulva glabra oblongo-ovali.

- crenata. 50. V. testa trigona : striis transversis confertis elevatis ; fulcis intermediis & magine crenulatis, ano rugoso fusco cordato.

Bonann. recr. 2. f. 377.

mus. Kirch. 2. f. 113.

B b b b b b b b b 3

VERMES TESTACEA Venus.

Chemn. Conch. 6. t. 36. f. 385.

β) *Chemn. Conch.* 6. t. 36. f. 386.

Habitat rara in India, testa ex cinereo alba, radiis, pilibus maculisque fuscis varia, vulvæ ovata labitis platicatis.

Textile. 51. V. testa ovali glaberrima inaequilatera; vulva anoque oblongis; lineis dilute spadiceis aut cærulecentibus pictis, margine integerrimo.

Lift. Conch. t. 400. f. 439.

Knorr Vergn. 2. t. 28. f. 4.

Chemn. Conch. 7. t. 42. f. 442. 443.

Habitat ad Malabaricæ litius & in mari rubro, testa ad $\frac{1}{2}$ pollicem longa, & $2\frac{1}{4}$ lata flavicanie aut dilutius incarnata cærulecentibus aut subfuscis picta, vulvæ labitis rotundatis.

corrugata. 52. V. testa ovata exalbida: striis transversis anterius crassus validis, posterius tenerrimis medio undulatis.

Chemn. Conch. 7. t. 42. f. 444.

Habitat in mari mediterraneo, rima oblonga ampliante.

monstro- fa. 53. V. testa ovata albida decussatim striata, cardinis sinistra valva dentibus modo duobus.

Chemn. Conch. 7. t. 42. f. 445. 446. a. b.

Habitat rarissima ad insulas Nicobaricas, valva dentata sinistram superante tam ad cardinem, quam anterius posteriusque prominentiis inaequali.

pondero- fa. 54. V. testa solida inaequilatera anterius posteriusque rugosæ cinerea: margine crenulato, cardinis dentibus duobus.

Chemn. Naturf. 19. t. 8. f. a-d. & *Conch.* 7. t. 69. f. A. D.
Habitat in Oceano australi, vulva oblongo-ovata, tibus versus anum ovarum impressum versis.

subviridis. 55. V. testa subviridi glabra solida: natibus prominentibus margine integerrimo.

Lift. Conch. t. 158. f. 13.

Habitat in - - - flaviis.

rostrata. 56. V. testa ovata: striis perpendicularibus transversas decussantibus squamosi.

- *Lift. Conch.* t. 346. f. 183.

Klein ostrac. t. 10. f. 51.

β) *Lift. Conch.* t. 348. f. 186.

Habitat - - - β) fuscoc-maculata.

fusca. 57. V. testa fusca : striis subtilissimis perpendicularibus.

List. Conch. t. 423. f. 371.

Habitat - - - testa $1\frac{3}{4}$ pollicis longa, & $2\frac{1}{4}$ lata, an distincta hujus generis species?

lusitanica. 58. V. testa oblonga transversim subtiliter striata, margine crenato.

Bonann. recr. 2. f. 45.

muf. Kirch. 2. f. 44.

Habitat in mari lusitanico.

punctula- 59. V. testa ovata alba, lineis badiis punctisque subflavis varia.

Bonann. recr. 2. f. 46.

muf. Kirch. 2. f. 45.

Habitat in mari Drepanitano.

fasciata. 60. V. testa tereti laevi radiis badiis & subflavis picta altera parte cyanea altera livida.

Bonann. recr. 2. f. 66.

muf. Kirch. 2. f. 65.

Habitat - - -

carnea. 61. V. testa oliva inaequilatera subrugosa carnea : radiis tribus.

Bonann. recr. 3. f. 382.

muf. Kirch. 2. f. 115.

Habitat - - - testa $1\frac{1}{2}$ polliceni longa, $2\frac{1}{2}$ lata centrum versus in rosea vel purpuræ colore vergente.

virgata. 62. V. testa intus violacea, extus chalybea : radiis luteis.

Rumpf muf. t. 42. f. I.

Petiv. amb. aq. t. 18. f. 16.

Habitat in Oceano Indico, coaxanti affinis at testa tenuiori.

vericolor. 63. V. testa ovali oblique striata albida : radiis albis, fulvidis cærulecentibus rubrisque.

Gualt. test. t. 86. f. B. C.

Habitat - - - testa inaequilatera profunde sulcata.

variegata. 64. V. testa ovata inaequilatera subtilissime striata cærulecenti-punctata ; radiis subfuscis & nigricantibus.

Gualt. test. t. 89. f. H.

Habitat - - - testis lineis nonnullis transversis albis insignita.

amethystina. 65. V. testa ovata violacea perpendiculariter striata.

Argeny. Conch. t. 21. f. D.

*Habitat --- testa ultra 1½ pollicis longa & 2¼ lata, et
hujus generis?*

calipyga. 66. V. testa posterius ovata transverse inæqualiter striata
lineis angularibus picta.

Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 5. f. 1.

β) *Bonann. recr. 2. f. 62.*

mus. Kirch. 2. f. 61.

*Habitat ad Ulyssiponense littus, testa flavicante, lineis
fuscis picta: umbone niveo.*

Senega- 67. V. testa ovata subtilissime decussatim striata alba aut
lenfis. carnea fusco varia.

Adans. Seneg. t. 17. f. 11. Lunot.

*Habitat in Senegalia, minuta, testa sesquipollicem latam
& duplo breviori.*

Matadoz. 68. V. testa triangulari alba aut flava: fulcis transversis
parallelis circiter quadraginta.

Adans. Seneg. t. 18. f. 5. Matadon.

*Habitat rarissima in Senegalia, triplex affinis, testa sesqui-
pollicem longa.*

fuccincta. 86. V. testa cordata fulcis transversis remotis excavatis:
margin'e crenulato. *Mart. 2. p. 546.*

*Habitat --- testae magnitudine extimi digiti, fulcis 1½
ano ovato impresso, vulvae rima excisa.*

compressa. 87. V. testa subcordata compressissima transverse sulcata
Mart. 2. p. 546.

*Habitat --- testae margine integerrimo, vulva anque
linearibus subexcisis.*

australis. 88. V. testa cordata nitida alba, characteribus fuscelcen-
tibus notata: margine integro. *Chemn. Conch. 10.
p. 355. t. 171. f. 1662.*

ε) *Mart. univ. Conchol. t. 40?*

Habitat in Oceano australi.

gigantea. 89. V. testa ovata livida: radiis numerosissimis interruptis
cærulescentibus, ano impresso ovato. *Chemn. Conch.
10. p. 354. t. 171. f. 1661.*

Favann. Conch. t. 49. f. 91.

Habitat ad Zeylonæ, Floridæ littore.

†† orbiculata.

- tigerina. 69. V. testa lentiformi : striis crenatis decussatis , ano imprelio ovato. *Mus. Lud. Ultr.* 503. n. 65.*
Adans. seneg. t. 16. f. 3. Codock.
List. Conch. t. 337. f. 174.
Bonann. recr. 2. f. 69.
muf. Kirch. 2. f. 70.
Rumpf muf. t. 43. f. H.
Petiv. amb. aq. t. 18. f. a.
Gualt. test. t. 77. f. A.
Argenv. Conch. t. 21. f. E.
Bytem. app. t. 11. f. 44.
Knorr Vergn. 4. t. 2. f. 1. & t. 3. f. 2. & 6. t. 37.
 f. 2.

Chemin. Conch. 6. 37. f. 390. 391.
 β) *Knorr Vergn.* 4. t. 3. f. 2?

γ) *Venus orbicularis. Syst nat.* X. 1. p. 688. n. 318.

Habitat in Oceano americano & indicō, satis magna;
testa interdum tota alba, interdum anterius & posterius
rubella intusque rubra: umbone flavo, striis perpendicularibus
evidenterib⁹, margine intus glabro exterius
crenato, vulva linearis, ano angusto, cardinis dentibus
mediis 2.

Prostrata. 70. V. testa orbiculata transverse striata, labiis scabro-
 membranaceis. *Mus. Lud. Ultr.* 504. n. 66.*
Born muf. Caes. Wind. test. t. 5. f. 6.
Chemin. Conch. 6. t. 29. f. 298.

Habitat ad littus Coromandel, testa complanata nigra;
cineræ aut subfuscæ, 2 pollices longa, & paulo minus
lata, natibus reflexis, vulva subpubente, rima oblonga,
patula, ano cordato.

Pensylvana- 71. V. testa lentiformi glabro-rugosa alba : anterius
 utrinque sulco longitudinali. *Mus. Lud. Ulr.* 504.
 n. 67.*
List. Conch. t. 305. f. 138.
Argenv. Conch. t. 21. f. N.
Knorr Vergn. 4. t. 14. f. 4.
Born muf. Caes. Wind. test. t. 5. f. 8.
Schroet. Journ. 31. t. 2. f. 8.

Chemin. Conch. 7. t. 37. f. 394-396.
 β) *Venus sulco longitudinali utrinque altero ad annum.*
List. Conch. t. 265. f. 101? t. 298. f. 135.
 γ) *Venus fragilis. O. Fabr. Fn. groenl.* p. 313. n. 314?

*Habitat in Oceano americano, testa ad 2 pollices longa,
alba, solida, rima linearis, ano exili rugoso cordato,
marginem integerrimo.*

- spuria. 72. V. testa alba subglabra : sulco anterius longitudinalis
cardinisque dentibus lateralibus nullis.
Lift. Conch. t. 296. f. 133.
Chenin. Conch. 7. t. 38. f. 399.
*Habitat in mari Islandiam insulamque Ferroe alluentibus
pensylvanicæ affinis, at rima ampliori, rimaque oblonga*
- incrusta- 75. V. testa lentiiformi glaberrima laevissima punctis excava-
ta. *Mus. Lud. Ulr. 505. n. 68.**
*Habitat in Oceano indico, testa intus crusta crassa albida
obducta, an forsitan eadem cum tigerina, forsitan aetate
arte deformata?*
- punctata. 74. V. testa lentiiformi longitudinaliter sulcata intus pun-
tata. *Mus. Lud. Ulr. 505. n. 69.**
Rumpf mus. t. 43. f. D.
Petiv. amb. aq. t. 18. f. 6.
Gualt. test. t. 75. f. D.
Chemn. Conch. 7. t. 37. f. 397. 398.
*Habitat rara in India, testa solida antiquata ultra 2 polli-
ces longa, & $2\frac{1}{2}$ lata alba hinc inde rubella mixta, intus
crusta crassa ochroleuca interdum laevi obducta, ceterum
rubra, marginem integerrimo.*
- exoleta. 75. V. testa lentiiformi transversim striata pallida obsoleta
radiata, ano cordato. *Fn. suec. 2145. Mus. Lud.
Ulr. 506. n. 70.** *Müll. zool. dan. prod. 2973.*
Adans. Seneg. t. 16. f. 4. Cotan.
Lift. Conch. t. 292. f. 128. & t. 297. f. 134.
Gualt. test. t. 75. f. F.
v. Borni mus. Caes. Vind. test. t. 5. f. 9.
Chemn. Conch. 7. t. 38. f. 402. 404.
) *Venus Lupinus. Syst. nat. X. I. p. 689. n. 123.**
Y) *Venus testa æquilatera Chemn. Conch. 7. t. 38. f. 404.*
Lift. Conch. t. 293. f. 129.

*An distinctæ species, & si, cui familia adscribenda Venus testa ovata lat-
tencia a Mullero zool. dan. prodr. 2979. & Venus testa ovata minus longa
vexa crassa, n. 2980. notata? a Listero Conch. t. 274. f. 110. dep. 33. con-*
Bytemester spp. t. 11. f. 39. e. delineata?

Habitat in Norwegiae Angliaeque littore, γ) testa magis æquilatera flavidante aut ex cinereo alba ad insulas Antillas, prostratae affinis, at testa magis convexa labiis non scabris distincta, 2 fere pollices longa & perinde lata, intus crusta crassâ albida obducta, ano ferrugineo.

tumidula. 90. V. testa gibba : fulcis transversis remotis obsoletiusculis. *Mant.* 2. p. 546.

Habitat - - - testae margine integrerrimo, vulvæ rimæ simplici, ano impresso rhombeo-excavato.

sinensis. 91. V. testa longitudinaliter striata : arcibus transversis albis violaceisque, margine intus crenato.

Chemn. Conch. 10. p. 356. t. 171. f. 1663.

Habitat in mari Sinam affluente.

anguata. 76. V. testa lentiformi transversim striata alba : rima oblonga atque plena hiantem, cardinis dentibus quatuor.

Lift. Conch. t. 924. f. 130.

Chemn. Conch. 7. t. 38. f. 400. 401.

β) *Lift. Conch.* t. 290. f. 126.

γ) *Lift. Conch.* t. 289. f. 125.

Gualt. test. t. 75. f. N?

Chemn. Conch. 7. t. 38. f. 3.

Habitat rario ad insulas Nicobaricas, exoletaæ affinis, at testa minus orbiculari, magis convexa, striis magis elevatis distincta.

borealis. 77. V. testa lentiformi : striis transversis membranaceis erectis remotissimis.

Lift. an. angl. p. 174. t. 4. f. 123.

Gualt. test. t. 75. f. 5.

Chemn. Conch. 7. t. 39. f. 412. 414.

Habitat in Oceano europeo septentrionali, testa $1\frac{1}{2}$ pollicem longa, & paulo latiori sub epidermide spadicea albâ, angulata, ad rimam longam & angustam rectâ & quasi truncata, striis inæqualibus, & si cum exoleta compares, remotioribus, ano oblongo-ovato cardinis dente in altera valva 1. in altera 2.

peccinata. 78. V. testa sublentiformi : fulcis longitudinalibus rugosis, pube antrosum ramosa. *Mus. Lud. Ulr.* 507. n. 72.

Lift. Conch. t. 312. f. 148. t. 313. f. 149.

Rumpf mus. t. 42. f. D.

Petiv. amb. eq. t. 18. f. 14.

Gualt. test. t. 72. f. E. F. & t. 75. f. A.

Argenv. Conch. t. 21. f. P.

Knorr Vergn. 6. t. 3. f. 3.

Chemn. Conch. 7. t. 39. f. 415-419.

Habitat in Oceano indicō & americanō, testa ultra^s pollicem longa & 2 fere lata nunc magis nunc minis convexa, nunc alba: ano maculisque quibusdam anterius ribus fuscis, nunc per totam superficiem fusco maculata, nunc anterius maculis vibicibusque ex acro fuscis notata: ano cordato, margine inaequaliter crenato.

scripta. 79. V. testa lentiformi compressa striata: posterius angulo recto angulata. Mus. Lud. Ulri. 507. n. 73.*

Rumpf mus. t. 43. f. C. Chama litterata rotunda, Argenv. Conch. t. 24. f. M. Chama optica.

Pet. amb. aq. t. 18. f. 3.

Gualt. test. t. 77. f. C.

Knorr Vergn. 5. t. 15. f. 3.

Chemn. Conch. 7. t. 40. f. 420-426.

B) v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 5. f. 7.

Chemn. Conch. 7. t. 39. f. 410. 411.

Habitat rariissima in Oceano indicō, β) in mari rubra testa utrinque truncata, posterius quidem magis, intus alba: macula fusca, extrinsecus varia: margine inter gerrimo, vulva anno spadiceo-maculatis.

edentula. 80. V. testa subgloboso-lenticulari rugosa edentula: ovato. Mus. Lud. Ulri. 508. n. 74.*

Lift. Conch. t. 260. f. 96.

Gualt. test. t. 88. f. B.

Chemn. Conch. 7. t. 40. f. 427-429.

Habitat in Oceano americano, testa diaphana exalbida recenti rubella, intus præter marginem utrinque inter gerrimum aurea; ano ovato-acuto, valde excavato, rima angusta, natibus anum versus versis.

cincta. 81. V. testa valde convexa annulis cincta: sulcis inter mediis crenatis ano cordato, margine crenulato.

Chemn. Conch. 6. t. 36. f. 387.

Habitat — — testa minuta alba maculis & nebulis purpureis varia, intus sub umbone maculis aliquot purpureis.

concon- trica. 82. V. testa alba suborbiculari compressa: striis concen- tricis, margine integerrimo, ano cordato.

Adans. Seneg. t. 1. f. 5. Dosin.
List. Conch. t. 261. f. 91. t. 288. f. 124. & t. 291. f. 127.
Gualt. test. t. 76. f. F.
v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 5. f. 5.
Chenn. Conch. 7. t. 37. f. 392. 393.
Habitat in mari atlantico, americano, testa satis magna:
rima hiante, cardinis dentibus 4 oblique approximatis.

juvenile.

84. V. testa lentiformi: striis transversis confertis circula-
ribus anterius & posterius in rugas terminatis, ano
cordato, margine integerrimo.
Chenn. Conch. 7. t. 38. f. 405.

Habitat in India testa alba: maculis spadiceis, fasciis radiis-
que albis variis, rima oblonga, ampla, hiante, sinuata.

85. V. testa lentiformi: striis transversis acutis arcuatis,
margine integro, ano cordato, ferrugineo.
Chenn. Conch. 7. t. 38. f. 407.

Habitat rario in India, testa maculis radiisque spadiceis
varia, vulva elongata, lata, sinuata, maculis albis
spadiceisque varia.

86. V. testa globoso hyalina: striis transversis subtilissi-
mis, margine integerrimo, cardinis dentibus duobus.
Chenn. Conch. 7. t. 40. f. 430. 431.
Habitat rarissima in mari rubro, testa ultra pollicem longa,
& pene $\frac{1}{4}$ lata, ano vulvaque vix impressis.

87. V. testa orbiculari æquilatera transversim rugosa rufa
variegata.
List. Conch. t. 254. f. 89. t. 255. f. 90. & t. 256. f. 91.
Habitat in Japonia.

88. V. testa orbiculari subcompreffa æquilatera alba: striis
transversis subtilibus.
List. Conch. t. 273. f. 109.
β) List. Conch. t. 274. f. 110.
Habitat in Jamaica.

89. V. testa orbiculari inæquilatera: striis transversis con-
fertis acutis.

An huic generi inferenda testa, a Chennizio Conch. 10. t. 172. f. 1670.
1671. depicta?

Bifilio.

Globosa.

Pectunculus.

albida.

Ampe-

clientis.

VERMES TESTACEA. : Venus.

- Lift. Conch. t. 283. f. 121.*
Habitat in sinu Campechiensi, testa 2 $\frac{1}{4}$ pollices longa
- craffa.** 90. V. testa orbiculari solida compressa : striis transversis
 subtilibus, radiis rubris.
Lift. Conch. t. 299. f. 136.
Habitat - - -
- pupurascens.** 91. V. testa orbiculari subtiliter transversim striata purpurea :
 rufescente radiata.
Lift. Conch. t. 303. f. 144.
 ♂) *Lift. Conch. t. 304. f. 145.*
Klein ostr. t. II. f. 57.
Habitat - - -
- tubra.** 92. V. testa orbiculari inaequilatera spadicea obscurius diata : striis transversis confertis crassis.
Lift. Conch. t. 306. f. 139.
Habitat in Jamaica.
- pusilla.** 93. V. testa orbiculari aequilatera albida perpendiculariter striata.
Lift. Conch. t. 311. f. 547.
Habitat - - - an forsan cardii species ?
- violacea.** 94. V. testa intus violacea : striis perpendicularibus squamosis, margine denticulato.
Lift. Conch. t. 338. f. 175.
Habitat - - - testa medicea magnitudinis, longior quam lata.
- spadicea.** 95. V. testa spadicea : striis perpendicularibus versus marginem squamosis.
Lift. Conch. t. 340. f. 177.
Habitat - - - testa 2 pollices longa, & pene 2 $\frac{1}{2}$ lat.
- cancellata.** 96. V. testa subrufa cancellata.
Lift. Conch. t. 344. f. 181.
Habitat - - - exilis.
- bengalen sis.** 97. V. testa orbiculari subaequilatera : striis crassis perpendicularibus, natibus anum versus versis.
Lift. Conch. t. 345. f. 182.
Habitat in Bengala, satis magna.
- aurea.** 98. V. testa suborbiculari aurea inaequilatera suborbiculari : striis transversis subtilibus confertis.

Lift. Conch. t. 404. f. 249.

Habitat - - - - -

99. V. testa fusca : striis perpendicularibus tenuissimis.

Lift. Conch. t. 423. f. 271.

Habitat - - - testa 1 $\frac{1}{4}$ pollicis longa, 2 $\frac{1}{4}$ lata.

Purpura- 100. V. testa orbiculari subaequilatera perpendiculariter ru-
ta,
gosa : radiis purpureis.

Lift. Conch. t. 424. f. 272.

Habitat - - - testa 1 $\frac{1}{2}$ policem sere longa, & 1 $\frac{3}{4}$ lata.

Nux.
rugata.
Bibbula.
stellata.
italica.
brasili-
na.

101. V. testa lentiformi testacea rugosa, ano cordato.

Bonann. recr. 2. f. 39.

mus. Kirch. 2. f. 38.

Habitat in mari Jonico.

102. V. testa orbiculari testacea subaequilatera : rugis trans-
versis distantibus.

Bonann. recr. 2. f. 54.

mus. Kirch. 2. f. 52.

Habitat - - -

103. V. testa lentiformi transversim striata, antrorsum
truncata.

Bonann. recr. 2. f. 55.

mus. Kirch. 2. f. 53.

Habitat - - -

104. V. testa orbiculari laevi aurea : stella ad umbonem
candida.

Bonann. recr. 2. f. 62.

Habitat in Ulyssiponensi littore.

105. V. testa orbiculari lutea : striis transversis elevatis
distantibus.

Bonann. recr. 2. f. 75.

mus. Kirch. 2. f. 75.

Habitat in mari mediterraneo, Italianam alluente.

106. V. testa lentiformi fusco lutea : striis transversis te-
nerioribus distantibus, ano cordato vulvaque latis cæ-
ruleoscentibus.

Bonann. recr. 3. f. 345

mus. Kirch. 2. f. 102.

β) *Bonann. recr. 3. f. 380.*

mus. Kirch. 2. f. 114.

*Habitat frequens in Brasiliæ littore, natibus anum versus
inflexis.*

pellucida. 107. V. testa orbiculari pellucida lœvi : valva dilute aureo spadiceo maculata, ano cordato viridi rubroque venolo. *Bonann. recr. 3. f. 397.* *mus. Kirch. 2. f. 118.*
Habitat in Brasiliæ oris.

holoseri- 108. V. testa orbiculari solida candida : striis extrinsecus undulatis aureis, faciaque versus marginem lata flavo lineis transversis fuscis varia. *Bonann. recr. 3. f. 398.* *mus. Kirch. 2. f. 119.*
Habitat - - - pellucida major, pictura opus holosericeum punto francescæ Italæ dictum simulans.

macassia- 109. V. testa orbiculari ventricosa crassa subfuscata albo flavo ricta. diata : striis annularibus. *Leers catal. p. 129. n. 1240.* Eykenhouts doublet. *Rumpf mus. t. 43. f. K.* *Petiv. amb. aq. t. 18. f. 13.*
Habitat in Macassar.

aurantia. 110. V. testa suborbiculari aurantia. *Valent. Abb. t. 15. f. 20.*
Habitat - - - testa 2 ferè pollices longa, & 2¹/₄ latitudine an hujus familie?

fulva. 111. V. testa lett. formi fulva : striis circularibus subtiliter simis. *Gualt. test. t. 75. f. E.*
Habitat - - -

albicatus. 112. V. testa orbiculari transversim striata albida lineis angularibus characteribus maculata que fuscis varia. *Gualt. test. t. 75. f. G.*
Habitat - - - castrensi affinis.

candida. 113. V. testa orbiculari alba reticulatum striata. *Gualt. test. t. 75. f. L.*
Habitat - - -

undulata. 114. V. testa suborbiculari transversim striata exalbida lineis undulatis punctisque rubellis varia. *Gualt. test. t. 75. f. O.*
β) *Gualt. test. t. 75. f. P.*
γ) *Gualt. test. t. 75. f. R.*
δ) *Gualt. test. t. 76. f. A.*
Habitat - - -

- lineata*, 115. *V. testa orbiculata æquilatera alba : striis transversis subtilibus, marginem versus crassioribus.*
Gualt. test. t. 77. f. B.
Habitat - - -
- lævis*, 116. *V. testa lævi subæquilatera albida.*
Gronov. zooph. 3. p. 260. n. 1090.
Gualt. test. t. 77. f. F.
♂) Gualt. test. t. 77. f. G.
Habitat. - - - an distincta species?
- cornea*, 117. *V. testa orbiculari lævi inæquilatera livido-cornea :*
linea transversa alba.
Gualt. test. t. 82. f. B.
Habitat - - -
- Gutta-*
ta, 118. *V. testa orbiculata fulvida ad marginem albo guttata,*
Gualt. test. t. 82. f. F.
Habitat - - -
- rufes-*
cens, 119. *V. testa inæquilatera rufescente lævi : lineis nonnullis*
transversis.
Gualt. test. t. 85. f. D.
Habitat - - -
- virens*, 120. *V. testa lentiformi cancellatim striata radiata margine*
crenulata virente obscurius maculata.
Argenv. zoomorph. t. 5. f. B. Palourde.
Habitat - - -
- macu-*
lofa, 121. *V. testa alba maculato-radiata arcuatum striata :*
macula media grisea magna sursum attenuata.
Argenv. zoomorph. t. 12. f. G.
Habitat - - -
- costata*, 122. *V. testa tota incarnata : costis longitudinalibus rugas*
transversas remotiores decussantibus.
Knorr Vergn. 4. t. 3. f. 3.
Habitat - - - testa $1\frac{1}{4}$ pollicem longa, $1\frac{1}{2}$ lata.
- Wauaria*, 123. *V. testa tenui convexuscula subtiliter transversim*
striata intus nivea, extrinsecus littera W punctis mul-
tis adspersis insignita, natibus inflexis.
Regenf. Conch. I. t. 7. f. 12.
Habitat - - - scriptæ affinis.

VERMES TESTACEA. Venus.

- tumens.* 124. V. testa tumida solida nivea lœvi, marginem verfus rugis aliquot transversis exarata.
Adans. Seneg. I. t. 16. f. 7. Pitas.
Habitat ad Africæ littus occidentale, testa epidermide
fondide alba vestita, 1 $\frac{1}{2}$ pollicis longa, ultra 2 lata,
cardinis dentibus 4 in utraque valva.
- diaphana.* 125. V. testa tenui orbiculari pellucida lœvissima nivea,
cardinis in utraque valva dentibus duobus.
Adans. Seneg. I. t. 16. f. 8. Felan.
Habitat in Africæ littore occidentali, diametri sesquipoli-
carius.
- dura.* 126. V. testa suborbiculari compressa dura transversim sulcata
rubella fusco radiata intus violacea.
Adans. Seneg. I. t. 17. f. 12. Pegon.
Habitat ad Africæ littus occidentale; testa 2 fere pollices
longa nitente.
- nivea.* 127. V. testa alba pellucida subhiantē : sulcis viginti dil-
tantibus marginem versus in rugas abeuntibus.
Adans. Seneg. I. t. 17. f. 17. Fatan.
Habitat ad Africæ littus occidentale, testa 6 fere pollices
lata, 4 $\frac{1}{2}$ longa, an hujus generis?
- eburnea.* 128. V. testa orbiculari compressa nivea : sulcis longitu-
dinalibus rotundatis strias transversas decussantibus.
Adans. Seneg. I. t. 18. f. 3. Jajon.
Habitat ad Africæ littus occidentale, testæ diametro 9
linearum, sulcis circiter 26-30, cardinis dentibus 9
brevissimis.
- lucida.* 129. V. testa lucida dilute fulva intus & extrinsecus sulci-
longitudinalibus subtilissimis exarata.
Adans. Seneg. I. t. 18. f. 4. Movin.
Habitat ad Africæ littus occidentale, testa 16 circitt
lineas longa vix angustiore.
- discors.* 130. V. testa orbiculari convexiuscula striis longitudinali-
bus : mediis perpendicularibus, exterioribus obliqui
divergentibus transversas decussantibus : sulcis inter
mediis & margine interno crenatis.
Schloet. Enul. in Conch. 3. p. 199. t. 8. f. 11.
Habitat - - - testa inaequilatera albida aut ochroleuca
striis non raro undulatis, aut radius, interdum maculis
nebulisque nonnullis fascis varia, intus albâ, ano cordati

*oblongo; vulva angusta oblonga fusca: labiis cancellatis
albis nigro lineatis.*

aculeata. 131. V. testa orbiculari subaequilatera: costis acutis elevatis tuberculatis, margine denticulato crenato, cardinis dentibus mediis duobus.

Schroet. *Eint. in Conch.* 3. p. 200. t. 8. f. 13.

Habitat — — testa rarius unicore rubra perfici florum temula, frequentius alba fusco striata, vulva minuta, sulcis profundis.

††† ovales, supra rimam subangulatæ.

litterata. 132. V. testa ovata anterius subangulata: striis transversis subundulatis. Fn. suec. 2146. Mus. Lud. Ulr. 508. n. 75.*

Argeny. *Conch.* t. 21. f. A. Chama litterata.

Rumpf mus. t. 43. f. B. Chama litterata oblonga.

List. *Conch.* t. 402. f. 246.

Bonann. *recr.* 2. f. 67.

mus. Kirch. 2. f. 66. 120.

Petiv. amb. aq. t. 18. f. 2.

Valent. *Abh.* t. 13. f. 6. t. 14. f. 13.

Gualt. test. t. 86. f. E? F.

Knorr Vergn. 1. t. 6. f. 4.

Regenf. *Conch.* 1. t. 4. f. 39.

Chemn. *Conch.* 7. t. 41. f. 432-434.

β) Venus litterata nebulosa. Chemn. *Conch.* 7. t. 41. f. 435.

Valent. *Abh.* t. 14. f. 10. 11. 12. 14.

Knorr Vergn. 6. t. 14. f. 1.

γ) Venus litterata punctata. Chemn. *Conch.* 7. t. 41. f. 436 437.

Valent. *Abh.* t. 15. f. 19.

δ) Venus litterata conspersa. Chemn. *Conch.* 7. t. 42. f. 438.

ε) Venus litterata radiata. Chemn. *Conch.* 7. t. 42. f. 439.

ζ) Venus litterata maculosa. Martin. *allg. Naturg.* 1. p. 267.

t. 12. f. 4.

η) Valent. *Abh.* t. 14. f. 7-9. & t. 15. f. 17. 18.

δ) Regenf. *Conch.* 1. t. 4. f. 40?

Habitat rarer in India, testa ad 2 pollices longa, 3 lata, characteribus lineisque fusciis picta, vulva longa angusta profunda: rima longiuscula lata, natibus minutis.

Geogra-
phica,

133. V. testa inaequilatera tenui subtiliter decussatim striata, alba, fusco reticulata.

Gualt. test. t. 86. f. H.

Chemn. *Conch.* 7. t. 42. f. 440.

Habitat in mari mediterraneo.

- rotunda*- 134. V. testa ovata anterius subangulata : striis transversis cardinis dente intermedio bifido. *Mus. Lud. Vir. 509.*
ta. *n. 76.**
- Argenv. zoom. t. 12. f. D.*
Olear. goit. t. 29. f. 4.
Knorr Vergn. 2. t. 18. f. 4.
Chemin. Conch. 7. t. 42. f. 441.
Habitat rarer in Oceano indico, testa $1\frac{1}{2}$ pollicem longa & 3 lata, subfusca aut maculosa flava radiis ex maculis fuscis luteisque compositis picta, ano ex ovato lanceolato decussata.
- decussata*- 135. V. testa ovata anterius angulata decussatim striata *Mus. Lud. Vir. 509. n. 77.**
- Gualt. test. t. 85. f. E. I. L.*
v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 5. f. 2. 3.
Chemin. Conch. 7. t. 43. f. 455. 456.
Habitat frequens in mari mediterraneo, testa ad $1\frac{1}{2}$ pollicem longa & 2 lata, solida, convexa, colore varia, radiata, maculata, aut virgata, intus alba flavo mixta, minimo retuso, vulva longa angusta margine interno plurimum cærulea ; cardinis dentium intermedio rarius 2 fissis.
- virginea*. 136. V. testa subovata anterius subangulata : striis transversis inæquilineatis, vulva tumida.
- Chemin. Conch. 7. t. 42. f. 447. t. 43. f. 457. 458. & a. b. c.*
Habitat frequens in mari adriatico aliisque, decussatim striatis, at testa minore, striis perpendicularibus nullis diffincta, rubella, interdum radiata, maculis cinereis, aut lineis angularibus fuscis varia, intus alba aut pallidior, vicante, ad latera interdum aut marginem exrufata, nunc magis nunc minus ovata, striis transversis rugosius, magis nunc minus conspicuis : Incola edulis.
- virginica*. 137. V. testa ovata transversim rugosa : cardinis dentibus duobus.
- List. Conch. t. 390. f. 229.*
Habitat in Virginia, testa pollicem longa, & $1\frac{1}{2}$ lata.
- cruenta*- 138. V. testa ovata inæquilatera transversim striata submaculata.
- List. Conch. t. 396. f. 243.*
Klein ostr. t. 10. f. 50.
β) List. Conch. t. 403. f. 247.
Habitat. - - - testa striis exasperata.

- lutescens.* 139. V. testa ovata transversim striata exterius radiata marginem versus characteribus lincis maculisque varia intus lutescente.
Lift. Conch. t. 404. f. 248.
Habitat - - -
- sanguino-lenta.* 140. V. testa ovali lævi flavescente: maeulis punctisque rubris mus. *Bonann. recr. 2. f. 68.*
muf. Kirch. 2. f. 67.
Habitat ad Neapolitanum littus, testa $1\frac{1}{4}$ pollicem longa, $1\frac{3}{4}$ lata.
- argentea.* 141. V. testa oblongiuscula lævi argentea: lineis nigris in fascias coadunatis.
Bonann. recr. 2. f. 85.
muf. Kirch. 2. f. 85.
Habitat in Gaditano littore, an hujus generis.
- donacina.* 142. V. testa oblongiuscula complanata auterius transversim sulcata, margine interno crenulato, vulva anoque linearie excavatis.
Knorr Vergn. 6. t. 28. f. 7.
Habitat - - - testa $1\frac{1}{4}$ pollicem longa, $1\frac{3}{4}$ lata, nunc unicolor, nunc maculis, lineis angulatis aliterve varia, vulvæ rima minuta vix hiante, cardinis dentibus modo 2.
- africana.* 143. V. testa sulcata: umbone acuminatō; ano excavato rugoso cordato.
Adans. Seneg. I. t. 16. f. 6. Gordet.
Habitat in Africæ littore occidentali, testa pollicem lata, sulcis subtilioribus ultrâ 130. exarata.
- dealbata.* 144. V. testa oblonga tenui complanata vivo animali cærulecente, mortuo nivea.
Adans. Seneg. I. t. 17. f. 18. Calcinellie.
Habitat ad Africæ littus occidentale, testa $1\frac{1}{2}$ pollicem lata, dimidio angustiori; an hujus familiæ?
- lithophaga.* 145. V. testa ovata reticulata utrinque hiante: cardinis dentibus binis; alternis bifidis. *Retzius a. Taurin. 1786.*
1787. add. p. 11-14. f. 1. 2.
Habitat Liburni ad rupes littoreas, intra lapidem calcareum porosum flavicantem.

310. SPONDYLUS. *Animal Tethys.*

*Testa inaequivalvis, rigida.
Cardo dentibus 2 recurvis
cum foveola intermedia.*

- Gædaro- I. Sp. testa subaurita spinosa. *Mus. Lud Ulr.* 510. n. 78:
pus. *Boccon. observ.* 1674. t. 304. *Concha histricina.*
Adans. Seneg. I. t. 14. f. 6. *Gouron.*
Lift. Conch. t. 206. f. 40.
Bonann. recr. & mus. Kirch 2. f. 21.
Rumpf mus. t. 47. f. E.
Petiv. amb. aq. t. 20. f. 6.
Gault. test. t. 99. f. F.
Argenv. Conch. t. 20. f. B.
zoomorph. t. 12. f. A.
Klein ostr. t. 8. f. 23. & t. 9. f. 37.
Seb. mus. 3. t. 89. f. 7.
Regenf. Conch. I. t. 4. f. 48.
Knorr delic. t. B. IV. f. I.
Vergn. I. t. 7. f. I.
Murray testaceol. t. 2. f. 14.
v. *Born mus. Caes. Vind. test.* p. 76. vign.
Chemn. Conch. 7. t. 44. f. 459.
β) *Bonann. recr. & mus.* Kirch. 2. f. 20. 22.
Gault. test. t. 101. f. A.
Argenv. Conch. t. 20. f. E.
Chemn. Conch. 7. p. 63. vign. 9. f. a. b.
γ) *Chemn. Conch.* 7. p. 63. vign. 9. f. c.
δ) *Chemn. Conch.* 7. t. 44. f. 460.
ε) *Rumpf mus.* t. 48. f. I.
Gault. test. t. 101. f. B.
ζ) *Argenv. Conch.* t. 19. f. E. H.
Seb. mus. 3. t. 88. f. I.
Chemn. Conch. 7. t. 44. f. 461. 462.
η) *Chemn. Conch.* 7. t. 45. f. 463.
η) *Chemn. Conch.* 7. t. 45. f. 464.
η) *Seb. mus.* 3. t. 89. f. 8.
Knorr Vergn. 5. t. 9. f. I. & 6. t. 9. f. I.

Spondyli tota teste structura ad ostreas accidunt, sed dentibus cardinis diffinunt,
spinis vulvarum chemis propiores, scopulis ut plurimum adhaerentes, teste altera
convexa, altera planiore.

- Chemn. Conch. 7. t. 45. f. 465.
 *) Chemn. Conch. 7. t. 45. f. 466.
 **) Chemn. Conch. 7. t. 45. f. 468.
 ^) Chemn. Conch. 7. t. 45. f. 469.
 *) Knorr Vergn. 5. t. 7. f. 2. 3.
 Chemn. Conch. 7. t. 45. f. 470.
 *) Rumpf' mus. t. 48. f. 2.
 Argenv. Conch. t. 19. f. G.
 Seb. mus. 3. t. 88. f. 10. II. & t. 89. f. 5.
 Knorr Vergn. I. t. 9. f. 2.
 Chemn. Conch. 7. t. 46. f. 472.
 z) Knorr Vergn. 6. t. 9. f. 2.
 Chemn. Conch. 7. t. 47. f. 474.
 *) Chemn. Conch. 7. t. 47. f. 476.
 *) Seb. mus. 3. t. 88. f. 4.
 Chemn. Conch. 7. t. 47. f. 477. 478.
 t) Bonann. recr. & nius. Kirch. 2. f. 18.
 Knorr Vergn. 6. t. 12. f. 3.
 Chemn. Conch. 7. t. 69. f. E. F.
 Schroet Einl. in Conch. 3. p. 213. t. 8. f. 14. 15.
 o) List. Conch. t. 207. f. 41.
 r) List. Conch. t. 208. f. 42.
 u) List. Conch. t. 209. f. 43.
 p) Valent. Abb. t. 16. f. 24.
 x) Gualt. test. t. 99. f. E. b.
 +) Gualt. test. t. 100. f. A.
 w) Argenv. Conch. t. 20. f. I.
 ee) Seb. mus. 3. t. 88. f. 2.
 BB) Seb. mus. 3. t. 88. f. 3.
 rr) Seb. mus. 3. t. 88. f. 5.
 dd) Seb. mus. 3. t. 88. f. 6.
 ee) Seb. mus. 3. t. 88. f. 7.
 EE) Seb. mus. 3. t. 88. f. 9.
 ee) Seb. mus. 3. t. 89. f. I.
 gg) Seb. mus. 3. t. 89. f. 2.
 u) Seb. mus. 3. t. 89. f. 3.
 xx) Seb. mus. 3. t. 89. f. 4.
 xx) Adans. Seneg. I. t. 14. f. 7. Satal.
 uu) Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 224. n. 42. t. 8. f. 16.
)) Chemn. Conch. 9. t. 115. f. 984.
 ZZ) Chemn. Conch. 9. t. 115. f. 985. 986.
 oo) Chenin. Conch. 9. t. 115. f. 987.
 zz) Chemn. Conch. 9. t. 115. f. 988 - 990.
 tt) Chemn. Conch. 6. t. 116. f. 991.

Habitat in mari mediterraneo, δ) & γ) in mari rubro; ε) in sinensi, β) γ) ζ) η) λ) μ) ν) ξ) ο) π) in Oceano indico, δ) & ι) in americano, testæ colore nunc simplici purpureo, aurantio, albo, persici florum æmulo, nunc striis, maculis, punctis, fasciis, spinarum colore diverso vario, magnitudine, crassitie in immensum varians.

regius. 2. Sp. testa inaurita spinosa. *Mus. Lud. Ulr. 511. n. 79.*
Argenv. Conch. t. 20. f. G.

Chenin. Conch. 7. t. 46. f. 471.

β) Knorr Vergn. 5. t. 6. f. 2.

γ) Knorr Vergn. 5. t. 13. f. I.

δ) Argenv. Conch. t. 20. f. I.?

ε) Argenv. Conch. t. 20. f. M.

Habitat rarissimus in India, γ) prope Maltam, testa majore subglobosa, intus alba, exterius purpurascente, kermechina, ignea, aurantia, rarius alba, spinis upplurimum longioribus, ad 2 pollices longis, interdum cylindricis, margine crenato.

plicatus. 3. Sp. testa inaurita mutica plicata. *Mus. Lud. Ulr. 511. n. 80.*
Adans. Seneg. I. t. 14. f. 2. Garin.

Lift. Conch. t. 210. f. 44. & t. 1059. f. I.

Gualt. test. t. 99. f. E. & t. 104. f. F?

Schroet. Litterat. I. t. I. f. 7.

Chemn. Conch. 7. t. 47. f. 479-482.

β) Regenf. Conch. I. t. 9. f. 30.

Habitat in Oceano indico & americano; mari rubro, mediterraneo, β) in Guinea, testa alba lineis venis que nunc flavicantibus & rubellis, nunc subfuscis & violaceis varia, β) aurantia.

citreus. 4. Sp. testa oblonga plicata spinosa.

Argenv. Conch. t. 20. f. K.

Habitat - - - testa imbricata, 2 circiter pollices longi, 1½ lata, -citra, aut rubra margine interno aurantio-

311. CHAMA. *Animal Tethys.**Testa bivalvis, grossior.**Cardo callo gibbo, oblique inserto
fossulae obliquæ.**Vulva clausa absque nymphis.*

1. Ch. testa subrotunda lævi: natibus recurvatis, rima
hiante. *Mus. Lud. Ulr. 516. n. 88.**

*Lift. Conch. t. 275. f. III.**Bonann. recr. 2. f. 88.**mus. Kirch. 2. f. 92.**Rumpf mus. t. 48. f. 10.**Gualt. test. t. 71. f. E.**Seb. mus. 3. t. 86. f. I.**Ginann. adriat. t. 2. t. 19. f. 129.**Knorr Vergn. 6. t. 8. f. I.**Chemin. Conch. 7. t. 48. f. 483.*

*Habitat in mari adriatico versus Dalmatiam, etiam eas-
pico, testa grandi intus alba, exterius sub epidermide
nigricante ex alba & subfuscō varia, crassa, subrotun-
da, transversim rugosa clausa, margine integerrimo,
valvis figura cor turgidum referentibus, natibus ru-
bellis, magnis, instar cornu arietis contortis, ani re-
gione retusa, in medio paulisper elevata; vulva ovato-
oblonga: nymphis nudis ligamento coriaceo obtegdis.*

2. Ch. testa plicata fornicate-squamosa: ano hiante. *Mus.
Lud. Ulr. 512. n. 81.**

*Rumpf mus. t. 42. f. A. B. Chama squamata.**Argenv. Conch. t. 23. f. E. Imbricata.**Lift. Conch. t. 351. f. 189. t. 352. f. 189. b. t. 353. f.
190. t. 354. f. 191.**Bonann. recr. 2. f. 83. 84.**mus. Kirch. 2. f. 82. 83.**Petiv. amb. aq. t. 5. f. 13. & t. 7. f. 13.**Gualt. test. t. 92. f. A-G. & t. 93. f. B.**Klein ostr. t. 10. f. 53.**Lochner mus. Beßler. t. 20.**Olear. mus. t. 29. f. 6.**Knorr delic. t. B. III. f. I.**Vergn. 1. t. 19. f. 3. & 6. t. 36. f. 3.**Regenf. Conch. 1. t. 10. f. 48.*

Murray testaceol. t. 2. f. 12. 20.

Chern. Conch. 7. t. 49. f. 492-496.

§) *Chern. Conch.* 7. t. 49. f. 497.

Habitat in Oceano indico, testa lucida alba, extrinsecus interdum rosea, aut ex flavo rubro alboque varia, minimum $\frac{3}{4}$ pollicis longa, & $1\frac{1}{2}$ lata, sed saepius omnino concharum maxima, ut 532 libras pondere aequat, mali inhabitante tam grandi, ut 120 hominibus cibis servire queat, tamque robusto, ut navium funes distendere, hominumque manus resecare vivum valeat; costis, sulcis, squamis magnitudine variis, ani his ovali: ambitu tunido crenato, testae margine dentata, cardine praeter callum sub vulva dente armato.

Hippo-
pus.

3. Ch. testa plicata muricata; ano retuso clauso dentato
Mus. Lud. Ulr. 513. n. 82.*

Rumpf mus. t. 42. f. C. *Chama aspera obtusa.*

Argenv. Conch. t. 23. f. H. *Folium brassicæ.*

Lift. Conch. t. 349. f. 187. t. 350. f. 188.

Bonann. recr. 2. f. 81. 82.

mus. Kirch. 2. f. 80. 81.

Petiv. amb. aq. t. 18. f. 15.

Gualt. test. t. 93. f. A.

Lesser testaceoth. f. 124.

Regenf. Conch. 1. t. 10. f. 49.

Knorr Vergn. 1. t. 22. f. 1. 2. & 6. t. 9. f. 3.

v. *Born. mus. Caes. Vindob. test.* p. 79. vign.

Chern. Conch. 7. t. 50. f. 498. 499.

Habitat in Oceano indico, testa ad 5 pollices longa,
lata, alba, extrinsecus maculis rubris & purpureis
varia, interdum flavicante, ventricosa, cardinis
flavis, in altera valva 2.

antiqua-
ta.

4. Ch. testa subcordata: fulcis longitudinalibus striis
transversis. *Mus. Lud. Ulr.* 514. n. 84.*

Adans. Seneg. 1. t. 16. f. 2. Ajar.

Bonann. recr. 2. f. 93.

mus. Kirch. 2. f. 96.

Valent. Abh. t. 16. f. 30.

Gualt. test. t. 71. f. I. L.

Knorr Vergn. 2. t. 20. f. 3. & t. 14. f. 2.

Chern. Conch. 7. t. 48. f. 488-491.

Habitat in mari atlantico, americano, indico, tepe
quilatera, maculis fuscis, rarius ferrugineis varia,

19-22 ut plurimum transversim striatis, margine dentato, natibus anum versus inflexis, vulvæ rima profunda clausa.

- trapezia* 5. Ch. testa trapezia gibba: sulcis longitudinalibus crenulatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2981.
Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 236. n. 5. t. 8.f. 17.

Habitat in mari norwegico, testa parva, pisti magnitudine alba, extrinsecus antrorum fusca albo mixta, instar arcæ noæ gibbosa margine crenulata: striis circiter 20 nodulis obtusis inæqualibus, natibus parum recurvatis, ano ovato-cordato, vulva oblonga, distincta, plana, extus crenata.

- semiorbiculata.* 6. Ch. testa suborbiculata compressa rudi decussatim striata. *Mus. Lud. Ulr.* 514. n. 85.*

β) *Linné Lehrb. Thierr.* 2. t. 37. f. k?

Habitat — — testa longitudinaliter striata, squamis annotinis imbricata, ani lobo albido, margine posteriori crenato.

- calycula*-
7. Ch. testa oblonga: sulcis imbricatis, anterius retusa. *Adans. Seneg.* 1. t. 15. f. 8. *Jeson.*

List. Conch. t. 347. f. 184. n. 185.

Gualt. test. t. 90. f. F.

v. *Born. mus. Caes. Vind. test. t. 5. f. 10. II.*

Chemin. Conch. 7. t. 50. f. 500. 501.

β) *List. Conch.* t. 248. f. 186.

γ) *Bonann. mus. Kirch.* 2. f. 127.

Habitat in mari atlantico, americano & indico, interdum fossilis, testa ultra $\frac{1}{2}$ pollicem longa, $1\frac{1}{2}$ lata; alba, juniore fusca, cardinis dentibus 2, margine exteriori serrato, incriore leviti.

- cordata.* 8. Ch. testa cordata transversim striata, hinc elongata compressa. *Mus. Lud. Ulr.* 515. n. 86.*

β) *Knorr Vergn.* 2. t. 23. f. 7.

Chemin. Conch. 7. t. 50. f. 502. 503.

Habitat — — β) in mari rubro & indico, testa ferruginea β) spadicea, sulcis inferne, non versus marginem exteriorem, transversis, distinctis, obtusis: angulo inter rimam & marginem exteriorem elongato obscuriore.

- reniformis.* 9. Ch. testa subrotunda: sulcis dentatis punctis interlineatis, ano retuso.

VERMES TESTACEA. Chama.

Habitat — — testa alba extrinsecus rufescens : *sulcata*
elevatis longitudinaliter dentatis, alternis brevioribus
margine crenulato, ano cordato.

oblonga. 10. Ch. testa oblonga anterius angulata : dentatis anterioribus acutis. *Mus. Lud. Ulr.* 515. n. 87.*
Chern. Conch. 7. t. 50. f. 504. f. 505.

Habitat rarer ad Guineæ littora, mytilo modiolo affini, testa subdiaphana alba subtilissime decussata striata, intus citrea, margine integerrimo, *cardinali* dentibus 3 mediis, & laterali oblongo acuto, *forensi* inter binos dentes alterius valvæ interdum inserto.

Lazarus. 11. Ch. testa imbricata lamellis laceris, nate oblique spirali. *Mus. Lud. Ulr.* 513. n. 83.*
Argenv. Conch. t. 20. f. F. *Placenta foliacea.*
Rumpf mus. t. 47. f. C. t. 48. f. 3.
Valent. Abb. t. 13. f. 4. t. 16. f. 22.
Seb. mus. 3. t. 88. f. 12. t. 89. f. 6. 9. 11.
Knorr Vergn. 1. t. 8. f. 1.
v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 5. f. 12-14.
Chern. Conch. 7. t. 51. f. 507-509.

Habitat in India, scopolis adhaerens, testa flavo-
alba natibus rubris intus glabra: valva superiore ^{lato}
minore & planiore, in inferioris cardine callo obtri-
casso, lato, ad alterutrum latus crenato: for-
obliqua adjacente.

gryphoi- 12. Ch. testa orbiculata muricata : valvula altera planior
des. altera nate productiore subspirali.
Rondel. test. I. c. 25. *Concha rugata.*
Adans. Seneg. I. t. 15. *Jataron.*
Lift. Conch. t. 212. f. 47. t. 213. f. 48.
Gualt. test. t. 101. f. C. D. E. F.
Klein oſtr. t. 12. f. 86.
Knorr Vergn. 6. t. 16. f. 1.
Chern. Conch. 7. t. 51. f. 510-513.
Gesn. aq. 316.
Aldr. exsang. 458.
Sloan. jam. t. 241. f. 4-7.
β) Gualt. test. t. 101. f. L.
γ) Knorr Vergn. 3. t. 6. f. 1.
δ) Kaemmerer Cabin. Rudolſt. p. 234. *vign.* f. 1.
Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 255. t. 8. f. 19.

ε) Chemn. Conch. 9. t. 116. f. 992.

ξ) Chemn. Conch. 9. t. 116. f. 993.

Habitat in mari mediterraneo , americano , indicō , fixa
testae proportione & cardine Lazaro affinis , testa alba , fla-
via , rubra , sanguinea , albo rubroque varia , squamis
nunc magis foliaceis , nunc fornicatis & muricatis .

bicornis. 13. Ch. testa valvulis conicis : natibus corniformibus obliquis
tubulosis valvula longioribus.

Column. purp. c. 19. p. 43.

Major testac. t. 2.

Lift. Conch. t. 214. f. 49.

Gualt. test. t. 101. f. G.

Klein ostr. t. 12. f. 87. 88.

Chemn. Naturf. 20. t. 1. f. 1-5.

Conch. 7. t. 52. f. 516.-520.

Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 245. t. 8. f. 18.

Habitat rara in Oceano indicō & americano , etiam medi-
terraneo gryphoidi affinis , testa utrinque flava , rubra aut
alba , imbricatim lamellata , rarius rugosa .

Arcinella. 14. Ch. testa sulcata muricata excavato-punctata , cardinis
callo sessili.

Lift. Conch. t. 355. f. 192.

Bonann. recr. 3. f. 336.

mus. Kirch. 2. f. 101.

Olear. mus. t. 29. f. 3.

Lesser testaceoth. f. 98.

Knorr Vergn. 6. t. 14. f. 1. & t. 36. f. 1. 2. 3.

Chemn. Conch. 7. t. 52. f. 522. 523.

Habitat rario in Oceano americano , testa 2 pollices late,
& pene æque longa , alba , spinis rarius roscis , intus fla-
vicante , margine crenata ; ano cordata , impresso , ver-
rucoso , rugoso magno ad alterum latus appendice sa-
pius auctio.

Moltkia- na. 15. Ch. testa obtuse triangula æquilatera plicata , vulva
elevata plicis striisque obliquis inæquali.

Chemn. Conch. 7. t. 48. f. 484-487.

Habitat - - - Ch. cordi affinis , nucis avellanæ oblongæ
magnitudine , testa laetæ , opaca ; natibus paulisper
distantibus , cardinis dente sub natibus angusto rotundato

Chama plurime fixæ adhaerent aliis corporibus , valva superiore sapient planiore .

scrobi profundæ apposito, cui dens alterius valvæ inferatur, alteraque antrosum foveola longa profunda imbinos dentes intermedia, & paulo magis retrorsum adhuc rotundato & dilatato dente.

concavæ-16. Ch. testæ rugis transversis, strias latas longitudinales rata. decussantibus; utriusque valvæ medio intus ^{gamer} auctio.

Walch. *Naturf.* 12. p. 53. t. 1. f. 5-7.

Chemin. *Conch.* 7. t. 50. f. 506. a-d.

Habitat rarissima in Oceano americano, testa parva, albida,

macero- 17. Ch. testa rotundata seriatim lamellata: margine interna phylla. crenulato.

Seb. *muf.* 3. t. 88. f. 8.

Knorr *Vergn.* 1. t. 21. f. 2. & 5. t. 24. f. 1.

Chemin. *Conch.* 7. t. 52. f. 514. 515.

β) Seb. *muf.* 3. t. 89. f. 12?

Habitat in Oceano americano, gryphoidi perquam affinis testa nunc flava, nunc rubra nunc albo rubroque varia intus nunc alba, nunc rubra, β) elegantiissime variezta; valva utraque convexa, lamellis marginem verticis crescentibus; an varietas Lazari?

foliacea. 18. Ch. testa alba: striis transversis foliaceis serratis, interstiis crenatis, natibus recurvatis.

Lift. *Conch.* t. 215-217. f. 51-53.

Klein *ostr.* t. 12. f. 81.

Chemin. *Conch.* 7. t. 52. f. 521.

β) Lift. *Conch.* t. 215. f. 50.

Habitat in mari mediterraneo & americano, fossilis quodammodo in Campania Galliæ, testa nunc subrotunda nunc oblonga;

arata. 19. Ch. testa rotundata alba, fusco undulata: costis triangularibus perpendicularibus rugosis, margine inæquali.

Bonann. *recr.* 2. f. 86.

muf. Kirch. 2. f. 84.

Habitat rare in Syracusano littore, utrum hujus generis an ad cardia referenda.

fusca. 20. Ch. testa rugosa oblonga angusta fusca: valvæ interioris nate protensa rotundata subincurva.

Gualt. *test.* t. 101. f. 1.

Habitat - - -

21. Ch. testa subrotunda ventricosa inæquivalvi marginata : spinis sparsis inæqualibus squamosis.
Regenf. Conch. I. t. 4. f. 44.
Habitat in Oceano americano, testa citrea, cardine ad chamas accedente.
22. Ch. testa subrotunda longitudinaliter striata, ano retuso.
Molin, hist. nat. Chil. p. 178.
Habitat ad littus Chilense in arena se occultans, testa alba violacea & flava intus eleganter purpurascente diametri 4 pollicum, verme incola sapidissimo.
23. Ch. testa suborbiculata : sulcis profundissimis, rugis subimbricatis, margine dupliciter plicato. Mant. 2. p. 546.
Habitat - - - testa magnitudine extini digitii, gibba, crassa, sulcis 30, margine interiore obtuso plicato, exteriore unguibus eminentibus concavis e ruga educatis, cardine sulcis 2-3 obliquis versus vulvam declinatis.
24. Ch. testa obliqua lacuna laterali, rugosa, cardinis collodentato. Mant. 2. p. 546.
Habitat in Barbaria, Anomiae Gryphi facie, testa ponderosissima, crassissima, pugni magnitudine, natibus oblique versus anum incurvatis longitudinaliter concavum, vulva longitudinaliter canaliculata, versus nates obliqua.
25. Ch. testa cylindrica alba diaphana decussatim striata : striis transversis arcuatis imbricatis. Chemin, Conch. IO. p. 359. t. 172. f. 1673. 1674.

312. ARCA. Animal. Tethys?

Testa bivalvis æquivalvis.

Cardo dentibus numerosis acutis alternis insertis.

* *margine integerrimo.*

† *natus recurvatis.*

I. A. testa parallelepipedæ striata : valvula oblique carinata.
Mus. Lud. Ulr. 517. n. 861.*
Rumpf mus. t. 47. f. k. Ostreum tortuosum.
Bonann. mus. Kirth. 2. f. 122. 123.
Petiv. amb. sq. t. 20. f. 9.

Gualt. test. t. 95. f. B.
Argenv. Conch. t. 19. f. I.
Klein oft. t. 8. f. 16.
Lesser testaceoth. f. 137.
Knorr Vergn. I. f. 23. f. 3.
Martin. Besch. berl. Naturf. 3. t. 6. f. 14.
Chemn. Conch. 7. t. 53. f. 524. 525.
*Habitat rara & pretiosa in Oceano indicō, testa alba, intus
dum subfuscō-maculata aut nebulosa triplo latiore,
longa, ex irinsecus varia directione & intus striata,
vis dissimilibus, margine intus, in junioribus utrinque
crenato.*

†† natibus inflexis.

- Noæ. 2. A. testa oblonga striata apice emarginata, natibus rem-
tissimis, margine hiante. *Mus. Lud. Ulr. 517. n. 70.*
Rondel. aq. 2. p. 27. Concha rhomboides.
Lift. Conch. t. 368. f. 208. & t. 369. f. 209. Musculid.
Matthioli.
Rumpf mus. t. 44. f. P. Arca Noæ.
Adans. Seneg. I. t. 18. f. 9. Mussole.
Bonann. recr. 2. f. 32. Concha rhomboides.
mus. Kirch. 2. f. 31.
Petiv. amb. aq. t. 17. f. 10.
Gualt. test. t. 87. f. G. H. 1?
Argenv. Conch. t. 23. f. G.
Lesser testaceoth. f. 138.
Knorr delic. t. B. V. f. 2.
Vergn. I. t. 16. f. I. 2.
Regenf. Conch. I. t. 12. f. 73.
Martini Besch. berl. Naturf. 3. t. 6. f. 5.
Chemn. Conch. 7. t. 53. f. 529-531. a. b. & t. 54. f. 532.
533.
β) *Argenv. Canc. t. 29. f. 20. A.*
*Habitat in mari mediterraneo, rubro, atlantico, americanis
indico, testa alba, rarius unicolo. frequentius subfusca
luteo aut fuscō maculata nebulosa, striata, undulosa, rora-
sa, rhomboidea, margine extimo crenato, interno latitudi-*
barbata. 3. A. testa oblonga striis barbata : natibus approximatis
margine clauso. *Fn. suec. 1147. Mus. Lud. Ulr. 517.
n. 91. Müller. zool. dan. prodr. 2982.*
Rondel. test. 14. Chama aspera.
Lift. Conch. t. 231. f. 65.

- Bonann. *recr.* 2. f. 79.
 muf. Kircher. 2. f. 78.
 Gualt. *test.* t. 91. f. F.
 Argenv. *Conch.* t. 72. f. M.
 Knorr *Vergn.* 2. t. 2. f. 7.
 Murray *testaceol.* t. 2. f. 22.
 Martini *Besch. berl. Naturf.* 3. t. 6. f. 8.
 Chemn. *Conch.* 7. t. 54. f. 535.
 β) Arca tortuosa. *Müll. zool. dan. prodr.* 2983.
 γ) Gualt. *test.* t. 90. f. B.
 Martini *Besch. berl. Naturf.* 3. t. 6. f. 12.
 Chemn. *Conch.* 7. t. 54. f. 534.
 δ) Seb. *muf.* 3. t. 88. f. 13.
 Chemn. *Conch.* 7. t. 54. f. 536. f. 537.
 Mus. *Tessin.* t. 6. f. 1.
 ε) Rumpf *muf.* t. 44. f. L. *Pecten saxatilis?*

Habitat in mari mediterraneo, rubro, indico, β) in norwegico, γ) etiam in americano, testa sub fibris subsparsa, interdum albo mixta, decussatim striata: fibris in sectionis angulo nodolosis.

Modiolus. 4. A. *testa oblonga striata anterius angulata.*

Habitat in mari mediterraneo, testa mytili modioli figura, fabae majoris magnitudine, exterius flavescens, intus alba aut subviolacea: cardine elongato, valvis anterius profundius striatis, posterioribus natibus vix vel parum longioribus. Zoega.

5. A. *testa ovata pellucida substriata: vulva prominente distincta, cardine ciliari.*

Chemn. *Conch.* 7. t. 55. f. 546.

Habitat in mari mediterraneo, testa alba, nitidissima, magnitudine seminis helianthi annui, subtrigona: fibris subtilissimis transversis semilunatis, natibus mediis vulva transverse striata, cardinis dentibus. sub vulva praesertim, subulatis, acutissimis, margine intus & extrinsecus edentulo. Logie.

6. A. *testa ovata decussatim striata nivea epidermide pulla obtecta: margine hianti.*

Chemn. *Conch.* 7. t. 54. f. 538.

Habitat in mari rubro, testa magna, ano excavato undulatim sulcato & striato; an hujus familie?

D d d d d d d d

- pellucida. 7. A. testa pellucida fragili anterius posteriusque rotundata obsolete striata : cardinis dentibus acutissimis.
Spengl. Catal. t. I. f. 10. II.
Chemn. Conch. 7. t. 55. f. 541. a. b.
Habitat ad insulas Nicobaricas, testa tenui straminea rarius fusca intus fuliginea.
- rostrata. 8. A. testa convexiuscula transversim striata posterius rotundata anterius in rostrum acutum producta.
Martini Besch. Berl. Naturf. 3. t. 7. f. 17. 18.
Schroet. Flusconch. t. 9. f. 2.
Chemn. Conch. 7. t. 55. f. 550. 551. a. b.
Habitat in mari Baltico & Norwegico, tellina rostrata affinis, testa epidermide virescente testa, ad $\frac{1}{2}$ pollicem longa, & $1\frac{1}{4}$ lata, natibus minutis, antrorsum flexilis.
- striata. 9. A. testa lentiformi copiosissime decussatim striata lateribus intus rubella, ano triangulare, cardine arcuato.
Chemn. Conch. 7. t. 58.
Habitat in mari rubro, testa pollicem lata & paulo longioris.
- pulchella. 10. A. testa subrotunda biradiata : striis transversis arcuatis.
Rumpf mus. t. 47. f. 1.
Habitat - - - an hujus generis & ordinis?
- afra. 12. A. testa exalbida epidermide albicante testa subtilissima decussatim sulcata oblique truncata.
Adans. Seneg. 1. t. 18. f. 8. Jabet.
Habitat ad Africæ littus occidentale, testa 4-5 lineas longa, & 3 lata, sulcis longitudinalibus 40-50, transversis 20, natibus approximatis, margine clauso.
- fossilis. 12. A. testa crassa subrotunda longitudinaliter striata transversim costata : costis undulatim striatis.
Schroet. neue Litterat. 2. f. 3. 4.
Habitat - - - hactenus modo fossilis reperta in Ducaru Limburgensi, testa 3 pollices longa, $3\frac{1}{4}$ lata.
- cancel- 13. A. testa cancellatim striata barbata, margine medio lata. hiante.
Schroet. Eind. in Conch. 3. p. 294. t. 9. f. 2.
Habitat in Oceano americano, testa sub epidermide nigra utrinque subfuscata, exterius albo mista, utrinque 4 pilorum fasciculis fimbriatis hianta, natibus subtervis, ano lanceolato.

minuta. 14. A. testa compressiuscula transversim striata : fine remotoire attenuato ; opposito rotundato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.*
414. n. 415. *Müll. zool. dan. prodr.* 2985.

Chemn. Conch. 10. t. 170. f. 1657. 1658.

Habitat rarissima in maris Groenlandiam alluentis profundis, testæ figura a. myas accedens, testa ochroleuca glabra, clausa, 2½ lineas longa, 4 lata, natibus conniventibus, albis, acutis, non stria. is.

** margine crenato.

† natibus recurvatis.

laetea. 15. A. testa subrhomboidea obsolete decussatim striata dia-
phana.

List. Conch. t. 235. f. 69.

Bonann. recr. 2. f. 34.

muf. Kirch. 2. f. 33.

Chemin. Conch. 7. t. 55. f. 547.

*nodulosa. β) Arca testa oblonga nodulis striata, natibus incurvis remo-
tis, margine integerrimo clauso. Müll. zool. dan. prodr.*
2984.

*Habitat in omni mari europæ, fabæ equinæ magnitudine;
natibus approximatis.*

antiquata. 16. A. testa oblique cordata multisulcata : fulcis muticis.

Mus. Lud. Ulr. 518. n. 91.

Adans. Seneg. I. t. 18. f. 7. *Anadara.*

List. Conch. t. 230. f. 64. & t. 236. f. 70.

Bonann. recr. & muf. Kirch. 2. f. 73. 74.

Rumpf muf. t. 44. f. 1.

Petiv. amb. ag. t. 17. f. 8.

Gualt. test. t. 87. f. B. C.

Klein ostr. t. 11. f. 73.

Gronov. zooph. t. 18. f. 13.

Knorr Vergn. I. t. 24. f. 3. 4.

Murray testaceol. t. 2. f. 15.

Chemin. Conch. 7. t. 55. f. 548. §49.

*Habitat in Oceano indico, americano, mari mediterraneo,
testa satis magna alba, epidermide pilosa obtecta, vulva
regione quasi angulo compresso prominente.*

*tenilis. 17. A. testa oblique cordata octosulcata lævi, margine pli-
cato. Mus. Lud. Ulr.* 518. n. 92.*

*An huic generi accessenderæ. & cuinam eius tribus & familie conchæ ab Argeuville
Conch., t. 25. f. 17. a. & a Knorr Vergn. I. t. 21. f. 4. delineata?*

Adans. Seneg. I. t. 18. f. 5. Fagan.

Lift. Conch. I. 238. f. 72.

Gualt. test. t. 87. f. D.

Argenv. Conch. I. 23. f. k.

Chemin. Conch. 7. t. 56. f. 554-556.

*Habitat in Oceano americano, & ad Africæ littus occidente
tale, testa crassa ultra 3 pollices longa & 4 lata alta
epidermide nigra, aut (in junioribus) fusca thalassij
misca obducta, anterius hiante.*

*granosa. 18. A. testa subcordata : fulcis muricatis. Mus. Lud. Ulr.
519. n. 63.**

Column. purp. II. p. 29. 30.

Major test. t. 10. f. 3.

Lift. Conch. I. 241. 78. & f. 242. f. 79.

Rumpf mus. I. 44. f. k.

Petiv. amb. aq. t. 17. f. 7.

Gualt. test. 87. f. E.

Argenv. Conch. I. 23. f. C.

Klein astr. t. 10. f. 45. 46.

Knorr Vergn. 6. t. 34. f. 2.

Martini Besch. berl. Naturf. 3. t. 6. f. 10.

Chemin. Conch. 7. t. 56. f. 557.

*Habitat in Oceano iadico & americano, testa alba,
pollicem longa, & 1 $\frac{1}{2}$ lata, fere æquilatera, costis
ter 20 validis spinoso tuberculatis.*

*Corbicula- 19. A. testa ovata compressiuscula : striis perpendicularibus
la, confertim nodulosis, natibus obtusis approximatis.*

Chenn. Conch. 7. t. 56. f. 558.

β) Lift. Conch. I. 234. f. 68.

Klein astr. t. 10. f. 43. 44.

Chenn. Conch. 7. t. 65. f. 559.

*Habitat ad insulas Nicobaricas, granosæ affinis, testa
circiter lineas longa & pollicem lata, β) subglobosa inter
capillariter striata.*

*decussata. 20. A. testa lenticulari decussatim substriata, rima clavis
Mus. Lud. Ulr. 519. n. 94.**

Regenf. Conch. I. t. 2. f. 22.

Knorr Vergn. 5. t. 30. f. 3.

Chenn. Conch. 7. t. 57.

*Habitat in Oceano americano, testa maculis fusco-sanguineis
varia, striis transversis nudo oculo vix conspicuis,
aene leviter arcuato.*

- equilatera.* 21. A. testa lenticulari subæquilatera extrinsecus intusque perpendiculariter striata alba : maculis spadiceis.
Chemn. Conch. 7. t. 57. f. 562.
Habitat rario in Oceano americano, decussatæ affinis,
et testa tenuiore, natibus approximatis.
- Pallens.* 22. A. testa lenticulari subobliqua decussatim striata, rima angustissima. *Mus. Lud. Ulr.* 519. n. 95.*
Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 270. t. 9. f. 1.
Habitat in Oceano indico & americano, testa æquilatera intus alba, exterius pallide interdum hinc inde obscurius maculata & nebulosa, striis subtilibus, transversis subtilissimis confertissimis, natibus mediis conniventibus, cardine arcuato.
- Cucullus.* 23. A. testa ventricosa decussatim striata : vulva cordata ; valvis intus costa curvata violaceo-fasciata, auctis, altera prominente, natibus remotis.
Martini Besch. Berl. Naturf. 3. t. 7. f. 15. 16.
Chemn. Conch. 7. t. 53. f. 526-528.
Habitat ad insulas Nicobaricas, testa ultra 2 pollices longa, & ultra 3 lata, extrinsecus cinnamomea ; utrum hujus, an sequentis familiæ ?
- magellani.* 24. A. testa utrinque rotundata decussatim striata spadicea : margine externo in medio inflexo repando, natibus approximatis.
Chemn. Conch. 7. t. 53. f. 539.
Habitat in freto magellanico.
- reticulata.* 25. A. testa subrhomboidea decussatim striata alba : natibus approximatis, vulva cordata.
Lift. Conch. t. 233. f. 67.
Martini Besch. Berl. Naturf. 3. t. 6. f. 9.
Chemn. Conch. 7. t. 54. f. 540.
Habitat - - arcæ Noæ affinis ; utrum hujus, an sequentis familiæ ?
- candida.* 26. A. testa pellucida rhomboidali anterius producta posterius truncata decussatim striata : natibus remotis, margine posterius hiante ; hiatu ovato ciliato.
Chemn. Conch. 7. t. 55. f. 542.
) Chemn. Conch. 1. t. 55. f. 544.
Habitat in Oceano americano & ad Africæ littus occiden-

*le, testa alba, quasi granulata, epidermide villosa et
atro subfuscā obducta.*

- indica. 27. A. testa inaequivalvi ovata : striis planis longitudinalibus fulcisque profundis, vulva cordata.
Lift. Conch. t. 232. f. 66.
Martini Besch. Berl. Naturf. 3. t. 6. f. 13.
Chemn. Conch. 7. t. 55. f. 543.
 β) *Mart. Besch. Berl. Naturf. 3, t. 6. f. 11.*
Chemn. Conch. 7. t. 56. f. 552.
*Habitat in Oceano indico, testa $\frac{1}{4}$ pollicis longa. 8¹¹
lata, alba, epidermide fusca villosa testa.*
- jamaicensis. 28. A. testa anterius truncata posterius rotundata : collis perpendiculatis crenatis vel nodulosis.
Lift. Conch. t. 229. f. 64.
Habitat ad Jamaicam, utrum hujus, an sequentis familiæ
- campechiensis. 29. A. testa ovata : striis perpendicularibus latis crenatis aut squamosis, cardine arcuata.
Lift. Conch. t. 237. f. 71.
 β) *Lift. Conch. t. 243. f. 74?*
Habitat in sinu Campechienfi, β) apud Börbados.
- lata. 30. A. testa latiuscula cancellata anterius truncata : vulva cordata.
Gault. test. t. 90. f. C.
Habitat - - - testa ventricosa vix pollicem lata & dimidio breviore ; utrum hujus, an sequentis familiæ?
- senegallenfis. 31. A. testa ovata longitudinaliter sulcata transversiter subrugosa alba.
Adans. Seneg. 1. t. 18. f. 6. Robet.
*Habitat ad Africæ littus occidentale, testa 8 lineas longas
& 10 lata interdum subrubella, intus quoque sulcata;*
†† natibus inflexis.
- undata. 32. A. testa lenticulari inaurita laeviuscula : margine plicata
Bonann. recr. 2. f. 60. 61.
muf. Kirch. 2. f. 58. 60.
Gault. test. t. 72. f. G.
Knorr Vergn. 6. t. 14. f. 4.
Martini Besch. Berl. Naturf. 3. t. 6. f. 2.
Chemn. Conch. 7. t. 57. f. 560.

Habitat in Oceano americano, pectunculo affinis, testa ad 2 pollices longa, & perinde lata & quivalvi, subtilissime & confertim transverse striata, fusco maculata, intus alba, interdum quoque fusco maculata, natibus approximatis, cardine arcuato.

Pectunculus. 33. testa lenticulari subaurita sulcata : sulcis subimbricatis, margine plicato. *Mus. Lud. Ulr. 520. n. 96.*⁷

List. Conch. t. 239. f. 73.

Bonann. mus. Kirch. 2. f. 129.

Gualt. test. t. 72. f. H.

Knorr Vergn. 5. t. 12. f. 4.

Martini Besch. berl. Naturf. 3. t. 6. f. 3. 4.

Chemin. Conch. 7. t. 58. f. 568. 569.

Habitat rario in Oceano americano & mari rubro, testa planiuscula, ad $1\frac{1}{2}$ pollicem longa, vix latiori, alba maculis sparsis fusca interdum tessellatis varia, intus fusca, albo nonnunquam internijlo, striis 16-20, cardine arcuato.

Pectinata. 34. A. testa lenticulari inaurita longitudinaliter striata : striis levibus.

Chemin. Conch. 7. t. 58. f. 570. n. 1. 2. & f. 571.

B) List. Conch. t. 239. f. 81.

Klein ostrac. t. 10. f. 41.

Habitat in Oceano americano, pectunculo affinis, at testa minore magis convexa, fusca, spadicea, aut lutea punctata, maculata, nebulosa, aut undulata, intus subfuscata aut alba.

Glycymeris. 35. A. testa suborbiculata gibba substriata. *Mus. Lud. Ulr. 521. n. 97.*

List. Conch. t. 247. f. 82. Chama glycymeris.

Adans. Seneg. 1. t. 13. f. 10. Vovan.

Bellon. eq. 403.

Rondel. test. 31.

Gualt. test. t. 82 f. C. D.

Knorr Vergn. 1. t. 21. f. 4. & 6. t. 14. f. 3.

Chemin. Conch. 7. t. 57. f. 564.

Habitat in mari mediterraneo, ad Africæ littus occidentale, in Oceano americanus pilosa minor, magis levis & plina, striis transversis oculo nudo vix conspicuis, cardine arcuato, superficie nunc cincta, nunc spadicea, nunc rubra, nunc flava, nunc maculata, nunc nebulosa, nunc undulata, nunc lineis angulatis notata.

- pilosæ. 36. A. testa suborbiculata æquilatera pilosa.
Gualt. test. t. 73. f. A. Ponderosa serico indumento
Bonann. recr. 2. f. 80. Nux pilosa.
mus. Kirch. 2. f. 79.
List. Conch. t. 240. f. 77.
Knorr Vergn. 2. t. 23. f. 6. & 6. t. 12. f. 4.
Martini Besch. berl. Naturf. 3. t. 6. f. 1.
Chemn. Conch. 7. t. 57. f. 565. 566.
ε) Bonann. recr. 2. f. 78.
mus. Kirch. 2. f. 77.
γ) List. Conch. t. 246. f. 80?
Born mus. Caes. Vind. test. t. 6. f. 1. a. b.
δ) Bonann. mus. Kirch. 2. f. 131?
*Habitat in mari mediterraneo, in Oceano asiatico & americanus
 cano, testa $2\frac{1}{2}$ pollices longa & $2\frac{1}{4}$ lata fusca, intus
 alba, interdum fusco maculata, epidermide villosa testa
 striis perpendicularibus obliquis, intus quoque conspicu-
 cis rugas transversas decussantibus.*

- numma- 37. A. testa subrotunda lævi subaurita transversim striata
 ria. *Habitat in mari mediterraneo, testa unguis magnitudine
 nitido glabra ruso undulata: striis subtilissimis.*

- Nucleus. 38. A. testa oblique ovata læviuscula: cardine triangulare
Gualt. test. t. 88. f. R.
Chemn. Conch. 7. t. 58. f. 574. a. b.
*Habitat in Oceano septentrionali, hinc inde etiam in
 Europa fossilis, testa avellanæ magnitudine, sub epidermide
 olivacea alba intus argentea, subtrigona, striis
 perpendicularibus subtilissimis, transversis arcuatis passis,
 ano subcordato.*

- rhomboi- 39. A. testa tota alba rhomboideo cordata costata: collis
 dea. anterioribus & dorsaliibus nodulosis, natibus remotis
List. Conch. t. 244. f. 75.
Gualt. test. t. 87. f. A.
Knorr. Vergn. 4. t. 14. f. 2.
Chemn. Conch. 7. t. 56. f. 553. a. b.
*Habitat in Oceano indico & americano, vulva cordata
 ano rhomboidalis.*

- rram- 40. A. testa æquilatera tenui planiuscula subtilissime decu-
 rata. *Intus striata, natibus approximatis, cardine arcuato.*
Chemn. Conch. 7. t. 57. f. 563.

Habitat in Oceano americano, testa alba, characteribus maculisque flavicantibus varia.

angulosa. 41. A. testa ventricosa longitudinaliter striata & lineata altero latere angulata, natibus approximatis, cardine arcuato.
Lift. Conch. t. 245. f. 76.

Chemn. Conch. 7. t. 57. f. 567.

Habitat ad littus Africæ occidentale & in Oceano americanus, testa fusca, aliter atque aliter maculata.

Scapha. 42. A. testa oblonga maxime depressa striata: natibus vix prominulis. Gronov. zooph. t. 18. f. 7.
Habitat ad insulam Zeylon.

313. OSTREA. Animal Tethys.

Testa bivalvis (plurimis) inæquivalvis, subaurita.

Cardo edentulus fossula cava ova-
ta, sulcisque (in plurimis) la-
teralibus transversis.

Vulva anusve nullus.

* *valvis auriculatis radiatis, Pectines.*

† *æquilateres, auriculis æqualibus.*

maxima. I. O. testæ radiis rotundatis longitudinaliter striatis. Fn.
succ. 2148. Mus. Lud. Ulr. 522. n. 98. Müll. zool.
dan. prodr. 2989.

Lift. an. angl. t. 5. f. 29. Pecten maximus.

Conch. t. 263. f. 1. & t. 167. f. 4.

Bonann. recr. 2. f. 8.

mus. Kirch. 2. f. 7.

Gualt. test. t. 98. f. A. B. t. 99. f. A.

Knorr Vergn. I. t. 14. f. 1. 2. & 2. t. 14. f. 1. & t. 17. f. 1. 3?

Regenf. Conch. I. t. 2. f. 19. & t. 7. f. 3.

Bytem. app. t. 12. f. 50.

Chemn. Conch. 7. t. 60. f. 585 - 587.

?) Lift. Conch. t. 168. a.

?) Knorr del. nat. sel. t. B. II. f. 2?

Vergn. I. t. 4. f. 2?

*Habitat in omni fere mari europæo, testa 5 circiter pollicے
longa, 5½ lata, auriculis magnis decussatim striatis
cardinis fossula ampla profunda, valva inferiore convexus
alba, saepius fasciis maculisve rubris varia, superio
plana rubra, radiis circiter 14.*

- jacobæa.** 2. O. testæ radiis quatuordecim angulatis longitudinaliter
striatis. *Mus. Lud. Ulr. 522. n. 99.**
Lift. Conch. t. 165. f. 2. t. 166. f. 3.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 2. f. 3. 4.
Gualt. test. t. 99. f. B.
Lesser testaceoth. f. 139.
Knorr Vergn. 2. t. 22. f. 3. 5. t. 28. f. 4. & 6. t. 38. f. 1.
Chemn. Conch. 7. t. 60. f. 588. 589.
*Habitat frequens in mari mediterraneo, maximæ affinitati
testæ sulcis transversim striatis, valvæ superioris planæ
radiis rotundatis, non longitudinaliter, sed transversim
striatis, auriculis levissimis.*
- Ziczac.** 3. O. testæ radiis octodecim explanatis. *Mus. Lud. Ulr. 522.
n. 100.**
Lift. Conch. t. 168. f. 5.
Regenf. Conch. I. t. 11. f. 53.
Knorr Vergn. 2. t. 19. f. 3. & t. 20. f. 1.
Chemn. Conch. 7. t. 61. f. 590 - 592.
*Habitat in Oceano americano, testa nunc unicolor, ^{nigra}
variegata, auriculis subtiliter rugosis, valvæ inferiores
convexæ radiis 18 - 20 & ultra subtilissime transversim
striatis, intus striis perpendicularibus duplo pluribus
in valva superiore plana lineis angularibus pectinatae
rum numero duplo majore.*
- striatula.** 4. O. testæ radiis sedecim oblitteratis transverse membranaceis
striatis, margine integerrimo. *Mus. Lud. Ulr. 522.
n. 101.**
*Habitat in Oceano indico, mediæ magnitudinis, testa
purpureo alboque varia intus flavescente: radiorum ¹⁶
terstiis albis, valva inferiore vix magis convexa
quam superior.*

Ostreæ multæ ad cardinem interius sulcis transversis numerosis parallelis in utramque
valva oppositis gaudent, probe distinguendæ ab arcis polyleptoglymis, guttae
dentes numerosi a terciam intrant alterius sinus. Pectines exstiant ex aperto
aqua in dimidiam ultimæ longitudinem expuere valent, vasculoque aperio re-
tus profundo retenti circumiacentia guttulis aquæ inquinant, aquæ immixti
deemergi mox valvas aperiunt, easdemque saepius rapide et cum sonita clausando

- minuta.* 5. *O. testæ radiis viginti convexis. Mus. Lud. Ulr. 524. n. 102.**
Habitat in Oceano indico, avellanca magnitudine, testa inferiore alba valde convexa, superiore alba fusco nebulosa planiore plicata.
- Pleuro-*
nectes, 6. *O. testa æquivalvi : radiis duodecim duplicatis, extus laevi. Mus. Lud. Ulr. 524. n. 103.**
Rumpf mus. t. 45. f. A. B. Amusium.
Argenv. Conch. t. 27. f. G. Umbella s. Solea.
Bonann. recr. 3. f. 354.
mus. Kirch. 2. f. 108.
Petiv. amb. eq. t. 17 f. 14:
Gualt. test. t. 73. f. B.
Klein. ostr. t. 9. f. 30.
Lesser testaceoth. f. 89.
Knorr Vergn. 1. t. 20. f. 3. 4.
Chemin. Conch. 7. t. 61. f. 595.
β) Knorr Vergn. 5. t. 21. f. 6.
Habitat in Oceano indico, testa nunc rubella, nunc carnea, nunc hepatica, in β) aurantia rubro radiata, intus argentea, ad $4\frac{1}{2}$ pollices longa, utrinque hiante.
- Laurentii.* 7. *O. valva superiore subconvexa laevi : lineis perpendicularris tenerrimis strias subtilissimas transversas concentricas secantibus, inferioris radiis viginti quatuor, intus striis quadraginta octo.*
Chenin. Conch. 7. t. 61. f. 593.
Habitat rarissima ad Americæ australis littore, testa 2 pollices 8 lineas longa, & perinde lata, valva superiore spadicea radiis albis maculisque albidis varia, inferiore alba flavicante obunibrata : radiis paulo obscurioribus.
- Iaponica.* 8. *O. testa æquivalvi convexiuscula flavo marginata : valvæ superioris lineis obsoletis fascias transversas concentricas decussantibus : striis intus elevatis quadraginta octo.*
Chenin. Conch. 7. t. 62. f. 596.
Habitat rario ad Guineæ & Japoniæ littora, pleuronecti affinis, at testa crassiore, auriculis subtiliter rugosis, & infra nodo auctis, valva inferiore ochroleuca glaberrima, testa ad $5\frac{1}{2}$ pollices longa & lata.
- magella-*
nica. 9. *O. testa subæquivalvi glabra : striis oblongis consertis.*
Chenin. Conch. 7. t. 62. f. 597.
Habitat in freto magellanico ; pleuronecti affinis, testa lateritia non radiata intus glaberrima, valva superiore

magis convexa, inferiore magis plana, quam in efferibus, auriculis transversim striatis.

hybrida. 10. O. testæ radiis novem aut decem : interstitiis longioribus dinaliter striatis, margine intus repando.

List. Conch. t. 173. f. 10.

Klein ostr. t. 9. f. 31.

Chemn. Conch. 7. t. 63. f. 601. 602.

Habitat in mari norwegico, testa temui : valva inferior alba, superiore sanguinea, venis lineisque angularibus pida.

Radula. 11. O. testa subæquivalvi : radiis duodecim convexis, decussatis crenatis. *Mus. Lud. Ulr. 525. n. 105.*

Rumpf mus. t. 44. f. A. Radula.

List. Conch. t. 174. f. 113 t. 175. f. 12.

Pet. amb. aq. t. 17. f. I.

Gualt. test. t. 74. f. L.

Argenv. Conch. t. 24. f. D.

Knorr Vergn. 5. t. 9. f. 4.

Chemn. Conch. 7. t. 63. f. 599. 600.

Habitat rario in Oceano indicō, testa oblonga $3\frac{1}{4}$ pollicis longa, $3\frac{3}{4}$ lata, alba, vel albo fuscoque varia, complanata, ut tamen valva inferior magis convexa sit, auriculis rugosis striis obliquis axaratis.

imbricata. 12. O. testa subæquivalvi planiuscula radiis novem inæquilibus imbricatiā squamosis.

Chemn. Conch. 7. t. 69. f. G.

Habitat in mari rubro, radulæ affinis, testa albida $\frac{1}{4}$ pollicis pureo maculata ad marginem paulisper crenata, radiis alternatim majoribus.

Subrotunda. 13. O. testa subrotunda : radiis octo convexis spadicēda. auriculis subrotundis albis : limbo luteo.

Knorr Vergn. 2. t. 19. f. 4.

Habitat - - - testa excolore, $1\frac{1}{4}$ pollicis longa, $2\frac{1}{2}$ latib.

Plica. 14. O. testa subæquivalvi : radiis sex convexis læviusculis decutiatim striata. *Mus. Lud. Ulr. 526. n. 106.*

Rumpf mus. t. 44. f. O. Pailium maculatum.

List. Conch. t. 171. f. 8.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 2. f. 9. 10.

Petiv. amb. aq. t. 2. f. 10.

Gualt. tel. t. 74. f. C. C.

Argenv. Conck. t. 24. f. C.

Chemin. Conch. 7. t. 62. f. 598. a. b.

β) *Gualt. test. 1. 73. f. E?*

Habitat rara in India, testa alba, aut alba fusco maculata;
aut rubra albo maculata 1 1/4 pollicis circiter longa, 1 lata,
striis transversis rarioribus margine repando.

crenata.

15. O. testa subrotunda : radiis convexis ; exterioribus secundum longitudinem subtiliter striatis, margine profunde crenato.

List. Conch. t. 170. f. 7.

Habitat - - - auriculis transverse striatis.

finuosa.

16. O. testa ovata creberrime & subtilissime striata : margine intus crenato.

List. an. angl. t. 5. f. 31.

Conch. t. 172. f. 9.

Habitat in mari britannico, testa crocea variegata.

squamofa.

17. O. testa oblonga : radiis squamosis ; interstitiis latioribus perpendiculariter striatis.

List. Conch. t. 184. f. 21.

Habitat - - - testa lineis angulatis maculisque varia :
auriculis perpendiculariter rugosis.

dubia.

18. O. testa subrotunda : radiis octodecim imbricato squamosis.

List. Conch. t. 192. f. 29.

Habitat - - - testa ultra 1 1/4 pollicis longa, auriculis transversim striatis.

elegans.

19. O. testae radiis vinginti levibus : interstitiis transversim striatis, margine repando.

List. an. angl. t. 5. f. 30.

Habitat ad Britanniæ magnæ littora, testa 2 circiter pollices longa paulisper latiore, rubente albo maculata, auriculis transversim striatis.

verificator.

20. O. testa complanata : radiis octodecim levibus ; interstitiis cancellatis.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 2. f. 6.

Habitat - - - testa lutea, alba, thalassina, nigricante aut sanguinea : auriculis transversim striatis.

tollea.

21. O. testa subrotunda : radiis quinque.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 2. f. 16.

Habitat - - - niediæ magnitudinis, testa rosea radiis albis, aut viridi, subflavo lurido & porraceo mixta, radiis lividis.

- fusca. 22. O. testa fusca : radiis planis versus cardinem evanescit
titus.
Bonana. recr. 2. f. 87.
mus. Kirch. 2. f. 86.
Klein ostr. 1. 9. f. 35.
Habitat in mari indicō, testa intus candida ; valva in-
riore convexa, superiore plana.
- tenuis. 23. O. testa tenui plana purpurea : striis minutissimis perpe-
dicularibus circulares decussantibus, intus elevatis.
Gualt. test. 1. 73. f. C.
Habitat - - - mediæ magnitudinis.
- lutea. 24. O. testa tenui lutea : radiis crassis.
Gualt. test. 1. 73. f. D.
Regenf. Conch. 1. 1. 7. f. 4. 5 ?
Habitat - - - mediæ magnitudinis.
- muricata. 25. O. testa subrotunda ex albo crocea : radiis convexis labi-
tilissime & acutissime muricatis.
Gualt. test. 1. 73. f. I.
Habitat - - - testa 2½ pollices longa.
- consper- fa. 26. O. testa subrotunda spadicea albo nigroque punctata
radiis crassis.
Gualt. test. 1. 73. f. O.
Habitat - - - testa pusilla.
- nodulosa. 27. O. testa subrotunda fusca : lineis transversis punctata
nigris, radiis convexis nodosis.
Gualt. test. 1. 73. f. P.
Habitat - - - mediæ magnitudinis.
- radiata. 28. O. testa tenui albido rosea albo virgata : radiis convexis
que variis, radiis crenatis.
Gualt. test. 1. 73. f. Q.
Habitat - - - nodulosa paulo major.
- punctata. 28. O. testa oblonga lutea albo maculata : natibus albo fulvo-
que variis, radiis crenatis.
Gualt. test. 1. 74. f. G.
Habitat - - - testa 2 pollices longa : auriculis cancellatis.
- aculeata. 30. O. testa tenui roseo albidoque varia subrotunda : radiis
crassis squamoso-aculeatis.
Gualt. test. 1. 74. f. H.
Habitat - - - punctatæ magnitudine.
- plana. 31. O. testa complanata tenui candida : cardine croceo, radiis
rotundis latis.

Gualt. test. t. 74. f. I.

Habitat - - -

32. *O. testa oblonga rubra minutissime striata.*

Gualt. test. t. 74. f. AA.

Habitat - - -

33. *O. testa utrinque convexiuscula intus flavicante : radiis convexis.*

Regenf. Conch. I. t. I. f. 8.

Habitat - - - testa exigua.

34. *O. testa subrotunda ruberrima : cardine maculisque nonnullis albis, radiis laevibus.*

Regenf. Conch. I. t. 9. f. 33.

Habitat - - - mediæ magnitudinis.

35. *O. testa glabra rubra.*

Regenf. Conch. I. t. 9. f. 34.

Habitat - - - spondylo affinis, at auriculis æqualibus.

36. *O. testa utrinque planiuscula exterius fusca intus violacea.*

Regenf. Conch. I. t. II. f. 52.

Habitat in mari mediterraneo, diametri pollicaris.

37. *O. testa subrotunda plicata subtiliter secundum longitudinem striata : fascia versus cardinem semicirculari alba.*

Regenf. Conch. I. t. II. f. 56.

Habitat - - -

38. *O. testa intus purpurea, extrinsecus fasciis fuscis rubrif- que alternis varia : radiis convexis.*

Regenf. Conch. I. t. II. f. 59.

Habitat - - - inter minores.

39. *O. testa alba maculis rubris confluentibus varia : radiis asperis, valvæ convexioris lamellis transversis crispis.*

v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 7. f. 1.

Habitat - - - testa I polliceri 6 lineas longa, & I. p.

4. l. lata.

40. *O. testa utrinque convexa clausa oblonga pellucida : radiis 32.*

v. Born. mus. Caes. Vind. test. t. 6. f. 7. 8.

Chemn. Conch. 7. t. 68. f. 649. b.

Habitat roriflamma - - - testa ochroleuca tenui duplo longiori quam lata.

†† auriculis inæqualibus : altera sæpius ^{atram}
ciliato spinosa.

- Pallium. 40. O. testa æquivalvi : radiis duodecim convexis, ^{atram}
scabra squamis imbricata. Mus. Lud. Ulr. 526. n. 10.
Rumpf mus. t. 44. f. B. Pecten secundus.
Argenv. Conch. t. 24. f. I. Pallium ducale.
Lift. Conch. t. 187. f. 25?
Valent. Abh. t. 16. f. 26.
Petiv. amb. aq. t. 17. f. 2.
Gualt. test. t. 74. f. E.
Seb. mus. 3. t. 87. f. 8-12.
Regenf. Conch. I. t. 6. f. 59.
Knorr Vergn. 2. t. 5. t. 21. f. 2. & t. 27. f. 2.
Murray testaceol. t. 2. f. 4.
Chemin. Conch. 7. t. 64. f. 607.
β) Seb. mus. 3. t. 87. f. 17?
γ) Knorr Vergn. I. t. 19. f. 2.
Habitat in India, testa solida, rubro, albo fuscoque ^{sanguineo},
auriculis striatis, crenatis aut squamosis : altera ^{longior}
giore, margine testæ denticulato.

- Sanguino- 41. O. testa æquivalvi : radiis novem crassis obtusis : ^{atram}
lenta, teretiis longitudinaliter striatis nodosis & aculeatis.
Chemin. Conch. 7. t. 64. f. 608.
Habitat in mari rubro, pallio affinis, testa alba ^{sanguinosa},
maculata : margine plicato crenato ; limbo purpureo
rascente, auricularum striis transversis nodulosis.

- maculosa. 42. O. testa æquivalvi lutea spadiceo maculata : radiis decim
crassis, planiusculis, auriculis albis lateribus
variis, costis transversis squamosis.
Knorr Vergn. 2. t. 19. f. 5.
Habitat - - -

- nodosa. 43. O. testæ radiis novem nodoso-vesicularibus. ^{Mus. Lud.}
Ulr. 527. n. 108.*
Rondel. test. 25. Concha corallina.
Argenv. Conch. t. 24. f. F. Pecten corallinus.
Lift. Conch. t. 186. f. 24.
Bonann. mus. Kirch. 2. f. 138.
Rumpf mus. t. 48. f. 7. 8.
Gualt. test. t. 99. f. C. D.
Seb. mus. 3. t. 87. f. 1-5.
Regenf. Conch. I. t. 4. f. 38.

Knorr *delic.* t. B. II. f. 5.

Vergn. I. t. 5. f. I. & 4. t. 13. f. 5.

Spengler *Besch. berl. Naturf. Fr.* 2. t. 13. f. 1. 2.

Chemin. *Conch.* 7. t. 64. f. 609-611.

β) *Knorr Vergn.* 2. t. 21. f. 5?

γ) *Knorr Vergn.* 3. t. 24. f. 1. & t. 25. f. 1?

Habitat in Oceano africano & americano, testa nunc rubra, nunc kermesina, nunc rubro alboque, nunc spadiceo alboque varia flavedine intermixta, testa superiore magis convexa, quam inferiore: auricula intus & subtus spinosa.

Pes felis. 44. *O.* testa radiis novem striatis scabris: auricula altera minuta. *Mus. Lud. Ulr.* 527. n. 109.*

Bonann. recr. 2. f. 7.

mus. Kirch. 2. f. 8.

v. *Born. mus. Caes. Vind. test.* t. 6. f. 2.

Chemin. *Conch.* 7. t. 64. f. 612. & t. 65. f. 613.

Habitat ad Africæ littora, testa parva, tenui, pellucida, ut plurimum subincarnata maculata & venosa, intus glabra, alba, radiis subundulatis, marginis plicis crenatis, auricularum striis transversis nodosis.

*Della-
cens.* 45. *O.* testa subæquivalvi: radiis novem, lœvi: fornice squamis cochleari-hemisphæricis. *Mus. Lud. Ulr.* 528. n. 110.*

β) *Chemin. Conch.* 7. t. 66. f. 625-627?

Habitat in mari africano, testa ovata minuta, pellucida, glabra, alba: valva superiore rubro maculata.

*oblitera-
ta.* 46. *O.* testa extus lœvi: radiis viginti quatuor duplicatis. *Mus. Lud. Ulr.* 525. n. 104.*

Chemin. Conch. 7. t. 66. f. 622-624.

Habitat rara in Oceano indico, pleuronecti affinis, at testa minore, subtilissime decussatim striata, testa inferiore dilute rubente, ad cardinem subflavescente, superiore obscure rubra, aut subspadicea.

*fanguin-
nea.* 47. *O.* testa æquivalvi: radiis viginti duobus scabris, semiaurita. *Mus. Lud. Ulr.* 528. n. 111.*

Lift. Conch. t. 185. f. 22.

Gualt. test. t. 74. f. M?

Chemin. Conch. 7. t. 66. f. 628.

Habitat in mari mediterraneo, atlantico, americano, testa subrotunda planiuscula sanguinea, spadicea, aut

kermesina, ad 2 pollices longa, & 1 $\frac{3}{4}$ lata, radiorum intersticiis perpendiculariter striatis.

- varia. 48. O. testa æquivalvi : radiis triginta scabris compre-
echinatis, uniaurita. *Mus. Lud. Ulr.* 529. n. 112.
Lift. Conch. t. 178. f. 15.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 2. f. 5.
Gualt. test. t. 73. f. G. N. & t. 74. f. R.
Argenv. Conch. t. 24. f. H.
Knorr Vergn. 2. t. 18. f. 3. 5. t. 11. f. 3. & t. 12.
5. 6. t. 16. f. 2.
Chemin. Conch. 7. t. 66. f. 633. 634.
Habitat in mari mediterraneo, sanguineæ affinis, at teff
colore magis varia, magis convexa, utrinque aculeata
marginè magis crenata, radius pluribus magis convexa
ris : intersticiis profundioribus non striatis, auricula
altera minima duplice aculeorum ordine armata, altera
rugoso plicata, subtus 5-7 aculeis armata.
- Pufio. 49. O. testa æquivalvi : radiis quadraginta filiformibus
uniaurita. *Mus. Lud. Ulr.* 529. n. 113.*
Lift. Conch. t. 181. f. 18. & t. 189. f. 23.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 2. f. 15.
Knorr Vergn. 4. t. 12. f. 2. & 5. t. 13. f. 2. & t. 28. f.
Chemin. Conch. 7. t. 67. f. 635. 636.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico, americanæ
testa avellanæ ut plurimum magnitudine, interdum
duplo majore, paulo longiore, quam lata, nunc hy-
line maculis rubentibus, nunc crocea rubrave maculata
albis varia, auricula altera vix conspicua, altera in-
crenam acute spinosa.
- glabra. 50. O. testa æquivalvi : radiis decem levibus planiusculis
internis striis elevatis duplicatis. *Mus. Lud. Ulr.* 529.
n. 114.*
Bonann. mus. Kirch. & recr. 2. f. 11-13.
Gualt. test. t. 73. f. H. & t. 74. f. A-D. F. Z.
Klein ostr. t. 9. f. 29.
Seb. mus. 3. t. 87. f. 16.
Regenf. Conch. 1. t. 1. f. 10. t. 3. f. 30. 31. t. 8. f.
t. 9. f. 28. & t. 11. f. 60.
Knorr Vergn. 1. t. 8. f. 5. 2. t. 10. f. 2. & t. 18. f.
5. t. 9. f. 2. & t. 10. f. 5. 6.
v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 6. f. 4.
Chemin. Conch. 7. t. 67. f. 638-645.

Habitat in sinu adriatico, mari mediterraneo, & ad Guineam, testa subrotunda 2 pollices longa & lata, rubra, flava, vel fusca, rarius unicolor, quam maculata aut nebulosa, interdum alba: valva superiore fusco maculata, sulcis nonnunquam lineatis, auriculis æqualibus, margine repando.

opercularis.

51. O. testa radiis viginti subrotunda decussatim striato-scabra, operculo convexiore. *Mus. Lud. Ulr. n. 530. n. 115.* Müll. zool. dan. prodr. 2997.*

Lift. Conch. t. 190. f. 27. & t. 191. f. 28.

Seba mus. 3. t. 87. f. 15.

Knorr Vergn. 2. t. 3. f. 2? 3?

Chemin. Conch. 6. t. 67. f. 646.

*Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 317. t. 9. f. 3.
n. Litterat. 3. p. 304.*

β) Peeten (vigintisulcatus) testa æquivalvi intus & extus sulcata fulva, maculis raris rufis, interstitiis rugosis. *Müll. zool. dan. prodr. 2996?*

γ) Knorr Vergn. 5. t. 28. f. 4?

Habitat in mari adriatico & septentrionali, testa hiantem plurimum variegata, in γ) auroræ in modum tincta, ad 2 $\frac{1}{4}$ pollices longa, & 2 $\frac{1}{2}$ lata, radiis acutis, interdum rotundatis, margine repando, intus dentato, auriculis decussatim striato-rugosis, longiore emarginata, & sub incisura spinosa.

Gibba.

52. O. testa æquivalvi: radiis viginti glabris, gibba. *Mus. Lud. Ulr. 531. n. 116.**

Gualt. test. t. 73. f. F.

*Regenf. Conch. 1. t. 1. f. 11. t. 2. f. 16. 17. t. 5. f. 51.
& t. 11. f. 51.*

*Knorr Vergn. 1. t. 18. f. 2. 2. t. 5. f. 4. & t. 17. f. 2. &
5. t. 13. f. 9.*

Brown Jam. t. 40. f. 10.

Chemin. Conch. 7. t. 65. f. 619. 620.

β) *Lift. Conch. t. 182. f. 19.*

Habitat in mari atlantico & americano, testa utrinque convexa rubra, rarius unicolor, quam albo maculata, striis longitudinalibus subtilissime crenatis notata, margine crenato, auriculis æqualibus.

sulcata.

53. O. testa alba carneo-maculata: radiis glabris, fornicis 32, operculis 28.

v. Born. mus. Caes. Vind. test. t. 6. f. 5. 6.
Chemn. Conch. 7. t. 63. f. 603. 604.

Habitat ad Malabariæ littus, testa circiter $1\frac{1}{2}$ pollicem longa
& paulo latiore, margine plicato crenato, fornicis auricula emarginata spinosa, operculo complanato.

histrio- 54. O. testa tenui complanata pellucida subtiliter transversis
nica. rugosa : radiis undecim.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 2. f. 14.

Knorr Vergn. 4. t. 12. f. 3.

v. Born. mus. Caes. Vind. test. p. 97. vign. f. 6. & t. 6? f. 3?
Chemn. Conch. 7. t. 65. f. 614.

Habitat - - - testa albo-rubro-& nigro maculata, rufus undatus, auriculis subæqualibus.

flandica. 55. O. testa orbiculari : circulis purpureis, radiis centrum
Müll. zool. dan. prodr. 2990.

Fabr. Fn. groenl. p. 415. n. 416. Pecten testa suborbiculari
aurita : radiis plano-convexis sulcatis numerosis
alternis minoribus integris, interne crocea.

It. wgoth. t. 5. f. 7.

List. Conch. 2. 1037. f. 4.

Gual. test. t. 73. f. R.

Seb. mus. 3. t. 87. f. 7.

Knorr delic. t. B. II. f. 3. 4.

Vergn. I. t. 4. f. 1. & t. 5. f. 2. & 5. t. 15. f. 3.
Spengler Schr. berl. naturf. Ges. 1. t. 5. f. 5.
Chemn. Conch. 7. t. 65. f. 615. 616.

Habitat in mari septentrionali varietate innumera, testa
 $3\frac{1}{2}$ pollices longa & $3\frac{1}{4}$ lata, vix hiante, rarius exalbata
quam vivacissima rubedine aut flavedine tincta fascijs
transversis semilunaribus ornata, operculo ut plurimum
elegantiore, radiis 50-100 squamis acutis imbricatis
asperis, margine crenato, auriculis striis transversis
squamosis rotatis, majore emarginata spinosa. Vermis
incola edulis.

rradiata. 56. O. testa sub æquivalvi glabra immaculata : striis mino-
tissimis. Müll. zool. dan. 2. t. 60. f. 1. 2. rar. 2. p.
57. prodr. 2991.

Habitat passim in variis Norwegiæ sinuum fucis, testa ru-
bra maculis parvis albis varia, intus rubente, radis in
operculo tribus : incola ovario slavicante.

57. O. testa subæquivalvi striata maculata marginem versus scabra.
Müll. zool. dan. 2. t. 60. f. 3-5. rar. 2. p. 58. prodr. 2994. Pesten striatus.
Habitat in fuso saccharino, testa rufa albidis candidisve maculis varia, intus rubra glaberrima: maculis pellucientibus operculi radiis exfoletis, incolæ ovario splendide rubro.
58. O. testa subæquivalvi striata glabra rubra: maculis albidis. *Müll. zool. dan. 2. t. 60. f. 6-8. rar. 2. p. 59. prodr. 2993.*
Habitat in Oceani septentrionalis fucis, rario, fornice profundius sulcata, maculisque magnis undulatis confluentibus pallide luteis varia, operculo guttato, incolæ ovario albo.
59. O. testa subæquivalvi striata glabra: radiis convexis septeni. *Müll. zool. dan. prodr. 2992.*
Habitat in Oceano septentrionali.
60. O. testa subæquivalvi intus & exterius sulcata rubea, hinc scabra, illinc glabra. *Müll. zool. dan. prodr. 2995.*
Habitat in Oceano septentrionali.
61. O. testa utrinque convexa: radiis 22 rotundatis transverse rugosis; intersticiis longitudinaliter granulatim striatis.
Regenf. Conch. I. t. 3. f. 36?
Chemn. Conch. 7. t. 65. f. 617.
Habitat in Oceano indico, testa 2 pollices 9 lineas longa, & pene perinde lata, extrinsecus violacea alboque varia, intus violacea, ad ambitum obscure badia.
62. O. testa aurantia: radiis 22 rotundatis, margine plicato, fornice planiore.
Valent. Abh. t. 13. f. 1.
Chemn. Conch. 7. t. 65. f. 618.
Habitat in india, radiis nonnullis squamosis sulcisque quibusdam granulato-lineatis.
63. O. testa æquabiliter convexa: radiis 20 glabris; intersticiis confertim transverse rugosis, margine plicato-dentato.
Lijt. Conch. t. 169. f. 6.
Chemn. Conch. 7. t. 65. f. 621. a. b.
Habitat rario in Oceano indico & americano, auriculis minimis, fornice alba, operculo ex flavicante, fusco, albo

& cinereo varia, forsan ad tertiani pedinum familiis
releganda.

sulphurea. 64. O. testa complanata tenui pellucida striata : radiis plurimi
rimis fornicato-imbricatis, margine plicato-crenato-

Seb. mus. 3. t. 97. f. 13. 18.

Chemn. Conch. 7. t. 66. f. 629.

β) Pecten aurantius. Seb. mus. 3. t. 87. f. 14.

Chemn. Conch. 7. t. 66. f. 630. 631.

Habitat in mari rubro, testa sulphurea fragili & circulata
pollices longa, & paulo angustiore, fornicis radiis aequalibus,
libus, operculi alternatim minoribus; β) testa aurantia,
interdum sanguinea; cardine aurantio, fasciaque semilunari alba,
aut albo & dilute spadiceo varia, limbis sanguineo.

porphyrea. 65. O. testa convexa purpurea intus alba aut sanguinea
radiis 25 crassis rotundatis squamosis.

Chemn. Conch. 7. t. 66. f. 632.

Habitat in mari rubro, testa 2 pollices & 3 lineas longa,
æque lata, maculis nonnullis albis varia.

vitrea. 66. O. testa hyalina margine acuta : radiis tenuissimis
squamularum arcubus concentricis.

Chemn. Conch. 7. t. 67. f. 637. a.

β) Chemn. Conch. 7. t. 67. f. 637. b. c.

Habitat in Oceano septentrionali, inter fucos & zoophytes
lentis ut plurimi magnitudine, testa levi fragili alba
β) albo rubroque varia, auricula altera emarginata
spinosa.

tranquebaria. 67. O. testae radiis viginti rotundatis : intersticiis subtilibus
rugosis, margine repando.

List. Conch. t. 179. f. 16.

Gault. test. t. 73. f. I.. M.

Knorr Vergn. 2. t. 4. f. 2. 3.

v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 7. f. 2.

Chemn. Conch. 6. t. 67. f. 647. 648.

Habitat copiosissima ad Tranquebar, testa nunc unicostata
sepius aurantia, nunc maculis undulatis fusca rubris
rubellis, cinereisve varia, operculo magis convexa.

fauciata. 68. O. testa alba purpureo maculata : radiis plurimis int-

qualibus, margine crenato.

Chemn. Conch. 7. t. 69. f. H.

Habitat in mari rubro.

- crenulata.* 69. O. testa oblonga : radiis striisque undulatis , fasciis transversis interruptis , margine crenulato.
Lift. Conch. t. 175. f. 12. a.
Habitat - - - exigua.
- innomi-
data.* 70. O testa subrotunda maculata : sulcis profundis subtiliter transversim striatis , margine crenato.
Lift. Conch. t. 175. f. 12. b.
Habitat - - - crenulata paulo major , auricula altera vix conspicua.
- subrufa.* 71. O. testa subrotunda subrufa : radiis viginti quatuor , auriculis decussatim striatis.
Lift. Conch. t. 180. f. 17.
Habitat - - - mediae magnitudinis.
- squamata.* 72. O. testa subrotunda : radiis crassis parallele squamosis ad latera aculeatis.
Lift. Conch. t. 183. f. 20.
Habitat - - - testa convexa maculata.
- anonyma.* 73. O. testa oblongiuscula : radiis angustis squamosis , intersticiis latioribus perpendiculariter striatis , auriculis perpendiculariter rugosis.
Lift. Conch. t. 184. f. 21.
Habitat - - - testa lineis angularibus maculisque varia.
- decem-
radiata.* 74. O. testa complanata : radiis decem levibus explanatis inaequalibus , auriculis transversim striatis.
Lift. Conch. t. 188. f. 26.
Habitat - - -
- tenuis.* 75. O. testa tenui : radiis depresso squamosis , auriculis brevibus.
Rumpf mus. t. 44. f. C.
β) Regenf. Conch. i. 10. f. 45.
Habitat in India , testa nunc badia , nunc cinerea nigro maculata , (etiam in mari septentrionali) nunc alba , nunc miniata , nunc citrina.
- Valentini.* 76. O. testae radiis viginti , fasciis transversis semilunaribus.
Valent. Abh. t. 13. f. 2.
Habitat in India , maximae affinis , testa rubra , at auriculis inaequalibus.

- media. 77. *O. testa oblongiuscula* : radiis confertis.
Gault. test. t. 74. f. N. O.
*Habitat - - - testa mediae magnitudinis ex rubro croceo
vel ex piceo nigricante.*
- crocea. 78. *O. testa crocea* : radiis squamofo-muricatis alternati minoribus.
Gault. test. t. 74. f. P.
Habitat - - - parva.
- floida. 79. *O. testa subrotunda alba* : maculis roseis.
Gault. test. t. 74. f. Q.
Habitat - - - testa parva radiata, an distincta species?
- ochroleuca. 80. *O. testa oblongiuscula ochroleuca* : radiis altera partea laevibus, altera granulatis.
Gault. test. t. 74. f. S.
Habitat - - - pusilla.
- mustelina. 81. *O. testa mustelina* : maculis fasciisque flavis, radiis laevibus, auriculis transversim striatis.
Gault. test. t. 74. f. T.
Habitat - - - testa 2½ pollicis longa & perinde lata.
- flammea. 82. *O. testa crocea oblongiuscula subtilissime perpendicula riter striata.*
Gault. test. t. 74. f. V.
Habitat - - - exilis.
- incarnata. 83. *O. testa oblongiuscula incarnata* : fasciis rubris inter ruptis, radiis explanatis.
Gault. test. t. 74. f. X.
Habitat - - - parva.
- guttata. 84. *O. testa subrotunda flavescente rubro punctata* : radiis ad cardinem inaequaliter convergentibus.
Gault. test. t. 74. f. B. B.
Habitat - - - parva.
- depressa. 85. *O. testa ochroleuca* : radiis explanatis bifidis.
Gault. test. t. 74. f. DD.
Habitat - - - testa pollicem longa, & paulo latiore.

*Quinam familie adscribendae, si quidem distinctae sint, species ab Argenville Conch. I.
24. f. A. & t. 29. f. 19. a. & zoomorph. t. 6. f. A. delineata?*

regia.

- 86 O. testa subrotunda ruberrima : radiis rotundatis.
Seb. Mus. 3. t. 87. f. 6.
Habitat - - - pallio affinis, at auricula fornicis profunde emarginata.

Palliat.

87. O. testa æquivalvi : radiis numerosis lævibus.
Knorr Vergn. I. t. 19. f. 2.
Habitat - - - pallio affinis, at testa minus scabra, rarius radiata, straminea : fasciis purpureis undulatis.

seminuda.

88. O. testa aurantia oblonga ad medium usque squamosomuricata : radiis viginti duobus.
Knorr Vergn. 5. t. 9. f. 4.
Habitat - - - testa 1 $\frac{1}{4}$ pollicis longa, 1 $\frac{1}{4}$ lata, auriculis subtiliter squamosis.

modesta.

89. O. testa subrotunda cana : maculis subfuscis rubellis & cærulescentibus, radiorum interstitiis latis.
Regenf. Conch. I. t. 5. f. 55.
Habitat - - - fasciis ad cardinem 2 filiformibus.

Principa-

- lis.
90. O. testa purpurea margine fusca : radiis squamosis a medio ad cardinem lævibus.
Regenf. Conch. I. t. 12. f. 63.
Habitat - - - pallio affinis.

verifica-

- tor.
91. O. testa variegata : radiis pectinatis lævibus.
Regenf. Conch. I. t. 12. f. 64.
Habitat - - - testa 1 $\frac{1}{4}$ pollicis longa, variae affinis.

lavicans.

† † † valvis altero latere magis gibbis.

92. O. testa subæquivalvi : radiis octo striatis, margine altero rotundato. *Mus. Lud. Ulr. 531. n. 117.**
Habitat in Oceano magis australi, testa quasi obliqua, alba fusco rubroque viria, intus alba : radiis flavis, auricula altera brevissima.

fasciata.

93. O. testa æquivalvi : radiis viginti scabris ; interstitiis striatis ; auriculis æqualibus exoletis. *Mus. Lud. Ulr. 532. n. 118.**
Lift. Conch. t. 177. f. 14.
Gualt. test. 74. f. E. E. t. 88. f. F. F. G.
Habitat in mari atlantico & americano, testa alba pellucida ; cingue hiant intus subtiliter striata : margine crenato.

- fragilis. 94. O. testa æquivalvi : radiis viginti quinque , marginatim integerrimo , auriculis acutis.
Chenn. Conch. 7. t. 68. f. 650.
Habitat rara ad insulas Nicobaricas , fasciatæ affinis , testa planiore : radiis pluribus , fragili , tenui , 1½ pollicis longa , & dimidio angustiori distincta.
- Lima. 95. O. testa æquivalvi : radiis viginti duobus imbricatis squamis altero margine rotundato , auriculis oblitteratis.
Mus. Lud. Ulr. 532. n. 119.*
Argenv. Conch. t. 24. f. E. Lima.
Bonann. recr. 2. f. 71.
mus. Kirch. 2. f. 69.
Rumpf mus. 44. f. D.
Petiv. amb. aq. t. 8. f. 4.
Gualt. test. t. 88. f. F.
Klein ostr. t. 9. f. 35.
Knorr Vergn. 6. t. 34. f. 3.
Chenn. Conch. 6. t. 68. f. 651.
β) *Gualt. test.* t. 88. f. E?
Habitat in mari mediterraneo , rubro , indico , testa albida , 3 pollices longa , 2½ lata satis plana , radiorum numerus incerto : squamis elatis , acutis , auriculis rugosis.
- glacialis. 96. O. testa æquivalvi : radiis quinquaginta imbricatis inter ruptis , auriculis æqualibus ; altera inæqualiter plicata.
List. Conch. t. 176. f. 13.
Klein ostr. t. 9. f. 32. 33.
Knorr Vergn. 6. t. 38. f. 5.
Chenn. Conch. 7. t. 68. f. 652.
β) *Chenn. Conch.* 7. t. 68. f. 653.
Habitat in Oceano americano , limæ affinis testa nigra , 3 pollices longa , 2½ lata , at radiis longe pluribus marginata crenata , β) integerrimo.
- hians. 97. O. testa exalbida tenui undique hiante obliqua : radiis exoletis undulatis striisque transversis rotundatis lunaribus.
Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 332. t. 9. f. 4.
Habitat in Norwegia , testa 1½ pollicent longa , ultra 3 pollicis lata , auriculis exiguis acutis , margine crenato , intus integerrimo.
- excavata. 98. O. testa solide alba : striis longitudinalibus undulatis anulisque paucioribus transversis , intus levavi , unicolor , margine integerrimo.

Chemn. Conch. 7. t. 68. f. 654.

Habitat rarissima ad Norwegiæ littora, testa 5 pollices longa, $3\frac{1}{4}$ lata.

* * rudes, vulgo Ostreæ dicæ.

Malleus. 99. O. testa æquivalvi triloba : lobis transversis. Mus. Lud. Ulr. 533. n. 121.*

Rumpf mus. t. 47. f. H. Ostreum divisum.

Argenv. Conch. t. 19. f. A. Malleus brachiatus.

Lift. Conch. t. 219. f. 54.

Bonann. mus. Kirch. 2. f. 120.

Petiv. amb. aq. t. 20. f. 10.

Gualt. test. t. 96. f. D. E.

Seb. mus. 3. t. 91. f. 4. 5. & t. 93. f. I. 2.

Knorr Vergn. 3. t. 3. f. I.

Spengl. selt. Conch. t. I. f. A.

Chemn. Conch. 8. t. 70. f. 655. 656.

Habitat rara & pretiosa in Oceani indici & australis abyso, testa nigra, rarius glutinis scriniariorum more tintæ, hiante, cruciata, & circiter pollices longa, $3\frac{3}{4}$ lata valvis lamellatis.

Valfella. 100. O testa subpellucida angusta elongata fragili lamellata altero fine rotundata lamellata intus levissima lucida.

Chern. Conch. 8. t. 70. f. 657.

2) Martini allegri. Naturg. 4. t. 147. f. 2.
Habitat in mari rubro, testa fragili violacea, spadicea aut ferruginea ad cardinem hiante, $3\frac{1}{2}$ pollices longa, 1 lata, extrinsecus aspera, fine rotundato tenuiore.

anatina. 101. O. testa pellucida lamellata lateraliter incurva.

Spengl. catal. rais. t. 6. f. I. 2.

Chern. Conch. 8. t. 70. f. 658. & t. 71. f. 659.

Habitat rara ad insulas Nicobaricas, testa tenui fragili, ex albo & violaceo varia, anari sedenti aliquantum simili, pollicem lata, primo $1\frac{1}{2}$ pollicem perpendiculari, tum incurva, & denuo $1\frac{1}{2}$ pollicem longa.

diluviana. 102. O. testa extus plicata : margine dentibus erectis acutangulis.

Habitat - - - in Sueciæ montibus calcareis, fossilis, magnitudine edulis & ultra, margine introrsum ad angulum cum testa ipsa rectum erecto; dentibus quasi serra excedens exterius quasi ex lamellis imbricatis compositis, margine plano saepe transversim striato : Valvis

pedinatim plicatis; acutis: Vix videtur diffin-
hujus generis species.

Folium. 103. O. testa ovata lateribus obtuse plicata parasitica.
 Lud. Ulr. 534. n. 122.*

Rumpf mus. t. 47. f. A. Ostreum Cratum.

Petiv. amb. aq. t. 10. f. 1.

Argenv. Conch. t. 19. f. F.

Klein ostr. t. 8. f. 22.

Knorr Vergn. I. t. 23. f. 2.

Spengl. selt. Conch. t. 1. f. H.

Chenn. Conch. 8. t. 71. f. 662-666.

2) Schroet. n. Litterar. 2. p. 78. t. 1. f. 5. 6.

Habitat in Oceano indico, gorgoniis non raro adhazere
 testa straminea, spadicea, violacea, intus argentea
 cardinis loco fossula trigona, valva superiore de
 circiter medio turgida, utrinque rugosa & transversa
 costata, inferiore minore planiore medio canaliculata

orbicula- 104. O. testa orbiculata plana: margine integro crenula-

ris. Gualt. test. t. 104. f. G.

Chenn. Conch. 8. t. 74. f. 680.?

Habitat - - - testa alba, magnitudine extimi articulo
 pollicis, margine obtusissimo.

edulis 105. O. testa semiorbiculata: membranis imbricatis undulatis
 valva altera plana integerrima. Fn. suec. 2149. M.

Lud. Ulr. 534. n. 123. * Müll. zool dan. prodr. 29. 10.

Gesn. aq. 2. p. 37. Ostrea.

Bonann. recr. 2. p. 108. f. 70. Ostrea.

muf. Kirch. 2. f. 68.

Aldr. exsang. 482. Ostrea Rondeletii marina.

List. anim. angl. p. 176. t. 4. f. 26. 27. Ostrea
 vulgare maximum.

Conch. t. 202. f. 36. & t. 203. f. 37.

Rondel. aq. 2. p. 37.

Gualt. test. t. 102. f. A. B.

Ginann. adr. 2. t. 18. f. 127.

Basler. op. subs. 2. p. 62. t. 8. f. 1. 2. 8. 9.

Argenv. zoomorph. t. 5. f. A.

Knorr Vergn. 3. t. 24. f. 2. & t. 25. f. 2.

Chenn. Conch. 8. t. 74. f. 682.

2) Adans. Seneg. I. t. 14. f. 3. Vetan.

List. Conch. t. 193. f. 30. & t. 194. f. 31. Ostrea mijoi
 fulcata, inaequaliter utrinque ad cardinem denticulata

Klein oſtr. t. 8. f. 21.

v. Born muſ. Caſ. Vindob. teſt. t. 6. f. 9. 10.

Chemn. Conch. 8. t. 73. f. 672. 673.

γ) Martini allgem. Naturg. 4. t. 148. f. 3. 4.

δ) Chemn. Conch. 8. t. 71. f. 660?

ε) Chemn. Conch. 8. t. 71. f. 661?

ζ) Chemn. Conch. 9. t. 116. f. 994-996.

Habitat in Oceano europæo & indico, β) etiam ad Caput Bonæ Spei, ſcopulis affixa, aut in fundo hærens teſta intus alba glabra, interdum matris perlarum ad inſtar nitente, colore ceterum, forma & magnitudine plurimum variante, ad $3\frac{1}{2}$ pollices longa, & 4 lata; incola verinis eſculenta γ) præſertim ſapidissima.

106. O. teſta ovalis ſemiaurita lævi basi obliqua. Muſ. Lud.

Ulr. 535. n. 134.*

Gualt. teſt. t. 84. f. H.

Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 365. t. 9. f. 6.

Habitat in mari mediterraneo, teſta $1\frac{1}{2}$ pollicem longa, & $1\frac{1}{4}$ lata, ſordide olivacea, lineis undulatis albis non-nunquam varia tenuiſſima, valva utraque convexa in roſtrum terminata, cardinis foſſulis 5 rotundis.

107. O. teſta rudi oblonga linearis: cardinibus divergentibus interne fornicatis. Forsk. fn. arab. p. 124. n. 61.

Chemn. Conch. 8. t. 71. f. 667. a. b.

Habitat in mari rubro, teſta tota ſpadicea fragili membranacea, digitis longitudinis, ad cardinem in roſtrum elongatum acutangulum terminata.

108. O. teſta rudi lamellata inæquali intus glabra: valva inferiore majore excavata in roſtrum terminata: ploris decem obtufis.

Chemn. Conch. 8. t. 72. f. 668.

Habitat ad Sinæ littora, teſta pulla, intus ad cardinem exalbida, 4 pollices longa, 3 & 10 lineas lata.

109. O. teſta æquivalvi pellucida complanata ovali roſtrata glabra: valva ſuperiore ſtriis granulatis perpendiculari bus undulatis, margine acutifimo.

Chemn. Conch. 8. t. 72. f. 669. 670.

Habitat in India, teſta 2 lineas ultra 3 pollices longa & 5. l. ultra 2 p. lata alba; maculis rarioribus ſpadiceis.

Forskah. 110. O. testa plicata in rostrum elongatum incurvatum cavum
terminata : costis intermediis, rugoso spinoso imbricata;
valva altera plana.

Chemn. Conch. 8. t. 72. f. 671. a. b. c.

Habitat in mari rubro, testa pollicem lata, & 2 cum
neis longa, valva planiore exalbida altera subviolacea.

plicatula. 111. O. testa longitudinaliter plicata : plicis rugosis, valva
inferiore paulo minore & planiore.

Gualt. test. t. 104. f. A.

Chemn. Conch. 8. t. 73. f. 674.

Habitat in mari americano & mediterraneo, forma & mili-
tudine varia, testa ut plurimum cinerea, violacea: eo inau-
misto, interdum alba rubro aut cærulecente striata.

rostrata. 112. O. testa oblonga rugosa : valva superiore lamellata
margin'e denticulata, altera excavata longitudinaliter
falcata, rostro prominente.

Gualt. test. t. 102. f. D.

Chemn. Conch. 8. t. 73. f. 676.

Habitat in mari mediterraneo, valva superiore ex viridi-
ficante, altera violaceo alboque varia, intus cretacea.

virginica. 113. O. testa subæquivalvi crassa rudi lamellofa: valva altera
rius rostro prominente.

Lift. Conch. t. 200. f. 34.

Chemn. Conch. 8. t. 73. f. 677.

β) Lift. Conch. t. 201. 35.

Chemn. Conch. 8. t. 74. f. 678.

Habitat in Oceano americano & indico, testa ad 9 pollia
longa, & 4 lata, exalbida, aut ochracea, intus nictans
alba.

Cornuco- 114. O. valva superiore plana, inferiore excavata strati-
piæ. squamis, rugis plicisque inæquali in rostrum elongatum
terminato.

v. Born. mus. Caes. Vind. test. t. 6. f. 11. 12.

Chemn. Conch. 8. t. 74. f. 679.

Habitat in Oceano indico & africano.

paristica. 115. O. testa tenui : valva inferiore convexa crassiori, ali-
planata.

Rumpf mus. t. 46. f. O.

Petiv. amb. aq. t. 19. f. XI.

Klein ostr. t. 8. f. 17.

Chemn. Conch. 8. t. 74. f. 681.

β) *Adans. Seneg.* 1. t. 14. f. 1. Gafar.

γ) *Chenin. Conch.* 9. t. 116. f. 997.

Habitat in mari indico & atlantico, arborum littoralium prefertim mangiferæ radicibus affixa, forma & magnitudine varians, ut testa interdum palmam virilem æquet

exalbida. 116. O. testa tenui : valva superiore longiore magisque convexa.

Knorr Vergn. 5. t. 14. f. 3. 4.

Habitat in mari adriatico, aliis testaceis nunc gregatim nunc solitarie affixa, testa ad 1½ pollicem usque longa, ceterum magnitudinis formaque variae, ut plurimum exalbida, rarius flava aut violacea.

117. O. testa rugosa imbricatim lamellata : margine obtuse plicato dentato, apice altero producto. v. *Born. mus.*

Caes. Vind. test. 1. p. 98. t. 7. f. 3.

Habitat - - - testa polliceni & 10 lineas lata, alba : maculis sparsis nigris, cardinis dente medio lato conico.

118. O. testa æquivalvi subrotunda lævi complanata.

Adans. Seneg. 1. p. 202. t. 14. f. 5. Rojel.

Habitat ad Africæ littus occidentale, saxis adhaerens, testa diametri bipollicaris spadicea, intus exalbida.

119. O. testa tenui depresso rudi inæquali : valva superiore costata, costis sparsim spinosis.

Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 377. n. 199. t. 9. f. 7. a. b.

Habitat ad Guineam, cardine aliis corporibus affixa, testa nunc subrotunda nunc oblonga, tenuissima, alba, radiis, virgis maculisque rubris aut cæruleoscentibus.

120. O. testa ovali tenuissima in rostrum breve acutum laterale canaliculatum producta : striis obsoletis perpendicularibus inæqualibus.

Schroet. Einl. in Conch. 8. p. 378. n. 120. t. 9. f. 8.

Habitat - - - testa pollicem circiter longa, fragili exalbida, intus argentea alba nitente, valva inferiore superiore longitudine & latitudine superante.

121. O. testa subrotunda nivea tenuissima pellucida : valva superiore in rostrum breve acutum terminata.

Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 378.

Habitat intrinsecus in lepadis tintinnabuli testa firmissime adhaerens.

- annulata. 122. O. testa æquivalvi orbiculari alba : semicirculis ^{cōcū}
centricis. Müll. zool. dan. prodr. 2987.
*Habitat in Oceano septentrionali, an distincte a reliquo
species?*
- retusa. 123. O. testa æquivalvi oblonga alba glabra striata : ^{ve}
bone a cardine remoto. Müll. zool. dan. prodr. 2987.
Habitat in Oceano septentrionali.
- *** *cardinis linea perpendiculariter sulcata.*
- Perna. 124. O. testa æquivalvi obovata inæquali : hinc rotundior
Lift. Conch. t. 199. f. 33. & t. 228. f. 63.
Klein. ostr. t. 8. f. 19. 20.
Seb. mus. 3. t. 90.
Martini Besch. berl. Naturf. 3. t. 7. f. 20. 21.
Chemn. Conch. 7. t. 59. f. 579. 580.
Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 351. t. 9. f. 5.
*Habitat rara in Oceano indico & americano, testa ed
pollices longa, figura pernæ, alba, interdum ferruginea,
lamellata, ad cardinem lævi, rostro brevi
recto, aperto.*
- Isogno-
mum. 125. O. testa æquivalvi : lobo laterali majore. *Mus. Lud.*
*Ulr. 533. n. 120.**
Rumpf mus. t. 47. f. I.
Petiv. amb. aq. t. 20. f. II.
Klein ostr. t. 8. f. 15.
Seb. mus. 3. t. 91. f. 6.
Chemn. Conch. 7. t. 59. f. 584.
β) *Seb. mus. 3. t. 91. f. 7.*
γ) *Gualt. test. t. 97. f. A.*
Valent. Abb. t. 13. f. 3.
Seb. mus. 3. t. 91. f. 8.
Knorr Vergn. 4. t. 10. f. 1. 2. & 6. t. 13. f. 1.
Mart. Besch. Berl. Naturf. 3. t. 7. f. 19.
Chemn. Conch. 7. t. 59. f. 582.
δ) *Chemn. Conch. 7. t. 59. f. 583.*
*Habitat rarior & pretiosa in Oceano indico, γ) quoque
in australi, testa interdum ultra 5, γ) ad $7\frac{1}{2}$ pollices
longa, & in medio $1\frac{1}{4}$ lata, nigra violacea intermixta
intus margaritacea, lamellata, rostro aperto.*
- Ephip-
pium. 126. O. testa æquivalvi orbiculata compressa membranosa
*Mus. Lud. Ulr. 525. n. 135.**
Lift. Conch. t. 227. f. 62.

Klein ostrac. t. 18. f. 18.
Sch. mus. 3. t. 90. ser. sac. fig. I. & ult.
Knorr Vergn. 6. t. 21. f. I.
Martin. Besch. berl. Naturf. 3. t. 7. f. 22.
Chenn. Conch. 7. t. 58. f. 576. 577.
Habitat rarissima in Oceano indicō & ad Caput Bonae Spei, testa nigricante, ferruginea aut purpurascens, intus margaritacea, 5 pollices aliquando longa, & 5½ lata, hiantē, subrotunda, lamellata: margine acutissimo.

- Pista,* 127. *O. testa æquivalvi tenui pellucida ad cardinem acuminata, altero fine dilatata: margine acutissimo.*
Mart. Besch. berl. Naturf. 3. t. 7. f. 23. 24.
Chenn. Conch. 7. t. 58. f. 575.
Habitat in mari rubro, testa nonnullas lineas ultra pollicem lata, duosque longa ex fusco lutescente: radiis dilutioribus undulatis.

- Legumen.* 128. *O. testa complanata cana tenui pellucida lamellata: cardinis linea obliqua; fulcorum interstitiis nigris.*
Chenn. Conch. 7. t. 59. f. 578.
Habitat rara ad insulas Nicobaiicas, testa 4 lineas lata, & 2 ultra pollicem longa, macula ad umbonem livida.

129. *O. testa complanata fragili pellucida marginem versus dilatata, cardinis linea obliqua in rostrum parvum terminata.*
Chenn. Conch. 7. t. 59 f. 581.
Habitat rara in Oceano americano.

- mytiloides,* des. 130. *O. testa subæquivalvi ovata ventricosa recta. Hermann Schr. berl. Naturf. 2. n. 11. p. 271. t. 9. f. 9.*
Habitat - - - fossilis in Alsacia prope Gundershofen.

- torta,* 131. *O. testa æquivalvi intorta. Hermann Schr. berl. Naturf. 2. p. 276.*
Habitat - - - fossilis in Alsacia prope Gundershofen.

- Pes lu-*
træ, 132. *O. testa æquivalvi lauri cuneata: plici se sis obtusis Mant. 2. p. 547.*
Gualt. test. t. 74. f. C C.
Lift. Conch. t. 171.
Argenv. Conch. t. 27. f. A.

Habitat testa ex purpurascente alboque varii longitudinaliter subtilissime striata; an hujus t. bus: an hujus etiam quadridentata, a Schroetero Eini. in Conch. 3. Vorr. p. XVI. memorata?

314. ANOMIA. *Animal Corpus Ligula emarginata ciliata* : ciliis valvæ superiori affixis : Brachiis 2 linearibus corpore longioribus coniventibus porrectis , valvis alternis utrinque ciliatis : ciliis affixis valvæ utriusque.

Testa inæquivalvis : valva altera planiuscula , altera basi magis gibba : harum altera basi sæpe perforata.

Cardo cicatricula linearis prominenti introrsum dente laterali ; valvæ vero planioris in ipso margine.

Radii duo ossei pro basi animaliis

Cranio-laris. 1. A. testa orbiculata : valva gibbosiore conico convexa, planiore basi foveolis tribus.

Retz. Schr. berl. Naturf. 2. t. I. f. 2. 3.

Chemn. Conch. 8. t. 76. f. 687. a. b.

β) Chemn. Conch. 8. t. 76. f. 688. α. β.

Habitat rarissima in mari mediterraneo & ad insulas Philippinenses , (frequentius fossiliis , nummulus ^{longus} tenbuigenis ,) testa albida , vix pollicem longam , & lata , valva inferiore solidiore , intus tuberculis 3 laevibus inæquali.

pectinata. 2. A. testa oblonga ramoso-sulcata : gibbosiore posteriori foveolis duobus.

Chemn. Conch. 8. t. 76. f. 689. 690.

Habitat in mari mediterraneo , (frequentius fossiliis exalbida , pollicem circiter longa , & $\frac{3}{4}$ lata , valva planiore perforata , altera striis longitudinalibus exparsa squamosis , hinc inde bisidis inæquali.

Fphip-pium. 3. A. testa suborbicularia rugoso-plicata planiore perforata.

Lift. Conch. t. 204. f. 38.

Bonnn. recr. 2. f. 56.

Bonann. mus. Kirch. 2. f. 55.

Gualt. test. t. 97. f. B.

Ginann. adr. 2. t. 27. f. 172.

Argenv. Conch. t. 19. f. C.

Chemn. Conch. 8. t. 76. f. 692. 693.

Habitat in Oceano indico & americano, testa utplurimum alba, interdum rubella, 2 pollices longa, 2 $\frac{1}{4}$ lata, tenera sublamellata.

Capa.

4. A. testa obovata inaequali violacea : superiore convexa, inferiore perforata.

Knorr Vergn. 6. t. 9. f. 5.

Murray testaceol. t. 2. f. 13.

Chemn. Conch. 8. t. 76. f. 694. 695.

- β (?) *Anomia violacea. Dic. encyclop. p. 71. n. 4.*

Habitat frequens in mari mediterraneo, atlantico, americano, testa figuræ variae, nucis juglandis utplurimum magnitudine, valva inferiore alba, superiore ex rubecente cærulecente.

électrica.

5. A. testa subrotunda siava lævi, altera convexo gibbosa.

Rumpf mus. t. 47. f. L. Odreum electricum.

Lift. Conch. t. 205. f. 39?

Petiv. amb. aq. t. 20. f. 8.

Knorr Vergn. 5. t. 25. f. 6.

Chemn. Conch. 8. t. 76. f. 691.

Habitat ad Africæ littus septentrionale & occidentale, cepæ affinis, at colore, testa minore, tenera, chartæ inflar tenui, valva inferiore planiore, foramine ovali pertusa, & minuto in cardinis regione umbone distincta.

Squamu-
la.

6. A. testa orbiculata integerima plana : margine altero gibba Ixvi. Fn. suec. 2151. Müll. zool. dan. prodr. 2998.

It. ugoth. 170. Patella.

Chemn. Conch. 8. t. 76. f. 696.

*Habitat frequentissima in Oceano Europæ septentrionali, aliis marinis adhaerens, minata, valva planiori tene-
riori utplurimum perforata.*

In duo genera divisit anomias inter fossilia frequentiores O. Fr. Mullerus, eas scilicet, quarum animal branchis gaudet cincinnatis, & in quarum testa valva superior deorsum perforata, & cardo in altera dentibus uncinis armatus, terebratulas, eas autem, quarum animal branchis gaudet simpliciatus, & in quarum testa cardo edentulus est, & valva inferior perforata, ancinis nuncupando.

- patellifor- 7. A. testa ovata convexa subdiaphana striata : vermicularis.
posteriori recurvo lævi. Fn. suec. 2152.* Müll. zool. dan. prodr. 2999.
Habitat in mari norwegico, rarer, patellæ luteæ affinis
testa albida tenera fragilis, striis longitudinalibus fortissimas transversas decussantibus, rustro obsoleto
valva inferiore plana, lævi, basi perforata.
- Scobina- 8. A. testa subrotunda lævi intus scabra, nate perforata.
Gualt. test. t. 96. f. A.
Chemn. Conch. 8. t. 78. f. 704?
Schroet. Journ. für Liebh. Steinr. 3. t. 2. f. 4.
Eint in Conch. 3. p. 389. t. 9. f. 9.
Habitat in Pelago, testa tenui pellucida, alba, tenerissima
striata, inuis argentea : margine externo glabro acuto
- aurita. 9. A. testa obovata striata subaurita : nate perforata.
Gualt. test. t. 96. f. B.
Habitat in mari norwegico, capiti serpentis affinis,
dorso testæ penitus aquabili distincta.
- retusa. 10. A. testa obovata striata retusa : convalle longitudinali
nate perforata. Fn. suec. 2153. Müll. zool. dan. prodr.
3000.
Habitat in Pelago norwegico, alcyoniis adhaerens, pen-
tant.
- Gryphus. 11. A. testa oblonga lævi : altera valva plica laterali obli-
leta ; nate incurvata altera brevi planiuscula.
Mus. Tessin. p. 92. t. 5. f. 9.
Olear. mus. 67. t. 33. j. 3.
Rumpf mus. t. 59. f. B.
List. an. angl. p. 238. t. 8. f. 45.
Column. aq. p. 54. t. 52.
Bonann. recr. 2. f. 31.
Habitat - - haecenus modo fossilis reperta, testa
mellata, rugosa, magnitudinis formaque varia.
- Pecten. 12. A. testa semiorbiculata depressa multistriata : valva
altera plana.
List. anim. angl. p. 243. t. 6. f. 49.
Habitat - - haecenus modo fossilis inventa, & testa
quidem, in Anglia, testa in regione cardinis linea
transversa notata.
- striatula. 13. A. testa subrotundo-dilatata utrinque gibba striata
valvis aequalibus.

Habitat - - - - *haecdenus modo inter fossilia detecta*, *testa rotundata, sed duplo latiori, quam longa, posterius magis gibbosu, anterius margine tenui.*

- truncata. 14. A. testa suborbiculata obsolete striata : cardine truncato. Müll. zool. den. prodr. 3001.

*List. Conch. t. 462. f. 23.
an. angl. t. 9. f. 50.*

Andreae Br. a. d. Schw. t. I. f. d-g.

v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 6. f. 14.

Chenin. Conch. 8. t. 77. f. 701. a. B.

Schroet. Journ. für Liebh. Steinr. 3. t. 2. f. 5.

Habitat in mari Norwegici coralliis, striatulae affinis, at cardine recto exciso distincta, testa exalbida, latiori quam longa, subtilissime decussatim rugosa convexa, intus granulata.

- reticulata- 15. A. testa cordata decussatim striata : valva breviore magis gibbosa.

Mus. Tess. p. 88. t. 5. f. 5.

Habitat - - - *haecdenus modo fossilis, testae lateribus prominulis compressis, natis planioris valva parum prominente.*

- plicatella. 16. A. testa dilatato-lunata plicata : sulcis longitudinaliter striatis, media latiore.

Habitat - - - *haecdenus tentummodo fossilis præcipue in Helvetia, testae lateribus submucronatis, plicis longitudinalibus, natum superiore cùmodum prominente.*

- crispa. 17. A. testa dilatato-triangulari plicata : sulcis rugolis, media latiore.

Mus. Tess. t. 5. f. 7.

List. anim. angl. t. 9. f. 56.

Habitat - - - *haecdenus modo fossilis reperta in Anglia, Helvetia, Eifalia, testae fere lunatae sulcis 5-6 rugis arcuatis transversis, lateribus submucronatis, natum superiore prominente.*

- lacunosa. 18. A. testa subrotunda multisulcata : valvis apice plicatis, altera breviore lacunosa, apice quadridentata.

Mus. Tessin. t. 5. f. 6.

Column. de purp. c. 15. p. 35. Concha altera anomia striata trilobos.

List. an. angl. p. 249. t. 9. f. 57.

Grew. mus. t. 19. f. 6.

Klein oſtr. t. II. f. 57.

Habitat - - - modo fossilis.

pubescens. 19. A. testa obovata sulcata : vulva altera nata ad cardinem dehiscente apertura.

Müll. zool. dan. pradr. 3007 ? Terebratula testa tomentosa subquinqangulari longitudinaliter striata.

Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 397. t. 9. f. 10. a. b. Habitat in Oceani Norwegici zoophytis, testa alba parvissima magnitudine vix seminis cucumeris, subæquivalvis, brevissimis ereditis distantibus, an forsitan a spongia specie adhaerente? hirta, non retusa, nec plicata, cardine instar longitudinaliter sulcata: Valva alterius natus posterius prominens alteram valvam versus foramen offert. Zoega.

fascia. 20. A. testa subrotunda multisulcata : valvis convexis apice octodentatis.

Habitat - - - haecenus modo inter fossilia deprehensa in Helvetia, Westphalia, testa nonnunquam fere grossa.

Caput ser. 21. A. testa obovata striata tomentosa : valva altera nata penitus longiori perforata. Fn. suec. 2154.

Gründler Naturf. 2. t. 3. f. 1-6.

Andreæ Br. a. d. Schweiz t. I. f. c.

v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 6. f. 13.

Schroet. Abh. Naturg. 2. t. 5. f. 8. a. b. & f. 9. a. b. Chemn. Conch. 8. t. 78. f. 712.

Habitat in mari norwegici abysso madreporæ prolifera utplurimum adhaerens, testa alba, longitudinaliter parumper transverse striata, anterius compressa, super gili, margine crenulato, cardine utrinque ad latitudinem prominentia in utraque valva dente armato; valva anteriori periore posterius prominente & utrinque longiore, anterius declinata, medio sulco exarata, apice perforata, ligamento affixa coralliis aliisve zoophytis; valva inferiore rotundata, anterius retusa.

Terebra- 22. A. testa obovata lævi convexa : valva altera triplicata, tula.

altera biplicata. Fn. suec. 2155.

Column. purp. c. 12. f. 1. p. 32.

Lift. anim. angl. p. 240. t. 8. f. 46?

Klein oſtr. t. II. f. 74.

Habitat - - - haecenus modo sed copiosissime fossilis reperta, nata alterius valvæ prominente pertusa.

angulata. 23. A. testa basi laterum compresse anterius plicata : media tridentato.

Mus. Tess. p. 96. p. 5. f. 4.

Habitat - - - haecenus modo fossilis, testae ceterum laevis antrorum plicis numero variis.

Hysterita. 24. A. testa dilatata laevi convexa striata subtriloba anterius depresso : margine acuto.

Mus. Tessin. p. 90. t. 5. f. 1-3.

Wolf. Hass. subterr. t. 3. f. 3-5.

Worm. mus. t. 83.

Habitat - - - haecenus tantummodo inter fossilia reperta in Hassia, & vicinis Moguntini electoratus terris, magnitudine & quodammodo etiam figura varians, testa laevi, rarius, & tunc quidem subtilissime, striata, valva altera breviore medio quam maxime convessa, ad latera depresso, altera longiore plana vulva faciem referente in rostrum longiusculum terminata.

biloba. 25. A. testa biloba æquali striata.

Habitat - - - modo fossilis. Pennant.

Placenta. 26. A. testa orbiculata plana pellucida : cardinum callis linearibus binis testæ interne adnatis. *Mus. Lud. Ulr. 536. n. 126.**

Lift. Conch. t. 225. f. 60. & t. 226. f. 61.

Seb. mus. 3. t. 90. fig. viii.

Knorr Vergn. 2. t. 24. f. 1.

Chenn. Conch. 8. t. 79. f. 716.

Habitat frequens in Oceano indico, testa 5 pollices longa lataque, & adhuc majore, alba, intus nitente argentea, tenera, pellucida, tenui, fragili, striis subtilissimis longitudinalibus rugas transversas arcuatas decussantibus, valva superiore penitus complanata.

Sella. 27. A. testa subquadrangula convexa arctissime clausa ænea margine repanda.

Bonann. Kirch. 2. f. 135?

Seb. mus. 3. t. 90. fig. med.

Knorr Vergn. 4. t. 18. f. 2. & 5. t. 29. f. 1.

Chenn. Conch. 8. t. 79. f. 714.

β) *Sella minor, altera valva alba.*

Rumpf mus. t. 47. f. B.

Petiv. amb. aq. t. 20. f. 3.

Gualt. test. t. 104. f. B.

Seb. mus. 3. t. 90. f. plur.

Habitat in Oceano indico, placente proxime affinis, lamellata intus nitente nonnunquam ultra 7 polita longa lataque, radicibus nonnullis dilute spatileis, que innumeris longitudinalibus, ad marginem tripli coloribus ludente, cardinis callis 2 ad unibonem convergentibus.

spinosa. 29. A. testa spinis longitudine testæ.

Habitat - - - hædenus modo fossilis reperta in Anglia Solander.

aculeata. 30. A. testa subrotunda aculeata : vertice lævi posterior recurvo. *Müll. zool. dan. prodr. 3005.*

Chemn. Conch. 8. t. 77. f. 702.

Habitat in mari Norwegici fucis & zoophytis, valvis inferiori plana, lævi ad verticem perforata.

muricata. 31. A. testa hyalina ventricosa : vertice dextrorsum flexuosa valva superiore longitudinaliter striata : striis in squamulas spinalisque cavas desinentibus.

Chemn. Conch. 8. p. 65. vign. 13. f. A. B.

β) *Chemn. Conch. 8. p. 65. vign. 13. f. C. D.*
Habitat ad Guineam, testa nivea, in β) majore minore que convexa, valva inferiore plana tenuissima; fuso minis ambitu elevato; dente lateralí.

squamata. 32. A. testa oblonga margine rotundata : valva altera plana, tenera lævi; apicis foramine ampio ovato, altera convexiuscula longitudinaliter striata.

Chemn. Conch. 8. t. 77. f. 697.

Habitat in mari Norwegico, squamula major, testa fragili, valva plana aliis corporibus adhaerente.

punctata. 33. A. testa orbicularia hyalina tenui punctata : valva planiore apice perforata : punctis exterius impressis.

Chemn. Conch. 8. t. 77. f. 698.

Habitat ad insulam Feioe, testa exigua fragili, punctis in valva convexa extrinsecus elevatis.

undulata. 34. A. testæ margine crenato, valva planiore tenuissima lævi : foramine ovali ampio pertusa, convexæ annulis transversis arcuatis longitudinales undulatas decurrentibus.

Müll. zool. dan. prodr. 3003 ? Anomia testa subovata pellucida, supra striis transversis undulatis.

Chemn. Conch. 8. t. 77. f. 699.

Habitat in mari septentrionali & mediterraneo, testa interdum rubella.

35. A. testa longitudinaliter striata subtruncata margine rotundato crenata; valvae planioris costa infra bispinosa.

Chenn. Conch. 8. t. 77. 703. a. b. c.

Habitat ad Caput Bonæ Spei, testa nunc rubella, nunc alba.

36. A. testa truncata orbiculata longitudinaliter striata: valva planiore costis intus tribus, altera intus longitudinaliter striata septo medio bipartita.

Gualt. test. t. 96. f. C.

Chenn. Conch. 8. t. 78. f. 705. a. b. c. d.

Habitat in mari mediterraneo, corallilis adhærens, testa parva: vertice perforata.

37. A. testa cornea lævi utrinque convexa: valva superiore emarginata ad latera radiata; dorso elevato sanguineo, apiceque prominente perforata.

Chenn. Conch. 8. t. 78. f. 706.

Habitat in India, testa pellucida.

38. A. testa ovata ventricosa hyalina tenuissima: cardines præter dentes laterales in valva inferiore radiis duobus officiis, valvae superioris apice prominente perforata.

Argen. zoomorph. t. 12. f. E.

Knorr Vergn. 4. t. 30. f. 4.

Wach Naturf. 3. t. 3. f. 5.

Andr. Br. v. d. Schw. t. 2. f. a. b.

Born mus. Caes. Vind. test. p. 116. vign.

Spengl. catal. rais. t. 4. f. I. 2.

Schroet. Journ. 3. t. 2. f. I.

Chenn. Conch. 8. t. 78. f. 707-709.

Habitat rarer in mari mediterraneo, testa intus nitente, $\frac{1}{2}$ pollicem circiter longa, & ulira pollicem lata.

39. A. testa lævi ventricosa transversim subtiliter striata.

Müll. zool. dan. prodr. 3006. Telebratula Cranium.

Schröt. Journ. 3. t. 2. f. 2.

Habitat in mari Norwegico, testa $\frac{3}{4}$ pollicis lata, & paulo longiori, planiore & breviore, quam in vitrea tenuissima sub epidermide sordide fuscescente nivea pellucida, striis subtilissimis transversis in valva longiore apice perforata aliis subtilissimas undulatas, conferitas decussantibus.

- dorsata. 40. A. testa cordata solida annulis rugisque arcuatis transversis striis sulcisque longitudinalibus inæquali, valvæ convexæ apice perforato dorsoque elevato.
Günther Naturf. 3. t. 3. f. 1-3.
Chemin. Conch. 8. t. 78. f. 710. 711.
*Habitat in freto magellanico, frequentius fossilis,*¹⁰
cinerea : margine repando cinereo.
- psittacea. 41. A. testa cornea subtilissime longitudinaliter striata: valvæ breviore gibba, longioris complanatae apice incurvatae perforato; foramine trianguli.
List. Conch. t. 211. f. 46.
Argenv. Conch. t. 23. f. O.
Klein ostr. t. 12. f. 84. 85.
Spengl. cat. rais. t. 4. f. 8.
Chemin. Conch. 8. t. 78. f. 713. a. b. c.
*Habitat rarissima in mari Groenlandiam alluente,*¹¹
satis magna pellucida : margine acuto lœvi angulus.
- tridentata. 42. A. testa flavescente pellucida tenui subtilissime transversim striata tricuspidate: cuspidibus tubulosis, valvæ connatis.
Forsk. Fn. arab. p. 124. n. 63.
Chemin. Conch. 8. p. 65. vign. 13. f. a. b. c. d. F. G.
*Habitat rario in mari mediterraneo, plicis in laterali ampliore sulcisque quatuor longitudinalibus,*¹²
obtuso semiorbiculato.
- spondylodes. 43. A. testa ovali antiquata: rostro obtuso canaliculata.
List. Conch. t. 211. f. 45.
Klein ostr. t. 12. f. 82. 83.
Habitat - - -
- yentrica. 44. A. testa subovata solida: rostro canaliculato.
Schroet. Journ. 2. t. 2. f. 3.
*Habitat - - - madreporæ proliferæ adhærens,*¹³
*vix affinis, testa serpide ochroleuca, apicis foraminis*¹⁴
amplo, altero latere longiore.
- gryphoides. 45. A. testa ovali lœvi solida opaca: valvæ majoris rotundatae obtuso truncatae.

An diligenter hujus generis species, quasi Bonanni recr. 1. f. 50. & mag. Kisch 2. f. 43. & ea, quam Matovi Berlin. Scandl. 3. t. 5. f. 12. delinquentem obviorum?

Schroet. Journ. 4. t. 2. f. 8.

Habitat - - - grypho affinis, testa exalbida.

- Rugosa.* 46. A. testa tenuissima lamellata : medio sellæ instar excavato, valva superiore plana, inferiore verticem versus convexa : foramine orbiculari infra verticem perforata.

Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 418. t. 9. f. 11.

Habitat in mari norwegico, madreporæ proliferæ adhaerens, testa queste insimata, valvæ inferioris parte convexa argentea.

- Rugosa.* 47. A. testa obovata : valva superiore plurimam partem convexa confertim subtilissime rugosa, inferioris tenuissime laevis foramine reniformi.

Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 419. t. 9. f. 12.

Habitat in mari norwegico, madreporæ proliferæ affixa, testa exalbida : margine acutissimo.

- Cylindrica.* 48. A. testa tenuissima cylindrica exterrsum angustata : valva superiore gibba, inferiori excavata.

Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 419. t. 9. f. 13.

Habitat in mari norwegico, echini cidaridis aculeis adhaerens.

- Nucleus.* 49. A. testa glabra ovali longitudinaliter sulcata.

Müll. zool. dan. prodr. 3008. Terebratula Nucleus.

Habitat in mari norwegico.

- Avenacea.* 50. A. testa pyriformi versus cardines protracta subcompressa. *Müll. zool. dan. prodr. 3004.*

Habitat in Oceano septentrionali.

- Sandarium.* 51. A. testa turbinata dorso plana cavitate striata, operculo piano hemisphaerico. *Mart. 2. p. 547.*

Habitat - - - inter fossilia modo, potissimum Eifaliæ reperta, madreporæ turbinatæ quodammodo figura testa solida crassa, magnitudine extimi pollicis, operculo concentrica striata.

315. MYTILUS. *Animal Ascidia?*

*Testa bivalvis, rudis, sæpius affixa
byssu, ut plurimum crassior.
Cardo (in plurimis) edentulus,
distinctus, (paucis exceptis
linea subulata excavata longi-
itudinali.*

* Parasitici, unguibus affixis.

- Crista galli. 1. M. testa plicata spinosa : labro utroque scabro.
Lud. Ulr. 537. n. 128.
Rumpf mus. t. 47. f. D. Ostreum plicatum minus.
Argenv. Conch. t. 20. f. D. Auris porci f. Crista galli.
Petiv. aq. amb. t. 20. f. 2.
Gualt. test. t. 104. f. E.
Knorr del t. B. IV. f. 8.
Vergn. 4. t. 10. f. 3-5. 5. t. 16. f. 1. & t. 17. f. 17.
Chern. Conch. 8. t. 75. f. 683. 684.
β) Gualt. test. t. 104. f. D.
Chern. Conch. 8. t. 73. f. 675.
γ) Davil. catal. system. I. p. 288. t. 19. f. 10?
δ) Chern. Conch. 9. t. 116. f. 993.
*Habitat gregaria in Oceani indici, β) maris rubri, δ)
tessimum gorgonii, testa ex purpurea subviolacea, dilata-
cinnamomea, vel badia punctis elevatis aspera, dilata-
glabra mellea, subæquivalvi, clausa, plicis 5-8-10
obliquis vel rectis, soveola ad cardinem pro-
gona.*
- Hyotis. 2. M. testa plicata imbricata squamis compressis patulis
labro utroque lævi. *Mus. Lud. Ulr. 548. n. 129.*
Gualt. test. t. 103. f. A.
Argenv. zoomorph. t. 12. f. F.
Chern. Conch. 8. t. 75. f. 685.
*Habitat rarius in pelagi gorgonii, testa rugosa for-
tis, ex virecente lutea, lamellata, plicis hac illuc can-
nulis, nucleis cavis canaliculatis obsefisis.*
- Frons. 3. M. testa plicata læviuscula : labro altero scabro.
*Lud. Ulr. 537. n. 127.**
Argenv. Conch. t. 19. f. D. Cratium f. Folium.

List. Conch. t. 197. f. 32. t. 198. f. 32. a?

Gualt. test. t. 104. f. C.

Knorr Vergn. 4. t. 8. f. 3.

v. *Born. mus. Caes. Vindob. test.* p. 121. vign. f. b.

Chemin. Conch. 8. t. 75. f. 686.

Habitat in Oceani americani gorgoniis, testa rubella, cærulecente, fusca, ut plurimum ovali, margine utrinque plicato, denticulato, valva inferiore glabra medio canaliculata, superiore ad marginem punctis elevatis scabra : costa media elevata.

** *Plani s. compressi ut plani appareant & subauriti.*

4. M. testa compresso plana suborbiculata basi transversa imbricata tunicis dentatis. *Mus. Lud. Ulr.* 538. n. 130.*

Imper. hist. nat. 905. Concha margaritifera.

Rumpf mus. t. 47. f. F. Matrix perlarum.

Argent. Conch. t. 20. f. A. Gallina guttata.

List. Conch. t. 221. f. 56. t. 223. f. 57. & t. 224. f. 58.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 2. f. I.

Petiv. amb. aq. t. 20. f. 4. 7.

Gualt. test. t. 84. f. E. F. G.

Knorr Vergn. 2. t. 25. f. 1-3. & 4. t. 18. f. 1.

v. *Born. mus. Caes. Vindob. test.* p. 121. vign. f. a.

Chemin. Conch. 8. t. 8. f. 717-721. a. b.

Habitat in Oceano indico & americano, testa solida, ad 8 pollices longa & adhuc latiori, intus margaritacea (hinc matrix perlarum potissimum) exterius nunc unicolor, præseriū smaragdina, nunc spadicea, aut persici florum ad instar tinda radiis albis, vel albida radiis virilibus : juniorum testa altera altero latere aurita, uii peccen, cardine rectissimo, longitudine totius teste ; ex ligamento cardinis androdamas, ex verme incola testaque laesa uniones.

5. M. testa subrotunda longitudinaliter striata pellucida subaurita. *Mus. Lud. Ulr.* 539. n. 131.*

Habitat in mari mediterraneo, testa tenerrima hyalina, subtilissime perpendiculariter striata, magnitudine unguis humani ; nonne ad ostreas pertinet ?

*** *ventricosusculi.*

6. M. testa cylindrica utrinque extremitatibus rotundatis,

Mus. Lud. Ulr. 539. n. 132.*

Rondel. aq. 2. p. 49. Pholas.

Rumpf mus. t. 46. f. F. Pholas.

Argenv. Conch. t. 26. f. K. Dactylus.
zoomorph. t. 7. f. 5.

Jonst. exsang. t. 15. f. 18. 19.

Lift. Conch. t. 427. t. 268. & t. 437. f. alt.

Bonann. recr. 2. f. 27-29?

mus. Kirch. 2. f. 27. 28?

Petiv. amb. aq. t. 19. f. 13.

Gualt. test. t. 90. f. D.

Lesser testaceoth. f. 132.

v. Born mus. Caes. Vindod. test. t. 7. f. 4.

Chemn. Conch. 8. t. 82. f. 729. 730.

E) Mytilus cinnamomeus Chemn. Conch. 8. t. 82. f.
Habitat in mari mediterraneo, indico, americano,
ralliis testaceis, saxis saepe durissimis forveas pro-
taculo excavans laevissimas, testa nonnunquam pro-
cem lata & ultra 3 longa, maris mediterranei frigidi
indici coriacea, striis transversis arcuatis exantri-
nigra, badia aut virescente, intus opalino - carabi-
cente, albido-argentea, aut margaritacea.

rugosus. 7. M. testa rhomboideo-ovali rugosa obtusa antiquata
Müll. zool. dan. prodr. 3011.

Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 429. t. 9. f. 14. a.
Habitat in Norvegia lacustribus ad ostia maris,
magnitudine vix ultimi articuli minimi digitii, oris
utroque tamen sine obtusissima, colore tristri cano, in
dimidiato cæruleo & albo; striis subtilissimis longu-
dinalibus rugas transversas confertas decussantibus,

bilocula- 8. M. testa exerulea striata : umbonibus fornicatis, dorsi
pimento albo. Mus. Lud. Ulr. 540. n. 133.
Spengl. catal. rais. t. 6. f. 3-5.

Chemn. Conch. 8. t. 82. f. 736. a. b. f. 737. r.
Habitat rarus ad insulas Nicobaricas, testa ovata, stria
rius plana medioque excavata & foramine ovali hirsuta,
posterioris convexa, epiderniide viridi tecta.

exultus. 9. M. testa striata : ventre angulato, margine crenatus
Mus. Lud. Ulr. 540. n. 134.
Lift. Conch. t. 365. f. 205.
Chemn. Conch. 8. t. 84. f. 754.

Mytili parasitici poteri jure ostreis accensendi, quibuscum cardinis quicunque
conveniunt; an ad hanc mytilorum tribum etiam spedant tanquam dñe
species conchæ ab Argenvill. conch. t. 20. f. C. & altera f. H. & à laudata
Vergn. 1. t. 29. f. 2. delineata?

Habitat in Oceano americano & mari rubro, testa 1 $\frac{1}{2}$ pollicem longa, ferruginea, albida flavicante, aut fusca, intus cærulecente, dentibus ad latera cardinis 4-5.

- barbatus. 10. M. testa laeviuscula ferruginea exterius apice barbata.
Fn. suec. 2157. Müll. zool. dan. prodr. 3012.
Ginann. adr. 2. p. 36. t. 27. f. 169. Musculus obscurus pilosus.

Gualt. test. t. 91. f. H. 2?

Chemin. Conch. 8. t. 84. f. 749.

Habitat in mari mediterraneo, norwegico, lithophytis adhærens, testa ad $\frac{1}{4}$ pollicis longa, sub epidermide ferruginea ex rubello cærulea aut albida.

- edulis. 11. M. testa laeviuscula violacea : valvis anterius subcircularis posterius retusis, natibus acuminatis. *Fn. suec. 2156. Mus. Lud. Ulr. 541. n. 135.* It. oel. 43. It. wgoth. 170. Müll. zool. dan. prodr. 3013. Brünn spol. mar. adr. p. 108. O. Fabr. Fn. groenl. p. 417. n. 417.*

Gesn. aq. 277. Mytulus.

Bell. aq. 397. Mytulus.

Mery act. par. 1711. t. 3. f. 4. 5.

Rondel. aq. 2. p. 46.

Aldrov. exsaug. p. 512.

Lift. Conch. t. 362. f. 200.

anim. angl. t. 4. f. 28.

Bonann. recr. 2. f. 30.

mus. Kirch. 2. f. 29.

Ginann. adr. 2. p. 36. t. 23. f. 168.

Bost. op. subf. 3. p. 101. t. II. f. 9-II.

Heyda anat. mytal. 1683-8.

Argenv. zoomorph. t. 5. f. D. E. F.

Knorr Vergn. I. t. 4. f. 5. 6. 4. t. 15. f. 1. & 5. t. 25. f. 1.

Regenf. I. t. 7. f. 8. t. 11. f. 58. & t. 12. f. 71. 72.

8) *Chemin. Conch. 8. t. 84. f. 750. 751. 755.*

9) *Lift. Conch. t. 362. f. 201.*

10) *Lift. Conch. t. 362. f. 202.*

11) *Lift. Conch. t. 363. f. 204.*

12) *Gualt. test. t. 7. f. A?*

Habitat in mari caspio, balthico, mediterraneo, oceano, europæo & indico, intra tropicos ut plurimum maximus, intra arcticum minimus, testa subtrigona sub epidermide subfuscâ aut virescente nitidissime violacea,

Huc referendi quoque lithophago affines, truncatus, cordatus, curvirostrus & donacium, a Schröetero Linl. in Conch. 2. Verr. p. XV. XVI. memorati.

rarius fusca, flavicante, aut radiata, ad 3 $\frac{1}{2}$ pollices longa, pinnæ more byssō exserendo instrūcta; incrustatione plebeiis edulis, concoctu difficultissimus, etiam cepis additatis, certis anni temporibus, an ab asteria ophiochela comepta? venenatus.

ungula-
tus.

12. M. testa lœvi subcurvata : margine posteriori inflata, cardine terminali bidentato. *Mus. Lud. Ulr.* 54^o n. 136.*

Lift. Conch. t. 360. f. 199. & t. 364. f. 203?

Gualt. test. t. 91. f. E.

Regenf. Conch. I. t. 4. f. 47.

Chamn. Conch. 8. t. 84. f. 756.

B) *Chamn. Conch. 8. t. 84. f. 747.*

Habitat in mari mediterraneo & ad Caput Bonæ Spei, ad novam Seelandiam, eduli affinis, sed testa magnior ultra 5 pollices longa, & 2 $\frac{1}{2}$ lata, viridi, cæruleo-centre, aut virore intermixta nigra, annulata 6 latus distantibus acutis, cardinis apice dentibus 6 latus crenis ad 100 notato, valvis valde convexis percurrentibus unguis referentibus.

bidens.

13. M. testa striata subcurvata : margine posteriori inflata, cardine terminali bidentato.

Lift. Conch. t. 356. f. 193. t. 358. f. 196. & ? t. 364. f. 206.

Klein ostr. t. 9. f. 24.

Knorr Vergn. 4. t. 30. f. 3. 5. t. 13. f. 6? & 6. t. 4. f. 3.

Chamn. Conch. 8. t. 83. f. 742. 743.

Habitat in mari mediterraneo, æthiopico, atlantico, freto, magellanico, angulato affinis, pollicis magnitudine versi longitudinaliter striatus, epidermide cinerea, fusca, cærulea aut nigra pulcherrime tintâ.

Modiolus. 14. M. testa lœvi : margine anteriori carinato, gibbis, cardine sublateralis. *Mus. Lud. Ulr.* 54^o n. 137. *Müll. zool. dan. 2. t. 53. f. 1-5. rar. 2. p. 3-6. Prodr.* 3014.

Argenv. Conch. t. 22. f. C. Musculus papuanus. Adans. Seneg. I. t. 15. f. 1. Lulat.

Lift. Conch. t. 356. f. 195. & t. 359. f. 198.

Rumpf mus. t. 46. f. B. C? E?

Petiv. amb. aq. t. 19. f. 2? 10. 12?

Gualt. test. t. 91. f. H. 1.

Klein ostr. t. 9. f. 25. & ? t. 11. f. 67.

Knorr Vergn. 4. t. 15. f. 3.

Chamn.

Chemn. Conch. 8. t. 85. f. 757-760.

2) List. Conch. t. 356. f. 194.

Klein ostr. t. 12. f. 78. 79.

3) List. Conch. t. 1057. f. 5.

Habitat in mari mediterraneo, oceano septentrionali, indico, americano, fucis, testaceis, zoophyis adhaerens; testa ad $\frac{1}{2}$ pedem longa, & $2\frac{1}{4}$ pollicem lata, sub epidermide nigra, cinerea aut fulva, cærulecente aut admissa candore cærulea, aut alba vel flavicante radiis rubris, aut dimidiato spadicea & alba, umbonibus tumidis oblongis, natibus retrorsum prominentibus, vulvæ regione recurvato striata, parte posteriore ultra nates protuberante, cardine ante nates cartilagineo, incola ipso rubro & aurantio eduli.

cyanescens. 15. M. testa ovata anterius compressiuscula fragilissima, cardine laterali.

Müll. ver. terr. & fluviat. 2. p. 208. n. 394. zool. dan. prodr. 3010. Mytilus testa ovata antice convexa natibus integris.

List. Conch. t. 156. f. 11.

an. angl. app. p. 146. t. 2. f. 29.

Gualt. test. t. 7. f. F.

Argenv. Conch. I. t. 24. n. 10. f. 5. 6. 7. 11.
zoomorph. t. 8. f. 12.

Schröet. Flusconch. t. 3. f. 1.

Chemn. Conch. 8. t. 85. f. 762.

) Mytilus (radiatus) testa ovali antice compressiuscula postice radiata. Müll. hist. ver. terr. & fluv. 2. p. 209. n. 395.

List. Conch. t. 155. f. 10.

Ginann. adriat. 2. p. 51. t. 3. f. 15.

2) List. Conch. t. 150 f. 5?

Habitat frequens in Europæ lacubus & ad fluviorum ostia, testa a 12 lineis ad 6 pollices lata, & a 20 lineis ad $3\frac{1}{2}$ pollices longa hiantes sub epidermide transversim rugosa saepe nitida, anterius interdum ochroleuca: radis viridibus, intus alba opaca natibus minutis retroversis, conniventibus.

natinus. 16. M. testa ovali compressiuscula fragilissima margine membranaceo, natibus decorticatis. Fn. suec. 2158.

Müll. hist. ver. terr. & fluv. 2. p. 207. n. 393. zool. dan. prodr. 3009. Mytilus testa ovali antice compressa, natibus decorticatis.

VERMES TESTACEA. *Mytilus*

Lift. Conch. t. 153. f. 8.

Klein oölr. t. 9. f. 26.

Gault. test. t. 7. f. E.

Argeny. Conch. I. t. 24. n. 10. f. 1. 2.
zoomorph. t. 8. f. 8. II.

Rondel. pisè. p. 214.

Gefn. aq. p. 281.

Petiv. gazoph. t. 93. f. 8. 9.

Schroet. Flusconch. t. I. f. 2. 3.

Chemin. Conch. 8. t. 86. f. 763.

β) *Lift. Conch.* t. 154. f. 9.

γ) *Lift. Conch.* t. 151. f. 9?

*Habitat in Europæ aquis dulcibus, frequentius in stagnis
tibus, a mya pilorum fragilitate & cardine distin-*
*cibus, mytilo cygneo similior, an vere distinctus? anum
cibus, testa tenerrima pellucida, 8-30 lineas lata,¹¹
54 longa, utrinque rotundata, viridescente nitida, apertura
apertura parallelis subtilissimis strigisque paucis
cantibus rotata, intus glabra, nitida, alba, cærulea
vel cærulecente, luteoque varia, & iridis colorita
inicante.*

- viridis.* 17. *M. testa lœvi ovata membranacea pellucida, cardine*
*terminali. Mus. Lud. Ulr. 542. n. 138.**
*Habitat in Oceano meridionali, testa viridi, tenerrima
ungue minori.*
- ruber.* 18. *M. testa rugosa : valvis obliquis anterius dilatatis, ma-*
*gine cardinali apicem æquante. Mus. Lud. Ulr. 543.**
*139.**
*Habitat in Oceano magis australi, testa rubra, minus
convexa : cardinis dente brevissimo compresso.*
- albus.* 19. *M. testa transversim striata, natibus gibbis, cardine la-*
rali. Molin. hist. natur. Chil. p. 177.
Habitat frequens ad littus Chilense, testa 6 circiter polluti-
longa, & ad $3\frac{1}{2}$ lata sub cærulea epidermide nivea capi-
leo tincta, verme incola albo sapidissimo.
- ater.* 20. *M. testa sulcata posterius squamosa. Molin. hist. na-*
Chil. p. 177.
Habitat ad littus Chilense, albo minor, testa pinnæ mor-
aspera, obscure cærulea, incola nigro non eduli.
- discors.* 21. *M. testa ovali cornea subdiaphana anterius longitu-*
naliter posterius transversaliter striata. Müll. zool. da-
prodr. 3014. O. Fabr. Fn. groenl. 418.

Hermann Naturf. 17. t. 3. f. 5 - 8.

v. Born mus. Caes. Vind. test. p. 121. vign.

Chemn. Naturf. 10. t. 1. f. 8.

Conch. 8. t. 86. f. 764 - 768.

Schroet. Eint. in Conch. 3. p. 444. t. 9. f. 15.

Habitat in Oceano septentrionali & australi, scopolis byssi
interventu affixa, anatuni cibus, testa $2\frac{1}{2}$ 22 lineas longa,
 $1\frac{3}{4}$ - $13\frac{1}{2}$ lata, cornea, plurimam partem fusca, vireidine
potissimum ad marginem intermixta, intus cæruleescente
cum rubore aut ex viridi albicante, in 3 quasi creas di-
visa, quarum media striae vix conspicuas transversas aut
nullas habet; incolæ non edulis, pes albus, labia fulva,
branchiæ & aperturæ anteriores brunneæ, dorsum fuscum.

Hirundo. 22. M. testa laevi: valvis bilobis; lobo cardinali longiore
tenuioreque. Mus. Lud. Ultr. 543. n. 140.*

Adans. Seneg. I. t. 15. f. 6. Chanon.

Rumpf mus. t. 46. f. G. Avicula.

Argeny. Conch. t. 19. f. B. Avicula t. Hirundo.

Lift. Conch. t. 220. f. 55. & t. 224. f. 59.

Bonann. recr. 2. f. 58.

mus. Kirch. 2. f. 57.

Petiv. aq. amb. t. 19. f. 9.

Gualt. test. t. 94. f. B.

Klein ostr. t. 8. f. 13. & t. 9. f. 38.

Knorr delic. t. B. IV. f. 7.

Vergn. 4. t. 8. f. 5. & 5. t. 10. f. 1. 24

Chemn. Conch. 8. t. 81. f. 722-725.

β) Chemn. Conch. 8. t. 81. f. 726.

γ) Chemn. Conch. 8. t. 81. f. 727.

δ) Gualt. test. t. 94. f. A?

Knorr Vergn. 6. t. 2.

Chenin. Conch. 8. t. 81. f. 728.

ϵ) Adans. Seneg. I. t. 15. f. 7. Essan.

ζ) Chemn. Conch. 10. t. 171. f. 1672.

Habitat in Oceano indico, americano, atlantico, medi-
terraneo, testa magnitudine, crassitie, forma, colore,
pictura varia, subtilissime & confertim transverse rugo-
sa, intus margaritacea, basi contrada.

Pholadis. 23. M. testa oblonga anterius obtusiore rudi transversaliter
rugosa. Mant. 2. p. 548. It. wgoth. t. 5. f. 22. Müll.
zool. dan. 3. p. II. t. 87. f. 1 - 3.

Chenin. Conch. 8. t. 82. f. 735.

Habitat in Oceano septentrionali, in corallitiis & saxis p^{ho}t^o latis more habitaculum sibi excavans, testa magnitudine fabae $\frac{1}{2}$ pollicem longa, 1 $\frac{1}{4}$ lata, vix a:roque fine claufile inconspicua, cardine edentulo, aut denticulo obsoleto?

striatus. 24. M. testa subtilissime striata: cardine terminali unidentato.
Mant. 2. p. 548.

v. Born mus. Caes. Windoh. test. t. 7. f. 5?

Chenn. Conch. 8. t. 83. f. 744. a? b?

Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 449. t. 9. f. 16.

Habitat in Oceano septentrionali & indico, testa 1 $\frac{1}{2}$ pollicem longa, & $\frac{1}{2}$ lata, formæ semilunatae, qua rotundata ab exusto discrepat, anterius dilatata, subdiaphana sp^o dicea: margine extorsum subtilissime crenato.

vulgaris. 25. M. testa altero latere planiuscula inflexa: natibus incurvis convergentibus, cardine unidentato.

Chenn. Conch. 8. t. 82. f. 732.

Habitat frequens in Oceano americano, testa intus dilatata, margaritacea: epidermide fusca.

plicatus. 26. M. testa rhombea inaequilatera tenuissima transversim striata rugosaque, natibus incurvis posterioribus.

Chenn. Conch. 8. t. 82. f. 733.

Habitat ad insulas Nicobariacas, testa hyalina, striatissima, intus diluie argentea, altero latere rotundata, dilatata, angulosa.

niveus. 27. M. testa ovata subdiaphana subtilissime longitudinaliter striata: margine acuto, cardine bidentato.

Chenn. Conch. 8. t. 82. f. 734.

Habitat rarissimus ad insulas Nicobaricas, testa nivea, intus glaberrima.

afer. 28. M. testa subtrigona anterius dilatata posterius planiuscula: natibus acuminatis retrorum veris, margine acutissimo.

v. Born mus. Caes. Wind. test. t. 7. f. 6. 7.

Knorr Verga. 4. t. 15. f. 5?

Chenn. Conch. 8. t. 83. f. 739 - 741.

Habitat in maris mediterranei australioribus, & ad Africam littus, testa ad 4 pollices longa, & 2 lata. intus ochro-leuca iridis coloribus varia, exteriorius straminea, ex vidente & flavicante mista lineisque angularibus, bellis picta; an myæ Pernæ varietas?

- fmarag-* 29. M. testa subtrigona planiuscula : cardine in altera valva bidentato, in altera unidentato.
dinus. *Chemn. Conch.* 8. t. 83. f. 745.
β) *Chemn. Conch.* 8. t. 84. f. 746.
Habitat ad Tranquebariae littora, testa viridi intus sub-
margaritacea, β) ad Guineam habitans, testa fusca,
margine, interdum quoque maculis disci viridibus.
- verfico-* 30. M. testa subtrigona planiuscula : cardine unidentato, marginе glabro acutissimo.
Argenv. Conch. t. 22. f. Q.
Chemn. Conch. 8. t. 84. f. 748.
Habitat in Guineæ litorie, afro affinis, testa ad 3 pollices
longa & ultra 2 lata, sub epidermide fusca, striis trans-
versis confertis fasciisque 2 obscure viridibus, utrisque
arcuatis notata ex violaceo, albo & spadiceo varia;
an ad myam pernam referendus?
- corallio-* 31. M. testa medio carinata margine crenata : umbone obtuso.
Phagus. *Chemn. Conch.* 8. t. 84. f. 752.
Habitat in Oceano indico & americano, corallifero, scopu-
los pholadis instar perforans, testa $\frac{3}{4}$ pollicis circiter longa.
- lineatus.* 32. M. testa trigona extrorsum dilatata : lineis angulatis decussantibus & confluentibus, cardine bidentato.
Chemn. Conch. 8. t. 84. f. 753.
Habitat - - - testa minuta ex flavo sordide virescente,
intus dilute argentea.
- Faba.* 33. M. testa ovali rufa striata : margine crenulato. *Müll.*
zool. dan prodr. 3015. O. Fabr. Fn. groenl. 419.
Chemn. Conch 8. t. 85. f. 761.
Habitat in mari Gioenlandiam affluentis scopolis, byssio
œneo se affigens, anais hiemalis & histrionicæ cibus,
testa inflata semipellucida, lœvigata, sub epidermide
rufa alba, intus glaberrima, margaritacea.
- fluviatilis.* 34. D. testa tenui subcuneata intus rubescente : natibus recurvis magnis.
Lift. Conch. t. 157. f. 12.
Habitat in Europæ aquis dulcibus, anatino affinis, an
vera distincta hujus generis species?
- fucus.* 35. M. testa oblonga angusta subtiliter transversim striata, altero latere emarginata, altero rotundata : natibus prominulis curvis.

Lift. Conch. t. 359. f. 197.

Habitat. - - - testa minuta, fusca.

mamma- 36. M. testa lata brevi retrosum rotundata : natibus mamma-
rius. marum instar protuberantibus.

Lift. Conch. t. 361. f. 199. b.

Klein ostr. p. 129. t. 9. f. 27.

Habitat - - -

perficus. 37. M. testa lata sub cortice aspero rugoso luteo intus laetior.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 2. f. 17.
Habitat in mari Persico, testa duplo latiori, quam longe

pictus. 38. M. testa lata levissima flammea vel rosea albo fasciata;
natibus obtusis.
Bonann. recr. 2. f. 35.
mus. Kirch. 2. f. 34.

Habitat in mari Lusitanico, testa triplo latiore, quam longe

undatus. 39. M. testa lata utrinque rotundata vinoso : striis undulatis
virescentibus & cærulecentibus, margine ferrato.
Bonann. recr. 2. f. 36.
mus. Kirch. 2. f. 35.

Habitat in mari Lusitanico, testa, quam pedi, longiore

fasciatus. 40. M. testa pellucida nitente cærulecente : fascia vino-
& carnea.
Bonann. recr. 3. f. 352.
mus. Kirch. 2. f. 106.

*Habitat in mari Brasiliam alluente, testa semipalmam lutea
at dimidio breviora.*

purpure- 41. M. testa posterius rotundata dilutius incarnata intus
us. purpurea : margine denticulato.
Bonann. recr. 3. f. 384.
mus. Kirch. 2. f. 116.

Habitat frequens in Brasiliæ littore.

saxatilis. 42. M. testa auriformi exterius rugosa granulata : marginis
barbato, externo dilatato rotundato.
Rumpf mus. t. 46. f. D.
*Habitat ad Amboinam, scopolis præsertim durioribus
affixus, anctum suumque cibus, articulo digiti latior,
sed brevior.*

VERMES TESTACEA. *Mytilus*:

3361

- argenteus.* 43. *M. testa transversim striata utrinque rotundata fusca intus argentea , natibus rotundatis.*

Gualt. test. t. 7. f. D.

Habitat - - -

- fulgidus.* 44. *M. testa angustata nitente aurorea ad latera violaceo-maculata : natibus rotundatis dilatatis.*

Argenv. Conch. t. 22. f. D.

Habitat in freto magellanico , testa matris perlarum instar nitida.

- azureus.* 45. *M. testa gibba azurea subtus flavicanti striata : natibus obtusis.*

Argenv. Conch. t. 22. f. H.

Habitat - - - testa pollicem circiter lata , 1 $\frac{3}{4}$ longa : margine inferiori angustato.

- murinus.* 46. *M. testa murina violaceo maculata margine lato rotundato rosea : natibus acuminatis rectis.*

Argenv. Conch. t. 22. f. K.

Regenf. Conch. I. t. 9. f. 32.

Habitat ad Guineam.

- tegulaceus.* 47. *M. testa elongata angustata sub epidermide testacea nitente ex argenteo , cæruleo , rubello , flavo , fusco-que varia.*

Knorr Vergn. 4. t. 15. f. 4.

Habitat - - - modiolæ affinis , at testa majore & pulchriore.

- virgatus.* 48. *M. testa extrorsum dilatata ex viridi flava : virgis roseis , natibus obtusis curvis.*

Knorr Vergn. 4. t. 4. f. 2.

Habitat - - - rubro affinis.

- cordatus.* 49. *M. testa oblonga tenuissima alba obsolete striata posterius hiante : hiatu cordato.*

Spengl. Besch. berl. naturf. Ges. 2. t. 9. A. f. 3-5.

Catal. rais. t. 5. f. 13-17. coll. f. 12.

Martini Besch. berl. naturf. Ges. 2. t. 12. f. 1.

β) Heart muscæ. Mart. univ. Conch. 2. t. 77.

An diligendæ a reliquis species , quas Listerus Conch. t. 1055. f. 9... & t. 357. f. 195. b. & ex eo Klein oſtr. t. 12. f. 76. 77. fit? an a Müller zool. dan. prodr. 3016. memoratus mytilus testa ovata , oblonga planiuscula?

G g g g g g g g 4.

*Habitat in Oceano potissimum indico, & australi, corallis
& testaceis adhaerens, nonnunquam inhærens, cardini
omnino mytili; an distinctum genus?*

stagnalis. 50. M. testa ovali planiuscula transversim costata.

Schroet. Flusconch. t. 1. f. 1.

*Habitat in Schwansee, stagno ducatus Isenacensis, cyaneo
affinis, at testa longe majore ad 8 pollices lata, &
longa, minusque convarea, virescente radiis obscurius
ridibus picta & marginem versus ex luteo fusca distinctus*

zollensis. 51. M. testa ovali convexa posterius rotundata anterius
elongata & obtuse acuminata, natibus exoletis.

Schroet. Flusconch. t. 2. f. 1.

*Habitat in fossa, moenia urbis Cellensis circumdantis
cyaneo affinis, at testa majore, 7 pollices lata, 3 longa,
ex virescente flava.*

roseus. 52. M. testa suborbiculata: sulcis 15 triangularibus crip-
tatis & dentibus triangularibus alternis.

Adans. Seneg. I. t. 14. f. 4. Bajet.

*Habitat ad Africæ littus occidentale, testa rosea intus
alba ad marginem purpurea, 3 pollices lata, & pavo-
breviore; an hujus generis & tribus?*

punicens. 54. M. testa gibba acuminata: sulcis quindecim, margins
dentato.

Adans. Seneg. I. t. 15. f. 2. Aber.

*Habitat ad Africæ littus occidentale, testa 14 lineas longa
& dimidio angustiori, sub epidermide fulva violacea una
punicia, interdum fusco viridique intermixta; cardinis
dentibus 4 minimis.*

niger. 54. M. testa complanata tenui subtilissime sulcata sub epider-
mide nigra nitidissime lactea.

Adans. Seneg. I. t. 15. f. 3. Dotel.

*Habitat ad Africæ mediae littus occidentale, testa tenera
rima sesquipolllicem longa sulcis circiter 100 exarata,
cardinis dente 1-2 minimis.*

laviga- 55. M. testa complanata laevi sub epidermide crassa fulva
tus. rosea: margine integerrimo.

Adans. Seneg. I. t. 15. f. 4. Fonet.

*Habitat in Africæ littore occidentali, testa 2½ polliceri
longa & dimidio angustiore intus niargata, epider-
midi interdum virore intermixta, cardinis dentibus 2-3*

56. M. testa transversim rugosa, utrinque obtusa fulva intus margaritacea: natibus exoletis, cardine edentulo.
Adans. Seneg. I. t. 17. f. 21. Mutual.

Habitat in Africæ mediæ aquis dulcibus, testa ad 5 pollices lata, 2 longa, an hujus generis?

57. M. testa quinqueloculari: valvis carinatis latere incombente planiusculis, natibus acutis deorsum inflexis.
Pall. it. I. app. n. 85.

Habitat in mari nuclei pruni magnitudine, quadruplo major in aquis dulcibus Russæ, glomeratim penicillis radiatis lapidibus & testaceis adhaerens, testa subsufca, loculorum discipimentis brevissimis.

58. M. testa laeviuscula brunnea intus versicolore, scrobiculo cardinis canaliculato. Martyn. univers. conchol. 2. t. 78.
Habitat ad novam Seelandiam.

316. PINNA. Animal Limax.

Testa subbivalvis fragilis erectahians, emittens barbam byfzinam.

Cardo edentulus coalitis in unam valvis.

I. P. testa sulcata: squamis fornicatis per series digestis
Mus. Lud. Ulr. 544. n. 41.*

Adans. Seneg. I. t. 15. f. 5. Apan.

List. Conch. t. 373. f. 214

Ginann. adr. 2. t. 25. f. 166.

Gualt. test. t. 79. f. C.

Chemin. Conch. 8. t. 88. f. 773.

β) Rumpf mus. t. 46. f. 11. Pinna lata.

Pet. amb. sq. t. 19. f. 6.

Gualt. test. t. 81. f. A.

Chemin. Conch. 8. t. 88. f. 774.

Habitat rarer in Oceano americano & atlantico, β) in indico & mari rubro, testa 12-16 pollices longa, 4 $\frac{1}{2}$ -8 lata, rubra sulcis 6-8 exarata, β) nigra sulcis vix conspicuis.

2. P. testa dimidia longitudinaliter striata: latere altero transverse subrugoso. Gualt. test. t. 79. f. A.

Argenv. zoomorph. t. 5. f. N?

Chemn. Conch. 8. t. 87. f. 770.

β) *Chemn. Conch.* 8. t. 87. f. 771.

Habitat in Oceano indico, testa triangulari cornea, pollices longa, & 4 lata, β) minore, tenuiore, riore, 4 pollices & 5 lineas longa, 2 p. & 5 lineas latius

nobilis. 3. P. testa striata : squamis caniculato-tubulosis subimbricatis. *Mus. Lud. Ulr.* 544. n. 142.

Bonann. rezr. 2. f. 24.

muf. Kirch. 2. f. 26.

Gualt. test. t. 78. f. B.

Seb. muf. 3. t. 91. f. 3.

Knorr del. t. B. V. f. 3.

Vergn. 2. t. 26. f. I.

Chemn. Conch. 8. t. 89. f. 775. 776. ·

β) *List. Conch.* t. 372. f. 213?

Chemn. Conch. 8. t. 89. f. 777.

γ) *Knorr Vergn.* 2. t. 26. f. 2.

Chemn. Conch. 8. t. 92. f. 785.

δ) *Argenv. Conch.* t. 22. f. F.

Chemn. Conch. 8. t. 86. f. 769.

Habitat in mari mediterraneo, adriatico, americano, testa subfusca, margine externo rotundata, $7\frac{1}{2}$ pollicis longa, & $3\frac{3}{4}$ lata, squamis extrorsum majoribus ad $1\frac{1}{2}$ pollicem longis, rectis: valvarum parte dimidia collata, altera transversim rugosa: rugis partem latiorern versus strias decussantibus. Tendo gracis in deliciis.

muricata. 4. P. testa striata : squamis concavis ovatis acutis. *Mus.*

Lud. Ulr. 545. n. 143.*

Hasselq. it. 447. n. 137. *Concha Pinna.*

List. Conch. t. 370. f. 210. *Pinna tenuis striata muricata.*

Rumpf muf. t. 46. f. M. *Pinna lata altera.*

Pet. amb. aq. t. 19. f. 14.

Gualt. test. t. 79. f. D.

Seb. muf. 3. t. 92. ser. I. f. prim. & ult.

Knorr Vergn. 6. t. 20. f. I.

Chemn. Conch. 8. t. 91. f. 781.

Byssus, quam pinnae largiter præbent, serici inflar operibus textilibus in Italia meridionali inservit, Jerico adhuc potior, eo quod tintura non egeat pinne iijj'le ereðæ in jirubus potissimum tranquillis maris paulo calidioris ut plurimum Egit gatim habitant, neque a sepiæ vexata, neque a cancro adversus hostem de

Habitat in Oceano indico, testa tenui, pellucida, cornea, ultra 5 pollices longa, & 3 fere lata: striis alternis echinatis.

rotundata. 5. P. testa squamis obsoletis: margine rotundata. *Mus.*
*Lud. Ulr. 545. n. 144.**

Gualt. test. t. 80. f. A. B.

Seb. mus. 3. t. 91. f. I.

Chemn. Conch. 8. t. 93. f. 79.

Habitat in maris mediterranei sinibus tranquillis, testa oblonga, albida, non raro ultra 2 pedes longa: rugis perpendicularibus undulatis, parallelis, squamis in latiori parte subtilissimis concavis, acutis, rarioribus.

squamosa. 6. P. testa squamis subtilissimis undulatis rugisque flexuofisis latis: infra acuminata nuda.

Lift. Conch. t. 374. f. 215.

Gualt. test. t. 78. f. A.

Argenv. Conch. t. 22. f. B.

Chemn. Conch. 8. t. 92. f. 784.

Habitat in mari mediterraneo, testa 13 fere pollices longa & 6½ lata, infra albida, supra suspadicea, margine externo angulato.

carnea. 7. P. testa tenui carnea nuda longitudinaliter sulkata: margine externo subrotundato.

Knorr Vergn. 2. t. 23. f. I.

Habitat - - - maculis interdum albis varia.

faccata. 8. P. testa laevi saccata erectiuscula subfastigiata. *Mus.*

*Lud. Ulr. 546. n. 145.**

Rumpf mus. t. 46. f. N. Pinna alba.

Petiv. amb. aq. t. 19. f. 7.

Lift. Conch. t. 370. f. 211? & t. 371. f. 212?

Gualt. test. t. 79. f. F.

Chemn. Conch. 8. t. 90. f. 779?

Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 481. t. 9. f. 17.

Habitat rarissima in mari mediterraneo & indico, testa tenui inferius albida, superne rubella, 5½ pollices longa, 2¾ lata, superius plana margine rotundata, inferius gibba, squamis nuda, striis 10. extrarsum latescentibus longitudinibus.

digitiformis. 9. P. testa laevi tubulosa digitiformi incurva margine summo membranacea. *Mus. Lud. Ulr. 546. n. 146.**

Habitat in Oceano indico, testa planiuscula, oblonga pellucida.

- lobata. 10. P. testa nuda lobata. *Mus. Lud. Ulr.* 547. n. 147.
*Habitat in Oceano indico, testa straminea, striis purpureis
 piæta, membranacea, dum valvæ explicantur, abs
 data: lobis lateralibus rotundatis latioribus, a carina
 ad lobos nervus; a nervo lineæ laterales dudæ.*
- vitrea. 11. P. testa hyalina longitudinaliter subundulatum striatum
*striis variis squamatis strias ad marginem transversum
 decussantibus.*
Gualt. test. t. 78. f. C. & t. 79. f. E.
Chemn. Conch. 8. t. 87. f. 772.
Habitat rarissima in Oceano indico.
- incurva. 12. P. testa angustata elongata nuda-carinata: rugis transversis undulatis.
Bonann. recr. 2. f. 23.
mus. Kirch. 2. f. 25.
Rumpf mus. t. 46. f. I. K.
Petiv. amb. aq. t. 19. f. 4. 5.
Klein ostr. t. 11. f. 71.
Chemn. Conch. 8. t. 90. f. 778.
*Habitat in Oceano indico, testa speciebili, dilute coriacea
 ad cardinem curvata, striis paucis longitudinalibus notata.*
- bicolor. 13. P. testa tenui ad marginem lateralem inflexa flavicante radiis ex atro subfuscis, striis paucis longitudinalibus.
Chemn. Conch. 8. t. 90 f. 780.
*Habitat rarer in mari rubro, testa cornea elongata, finis
 ad marginem crenatum nonnullis transversis arcuatis
 margine, upremo rotundato.*
- exusta. 14. P. testa planiuscula cornea nigricante radiata maculata & nebulosa: striis multis lœvibus, paucioribus spinolosis squamis canaliculatis.
Seb. mus. 3. t. 91. f. 2.
Chemn. Conch. 8. t. 91. f. 782.
Habitat rarer in Oceano indico australi.
- Vexillum. 15. P. testa truncata extrosum: dilatata nuda cornea nigra inde nigro nebulosa anterius longitudinaliter striata, posterius transversim rugosa.
v. Born mus. Cœf. Vind. test. t. 7. f. 8.
Chemn. Conch. 8. t. 91. f. 783.

Habitat rarissima in India, testa quasi alata, margine laterali curvo.

16. P. testa tenuissima cornea fragili longitudinaliter costata : margine extremo subrotundato.

Chemn. Conch. 8. t. 93. f. 786.

Habitat in Oceano indicō, dorso costarum rarius squamato, in testae medio macula ex violaceo subfuscā, & ad marginem lateralem rugis nonnullis transversis.

17. P. testa planiuscula subincurva sanguinea: striis perpendicularibus rarīs lāvibus.

Gualt. test. t. 79. f. B.

Habitat - - - testa 3 pollices longa; an distincta species?

18. P. testa rectissima tenui perpendiculariter striata : rugis ad marginem inferiorem transversis spinosis.

Gualt. test. t. 79. f. C.

Habitat - - - an distincta a reliquis species?

317. ARGONAUTA. *Animal Sepia, aut Clio.*

Testa univalvis spiralis involuta membranacea unilocularis.

1. A. carina utrinque subdentata. *Mus. Lud. Ulr. 548. n. 148.**
Bellon. eq. t. 380. Nautilus.

Bonann. recr. & mus. Kirch. I. f. 13. Nautilus s. Naupilius.
Rumpf mus. t. 18. f. I. 4. A. B. Nautilus tenuis.

Gualt. test. t. 11. f. A. B. & t. 12. f. A. B. C. Cymbium.
Olear. mus. p. 66. t. 32. f. 4. Nautilus.

Tessin epist. I. n. 28. Cymbium.

Klein ostr. t. 1. f. 3. Nautilus sulcatus.

Argenv. Conch. t. 5. f. A. B. C. Nautilus papyraceus,
zoomorph. t. 2. f. 2. 3.

Lift. Conch. t. 554. 555.

Lochn. mus. Beßler. t. 19.

Mus. Gottwald t. 40. f. 272 - 274.

Leßer testaceoth. t. I. n. 6.

Seb. mus. 3. t. 84. f. 4-12.

Ginann. adr. 2. t. 3. f. 29.

Murray testac. t. I. f. 8.

Knorr del. t. B. I. f. 3. 4.

Vergn. 1. t. 2. f. 1. 2. 4. t. 99. f. 1. & 6. t. 3¹

β) *Martin. Conch. 1. t. 17. f. 156.*

γ) *Martin. Conch. 1. t. 17. f. 157.*

δ) *Martin. Conch. 1. t. 17. f. 158. 159.*

ϵ) *Martin. Conch. 1. t. 18. f. 160.*

ζ) *Martin. Conch. 1. vign. 8. f. 2.*

Habitat in Pelago, mari indicō, mediterraneo, testa interdum flavescente striis costisve lāvibus vel nodis non raro bifurcis, carina ut plurimum fuscescente: testa navigat emissā, aqua exonerata sentia supinus in suum aquarum, membranam mirae tenuitatis extendit, chia duo retorquens, cæteris subremigans, testa demum hausta se mergens aqua. Plinius IX. 29.

vitreus. 2. A. carina medio dentata.

Argenv. zool. t. 10. f. B.

Martin. Conch. 1. p. 239. t. 18. f. 163.

Habitat - - - rarissimus testa conica transversim compressa, carina convexa, apertura ovali.

Cymbium. 3. A. carina rugosa mutica.

Gualt. test. t. 12. f. D.

Mart. Conch. 1. t. 18 f. 161.

Habitat in mari mediterraneo, testa vix minima æretudo magnitudine, depresso, tenera, rugosa: rugis pro subtiles longitudinales decussantibus.

Cornu. 4. A. carina annulis quatuor lāvibus elevatis.

Spengl. Besch. berl. Naturf. 2. p. 458. t. 13. f. 3¹

Chemin. Conch. 10. t. 137. f. 1271 - 1273.

Favann. Conch. t. 5. f. 1.

Habitat ad Caput Bonæ spei, testa lineam alta, spiræ et tenera, pellucida, striis flexuosis notata, spiræ et fractibus omnibus exterius conspicuis disjunctis, doppia tura parallelogramma.

arctica. 5. A. perforata, carina integra. *O. Fabr. Fa. groenl.* 386. n. 384.

Pallas spic. zool. 10. p. 38. Clio helicina.

Habitat frequens, vere potissimum & autumno, in superficie maris Groenlandiam alluentis, testa fragilis, diametri 3½ linearum alba, subtiliter sulcata, umbilicata perforata.

318. NAUTILUS. *Animal (Rumpf mus. t. 17. f. B.)*
Testa univalvis isthmis perforatis concamerata, polythalamia.

* *spirales rotundati.*

† *anfractibus contiguis.*

- Pompi-
lius.
- I. N. testæ apertura cordata, anfractibus obtusis lævibus.
*Mus. Lud. Ulr. 549. n. 149.**
Rondel. aq. p. 97. Cochlea margaritifera.
Bellon. aq. t. 382. Nautilus alter.
Rumpf mus. t. 17. f. A. C. Nautilus major crassus.
Jonst. aq. t. 10. f. I. 2. 7.
Lift. Conch. t. 550. f. I. 3. t. 551.
Bonann. recr. & mus. Kirch. I. f. I. 2.
Gualt. test. t. 17. A. f. A. B. t. 17. B. & 18.
Argenv. Conch. t. 5. f. E. F.
Pet. amb. aq. t. 3. f. 7.
gazoph. t. 99. f. D.
Breyn. polyp. 14.
Klein ostr. t. I. f. I.
Seb. mus. 3. t. 84. f. I-3.
Besl. gazoph. t. 22. f. prim. & ult.
Lochner mus. Bester. t. 19. f. 5. 6.
Mus. Guttwald. t. 40. f. 271. aa. b. t. 41. f. 276.
Lesser testaceoth. t. 2. f. II.
Chemn. Beytr. 2. Testaceoth. tit.
Knorr delic. t. B. f. I. 2. & t. B. I. f. I. 2.
Vergn. I. t. I. f. I. 2. & t. 2. f. 3. & 4. t. 22. f. I. 2?
Martin. Conch. I. p. 226. vign. 10. t. 18. f. 164-167.
β) Lift. Conch. t. 552. f. 4.
Knorr del. nat. sel. t. B. 3. f. I.
Favann. Conch. t. 7. f. D. 3.
cata. raf. t. 2.
Chemn. Conch. 10. t. 137. f. 1274. 1275.
Habitat in indico & africano Oceano, testa scapius grandi, solida, sub cortice albo, maculis virgotis fusca- striis flexuosis spectabili matris perlarmi instar nitente, hinc scapius decorticata & pulchra pictura elaborata, ad pocula aquæ potatorum orientalium præparatur.

- Calcar. 2. N. testæ apertura linearis, anfractuum geniculis elevatis
Planck. Conch. 12. t. 1. f. 3. 4.
Gualt. test. t. 19. f. B. C.
Lederm. microsc. t. 8. f. c. d.
Martin. Conch. 1. t. 19. f. 168. 169.
*Habitat in mari adriatico, minutus; an vere distincta
 reliquis species.*
- crispus. 3. N. testæ apertura semicordata anfractuum geniculis
 natis.
Planck. Conch. 10. t. 1. f. 2.
Gualt. test. t. 19. f. A. D.
Ginann. adr. t. 14. f. 112.
Lederm. microsc. t. 8. f. 6.
*Habitat in mari mediterraneo, testa minuta utrinque un-
 bilicata, granulata, striata: striis flexuosis, dorso angu-
 lato, siphone centrali, cameris medio paulisper inflatu-*
- Beccarii. 4. N. testæ apertura obovata, anfractibus tortuosis:
 geniculis insculptis.
Planck. Conch. 8. t. 1. f. 1.
Gualt. test. t. 19. f. H. H. I.
Ginann. adr. 2. t. 14. f. 111.
Lederm. microsc. 16. t. 8. f. a. & t. 4. f. B.
Murray testac. t. 1. f. 16.
Schroet. inn. Bau. Conch. t. 1. f. 3.
Martin. Conch. 1. t. 19. f. 178. 179. & t. 20. f. 175.
 ammono- 6) Nautilus testa compresia: apertura linearis: anfractibus
 noides. contiguis: striis elevatis multiradiata. *Gronov. Zool.*
t. 19. f. 5. 6.
*Habitat in mari mediterraneo & adriatico, inter protyn-
 cornuum ammonis fossiliuni princeps, testa subdepressa
 minuta.*
- balthicus. 5. N. testa convexa: apertura linearis, anfractuum pri-
 reliquos longe superante.
Schroet. Einl. in Conch. 1. p. 20. t. 1. f. 2.
Naturf. 17. p. 120.
*Habitat in mari balthico, furorum radicibus adhaere-
 n. Beccarii affinis, testa nunc opaca, nunc nitens,
 saepius pellucida, anfractibus nunc levibus, nunc pro-
 tis, nunc costatis, nunc tuberculatis.*

Nautili plurimi etiamnum in pelagi abyssi latent, & noti habentur, *Pomilio*, *Sp*
rula, *Orthoceras* & *fossilibus exceptis*, tam exilis, ut armato ccelo examini-

- Relicites.* 6. *N. anfractibus occultis.*
Schroet. Einl. in Stein. 4. t. 10. f. 2.
Habitat - - - hædenus tantummodo fossilis repertus in monte S. Petri ad Mosæ Trajectum, lenis ut plurimum magnitudine, testa nunc convexiuscula, nunc depresso, nunc laevi, nunc striata.
- tugofus.* 7. *N. testæ apertura linearis, anfractibus compressis incrassato-marginatis.*
Habitat in Oceano australi, minutus, testa alba, depresso-plana: dissimilis internis extrinsecus prominulis, s. rugis transversis secundum dissimila.
- umbilica-
tus.* 8. *N. testæ apertura compresso-lineari, anfractibus compressis, umbilico concavo.*
Column. phytob. 2. t. 38. f. E.
Habitat Liburni, minutus, testa, praesertim ad carinam, sulcis transversis secundum dissimila oblique articulata.
- Spicula.* †† *anfractibus disjunctis.*
9. *N. testæ apertura orbiculari, anfractibus cylindricis.*
*Mus. Lud. Ulr. 549. n. 150.**
Swammerd. bibl. nat. 1. t. 7. f. 7. 8.
List. Conch. t. 550. 2.
Bonann. mus. Kirch. 1. f. 39.
Rumpf mus. t. 20. f. 1.
Gault. test. t. 91. f. E.
Argenv. Conch. t. 5. f. G. G.
Breyn. polyh. 21. f. 2.
Klein ostr. t. 1. f. 6.
Scheuchz. Schweiz. Naturg. 3. f. 15.
Bytem. app. t. 11. f. 49.
Knorr Vergn. 1. t. 2. f. 6.
Martin. Conch. 1. p. 254. vign. II. f. 1-3. & t. 20. f. 184. 185.
Habitat in Oceano americano & indico, testa pollicem circiter magna, exalbida, intus matrix perlucrum instar nitente orbiculari, anfractibus introrsum sensim decrescentibus, primo prominulo rediusculo, siphone testæ parietibus contiguo, an protypus lituitarum?
- Spengle-
ti.* 10. *N. testa laevi: tuberculis quatuor conicis.*
Spengl. Schr. daenish. Ges. 1. p. 373. t. 2. f. 9. b. c.
Habitat in arena buccinorum cassideorum Indicæ, testa minima,

Hhh hh hhh b

- unguiculatus. 11. N. testa diaphana : septis intermediis exterius propter berantibus, tuberculis conicis sex.
Spengl. Schr. daen. Ges. 1. p. 373. t. 2. f. 9. d.
Habitat in arena buccini cassidei Indiæ, testa minima
tenera, nitida, alba subcostata.
- ** elongati rediūsculi.
- Semili- 12. N. testæ apice incurvato-spirali, anfractibus contumacibus, Column. phytob. 3. t. 38. f. D. Semilituus.
Martin. Conch. 1. t. 20. f. 186. 187.
Habitat Liburni, ad littus, testa minima convexa, dissepimentiis extrinsecus per incisuras conspicuis, raro umbilicata.
- Lituus. 13. N. testa subconica : articulis globosis sensim decrescentibus, apice incurvato spirali.
Spengl. Schr. daen. Ges. 1. p. 373. t. 2. f. 10. d. e.
Klein Danz. naturf. Ges. Schr. 2. p. 47. t. 1. f. 1.
Habitat rario in mari rubro, frequentior inter
- obliquus. 14. N. testa recto-subarcuata : articulis oblique annulatis, Gualt. test. t. 19. f. N.
Martin. Conch. vign. 1. f. H. h.
Habitat in mari adriatico & mediterraneo, testa marginata crenata ; siphone centrali : an protypus orthoceratitarum incurvorum ?
- Paphanif- 15. N. testa subcylindrica : articulis torosis ; striis elevatum. duodenis, siphone centrali regulari.
Lederm. microsc. t. 4. f. X. poster.
Habitat in mari mediterraneo, unguis magnitudine phano major ; an protypus orthoceratitæ cylindricæ ?
- Rhapha- 16. N. testa articulata : articulis torosis ; striis elevatis fedenis, siphone sublaterali obliquo.
Planc. Conch. t. 1. f. 6.
Gualt. test. t. 19. f. L. L. M.
Lederm. microsc. t. 4. f. X. prior, & t. 8. f. F.
Habitat in mari adriatico & mediterraneo, minutus, protypus orthoceratitæ conici ?
- Granum. 17. N. testa ovato-oblonga : articulis torosis ; striis elevatis octonis interruptis, siphone obliquo.
Habitat in mari mediterraneo, minutus, striis elevatis cularum genicula admodum contraxis a raphanis, tindus.

- Radicula.* 18. N. testa oblongo-ovata : articulis torosis glabris.
Planc. Conch. 14. t. I. f. 5.
Lederm. microsc. t. 8. f. e. & t. 4. f. I. f.
Habitat rarissimus in mari adriatico, minutus, siphone sublaterali.
- Fascia,* 19. N. testae articulis striatis : geniculis lœvibus elevatis.
Gualt. test. t. 19. f. O.
Mart. Conch. I. vign. I. f. DD.
Habitat in mari adriatico, minutus, testa conica, confertim striata, apice obtusa, margine denticulata : siphone centrali.
- inæqua-
lis.* 20. N. testa cylindrica : articulis octo, secundo, tertioque brevissimis, apertura marginata.
Spengl. daen. Ges. Schr. I. p. 373. t. 2. f. 10. a. b. c.
Habitat in maris rubri arena, testacea replente, testa minuta nivea.
- Siphun-
culus,* 21. N. testa lœvi : articulis cylindricis remotis : geniculis attenuatis cylindricis.
Gualt. test. t. 19. f. R. S.
Martini Conch. I. vign. I. f. f. F. FF.
Habitat in freto siculo, rupi coralliferæ adhærens, testa minuta, articulis II, alternatum angustioribus & latioribus.
- Legumen.* 22. N. testa compressa articulata, hinc marginata : siphone laterali. *Planc. Conch. 8. t. I. f. 7.*
Gualt. test. t. 19. f. P.
Lederm. microsc. t. 8. f. g.
Martin. Conch. I. vign. I. f. e. E. I.
Habitat in mari adriatico, testa minuta subconica, apice ad alterum latus cultrato, ad alterum leviter arcuato.
- Orthoce-
ra.* 23. N. testa anfractibus carinato striatis. *It. oel. 140.*
Mus. Tessin. 86. Nautilus rectus.
Scheuchz. helv. 7. f. 8. diluv. 938. Alveolus.
Gmelin act. Petrop. 3. p. 246.
Gron. lap. 71.
Habitat in alto pelago, frequenter fossilis, an distincta a reliquis species protypus?
- Relemini-
ta.* 24. N. testa æquabili lœvi conica acuta.
Habitat - - - frequens inter fossilia omnis Europæ ; nonne potius hujus generis, quam alcyonii ?
Hhhhhhbbb b 2.

319. CONUS. *Animal Limax.*

*Testa univalvis, convoluta, turbu-
nata.*

*Apertura effusa, longitudina-
linearis, edentula, basi inter-
gra.*

Columella lœvis.

* *Truncati s. spira fere truncata.*

- marmo- 1. *C. testa conica fusca : maculis ovatis albis, fractibus canaliculatis. Mus. Lud. Ulr. 550.* ^{spira 30°}
reus. *Olear. mus. t. 31. f. 2.*
Mus. Gotwald. t. 14. f. 104. a. 104. b.
List. Conch. t. 787. f. 39.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 123.
Rumpf mus. t. 32. f. N. & I.
Valent. Abh. t. 3. f. 25. t. 5. f. 43. & t. 7. f. 65.
Petiv. gazoph. t. 47. f. II.
Gualt. test. t. 22. f. D.
Argenv. Conch. t. 12. f. M. O.
Seb. mus. 3. t. 46. f. 1-4. 13-19. & t. 47. f. 1-4. & t. 17. f. 1-3.
Knorr Vergn. 1. t. 7. f. 4. & t. 15. f. 2. & 4. t. 17. f. 1-3.
Regenf. Conch. 1. t. 5. f. 53.
Martin. Conch. 2. t. 62. f. 685. 686.
β) *Valent. Abh. t. 2. f. 10. & t. 5. f. 44.*
Knorr Vergn. 1. t. 7. f. 4.
Seb. mus. 3. t. 46. f. 5-12.
Martini Conch. 2. t. 62. f. 687. 688.
γ) *Chern. Conch. 10. t. 138. f. 1279.*
δ) *Chern. Conch. 10. t. 139. f. 1292.*
*Habitat in Asia, δ) rarer, testa subtiliter striata, inter-
dum atra aut fulva, maculis subtrigonis in β) ^{β)} ^{Paulo} ¹⁷ ¹⁷
cioribus & in fascias confluentibus; spiræ paulo ¹⁷ ¹⁷
tioris anfractibus emarginatis tuberculato spinosiss.*

- imperia- 2. *C. testa albida : fasciis longitudinalibus lividis cingue-
lis. lisque linearibus albo fuscoque articulatis. Mus. Lud. Ulr. 550. n. 152.**
Rumpf mus. t. 34. f. H I. Kroon hoorn.
Argenv. Conch. t. 12. f. E. F. Corona imperialis.
List. Conch. t. 766. f. 15.
Valent. Abh. t. 3. f. 26.

Gualt. test. t. 22. f. A.

Klein ostr. t. 4. f. 84.

Seb. mus. 3. t. 47. f. 18-21.

Knorr Vergn. 2. t. 11. f. 2.

Regenf. Conch. 1. t. 3. f. 35.

Martini Conch. 2. t. 62. f. 690-692.

β) Martini Conch. 2. t. 62. f. 693?

γ) Chemn. Conch. 10. t. 139. f. 1289.

δ) Chemn. Conch. 10. t. 139. f. 1290. 1291.

Habitat rario - - - testa satis magna alba, fasciis ut plurimum 2 luteis, cingulisque pluribus ex lineis interrupitis albis fuscisque conflatis, spira plana, magis minusve emarginata, virgisque undulatis fuscis picta.

litteratus. 3. C. testa conica alba: punctis fuscis. *Maf. Lud. Ulr.* 551. n. 153.

Rumpf. mus. t. 31. f. D. *Voluta musicalis.*

List. Conch. t. 773. f. 19? t. 774. f. 20.

Bonann. recr. 3. f. 132? 363.

mus. Kirch. 3. f. 357.

Gualt. test. t. 21. f. G. O.

Seb. mus. 3. t. 45. f. 1-5.

Maf. Gottwald. t. 14. f. 101. c. 101. d.

Knorr delic. t. B. III. f. 4.

Vergn. 1. t. 16. f. 3. 3. t. 3. f. 2. & 4. t. 26. f. 1.

Regenf. Conch. 1. t. 3. f. 29. & t. 4. f. 46.

Martini Conch. 2. t. 60. f. 666-668.

β) Gualt. test. t. 22. f. B. C.

Seb. mus. 3. t. 44. f. 5. 7. t. 45. f. 8. 9. 12-15. & t. 47. f. 25.

Knorr Vergn. 3. t. 6. f. 4. & 5. t. 24. f. 5.

Martini Conch. 2. t. 669.

Habitat in Oceano asiatico, testa interdum rubella aut flavescente, punctis s. potius maculis subcubicis, in series digestis: fasciis nonnunquam obsoletis flavis interstitiis, aut in β) lineis spadiceis, spira maculis virgatis fuscis picta, nunc magis plana, nunc magis convexa.

Generalis. 4. C. testa conica nitida: spira plana muricata; anfractibus canaliculatis.

List. Conch. t. 786. f. 35.

Rumpf mus. t. 33. f. Y.

Petiv. Gazoph. t. 27. f. II.

Valent. Abb. t. I. f. 9.

Gualt. test. t. 20. f. G.

Argenv. *Conch.* t. 12. f. T.

zoomorph. t. 3. f. F.

Seb. *mus.* 3. t. 54. f. 11-13.

Mus. *Gottwald.* t. 13. f. 100. 100. a.

Olear. *mus.* 4. t. 31. f. 5.

Knorr Vergn. 1. t. 7. f. 3. 2. t. 5. f. 2. & 3. t.
f. 4. 5. & t. 18. f. 3. 4.

Regenf. *Conch.* 1. t. 6. f. 65.

Martin. *Conch.* 2. t. 58. f. 645-652.

β) *Chenn.* *Conch.* 10. t. 140. f. 1301-1303.

*Habitat paulo rarer in India, testa pulla, lutea, fasciata
vel aurantia, nunc latiore nunc angustiore : fasciis
2-4 albis, maculis virgatis peditis ; spira albida, maculis
virgatis undatis varia medio acuminata.*

Virgo. 5. *C. testa conica : basi cærulecente. Mus. Lud.* Ul.
551. n. 153.*
Lift. *Conch.* t. 753. f. 1. t. 754. f. 2. & t. 758. f. 3.
Rumpf *mus.* t. 31. f. E.
Gualt. *test.* t. 20. f. B.
Bonann. *recr.* 3. f. 365.
mus. *Kirch.* 3. f. 356.

Klein ostr. t. 4. f. 83.

Seb. *mus.* 3. t. 47. f. 8. 9.

Knorr Vergn. 2. t. 24. f. 4. & 3. t. 22. f. 1.
Mus. *Gottwald.* t. 13. f. 99. b. & t. 14. f. 105. a. 105. b.
Martin. *Conch.* 2. t. 53. f. 595-589.

β) *Knorr Vergn.* 4. t. 16. f. 5.

Martin. *Conch.* 2. t. 63. f. 701. 702.

γ) *Lift.* *Conch.* t. 767. f. 17.

Valent. *Abh.* t. 6. f. 52. & t. 8. f. 73.

Gualt. *test.* t. 21. f. H.

Seb. *mus.* 3. t. 55. f. 4-9.

Knorr Vergn. 2. t. 12. f. 3.

Regensf. *Conch.* 1. t. 8. f. 19.

Martin. *Conch.* 2. t. 59. f. 653. 654.

δ) *Knorr Vergn.* 6. t. 11. f. 4?

ε) *Chenn.* *Conch.* 10. t. 138. f. 1281.

*Habitat in Oceano africano, testa levavi flavicante, in
quenius nivea, in γ) albo rubroque tessellata, in δ)
alba : fascia straminea, spira cærulea, aut cærulea
spira alba ; fascia ochroleuca.*

Capita-
neus. 6. *C. testa conica glabra basi fusca : spira convexiuscula*
Mus. *Lud.* Ul. 552. n. 155.*

Lift. Conch. t. 780. f. 27. t. 781, f. 28?

Valent. Abh. t. 3. f. 22. 23. & t. 6. f. 49.

Mus. Gottw. t. 12. f. 85. b. c. & t. 13. f. 99. c-g.

Knorr Vergn. I. t. 7. f. 6. & t. 15. f. 3. 2. t. 6. f. 3.
& 5. t. 16. f. 2.

Martini Conch. 2. t. 59. f. 660-662.

B) Gualt. test. t. 20. f. 1.

Y) Rumpf mus. t. 33. f. X.

Argenv. Conch. t. 12. f. K.

Gualt. test. t. 22. f. M.

Regenf. Conch. I. t. 7. f. 7.

d) Bonann. recr. 3. f. 361.

mus. Kircher. 3. f. 354.

Seb. mus. 3. t. 42. f. 26-36.

e) Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 139.

z) Valent. Abh. t. 5. f. 47.

Gualt. test. t. 20. f. Q.

Seb. mus. 3. t. 42. f. 40. 41.

Martini Conch. 2. t. 57. f. 630. 631.

w) Favann. Conch. 2. t. 15. f. A?

Chemin. Conch. 10. t. 138. f. 1280.

s) Gualt. test. s. 25. f. F.

Chemin. Conch. 10. t. 140. f. 1298.

t) Chemin. Conch. 10. t. 144. A. f. a. b.

x) Kaemm. Cab. Rudolst. t. 7. f. 4.

Habitat in Asia, testa olivacea, lutea, fusca, spadicea
aut intermedia, rarius unicolor frequentius fascia aut
2 albis, maculis virgatis undulatis vel quadratis va-
riis, & præterea crebro pundorum macularumve se-
riebus picta, spira rarius plana, ut plurimum maculis
virgatis varia.

Tribunus. 7. C. testa alba : fasciis tribus flavicantibus spadiceo ma-
culatis, spira convexiuscula, basi transversim striata.

Martin. Conch. 2. t. 59. f. 655.

Habitat ---- testa lineis spadiceis undulatis rarioribus
picta.

Miles. 8. C. testa conica rudi : basi fusca, spira convexa.

Argenv. Conch. t. 12. f. L. Pseudo-Archithalassus.

Lst. Conch. t. 786. f. 34.

Rumpf mus. t. f. W.

Gualt. test. t. 20. f. N.

Seb. mus. 3. t. 42. f. 23. 25.

Mus. Gottwald. t. 13. f. 99. a 99. b.

Hhh hhh hhh h 4.

Knorr Vergn. I. t. 15. f. 4. & 3. t. I. f. 2. 3.
Martini Conch. 2. t. 59. f. 663. 664.

Habitat in India, *testa albida aut flavescente lineis longitudinalibus undulatis notata, basi transversim striata, fascia spiram fusco maculatam versus fusca.*

Cingu- 72. C. testa conica ex luteo flavicante : cingulo medio
lum. elevato solitario, spira acuta. *Mant. univ. Conch.*
t. 39.

Habitat ad insulas amicas.

** *pyriformes, basi rotundata subcylindrica sequestrata longiore, quam spira.*

Princeps. 9. C. testa flava : lineis fusco purpureis longitudinalibus
ramosis. *Mus. Lud. Ultr.* 552. n. 156.*

Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 138?

Schroet. Einl. in Conch. I. p. 30. t. f. 3.

α) *Lift. Conch.* t. 779. f. 26.

Gualt. test. t. 25. f. Q.

Argenv. Conch. t. 12. f. B.

Seb. mus. 3. t. 47. f. 30. 31.

Knorr Vergn. 3. t. 4. f. 2.

Martini Conch. 2. t. 63. f. 699. 700.

γ) *Chemin. Conch.* 10. t. 138. f. 1276.

Habitat - - - testa 2½ pollices longa : fasciis duabus
albis hinc inde fusco maculatis, spira obtusa subtiliter
sime transversim striata, maculis spadiceis, superne
atris varia ; testa in β) breviore ex atro fusca.

Ammira- 10. C. testa basi punctato-scabra. *Mus. Lud. Ultr.* 553.
lis. n. 157.*

larvatus. α) fasciis nullis.

Mart. Conch. 2. t. 57. f. 635. a.

america- β) fasciis irregularibus.

nus. α) testa fusca albo nebulosa maculataque.

Rumpf mus. t. 34. f. E.

Seb. mus. 3. t. 46. f. 20.

Martin. Conch. 2. t. 57. f. 640.

β) testa spadiceo reticulata nebulosaque, fascia interdum
alba.

Rumpf mus. t. 34. f. F. *Proarchithalassus.*

Argenv. zoomorph. t. 10. f. K. L. V.

Seb. mus. 3. t. 48. f. 11. 12. 20. 23.

Knorr Vergn. 3. t. 24. f. 4.

Martin. Conch. 2. t. 57. f. 638. 639.

- c) testa alba fusco maculata, guttata, nebulosa punctata.
List. Conch. t. 759. f. 4. & t. 777. f. 24.
Gualt. test. t. 21. f. L.
Knorr Vergn. 6. t. 13. f. 5.
Mart. Conch. 2. t. 61. f. 678.
- d) testa alba, fasciis aurantio lineatis.
Argenv. zoom. t. 10. f. G.
Seb. mus. 3. t. 44. f. 6.
Mart. Conch. 2. t. 53. f. 590.
- e) *Chenn. Conch.* 10. t. 140. f. 1297.
- f) fasciis regularibus.
- angelicus.* a) fascia unica, a) cingulis pluribus punctatis albis, testa rubra, spira fusco maculata.
Gualt test. t. 20. f. P.
Knorr Vergn. 5. t. 17. f. 5. & t. 24. f. 2.
Martin. Conch. 2. t. 61. f. 680.
- b) cingulo punctorum rubellorum, lineisque transversis elevatis.
Argenv. zoomorph. t. 10. f. M.
Martin. Conch. 2. p. 275. vign. 26. p. 214. f. 1.
- c) fascia flava media, cingulisque punctatis pluribus.
Argenv. zoomorph. t. 10. f. N.
Martin. Conch. 2. vign. 26. p. 214. f. 2.
- d) testa fusca, fascia alba, serieque macularum albarum obliqua.
Knorr Vergn. 5. t. 25. f. 3.
- a) fasciis duabus a) fasciis aurantiis obscurius lineatis: interstiriis albis, punctis maculisque undulatis aurantiis.
Seb. mus. 3. t. 46. f. 22. 23.
Martin. Conch. 2. t. 61. f. 677.
- b) fasciis albo fuscoque variis, testa alba: maculis undatis fuscis.
Martin. Conch. 2. t. 62. f. 684.
- c) fasciis flavicantibus trifariam fusco lineatis, testa alba fusco striata.
Knorr Vergn. 3. t. 6. f. 3.
- d) fasciis fuscis granulato ictiatis, testa albo fuscoque nebulosa.
Martin. Naturgesch. I. p. 378. t. 19. f. 12.

Coni paucissimi europaei, multi parum, si patriam nativamque formam species, sunt, & si in nullo alio genere, in hoc certe, difficillimum, ex iconibus & in museis affervatis speciminiis certo determinare, quid species sit, quid varietas, quantum arti in exornando exemplo debetur: Ammiralium 10 & varietates nitidus, turbinis scalaris & ostreæ Mallei amulas nobilitavit docta ignorantia, pretiavat, quam patiuntur opes, stultitia, emitayit barbara luxuria.

- ordinarius. e) fasciis tribus.
a) testa testacea albo maculata, fasciis albis subreticulatis : media cingulo articulato.
Knorr Vergn. 4. t. 3. f. I.
Rumpf mus. t. 34. f. C. Admiral.
- guineensis. b) testa straminea : fascia media lineis angulatis aurora modo tinctis picta.
Argenv. zoomorph. t. 10. f. Q.*
Chemn. Coneh. 18. t. 144. A. f. i. k.
- surinamensis. c) testa badia , fasciis maculatis : infima fusco alboque punctata, cingulis punctato articulatis pluribus.
Argenv. zoomorph. t. 10. f. R.
Martin. Conch. 2. p. 282. vign. 26. p. 214. f. 5.
†) *Chemn. Conch.* 10. t. 139. f. 1293.
d) testa fusca : maculis cordatis albis , fasciis albis : mediis maculis duabus quadratis.
Knorr Vergn. 4. t. 3. f. I.
d) fasciis quatuor.
- summus. a) testa ferruginea maculis albis sparsis : fasciis flavis tenuissime reticulatis : tertia cingulo albo maculata.
Rumpf mus. t. 34. f. B. Opper admirals.
Argenv. Conch. t. 12. f. N. Archithalassus primus
Petiv. gazoph. t. 28. f. 4. (male).
amb. t. 15. f. 18.
Seb. mus. 3. t. 48. f. 5. 6.
Knorr delic. t. B. V. f. 6.
Vergn. I. t. 8. f. 2.
Regenf. Conch. 2. t. I. f. I.
Favann. Conch. t. 17. f. I.
Spengl. Selt. Conch. t. I. f. E.
v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 7. f. II.
Martin. Coneh. 2. t. 57. f. 634.
Chemin. Conch. 10. t. 141. f. 1308.
††) *Chemn. Conch.* 10. t. 141. f. 1309.
- occidentalis. b) testa testacea albo maculata : fasciis flavis reticulatis cingulo articulato.
c) fasciis quinque & pluribus.
Argenv. zoom. t. 10. f. O. P.
Seba mus. 3. t. 48. f. 4.
Martin. Conch. 2. t. 57. f. 635.
- Cedo nulli. d) cingulis punctato-articulatis.
a) testa flava rubro picta , cingulis lacteis 11.
Argenv. zoom. t. 10. f. H.
Seb. mus. 3. t. 48. f. 8.

Knorr Vergn. 6. t. I. f. I.

Martini Conch. 2. t. 57. f. 633.

b) testa aurantia lineis elevatis interruptis spadiceis con fertis.

Spengl. Besch. berl. Naturf. I. t. 9. f. 6.

Chemn. Conch. 10. t. 141. f. 1306.

Habitat in Oceano Americam australem alluente, va rietate fere infinita, pretiosus.

II. C. testa testacea albo maculata : fasciis quatuor flavis immaculatis ; secunda angulo divisa.

Argenv. Conch. t. 12. f. H. Archithalassus secundus.

Rumpf mus. t. 34. f. D.

Petiv. amb. t. 15. f. II.

Knorr Vergn. 4. t. 3. f. I.

Favann. Conch. t. 17. f. I⁵.

Chemin. Conch. 10. t. 141. f. 1307.

Habitat - - -

12. C. testa conica lævi glabra : spiræ anfractibus obtusis scriptis.

List. Conch. t. 784. f. 31?

Valent. Abh. t. 6. f. 50?

Martin. Conch. 2. t. 59. f. 659.

Habitat - - - testa flava albo maculata striisque trans versis albo-fuscoque articulatis numerosissimis notata.

13. C. testa subcylindrica lævi glabra. *Mus. Lud. Ulr.* 554. n. 158.*

Argenv. Conch. t. 12. f. M? Tigris lutea.

Valent. Abh. t. 3. f. 21.

Seb. mus. 3. t. 43. f. 13? 14?

Martin. Conch. 2. t. 62. f. 689.

Schroet. Einl. in Conch. I. p. 36. t. I. f. 4.

Favann. Conch. t. 14. f. E².

Chemin. Conch. 10. t. 141. f. 1312.

β) *Chemin. Conch.* 10. t. 141. f. 1313. 1314.

Habitat - - - testa nitidissima flava, aut fusca, ali quando in olivaceum vergente, albo maculata, striis transversis obsoletis subtiliter punctatis.

14. C. cingulis linearibus albo fuscoque articulatis. *Mus.*

Lud. Ulr. 554. n. 159.

Rumpf mus. t. 34. f. G. Genesesche Toot.

Adans. Seneg. I. t. 6. f. I. Jamar.

List. Conch. t. 767. f. 16. & t. 769. f. 17. b?

Clear. mus. t. 32. f. 3.

- Bonann. recr.* 3. f. 337.
mus. Kircher. 3. f. 336.
Gault. test. t. 22. f. G. H.
Argenv. Conch. t. 12. f. Q.
Seb. mus. 3. t. 48. f. 1-3.
Knorr Vergn. 3. t. I. f. I.
Martin. Conch. 2. t. 56. f. 624. 525.

Papilio. β) *Argenv. Conch.* t. 12. f. V. Ala papilionis.
Martin. Conch. 2. t. 56. f. 623.
*Habitat ad Guineæ littora, testa rubra : fasciis alternatis
 fusco rubroque tessellatis.*

glaucus. 15. C. testa basi emarginata striata : spiræ inermis anfractu-
 tibus contiguis. *Mus. Lud. Ulr.* 555. n. 160.*
Rumpf mus. t. 33. f. GG. Botervegie van Boer.
Bonann. recr. & *nus.* *Kircher.* 3. f. 128.
Valent. Abh. t. 9. f. 84.
Gault. test. t. 22. f. F.
Seb. mus. 3. t. 45. f. 6. t. 55. f. 10. & tres ic. inter 20.
 & tres inter 23.
Mus. Gottwald. t. 14. f. 101. c. x. c. H. c. o. d. ○. d. x.
 & f. 103.
Knorr Vergn. I. t. 17. f. 4. & 2. t. 7. f. I.
Mart. Conch. 2. t. 61. f. 670-674.
Chemin. Conch. 10. t. 138. f. 1277. 1278.
Habitat in India & Afrika, testa maculis fuscis, spadiceis, rubris, ut plurimum seriatis varia, spiræ transversim striata, nunc magis nunc minus convexa, maculis interdum quadratis, rarius virgatis varia.

Mona-
 chus. 16. C. testa gibba fusco-cærulescente nebulata acuta bafi-
 striata. *Mus. Lud. Ulr.* 555. n. 161.*
Rumpf mus. t. 33. f. CC. Capucinus s. Anicula.
List. Conch. t. 756. f. 8.
Gault. test. t. 25. f. M?
Seb. mus. 3. t. 47. f. 27. & t. 48. f. 46. 47.
Knorr Vergn. 3. t. 27. f. 2.
Martin. Conch. 2. t. 55. f. 612. a-d.
 β) *Chemin. Conch.* 10. t. 142. f. 1319. 1320.
Habitat in India? testa nonnunquam seriatis punctata.

minimus. 17. C. testa cinerascente punctis oblongis cincta. *Mus. Lud.*
Ulr. 556. n. 162.*
Knorr Vergn. 5. t. 25. f. 5. & 6. t. I. f. 5.

Martin. Conch. 2. t. 55. f. 613.
Habitat - - -

Rufitius. 18. C. testa ovata basi rugosa muricatoque scabra : spira conico-convexa. *Mus. Lud. Ulr.* 556. n. 163.*
 α) fascia nulla.

Rumpf mus. t. 32. f. R. Voluta cinerea.

Seb. mus. 3. t. 43. f. 32 ?

Gualt. test. t. 25. f. R.

Martin. Conch. 2. t. 52. f. 578.

β) fascia albido nebulata.

Gualt. test. t. 25. f. E.

Seb. mus. 3. t. 42. f. 37-39.

Argenv. Conch. t. 12. f. D.

Knorr Vergn. 4. t. 13. f. 3.

Mus. Gottwald. t. 12. f. 86. b ?

γ) *Chemn. Conch.* 10. t. 144. A. f. e. f ?

Habitat in Africa, testa livida : β) lineis punctisque nigricantibus varia.

19. C. testa ovata alba : fasciis reticulatis flavis. *Mus. Lud.* Ulr. 557. n. 164.*

Adans. Seneg. I. t. 6. f. 3. Tilin.

List. Conch. t. 788. f. 41.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 136.

Valent. Abh. t. 7. f. 65. B.

Argenv. Conch. t. 12. f. P.

Seb. mus. 3. t. 54.

Knorr Vergn. 2. t. 1. f. 4.

Mus. Gottwald. t. 12. f. 92. a.

Martin. Conch. 2. t. 56. f. 619. 620. 621 ?

Habitat ad Africæ littus occidentale ; testa mediæ magnitudinis interduni flavicante : fasciis nonnunquam fuscis aut spadiceis.

Betulinus. 20. C. testa basi subemarginata rugosa : spira planiuscula mucronata. *Mus. Lud. Ulr.* 557. n. 165.*

List. Conch. t. 762. f. II.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 131.

Rumpf mus. t. 31. f. C.

Gualt. test. t. 21. f. B.

Seb. mus. 3. t. 44. f. 1-4. & t. 45. f. 7. 10. 11.

Mus. Gottwald. t. 13. f. 101. a. b.

Medusa.

Knorr Vergn. 2. t. II. f. 3.

Martin. Conch. 2. t. 60. f. 665.

β) Martin. Conch. 2. t. 61. f. 675?

γ) Knorr Delic. I. t. B. III. f. 5?

Chenn. Conch. 10. t. 142. f. 1321.

Habitat in India, testa satis magna, flava, ut plurimum
ochroleuca, fasciis tessellatim maculatis lineisque
termediis fuscis aut lutescentibus varia; in β) ubi
seriebus tribus characterum violaceorum, in γ) ubi
fasciis, maculis punctisque fuscis varia.

- sigulinus. 21. C. testa basi subemarginata rugosa: spira acuminata
anfractibus planiusculis. Mus. Lud. Ulr. 558. n. 166.
Rumpf mus. t. 31. f. V. & t. 33. f. 1. Voluta filola.
Lst. Conch. t. 785. f. 32.
Valent. Abh. t. 4. f. 34.
Gualt. test. t. 20. f. E.
Argenv. Conch. t. 12. f. A.
Seb. mus. 3. t. 54. f. 1-4. 8.
Mus. Gottwald. t. 13. f. 98. a-f.
Knorr Vergn. 3. t. II. f. 2. & 5. t. 25. f. 2.
Regenf. Conch. I. t. 10. f. 47.
Martin. Conch. 2. t. 59. f. 656-658.
ε) Knorr Vergn. 6. t. 15. f. 2?
γ) Chenn. Conch. 10. p. 27. t. 138. f. 1285.
Habitat paulo rarius in India, testa ad 3 pollices longa,
fusca, ferruginea, flava, rarius olivacea, lineis & fasciis
obscuriorebus, intus ut plurimum alba, fascia interdum
1-2 flava, vel alba; in β) testa magis elongata, un-
rantia lineis obscurioribus fasciisque duabus flavidis
tibus varia, spira rubella nigro maculata.

ebraeus.

22. C. testa ovata alba: fasciis nigris ex maculis trans-
versis. Mus. Lud. Ulr. 558. n. 167.*
Rumpf mus. t. 33. f. BB. Musica rusticorum.
Argenv. Conch. t. 12. f. G. Hebraica.
Adans. Seneg. I. t. 6. f. 5. Coupet.
Lst. Conch. t. 779. f. 25.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 122.
Gudi. test. t. 25. f. T.
Valent. Abh. t. 11. f. 94.
Petiv. gaz. 99. f. 12.
Seb. mus. 3. t. 47. f. 28. 29.
Mus. Gottwald. t. 14. f. 101. e. f. 104. c. d.

Knorr Vergn. 3. t. 6. f. 2.

Martin. Conch. 2. t. 56. f. 617.

€) *Chemn.* Conch. 10. t. 144. A. f. q. r.

Habitat in India, testa minore, interdum rubella, man-
culis parallelogrammis nonnunquam spadiceis.

Stercus
musca-
rum.

23. C. testa basi emarginata striata : spiræ anfractibus
canaliculatis. *Mus. Lud. Ulr.* 559. n. 168.*

Rumpf mus. t. 33. f. Z. Voluta arcuata.

Lift. Conch. t. 757. f. 9.

Bonann. mus. Kirch. 3. f. 408.

Gualt. test. t. 25. f. N. O.

Argenv. Conch. t. 13. f. E.

Petiv. gazoph. t. 75. f. I.

Seb. mus. 3. t. 55. f. I.

Knorr delic. t. B. V. f. 7.

Vergn. I. t. 7. f. 5. & 6. t. 16. f. 4.

Mus. Gottwald. t. 12. f. 88. a. b. c.

Regenf. Conch. I. t. 7. f. 2.

Martin. Conch. 2. t. 64. f. 711-713.

€) *Rumpf mus.* t. 33. f. 2 ?

Seb. mus. 3. t. 55. f. 23 ?

Martin. Conch. 2. t. 63. f. 698. 698. a ?

γ) *Lift. Conch.* t. 761. f. 10.

Rumpf mus. t. 33. f. AA.

Gualt. test. t. 25. f. P.

v. *Born mus.* Caes. Vind. test. t. 7. f. 12.

Martin. Conch. 2. t. 63. f. 696. 697.

δ) *Chemn. Conch.* 10. t. 139. f. 1294 ?

ε) *Chemn. Conch.* 10. t. 140. f. 1295 ?

*Habitat in Asia, testa longa, angusta alba punctis nigris
aut rubris sparsis, interdum glomeratis, rarius in
fascias aggregatis, anfractibus obtusis, in β) & γ)
coronatis.*

24. C. testa elongata muricata : spira coronata acuta,

Mus. Lud. Ulr. 559. n. 169.*

Lift. Conch. t. 775. f. 21.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 129.

Rumpf mus. t. 34. f. L.

Gualt. test. t. 20. f. F.

Argenv. Conch. t. 12. f. R.

zoomorph. t. 10. f. X.

Seb. mus. 3. t. 44. f. 19-22. & t. 48. f. 14-17. 24. 25

Knorr Vergn. I. t. 8. f. 4. & t. 24. f. 5.,

Varinus.

Regenf. Conch. I. t. 7. f. 9. 10.

Martin. Conch. 2. t. 61. f. 679. & t. 62. f. 682.

β) *Seb. mus.* 3. t. 48. f. 26-28.

Favann. Conch. t. 16. f. E³.

Chemin. Conch. 10. t. 138. f. 1284.

Habitat in Oceano indicō, testa alba, fusco, spadiceo luteo nebulosa : striis granulatis per totam superficē recurrentibus.

achatinus. 25. C. testa elongata subtiliter transversim striata nebulosa albo punctata : spira brevi fusco maculata apice rubro.

Seb. mus. 3. t. 44. f. 30.

Mus. Gottwald. t. 12. f. 89. b. 90.

Martin. Conch. 2. t. 52. f. 579. 580.

β) *Seb. mus.* 3. t. 44. f. 29.

γ) *Chemin. Conch.* 10. t. 140. f. 1296 ?

δ) *Chemin. Conch.* t. 142. f. 1317.

Habitat in Oceano americano.

radiatus. 26. C. testa radiis fasciisque albis.

Valent. Abh. t. 6. f. 51.

Martin. Conch. 2. t. 53. f. 584.

Habitat - - - testa fusca, lutea aut cinerea.

leoninus. 27. C. testa luteo vel spadiceo maculata : fasciis septem transversis albis luteisque ex granis aut maculis.

List. Conch. t. 772. f. 18. & t. 777. f. 23.

Rumpf mus. t. 34. f. M.

Coronatas testae vocantur, quarum anfractus superne tantum notantur tuberculis mucronibus ; inter testas coronatas & calvas nulla datur differentia nisi ciliaris. An ad conos resistentes cochlearia a Listero t. 776. f. 22. & t. 778. f. 0. b. a Bonanni mus. Kirch. 3. f. 391. ab Argenville zoomorph. t. 11. f. 0. in mus. Gottwald. t. 12. f. 85. II. III. f. 87. f. 89. a. t. 13. f. 0. c. f. 100. b. f. 101. e. x. & f. 102. delineatae ? An distinctæ species ? cuinam tribui insistentes quas Listerus Conch. t. 743. f. 39. t. 763. f. 0. t. 768. f. 17. a. t. 771. f. 17. d. t. 778. f. 24. a. t. 782. f. 29. t. 786. f. 36. & 37. t. 789. f. 42. & t. 790. f. 43. Bonanni recr. & mus. Kircher. 3. f. 124. 125. a. b. f. 127. 137. recr. 3. f. 0. mus. Kirch. 3. f. 314. & 407. Rumpf mus. t. 33. f. DD. Guale. 2. f. 0. f. C. D. t. 21. f. A. C. I. Q. t. 22. f. E. L. t. 25. f. D. G. 2. f. A. ab Argenville Conch. t. 12. f. I. S. Seb. mus. 3. t. 42. f. 12. t. 43. f. 15. 16. 17. 18. 19. 23-28. 33. 34. 35. t. 44. f. 16. 17. 26. t. 47. f. 5. 6. 7. 26. t. 48. f. 913. 18. 19. 21. 29. (32. 33. 34. 35. t. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. f. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Knorr Vergn. 2. t. 1. f. 6. t. 5. f. 3. 3. t. 19. f. 8. 9. 10. f. 5. 5. t. 24. f. 3. 6. t. 1. f. 5. Mus. Gottwald. t. 12. f. 86. a. 8. f. 100. a. delineatas sisunt.

Valent. Abb. t. 6. f. 48.

Bonann. recr. 3. f. 130. 364.

mus. Kirch. 3. f. 130. 358.

Gualt. test. t. 21. f. N.

Seb. mus. 3. t. 42. f. 10. 11. 22. & t. 44. f. 13-15.

Regenf. Conch. 1. t. 3. f. 37.

Martin. Conch. 2. t. 55. f. 603. 604. 606. 607.

β) *Knorr Vergn.* 3. t. 12. f. 4. & 5. t. 22. f. 2.

Regenf. Conch. 1. t. 11. f. 54. 55.

Martin. Conch. 2. t. 55. f. 605.

γ) *Martin. Conch.* 2. t. 55. f. 608.

δ) *Martin. Conch.* 2. t. 55. f. 609-611.

ε) *Seb. mus.* 3. t. 43. f. 29. 30.

ζ) *Knorr Vergn.* 2. t. 1. f. 7.

η) *Knorr Vergn.* 2. t. 1. f. 6.

ς) *Knorr Vergn.* 2. t. 1. f. 5?

ι) *Knorr Vergn.* 6. t. 1. f. 3?

κ) *Knorr Vergn.* 6. t. 1. f. 4.

λ) *Gualt. test.* t. 21. f. D.

Favann. Conch. 2. t. 14. f. C^r.

Chenn. Conch. 10. t. 140. f. 1299.

μ) *Chenn. Conch.* 10. t. 140. f. 1300.

Habitat in Oceano indicō, spira parum acuta.

Inspideus. 28. C. testa subolivacea, punctis multifariis fasciaque obliqua albis.

Martin. Conch. 2. t. 55. f. 612.

β) *Mus. Gottwald.* t. 13. f. 97. a.

Habitat - - - *testa oblonga, parva.*

Nebulosa, 29. C. testa fusca cæruleo nebulosa alboque maculata.

Gualt. test. t. 25. f. R.

Valent. Abb. t. 9. f. 74.

β) *Bonann. recr.* & *mus. Kircher.* 3. f. 126.

Knorr Vergn. 3. t. 16. f. 2.

Regenf. Conch. 1. t. 12. f. 68.

Martin. Conch. 2. t. 55. f. 614.

Habitat - - - *testa angusta, spiram versus con vexiuscula; an varietas minimi?*

Maculatus. 30. C. testa conica flava : ocellis fasciaque albis, basi obliquie striata.

Martin. Conch. 2. t. 56. f. 616.

Habitat - - - *spira parum prominente, an hujus tribus?*

- coffeæ. 31. C. testa brevi fusca : fasciis duabus albis ; spiræ propiore
fusco maculata.
Martin. Conch. 2. t. 56. f. 618.
Habitat - - - testa mediae magnitudinis.
- Amadis. 32. C. testa dilute fusca : fascia lata cingulisque supra infar
que articulatis ; spira acuta coronata subtiliter trans
verbum striata.
Argenv. zoomorph. t. 10. f. S.
Conch. t. 1. f. 5.
Knorr Vergn. 6. t. 5. f. 3?
Martin. Conch. 2. t. 58. f. 642. 643.
Favann. Conch. t. 15. f. M.
Chemin. Conch. 10. t. 142. f. 1322. 1323.
*Habitat - - - testa nunc angustiori, nunc magis
ventricosa.*
- fulmi-
neus. 33. C. spira acuta labioque spadiceo maculatis,
spadiceis per totam testam decurrentibus, basi acutis
oblique striata.
Mart. Conch. 2. t. 58. f. 644.
Habitat - - - an hujus tribus ?
- acachnoi-
deus. 34. C. testa spadiceo reticulata : fasciis duabus tribus
obscuriorebus, spira coronata acuta.
Argenv. zoomorph. t. 10. f. T.
Knorr Vergn. 6. t. 4. f. 4.
Spengl. seit. Conch. t. 1. f. D.
Martin. Corch. 2. t. 61. f. 676.
) Chemn. Conch. 10. t. 144. A. f. c. d.
Habitat pretiosus - - - an hujus tribus ?
- costatus. 35. C. testa fusca : fascia alba rubello undulata,
crassis latisque, spira noduosa ; fascia granulata.
Gualt. test. t. 20. f. O.
Habitat - - -
- leucostic-
tus. 36. C. testa alba fusco nebulosa virgata & maculata : punctis
torum alborum & fuscorum seriebus pluribus, spira
coronata.
Lipi. Conch. t. 759. f. 4. & t. 777. f. 24.
Gualt. test. t. 21. f. L.
Knorr Vergn. 6. t. 13. f. 5.
Martin. Conch. 2. t. 61. f. 678.
) Martin. Naturg. 1. p. 378. t. 19. f. 12.
γ) G alt. test. t. 20. f. L?
β) G alt. test. t. 21. f. M?

\S) *Seb. mus.* 3. t. 48. f. 36. 37.

Chenn. Conch. 10. t. 140. f. 1305.

Habitat in Oceano americano, spira ut plurimum acuta.

titritinus. 37. *C. testa citrina lineis nigris interruptis inferne varia,*
spira coronata basique albis.
Mart. Conch. 2. t. 61. f. 681.
Habitat ad Curacas.

insularis. 38. *C. testa alba spadiceo nebulosa maculata punctataque,*
spira acuta.
Martin. Conch. 2. t. 61. f. 683.
Habitat - - -

toronai-
tus. 39. *C. testa cingulis articulatis maculisque tessellatis alternis,*
spira coronata.
Gualt. test. t. 20. f. R.
Valent. Abh. t. 3. f. 24.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 134?
Mus. Gottwald. t. 12. f. 91. a? b? f. 92. b. f. 93. a. b. d. e.
 $\beta)$ *Martin. Conch.* 2. t. 73. f. 709.
 $\gamma)$ *Martin. Conch.* 2. t. 63. f. 710.
 $\delta)$ *Chenn. Conch.* 10. t. 139. f. 1286.
 $\epsilon)$ *Chenn. Conch.* 10. t. 139. f. 128. t. 1288.
Habitat - - - testa minima varietate innumera, fascia
saepe alba.

puncta-
tus. 40. *C. testa fasciis duabus lineisque pluribus punctorum ex*
luteo fuscorum : spira punctis lineisque luteis varia.
Knorr Vergn. 6. t. 13. f. 6.
Habitat - - - rarius.

zeylanici-
cus. 41. *C. testa nivea roseo fuscoque nebulosa : cingulis pluri-*
bus articulatis maculisque albo spadiceoque variis,
spira acuminate.
Martin. neuest. Manigfalt. I. p. 443. t. 2. f. 20.
Chenn. Conch. 10. t. 142. f. 1318.
Habitat - - - basi oblique sulcata.

solidus. 69. *C. testa conica crassa : transversim striata albo fusco-*
que nebulosa : fascia lata spiraque pyramidali albis;
anfractibus canaliculatis. *Chenn. Conch.* 10. p. 59. t.
441. f. 1310.
Habitat - - -

VÉRMES TESTACEA. Conus.

*** elongati, basi rotundata, cylindro duplo longior quam spira.

Clavus. 42. C. testa striis convexis levibus : basi cærulecente.

Lift. Conch. t. 744. f. 34.

Knorr Vergn. 5. t. 11. f. 5.

Martin. Conch. 2. t. 52. f. 570.

β) Chemn. Conch. 10. t. 143. f. 1327.

Habitat rarissimus in mari indico, testa angusta, longa,
flava, maculis albis, majoribus spadiceo marginatis,
reticulata : fasciis 2 saturatioribus albo maculatis, spira
maculata sensim in micronem obtusum definente.

Nussatel- 43. C. testa subcylindrica rubra inermi striis tuberculatis
la.

Rumpf mus. t. 33. f. EE. Terebellum granulatum.

Gualt. test. t. 25. f. L.

Argenv. Conch. t. 13. f. P.

Mus. Gottwald. t. 13. f. 96. a. b. c. & t. 43. f. 52. a.

Knorr Vergn. 2. t. 4. f. 7.

Martin. Conch. 2. t. 51. f. 567.

β) Chemn. Conch. 10. t. 143. f. 1329.

Habitat rarius ad Afia insulam Nussatello, testa pallida
rubro nebulosa maculataque, rarius tota alba granulis
striarum transversarum ex luteo fusca, spira in mucro-
nem obtusum abeunte.

Terebel- 44. C. testa alba cæruleo obumbrata subcylindrica annulato-
lum. striata : fasciis flavis.

Martin. Conch. 2. t. 52. f. 577.

β) Lift. Conch. t. 745. f. 36.

Chern. Conch. 10. t. 143. f. 1330.

γ) Chern. Conch. 10. t. 143. f. 1331. n. I.

Habitat in mari indico.

Fusus. 45. C. testa fusiformi alba transversim striata.

Martin. Conch. 2. t. 52. f. 576.

β) Gualt. test. t. 22. f. 2.

Habitat - - - testa β) punctorum fuscorum ordinibus
varia.

coccineus. 46. C. testa rubra : lineis transversis nigro punctatis, fal-
cia spiraque albis sanguineo maculatis.

Knorr Vergn. 5. t. 24. f. 2.

Habitat - - - β) fasciis 2, cingulisque pluribus articu-
latis albis.

- latus.* 47. C. testa subcylindrica annulata costata rubra obscurius nebulosa albo fasciata : spira maculata.
Lift. Conch. t. 760. f. 5.
Knorr Vergn. 3. t. 6. f. 5.
Habitat - - - an ad granulatum spectat?
- ochroleucus.* 48. C. testa subcylindrica flavâ : fascia prope basin oblique striatam alba, spira acuminata virgatim maculata.
Martin. Conch. 2. t. 52. f. 573.
 β) *Seb. mus.* 3. t. 44. f. 12.
Habitat - - - testa in β) flavo spadiccoque maculata : striis rubro punctatis decussantibus varia.
- lævis.* 49. C. testa rufa maculis striisque transversis fulvis varia : spira flavo maculata, basi oblique striata.
Valent. Abh. t. 8. f. 70.
Martin. Conch. 2. t. 52. f. 572.
Habitat - - -
- affinis.* 50. C. testa cærulecente alba : fasciis quatuor fulvescente lineatis; punctis litorisve obscure purpureis intermediis.
Martin. Conch. 2. t. 52. f. 571.
 β) *Valent. Abh.* t. 2. f. II. p. 140.
Habitat - - - araujaco affinis, spira maculata : maculis in β) virgatis.
- Violaceus.* 51. C. testa albâ violaceo nebulosa : fasciis violaceis, radiis dilutè fuscis.
Martin. neuest. Manigf. I. p. 444. t. 2. f. 18. 19.
Habitat - - - spira pyramidali anfractuum 6.
- Granula-*
tus. 52. C. testa scabra inermis striis sulcatis lævibus. *Mus. Lud.*
Utr. 560. n. 170.*
Rumpf mus. t. 32. f. T. Voluta granulata.
Gualt. test. t. 25. f. H.
Pet. aquat. t. 15. f. I.
Knorr Vergn. 3. t. 6. f. 5.
Lift. Conch. t. 763. f. 12? t. 760. f. 1.
Martin. Conch. 2. t. 57. f. 632? t. 52. f. 574. 575.
 β) *Seb. mus.* 3. t. 48. f. 26.
Habitat in Oceano africano, testa lætius rubra & magis sulcata, quam congenerum : fasciis albis, striarumque punctis purpureis.

- polyzo- 53. *C. testa intus alba, extrinsecus ex fusco lutea lineis griseis nolorum subtilissimis aspera, fascia ad spiram alba, inferius denticulata, altera ad basin dilutius tincta pluribusque filiformibus.*
v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 7. f. 13.
Habitat - - - spira complanata: virgis spadiceis varia; basi exterius obscura, intus violacea; an hujus tribus?
- bifascia- 54. *C. testa alba lineis angulatis spadiceis fasciisque duabus aurantiis varia: spira prominula, basi lineis aurantiis cincta: maculis tessellatis intermediis.*
v. Born. mus. Caes. Vind. test. t. 7. f. 10.
Habitat - - -
- niveus. 55. *C. testa conica nivea: spira prominula coronata, apertura ampla.*
v. Born. mus. Caes. Vind. test. t. 7. f. 9.
Habitat - - - an hujus tribus?
- arausia- 56. *C. testa incornata laevi: fasciis albidis, anfractuum summis canaliculatis.*
Rumpf mus. t. 34. f. A. Oranjen Admiraal.
Valent. Abb. t. 12. f. 100.
Pet. amb. t. 7. f. 7.
Argenv. zoomorph. t. 10. f. I.
Seb. mus. 3. t. 48. f. 7.
Knorr Vergn. I. t. 8. f. 3. & 5. t. 24. f. I.
Spengl. selt. Conch. t. 2. f. E.
Martin. Conch. 2. t. 57. f. 636. 637.
β) Chemn. Conch. 10. t. 144. A. f. I.
Habitat rarus in India, testa alb. i; fasciis 2-3 aurantiis lineisque albis: maculis tessellatis pulvis, spira maculis oblongis rubris, albis fusciisque varia.
- Magus. 57. *C. testa subcylindrica: fasciis longitudinalibus albore punctatis. Mus. Lud. Ulr. 560. n. 171.**
Rumpf mus. t. 32. f. Q. Voluta maculosa.
Bonann. recr. 3. f. 362?
mus. Kirch. 3. f. 355.
Gualt. test. t. 20. f. F?
Argenv. zoomorph. t. 11. f. C.
Seb. mus. 3. t. 44. f. 27.
Knorr Vergn. 6. t. 16. f. 5? & t. 1. f. 3.
Martin. Conch. 2. t. 58. f. 641.

Habitat in India, testa alba, lineis punctatis maculisque oblongis spadiceis luteis, flavis, fuscis varia, spira acuta maculata.

- Ariatus. 58. C. testa ovato-oblonga gibba nebulosa : striis tenuisimis fuscis. *Mus. Lud. Ulr.* 561. p. 172.
Rumpf mus. t. 31. f. F. *Voluta tigerina.*
Adans. Seneg. I. t. 6. f. 2. *Melar.*
Lift. Conch. t. 755. f. 7. & t. 760. f. 6.
Gault. test. t. 26. f. D.
Valent. Abh. t. 7. f. 60. 61.
Pet. gaz. t. 98. f. 9.
Argenv. Conch. t. 13. f. C.
Seb. mus. 3. t. 42. f. 5-9. & t. 47. f. 22. 23.
Mus. Gottwald. t. 12. f. 83. a-g.
Knorr Vergn. I. t. 18. f. 1. & 3. t. 12. f. 5. t. 21. f. 1.
& t. 22. f. 4.
Regenf. Conch. I. t. 8. f. 13.
Martin. Conch. 2. t. 64. f. 714-716.
β) *Chemin. Conch.* 10. t. 141. f. 1311.
Habitat ad Africæ littus occidentale frequens, testa ad 4 pollices longa, nivea, striis interdum rubellis aut flavescens, basi emarginata, transverse striata.

- Textile. 59. C. testa venis reticulatis luteis : maculis luteis fuscisque.
Mus. Lud. Ulr. 561. n. 173.*
Argenv. Conch. t. 13. f. F. I. *Pannus aureus.*
Adans. Seneg. I. t. 6. f. 7. *Loman.*
Lift. Conch. t. 788. f. 40.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 135.
Rumpf mus. t. 32. f. O. P.
Gault. test. t. 25. f. I. AA.
Seb. mus. 3. t. 43. f. 6-12. & t. 47. f. 13-17.
Olear. mus. t. 31. f. I. 3.
Mus. Gottwald. t. 13. f. 85. a. b. c. f. 94. a. b. d. h.
& f. 95. a. β.
Knorr Vergn. I. t. 18. f. 6. & 2. t. 8. f. 3.
Regenf. Conch. I. t. 6. f. 62.
Martin. Conch. 2. t. 54. f. 598-600.
Martin. Conch. 2. t. 54. f. 602.
Chemin. Besch. berl. naturf. Ges. 3. t. 8. f. A.
Conch. 10. t. 143. f. 1324. 1325.
β) *Chemin. Conch.* 10. t. 143. f. 1326. a.
γ) *Chemin. Conch.* 10. t. 143. f. 1326. b. c.

*Habitat ad Bandam Asiac, testa alba, in γ) perfici
florum colore tincta, fasciis tribus aurantiis, in β) foli
ciis 2 obtusis obscurioribus varia.*

- zulicus.* 60. *C. testa venis reticulatis fasciisque longitudinalibus
fuscis interruptis. Mus. Lud. Ulr. 562. n. 174.**
*Argenv. Conch. t. 13. f. D. G. Nigeila.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 133.
Rumpf mus. t. 33. f. 3. 4.
Valent. Abh. t. 9. f. 75.
Gualt. test. t. 25. f. V. X. Z.
Seb. mus. 3. t. 43. f. 1-5. & t. 47. f. 10-12.
Olear. mus. t. 31. f. 4. 5.
Knorr Vergn. 2. t. 1. f. 1-3. & 3. t. 19. f. 1.
Regenf. Conch. 1. t. 8. f. 25.
v. Born. mus. Caes. Vind. test. t. 7. f. 14.
Favann. Conch. 2. t. 18. f. C⁶. C⁷.
Chemn. Conch. 10. t. 143. f. 1328.
 α) Martin. Conch. 2. t. 53. f. 591. 593. 594.
 β) Martin. Conch. 2. t. 53. f. 592. 595. t. 54. f. 596.
 γ) Martin. Conch. 2. t. 54. f. 597.
 δ) testa ex luteo fusca : maculis reticulatis cordatis per
pendicularibus.
 ε) Martin. Conch. 2. t. 54. f. 601.
 Seb. mus. 3. t. 47. f. 3?
 ζ) Knorr Vergn. 3. t. 18. f. 2.
*Habitat in Asia, an specie distinctus a textili.**

- Thomæ. 70. *C. testa lævi alba characteribus punctisque seriatis
badiis, cingulis tribus maculisque albis varia apice
rubicunda, spira conica : anfractibus canaliculatis.
Mart. Conch. 2. t. 53. f. 590.
Chemn. Conch. 10. t. 143. f. 1331. n. 2.
 β) Chemn. Conch. 10. t. 138. f. 1282. 1283.
*Habitat in mari indicō.**

* * * * *testa medio ventricosa, utrinque angustata.*

- sinensis.* 61. *C. testa medio ventricosa flava : ocellis albis
transversim striata.
Regenf. Conch. 1. t. 12. f. 66.
Martin. Conch. 2. t. 56. f. 615.
*Habitat - - -**

***** Laxi ventricosi in dorsum disiecti super mensam tinnitantes.

Spectrum, 62. C. testa cærulecente flava nebulosa: punctis striisque albo-luteis. *Mus. Lud. Ultr.* 562. n. 175.*
Rumpf mus. t. 32. f. S. *Voluta spectrorum.*

Lift. Conch. t. 783. f. 30.
Valent. Abb. t. 5. f. 39.

Gualt. test. t. 25. f. S.
Seb. mus. 3. t. 47. f. 24.

Mus. Gottwald. t. 14. f. 101. f? t. 12. f. 84. a-d. & f. 85. a. d.
Knorr Vergn. 2. t. 8. f. 4.

Martin. Conch. 2. t. 53. f. 581 - 583.

B) *Chenn. Conch.* 10. t. 140. f. 1304.

C) *Chenin. Conch.* 10. t. 144. A. f. g. h.

D) *Chenn. Conch.* 10. t. 144. A. f. o. p.

E) *Kaemm. Cab. Rudolft.* p. 79. n. 18. t. 6. f. 2?

Habitat in Oceano Asiæ australi rarer, spira satis acuta.

bullatus. 63. C. testa flava albo nebulosa. *Mus. Lud. Ultr.* 563. n. 176.*
Adans. Seneg. 1. t. 5. f. 1. *Potan.*

Lift. Conch. t. 741. f. 37. t. 742. f. 38. t. 743. f. 42.
 43. & t. 749. f. 44. 45.

Gualt. test. t. 26. f. C.

Argenv. Conch. t. 13. f. H.

Seb. mus. 3. t. 42. f. 14. 15. & t. 43. f. 15. 16.

Mus. Gottwald. t. 10. f. 65. a-f. & t. 66. a. b.

Knorr Vergn. 5. t. 8. f. 2. 3. & t. 11. f. 4.

Regenf. Conch. 2. t. 11. f. 45.

Favann. Conch. 2. t. 18. f. C³.

Martini Conch. 2. t. 65. f. 725-732.

Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. f. 1.

n. *Litterat.* 3. p. 245. t. 1. f. 10. II.

Chemn. Conch. 10. t. 142. f. 1315. 1316.

Habitat — — testa tenui, nunc unicolor, frequentius maculata, nebulosa, fasciata, nunc magis nunc minus ventricosa, apertura ut plurimum ampla, cærulecente, spira nunc plana, nunc acuta.

Tulipa. 64. C. testa oblonga gibba lævi: apertura dehiscente.

Argenv. Conch. t. 13. f. B. *Tulipa.*

Lift. Conch. t. 764. f. 13.

Bonann. mus. *Kircher* 2. f. 411.

Rumpf mus. t. 34. f. K.

Valent. Abb. t. 10. f. 89.

Seb. mus. 3. t. 42. f. 16-21. t. 43. f. 20. 21. 22. 3⁶?
Knorr Vergn. 3. t. 11. f. 4. & 5. t. 20. f. 1. 2.
Regenf. *Conch.* 1. t. 2. f. 20.
Martini Conch. 2. t. 64. 65. f. 718-721.
Habitat in India, Africa & meridionali America, *genitivo*
pho affinis, at testa non coronata, alba hinc inde *cervi-*
lescente fusco, luteo rubroque nebulosa, lineisque *fran-*
ceis interruptis pista, apertura cærulecenti, basi oblique
lissime transversim striata.

Geogra- 65. *C. testa oblonga gibba coronata*, apertura dehiscentia
plus. *Rumpf mus.* t. 31. f. G. *Nubecula*.
Argenv. *Conch.* t. 13. f. A. *Textile sericum*.
Klein ostr. t. 5. f. 90. *Nubecula*, *tulipa gallorum*.
Adans. *Seneg.* I. t. 6. f. 8. *Salar*.
List. *Conch.* t. 747. f. 41.
Bonann. *regr.* & *mus.* *Kircher.* 3. f. 319.
Gualt. *test.* t. 26. f. E.
Pet. *gaz.* t. 98. f. 8.
Seb. mus. t. 42. f. 1. 4.
Knorr Vergn. 3. t. 21. f. 2. & 6. t. 17. f. 3.
Mus. *Gottwald.* t. 12. f. 85. I.
Martini Conch. 2. t. 64. f. 717.
Habitat rario in Oceano indico & africano, *testa sub-*
lindrica ad basin rugosam paulo angustiore, *pellucida*,
alba, *fusco maculata nebulosaque*, apertura alba, spira
interdum rosea.

Nubecu- 66. *C. testa alba aurantio nebulosa & maculata* : *punctis*
- la. *sparsis albis*, spira prominente acuta.
Seb. mus. 3. t. 42. f. 14. 15.
Martini Conch. 2. t. 56. f. 622.
Argenv. *Conch.* t. 13. f. H.
Habitat - - -

Spirius. 67. *C. testa alba* : *macularum spadicearum aut nigritarum*
*irregularium seriebus fasciisque punctatis interrup-
alternis.*
Gual. *test.* t. 21. f. D. F.
Argenv. *Conch.* t. 12. f. C.
Seb. mus. 3. t. 44. f. 24. 25. 28 & t. 46. f. 24-29.
Knorr Vergn. 3. t. 18. 3. & 5. t. 4. f. 6. & t. 22. f. 3.
Martini Conch. 2. t. 56. f. 626-628.
Habitat - - -

- Vexillum. 68. C. testa fusca albo obumbrata : fascia alba interrupta.
Rumpf mus. t. 31. f. S.
Gualt. test. t. 20. f. M. & t. 21. f. E.
Seb. mus. 3. t. 44. f. 8-11. & t. 45. f. 16. 17.
Mart. Conch. 2. t. 57. f. 629.
 β) *Chemin. Conch.* 10. t. 144. A. f. m. n.
Habitat — — — *testa interdum satis magna, fascia non-nunquam cruciate.*

- ventrico-
fus. 71. C. testa fusca albo fasciata inferne angustata cærulecente
 obumbrata lævi, spira conica exserta. *Kæmni. Cab.*
Rudolst. p. 91. n. 46. t. 6. f. 3. 4.
Habitat — — —

320. CYPRÆA. *Animal Limax.*

Testa univalvis, involuta, subovata, obtusa, lævis.

Apertura utrinque effusa, linearis, utrinque dentata, longitudinalis.

- Exanthe-
ma. 1. C. testa subturbinata ferruginea maculis pallidis rotundis
 adpersa : linea longitudinali subramosa.
Lift. Conch. 1. 698. f. 45. & t. 699. f. 46.
Bonann. recr. 3. f. 257.
musp. Kirch. 3. f. 256.
Gualt. test. t. 16. f. O.
Pet. gaz. t. 96. f. 6.
Seb. mus. 3. t. 76. f. 4. 5. 16. 18.
Mus. Gol'wald. t. 3. f. 14? & t. 14. f. a. b. c. d. e. f.
Regenf. Conch. 1. t. 6. f. 63. & t. 10. f. 38.
Martin. Conch. 1. t. 28. f. 289. t. 29. f. 298-300.
 β) *Lift. Conch.* 1. t. 28. f. 289. t. 29. f. 298-300.
Chemin. Conch. 10. t. 145. f. 1343.
Habitat in Oceano americano, atlantico, mappæ affinis,
testa subtus pallida immaculata, dentibus aperturæ fuscis, supra oculis guttisive pallidis, nunc majoribus, nunc
minoribus, detrita fusco fasciata aut tessellata, aut
cærulea.

- Mappa. 2. C. testa subturbinata characteribus inscripta : linea longitudinali ramosa. *Mus. Lud. Ulr.* 565. n. 179.

Rumpf mus. t. 38. f. B. *Porcellana montosa*.
Argenv. *Conch.* t. 18. f. B. *Carte geographique*.
Seb. mus. 3. t. 76. f. 3. 13.
Pet. gaz. t. 96. f. 6.
 amb. aq. t. 16. f. 2.
Knorr *delic.* B. IV. f. 5.
Knorr *Vergn.* I. t. 26. f. 3.
Martin. *Conch.* I. t. 25. f. 245. 246.
Habitat in Oceano indico & africano, rarior testa brevior
 ventricosa ad littera lœvi, pallida immaculata ab exac-
 themate discernenda; testa supra ex fusco lutea, di-
 inde ocellis albis varia, subitus lœvi subincarnata: cu-
 culis dilute fuscis, aperturæ dentibus flavis.

arabica. 3. C. testa subturbinata characteribus inscripta: macula
 longitudinali simplici. *Mus. Lud.* *Ulr.* 566. n. 180.
Rumpf mus. t. 38. f. M. *Porcellana literata* s. *arabica*.
Barrel. rar. t. 1325. f. 20.
Lift. *Conch.* t. 658. f. 3.
Gualt. test. t. 16. f. V.
Lochn. mus. *Besler.* t. 21. f. 8.
Mus. Gottwald. t. 2. f. 7. a-d. & f. 8. b.
Knorr *Vergn.* 3. t. 2. f. 2. & t. 12. f. 2. & 6. t. 20. f.
Martin. *Conch.* I. t. 31. f. 328-330.
Schroet. inn. *Bau Conch.* t. 3. f. 5.
 β) *Lift.* *Conch.* t. 659. f. 3. a.
Bonann. *regr.* 3. f. 260.
Bonann. mus. *Kirch.* 3. f. 259.
Argenv. *zoomorph.* t. II. f. I.
Mus. Gottwald. t. 2. f. 8. a.
Knorr *Vergn.* 2. t. 16. f. I.
Martin. *Conch.* I. t. 31. f. 331.
 γ) *Martin.* *Conch.* I. t. 29. f. 304.
Habitat in India, testa ad 3 pollices longa, supra alba, cœruleo
 cœrulecente, ad latera incrassata fusco aut etrusca
 ta, intus violacea, aperturæ labiis planis et raro
 cinereis; detrita testa nunc cœrulecente fusco fuligineo
 nunc badia hinc inde albido nebulosa, nunc dilutius fuligineo
 ta: maculis virgatis lineisque angularibus obscurioribus
 nunc fusca violaceo mista, nunc ex cœruleo fuligineo
 cœruleo mista, nunc alba cœruleo obumbrata.

Argus. 4. C. testa subturbinata subcylindrica adspersa ocellis, fuscis
 maculis quatuor fuscis. *Mus. Lud.* *Ulr.* 567. n. 181.

Rumpf mus. t. 38. f. D. Argus.
 Argenv. Conch. t. 18. f. D. Argus magnus.
 List. Conch. i. 705. f. 54.
 Bonann. recr. & inv. Kirch. 3. f. 263.
 Barrel. rar. t. 1325. f. 25.
 Pet. gaz. t. 97. f. 6.
 Valent. Abb. t. 10. f. 86.
 Gualt. test. t. 16. f. T.
 Klein ostr. t. 6. f. 101.
 Lesser testacæoth. f. 28.

Knorr Vergii. 3. t. 11. f. 5.
 Regenf. Conch. I. t. 5. f. 57.
 Martin. Conch. I. t. 28. f. 285. 286.
 β) Favann. Cai. rais. t. 2.

Chemn. Conch. 10. t. 145. f. 1344. 1345.

Habitat in Oceano indicō & atlantico, testa ad 4 pollices,
 longa, angusta, supra grisea aut slavecente : fasciis
 tribus fasciis, ocellis rariis concoloratis, maculis sub-
 tuis sinistris majoribus, tabuis stramineis, dentibus fasciis.

5. C. testa obtusa subcylindrica : extremitatibus depressis.
 Mus. Lud. Vir. 567. n. 182.*

Rumpf mus. t. 38. f. C. Testudinaria.

Pet. amb. aq. t. 8. f. 7.

List. Conch. t. 689. f. 36.

Knorr Vergn. 4. t. 27. f. 2.

Martin. Conch. I. t. 27. f. 271. 272.
 β) List. Conch. t. 748. f. 42. 43. Larva?

Habitat in sinu persico & Oceano indice, testa, quam
 congenerum omnium, majore, exalbida, pullo nebulosa,
 maculis hinc inde magnis nigris quasi farina cons-
 persis interdum quoque albis.

6. C. testa subturbinata gibba livido testaceoque maculata
 utrinque marginata subtus plana.

List. Conch. t. 687. f. 34?

Gualt. test. t. 15. f. T?

Column. aq. t. 69. f. 1. 2.

Pet. gaz. t. 96. f. 7. 8.

Barrel. ic. t. 1321. f. 23. & t. 1322. f. 4.

Mus. Gottwald. t. 3. f. 10. a. b.

Knorr Vergn. 4. t. 13. f. 1.

Adans. Seneg. I. t. 5. f. L. A.

Schroet. Einl. in Conch. I. p. 99. t. 1. f. 5.

- β) Gualt. test. t. 13. f. L?
 γ) Chemn. Conch. 10. t. 144. f. 1332.
 δ) Chemn. Conch. 10. t. 144. f. 1333.

Habitat frequens ad Guineam, testa subovata undato ^{angustata}, anterius juxta spiram macula fusca, posterius ^{angustata} presso marginata destra, labro interiore posterius ^{angustata} retuso, apertura anterius valde gibba, dentibus ^{angustis} sulcis intermediis fuscis; testa sub epidermide nunc ^{angustata} virescente cærulea hinc inde maculata, nunc ^{angustata} translucentibus ornata, nunc maculis fuscis ^{angustis} fasciis 2 rectis, 2 undulatis, aut altero latere ^{angustata} 2 albitis ^{angustis} altero virescente, aut nigra: maculis 2 albitis ^{angustis} cærulea maculis hinc inde rubellis, aut dilute ^{angustata} rubidine translucente varia.

- Carneola. 7. C. testa subturbinata pallida: fasciis incarnatis ^{angustatis} violaceo. Mus. Lud. Ulr. 568. n. 183.*
 Rumpf mus. t. 38. f. K. Carneola.
 Pet. gaz. t. 30. f. 8.
 List. Conch. t. 665. f. 9?
 Gualt. test. t. 13. f. H.
 Argenv. Conch. t. 18. f. O.
 Mus. Gottwald. t. 5. f. 16. a? b?
 Knorr Vergn. 6. t. 17. f. 4.
 v. Born. mus. Caes. Vind. test. t. 8. f. 2.
 Martyn univ. Conch. I. t. 14.
 Martin. Conch. I. t. 28. f. 287. 288.
 β) Seb. mus. 3. t. 76. f. 23?
 Habitat in Oceano Aliæ australi, testa tenui, ^{angustata} ^{angustata} ^{angustata}
 $\frac{2}{3}$ pollices longa, intus subfuscusque alba, ^{angustata} ^{angustata} ^{angustata}
 supra interdum cinerea: fasciis fuscis.

- Zebra. 8. C. testa turbinata cinerea: fasciis fuscis.
 List. Conch. I. 669. f. 15.
 Bonann. recr. 3. f. 266.
 mus. Kirch. 3. f. 265.
 Argenv. Conch. t. 18. f. G.
 Schroet. Eirl. in Conch. I. p. 101. t. I. f. 6.
 Habitat rarer in India, carneolæ affinis, at testa ^{angustata} ^{angustata} ^{angustata}
 majore, spira magis prominente, subitus ocellis ^{angustis} ^{angustis} ^{angustis}
 letis dentibusque aperiunturæ fuscis distinctæ.
- Talpa. 9. C. testa subturbinata subcylindrica testacea: fasciis ^{angustatis} ^{angustatis} ^{angustatis}
 dis, subitus incrassata fusca. Mus. Lud. Ulr. 568. n. 1334.

Argenv. Conch. t. 18. f. H. *Talpa.*
Rumpf mus. t. 38. f. I. *Talpa.*
Pet. amb. aq. t. 16. f. I.
Valent. Abh. t. 2. f. 13?
Barrel. rar. t. 1325. f. 19..
Lift. Conch. t. 668. f. 14.
Gualt. test. t. 16. f. N.
Mus. Gottwald. t. 6. f. 23. a?
Knorr Vergn. I. t. 27. f. 2. 3.
Regenf. Conch. I. t. 10. f. 37.
Martin. Conch. I. t. 27. f. 273. 274.
 Habitat in India, testa ad 3 pollices longa nitidissima;
 supra nunc hepatica, nunc cinerea, nunc albida, frequen-
 tissime ex fusco lutea: fasciis 3 dilutioribus, intus alba,
 dentibus infra fascis: interstitiis canis.

10. C. testa subturbinata: lateribus gibbis corticatis, dorso-
 violaceo. *Mus. Lud. Ulr.* 569. n. 185. *
Rumpf mus. t. 39. f. Q. *Achatina.*
Pet. gaz. t. 32. f. 10.
Lift. Conch. t. 662. f. 6.
Seb. mus. 3. t. 76. f. 32.
Mus. Gottwald. t. 3. f. 13. a: b: t. 5. f. 18. c. & t. 7. f. 33. h.
Knorr. Vergn. 5. t. 28. f. 5.
Martin. Conch. I. t. 25. f. 247-249.
 β) Seb. mus. 3. t. 76. f. 24?
 Habitat in Madagascar, testa tenui, fasciis supra 4 fus-
 cescensibus nebulosis, ad alterum:rum latus characteribus
 exornata, intus cærulea, ampliore, quam in Zebra,
 spiraque minus prominente.

II. C. testa subturbinata lurida subfasciata: extremitatibus
 luteis nigro bimaculatis.
Argenv. Conch. t. 18. f. C. *Souris.*
Lift. Conch. t. 671. f. 17. & t. 673. f. 19.
Bonann. recr. 3. f. 251.
mus. Kircher. 3. f. 250.
Gualt. test. t. 13. f. E. I.
Mus. Gottwald. t. 5. f. 16. e.
Adans. Seneg. I. t. 5. f. I. D.
Martin. Conch. I. t. 30. f. 315.
 Habitat in mari mediterraneo, americano, frequentius in
 atlantico & æthiopico, testa ad 2 pollices longa, clavigata
 angusta, subitus alba, supranunc murina obscurius fasciata,

VERMES TESTACEA. Cypræa.

nunc virescente aut rubella : fasciis cærulecentibus, nunc subfuscæ : fasciis rubellis, & anfractuum margine interdum nigro, nunc dilutius fusca : fasciis exalbidis, nunc badia : fasciis obsoletis, aut cærulecentibus, nunc fuscæ luteæ, nunc laeta hinc inde albo nebulosa, nunc spadicea : fascia flava, alteraque alba.

- Venelli. 12. C. testa subturbanata maculata punctis lutescentibus extremitatibus fusco maculatis, fauce rufa *Mus. Lud. Ulr. 569. n. 186.**
Pet. gaz. t. 95. f. 13.
Habitat - - -
- Iota. 13. C. testa subturbanata alba : denticulis subulatis. *Lud. Ulr. 570. n. 187.**
Bonann. recr. 3. f. 245.
Mus. Kircher. 3. f. 244.
Mus. Gottwald. t. 5. f. 20. a. b. c.
v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 8. f. 4. s.
Martin. Conch. I. t. 30. f. 322.
 β) Gualt. test. t. 15. f. C?
Habitat in mari siculo, testa lactea nitidissima, transverse inter dentes sinistri labii rubore.
- fragilis. 14. C. testa turbinata ovata glauca testaceo-undata subfasciata. *Mus. Lud. Ulr. 570. n. 188.**
Rondel. aq. 2. p. 102.
Gualt. test. t. 16. f. Q.
Habitat in mari mediterraneo, testæ strudura arabis at magis tenui undis longitudinalibus fasciisque pallidioribus ab amethystea colore potius in cinereum vergente, cernenda.
- guttata. 15. C. testa tenui gibba fulva albo-guttata : linea horizontali, subitus alba : dentibus flavis.
List. Conch. t. 676. f. 23.
Gualt. test. t. 16. f. I.
Martin. Conch. I. t. 25. f. 252. 253.
Habitat - - -
- cinerea. 16. C. testa tenui ventricosa ex rubello cinerea : linea dilutoribus, ore albo.
List. Conch. t. 667. f. 11. t. 668. f. 13. a. b. & t. 670. f. 14.
Gualt. test. t. 16. f. H. L. M.
Martin. Conch. I. t. 25. f. 254. 255.
Habitat - - - testa brevi, fascia 1-4.

- Numbœa. 17. C. testa subturbinata tenui; dorso plumbeo; fasciis quatuor cæruleo fuscoque variis fuscescente undulatis ad marginem cæruleo fuscoque lineatis.
Martin. Conch. 4. t. 26. f. 256.
Habitat rario ad Guineam, ex anachemati affinis.
- culata. 18. C. testa subturbuata pulla albo ocellata: dorso fasciis tribus pallidioribus.
Mant. 2. p. 548. Cypræa Cervus?
Lift. Conch. t. 697. f. 44.
Bonann. recr. 3. f. 267.
mus. Kircher. 3. f. 266.
Knorr Vergn. 1. t. 5. f. 3. 4.
Martin. Conch. 1. t. 26. f. 257. 258.
 e) *Valent. Abb. t. 9. f. 83.*
 v) *Seb. mus. 3. t. 76. f. 20.*
Habitat in Oceano americano, testa satis grandi, coære colore tinda.
- Hidrio.
 Aurantium.
 ferruginea.
 livida.
 gibba.
120. C. testa ovata subturbinata sublivido ocellata, subtus plana alba, ad latera incrassata atra fuso maculata, linea dorsali livida, fauce violacea.
Chemn. Conch. 10. p. 110. t. 145. f. 1346. 1347.
Lift. Conch. t. 659. f. 3a.
Knorr Vergn. 2. t. 16. f. 1.
Martyn Conch. t. 15.
Habitat in mari indico.
121. C. testa subturbinata aurantia margine alba immaculata, fauce rutila. *Martyn univ. Conch. 2. t. 59.*
Habitat ad insulas amicas.
19. C. testa tenui elongata flavescente aut cærulecente: maculis ferrugineis, intus cærulea.
Martin. Conch. t. 26. f. 260-262.
Habitat - - - testa detrita cærulea.
20. C. testa tenui elongata unicolor straminea, lutea aut rubella, subtus fuso punctata, dentibus subulatis.
Lift. Conch. t. 656. f. 1.
Bonann. mus. Kirch. 3. f. 405.
Habitat - - -
21. C. testa tenui gibba: dorso nebuloso transversim fasciatum.
Lift. Conch. t. 663. f. 7.
Habitat - - - amethystea affinis.

- turbina- 22. *C. testa turbinata ovata glauca : maculis angulatis pal-*
ta. *lidis.*
v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 8. f. 6.
β) List. Conch. t. 675. f. 22.
Habitat - - - fragili affinis, β) testa fusca bifasciata
- venerea. 23. *C. testa oblonga fusca : maculis aureis virgatis, intus*
cærulea.
Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 262.
Habitat - - - bullis affinis.
- purpuraf. 24. *C. testa oblonga purpurascente : subtus linea alba cincta*
cens. *Gault. test. t. 16. f. A.*
β) Gault. test. t. 16. f. B.
Habitat - - -
- albida. 25. *C. testa oblonga albida : labiorum fine fulvo-maculata*
Gault. test. t. 16. f. C.
Habitat - - -
- rufescens. 26. *C. testa oblonga ex fusco rufescente, subtus albida.*
Gault. test. t. 16. f. D.
Habitat - - - testa 1 1/4 pollicis longa.
- translu- 27. *C. testa cylindrica cinerea : fasciis translucentibus,*
cens. *Gault. test. t. 16. f. G.*
Habitat - - -
- punctula- 28. *C. testa cylindrica fragili alba : fasciis punctorum ru-*
ta. *bellerum transversis.*
Gault. test. t. 16. f. P.
β) Mus. Gottwald. t. 6. f. 23. e.
Habitat - - -
- tigrina. 29. *C. testa obtusa ovata subturbanata ; linea longitudinali*

An distinctæ hujus primæ tribus species sunt cyprææ a Seba mus. 3. t. 76. f. 25-29. 31. a Listero Conch. t. 656. f. 1. a Bonanni mus. Kirch. 3. f. 49^o
on distinctæ species in mus. Gottwald. t. 4. f. 14. g. t. 5. f. 16. d. t. 7. f. 31^o
b. d. f. 17. a-e. f. 18. g. h. f. 19. d. e. f. k. f. 20. d. f. 21. a. b. f. 22. f.
e. h. t. 6. f. 23. b. c. f. 24. a. b. t. 7. f. 32. b. f. f. 33. m. f. 25. a-
38. f. 39. f. 40. b. e. & f. 41. a. b. delinearæ? cui tribui accensenda?
species ab Argenville conchyl. t. 18. f. 2. a Gaultiero test. t. 13. f. G. t. 13.
f. D. F. G. Q. V. X. Z. a Listero t. 710. f. 62. & t. 685. f. 32. & a Koenig
Vergu. 4. t. 9. f. 6. depictæ? An propriam constituit tribum cyprææ sub-
alba test. t. 13. f. C. a Gaultiero adumbrata? Cyprææ jam ex mari extin-
ta nitore & colorum eleantia uplurimum placent, detrita saxe, aliisque ar-
tibus nativa varietate auda in museis asservata, & in catalogis membratis

VERMES TESTACEA. Cypræa.

3403

Seb. mus. 3. t. 76. f. 12.

Habitat - - - C. tigridi affinis, at spira manifesta guttisque longe rarioribus distincta.

30. *C. testa oblonga ferruginea : fasciis dilutioribus.*

Seb. mus. 3. t. 76. f. 15.

Habitat - - - C. Exanthemati affinis.

31. *C. testa turbinata tenui ex cærulecente fusca ; utroque fine fasciisque tribus flavescentibus fusco variis.*

Knorr Vergn. 6. t. 18. f. 2.

Habitat - - - pretiosa, rara.

32. *C. testa turbinata ex cærulecente alba fusco guttata nebulosaque.*

v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 8. f. 1. Cypræa stercoraria.

Habitat - - - stercorariæ affinis.

33. *C. testa oblonga purpurascente obumbrata : fascia straminea alteraque angustiore alba, limboque fusco.*

v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 8. f. 3. Cypræa Zebra.

Habitat - - - testa 4 fere pollices longa.

34. *C. testa cylindrica supra dilute amethystina ad latera fuscescenti maculata ; ad utrumque finem maculis duabus fuscis.*

v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 8. f. 10.

Habitat rario - - - labiis albis, fasciis dorfi interdum 3 subfuscis.

35. *C. testa cylindrica lactea altero latere limbata liturisque angustis luteis rarioribus varia : dorso fasciis undatis tribus fuscescentibus.*

Schroet. Einl. in Conch. I. p. 161. t. 1. f. 7.

36. *C. testa ovata depresso-ovalis altero latere sublimbata : dorso albido confertim ex luteo fusco punctato & undulato : fasciis tribus obscurioribus obsoletis.*

Schroet. Einl. in Conch. I. p. 165. n. 120.

Habitat - - - testa tenuissima fragili, angusta, subtus & ad latera alba, $1\frac{1}{2}$ pollices longa, $\frac{3}{4}$ lata, lineis 2 infra spiram fuscis, dentibus alterius labii nullis, alterius subulatis.

- minuta. 37. C. testa oblonga unicolor persici florum colore tincta
 subtus albo punctulata: limbo alterius lateris dentibusque
 labii albis, utroque fine supra flavo, spiræ apice nigro.
Schroet. Einl. in Conch. I. p. 165. n. 121.
Habitat - - -
- sanguino- 38. C. testa tenui oblonga fusco-fasciata, ad latera fuscata
 lenta. guineo-punctata.
Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 234.
Mus. Gottwald. t. 4. f. 14. g. 3. & t. 6. f. 23. d.
Martin. Conch. I. t. 26. f. 265. 266.
Habitat - - -
- fasciata. 116. C. testa turbinata glauca marginata supra fasciis fuscescentibus transversis, fauce glauca. *Chemin. Conch. IO. p. 100. t. 144. f. 1334.*
Habitat ad Guineæ littora.
- Regina. 117. C. testa gibba ex glauco fusca, maculis trigonis tellus
 ceis albidisque fasciisque tribus transversis picta, fauce
 nigro-glaucæ. *Chemin. Conch. IO. p. 101. t. 144. f. 1335.*
1336.
Seb. mus. 3. t. 76. ser. 5. n. 3.
Knorr Vergn. 6. t. 18. f. 2. t. 27. f. 6.
Mart. Conch. I. t. 22. f. 207. 208.
Habitat - - -
- undulata. 118. C. testa turbinata fuscescente undulata ochroleuca
 nebulosa: fasciis saturationibus. *Chemin. Conch. IO. p. 102. t. 144. f. 1337.*
Habitat rara ad insulam S. Mauritii.
- ** obtusæ absque spira manifesta.
- Caput serpentis. 39. C. testa triquetro-gibba posterius obtusiuscula. *Moll.*
*Lud. Ulr. 571. n. 189.**
Lift. Conch. t. 702. f. 50. Concha veneris maculis quadratis reticulatis.
Rumpf mus. t. 38. f. F. Caput serpentis minus.
Bonann. recr. 3. f. 258.
mus. Kircher. 3. f. 257.
Rondel. aq. 2. p. 103. f. 3.
Pet. gaz. t. 96. f. 9.
amb. aq. t. 12. f. 7.
Gualt. test. t. 15. f. 1. O.
Mus. Gottwald. t. 6. f. 31. a. d. & f. 32. a.

Adans. Seneg. I. t. 5. f. G.

Knorr Vergn. 4. t. 9. f. 3.

Martin. Conch. I. t. 30. f. 316.

Habitat frequens ad insulam Mauritii, Larique & Nussatello, testa at 1½ pollicem longa, fusca, albo maculata, subtus alba, intus violacea.

- Reticulata.* 40. C. testa subrotunda gibba fascia: ocellis in reticulum contiuentibus, lineaque dorsi media horizontali albis, subtus alba.

List. Conch. t. 701. f. 49.

Martin. Conch. I. t. 26. f. 259.

β) List. Conch. t. 704. f. 53.

Habitat - - - capiti serpentis affinis.

- Mauritiana.* 41. C. testa triquetro-gibba posterius depresso acuta, subnigra. *Mus. Lud. Ulr. 571. n. 190.**
Rumpf mus. t. 38. f. E. Caput serpentis majus.
Valent. Abb. t. 4. f. 31.
Pet. gaz. t. 96. f. 8.
List. Conch. t. 703. f. 52.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 261.
Gualt. test. t. 15. f. S.
Seb. mus. 3. t. 76. f. 19.
*Mus. Gottwald. t. 6. f. 29. a. b. f. 30. a. b. t. 7. f. 34.**
Knorr Vergn. I. t. 13. f. I. 2. 2. t. 27. f. 5.
Martin. Conch. I. t. 30. f. 317-319.
Habitat ad insulam S. Mauritii, Javam & Nussatello, testa satis magna, fusca maculata.

- Vitellus.* 42. C. testa livida: maculis albis. *Mus. Lud Ulr. 572 n. 191.**
Rumpf. mus. p. 115. t. 38. f. L. Porcellana saita.
Pet. gaz. t. 80. f. 2.
List. Conch. t. 692. 693. f. 39. 40.
Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 254.
Gualt. test. t. 13. f. T. V.
Mus. Gottwald. t. 2. f. 9. a. d.
Knorr Vergn. 6. t. 20. f. 3.
Martin. Conch. I. t. 23. f. 228. 229.
Habitat in Oceano indico, testa ad 2½ pollices longa subvitellina, fasciis 3 obsoletis translucentibus, maculis rotundis, intus cærulea, ad latera cinereo punctatis maculataque.

- Mus.* 43. C. testa retusa gibba cinerea: fascia longitudinali fusca, denticulis nigricantibus. *Mus. Lud. Ulr. 572 n. 192.**

Lift. Conch. t. 657. f. 2.

Rumpf mus. t. 39. f. S.

Argenv. Conch. t. 18. f. F.

Seb. mus. 3. t. 76. f. 33. 34.

Knorr Vergn. 3. t. 12. f. 3.

Martin. Conch. I. t. 23. f. 222. 223.

Habitat in mari mediterraneo & americano, testa solidata,
vix gibba, ad latera subtusque alba, dorsi maculis
dilute fuscis.

Tigris. 44. C. testa ovata posterius obtusa anterius rotundata;
linea longitudinali testacea. Mus. Lud. Ulr. 573. n. 197.

Rumpf mus. t. 38. f. A. Porcellana guttata.

Pet. gaz. t. 96. f. 17.

Barrel. rar. t. 1325. f. 23. & t. 1326. f. 4.

Lift. Conch. t. 681. 682. f. 28. 29.

Bonann. recr. 3. f. 231. 232. 256. 264. 265.
mus. Kircher. 3. f. 231. 232. 255. 264. 265.

Valent. Abh. t. 1. f. 3. & t. 3. f. 29.

Gualt. test. t. 14. f. G. H. I. L.

Argenv. Conch. t. 18. f. F.

Seb. mus. 3. t. 76. f. 7. 9. 14.

Olear. mus. t. 39. f. 3.

Bytem. app. t. 12. f. 53. a.

Mus. Gottwald. t. 1. f. a. b. f. 2. a. b. f. 3. a. f. 4.
t. 1. f. C. t. 2. f. 6. a. c. d.

Knorr Vergn. I. t. 26. f. 4. & 6. t. 21. f. 4. 5.

v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 8. f. 7.

Martin. Conch. I. t. 24. f. 232-236.

Habitat frequens in Oceano indico & mari adriatico, teste
ad $4\frac{1}{2}$ pollices longa, & $2\frac{1}{2}$ alta albida, flavicante,
aut cærulecente, guttis numerosis sæpius confluentibus
varia, ad latera subtusque alba, linea dorsi obliqua,
crebro undulata, Caii ad lævigandos pannos adhibita.

flammea. 45. C. testa ovata posterius obtusa anterius rotundata;
maculis flavis undatis varia.

Valent. Abh. t. 4. f. 30.

Habitat rarissima - - - tigridi proxime affinis.

olivacea. 46. C. testa ovata olivacea flavo nebulosa fuscoque ma-
culata, subtus plana dilute fusca, intus cærulecente,
labii denticulis albis.

Martin. Conch. I. t. 31. f. 332.

Habitat - - - tigridi affinis, at testa minore, media-

magnitudinis.

feminea. 47. *C. testa ovata tenuissima alba guttis ex viridi flavis
seriatim varia, intus violacea.*

Lift. Conch. t. 672. f. 18.

Gualt. test. t. 16. f. S.

Seb. mus. 3. t. 76. f. I. 2. 8.

Mus. Gottwald. t. 3. f. II. a. b. & f. 12.

Habitat - - - tigridi affinis.

Lynx. 48. *C. testa oblongo ovata, punctis fuscis lineaque flaveſ-
cente, posterius acutiuscula: ore rufo. Mus. Lud. Ulr.
573. n. 194.**

Lift. Conch. t. 683. f. 30.

Rumpf mus. t. 38. f. N.

Pet. gaz. t. 97. f. 17.

Gualt. test. t. 13. f. Z. & t. 14. f. B. C. D.

Seb. mus. 3. t. 55. ic. nonn. ad nr. 20.

Mus. Gottwald. t. 1. f. 5. f. e. t. 5. f. 18. a. b. c.

Knorr Vergn. 4. t. 9. f. 6. & 6. t. 23. f. 6.

Murray testac. t. 1. f. 10.

v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 8. f. 8. 9.

Martin. Conch. I. t. 23. f. 230. 231.

8) *Knorr Vergn. 6. t. 23. f. 7?*

*Habitat ad insulam Madagascar, S. Mauritii, & in Oceano
indico, testa vix 2 pollices longa albida, cæruleſcente aut
flava, ad latera subtusque alba, labiis inter dentes rufis.*

Isabella. 49. *C. testa subcylindrica: extremitatibus luteis. Mus. Lud.
Ulr. 574. n. 195.**

Rumpf mus. t. 39. f. G. Isabella.

Pet. amb. aq. 16. f. 16.

gaz. t. 97. f. 16.

Lift. Conch. t. 660. f. 4.

Argeny. Conch. t. 18. f. P.

Mus. Gottwald. t. 7. f. 36.

Knorr Vergn. 4. t. 9. f. 5.

Martin. Conch. I. t. 27. f. 275.

*Habitat ad insulam S. Mauritii & Madagascar, testa vix 1 $\frac{1}{2}$
pollices longa angusta, alba vel grisea nigroque punctata,
interdum fasciata, labiorum denticulis albis.*

ambigua. 50. *C. testa pyriformi obscura dilutius nebulosa maculataque.*

Seb. mus. 3. t. 76. f. 30.

Habitat - - - an distincta species?

Scurra. 122. *C. testa ovato oblonga subtus plana lutescente: guttis vi-
rescentibus lividisve confluentibus, ad latera punctis fu-*

*cis sparsis varia. Chemin. Conch. 10. p. 103. t. 14
f. 1338. a. b.*

Mari. Conch. 1. t. 27. f. 276. 277.

Habitat in mari indico, an eadem cum indica?

*** Umbilicatae.

Onyx. 51. *C. testa subtus fusca supra albida. Mus. Lud. Ulr. 575.
n. 196.**

Rumpf mus. t. 38. f. G. Porcellana cærulea.

Bonann. recr. 3. f. 255.

mus. Kircher. 3. f. 254.

Gualt. test. t. 15. f. N.

β) *Chemin. Conch. 10. p. 106. t. 145. f. 1341.*

List. Conch. t. 657. f. 2.

*Habitat in Asia, testa pollicis magnitudine, supra ochrolo
ca, ceterum capiti serpentis similis, an mutata? hujus tr. bus?*

clandestina. 52. *C. testa lineis transversis subtilissimis flavescens pallid
concurrentibus.*

*Habitat in India, testa lœvi, livida, magnitudine
afelli, subtus alba intumculata, supra fascia una altera
rave pallida obsoleta notata, striis luteis oculo nudo vix
conspicuis. Zoega.*

succincta. 53. *C. labio interiori utraque extremitate rotundato. Mus.
Lud. Ulr. 575. n. 197.**

Habitat - - -

Ziczac. 54. *C. testa subtus lutea punctis fuscis: extremitatibus maculatis
culis duabus fuscis. Mus. Lud. Ulr. 575. n. 198.**

List. Conch. t. 661. f. 5. Concha venerea undatum depicta.

Pet. Mus. t. 12. f. 7.

A. gen. C. nch. t. 18. f. N. R.

Seb. mus. 3. t. 55. n. 19. f. 2.. 3. II.

Mus. Gottwald. t. 5. f. 18. i. k.

Martin. Conch. 1. t. 23. f. 224-227.

*Habitat - - testa supra dilute incarnata, fasciis 3 albidis
obsoletis lincitque angulatis rubellis vel flavicantibus
varia, subtus lutea nigro maculata; interdum pulla fusca
ciis 2 albis fuscis undulatis, sub us alba, aut alba lineis
longitudinalibus mustelinis undulatis, subtus lutea
fuscis fundata, aut cana, lineis angulatis paulo obscurioribus
confertis, subtus tota nivea.*

Hirundo. 55. C. testa supra cærulecente : extremitatibus maculis duabus fuscis. *Mus. Lud. Ulr.* 576. n. 199.*
Lift. Conch. t. 674. f. 20. 21.

Pet. gaz. t. 30. f. 3.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 235.

Seb. mus. 3. t. 55. n. 19. f. 8. 9.

Mus. Gottwald. t. 6. f. 25. n. b. c.

Knorr Vergn. 4. t. 25. f. 4.

v. *Born mus. Caes. Vindob. test.* t. 8. f. 11.

Martin. Conch. I. t. 28. f. 282.

Habitat ad insulas Maldivas, c. asello affinis, testa angusta elongata, subtus alba, ad marginem punctata, supra saepius fusco punctata, aut maculata : fasciis 2 transversis albis.

Afellus. 56. C. testa alba : fasciis tribus fuscis. *Mus. Lud. Ulr.* 577. n. 200.*

Rumpf mus. t. 39. f. M. Afellus.

Argenv. Conch. t. 18. f. T. Afellus.

Lift. Conch. t. 666. f. 10.

Pet. gaz. t. 97. f. 11.

amb. aq. t. 16. f. 18.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 236.

Barrel. rar. t. 1326. f. 27.

Gualt. test. t. 15. M. CC. DD.

Mus. Gottwald. t. 6. f. 26. a. b. c.

Bytem. app. t. 12. f. 56. 58.

Adans. Seneg. I. t. 5. f. H.

Knorr Vergn. 4. t. 25. f. 3.

Martin. Conch. I. t. 27. f. 280. 281.

Habitat frequens ad insulas Maldivas, testa oblonga, minuta, fasciis flavo marginatis, interdum rubellis.

orionea. 57. C. testæ macula testacea æquali. *Mus. Lud. Ulr.* 577. n. 202.

Habitat - - - macula solitaria a stolida distincta.

Urfellus 58. C. testa oblonga alba, supra lævi fusco varia : punctis ad umbilicum duobus fuscis.

Rumpf mus. t. 39. f. O.

Gualt. test. t. 15. f. L.

Martin. Conch. I. t. 24. f. 241.

Habitat rarer - - - testa minuta.

Pyrum, 59. C. testa dilute fusca : fasciis dilutioribus maculisque ochroleucis, subtus & ad latera fulva, intus cærulea.

Gualt. test. t. 14. f. E.

Martin. Conch. I. t. 26. f. 267. 268.

β) List. Conch. t. 667. f. 12?

γ) Mus. Gottwald. t. 7. f. 33. i. k?

Habitat - - - labii dentibus albis.

maculosa. 60. C. testa angusta elongata supra maculis carneis, pallidis fulvis glaucisque varia, ad latera spadicea.

Bonann. recr. 3. f. 259.

mus. Kircher. 3. f. 258.

Habitat - - -

pulla. 61. C. testa tenui ad latera pulla, supra alba aut dilata fuscis fasciis transversis lineave horizontali dilutiori norante.

Martin. Conch. I. t. 26. f. 269. 270.

Habitat rario - - -

indica. 62. C. testa cylindrica supra characteribus, ocellis lineatis horizontali dilutiore notata, ad latera rubella aucta guttata, labii denticulis fuscis.

Rumpf mus. t. 39. f. H.

Habitat rario in India, arabicæ affinis, inter primi tertiamque tribum quasi media, lateribus persicifloris colore tinctis.

Ovum. 65. C. testa oblonga tenui olivacea: maculis ferrugineis fissis, subtus alba.

Mus. Gottwald. t. 5. f. 19. g. h. i. & f. 22. b.

Martin. Conch. I. t. 27. f. 278. 279.

Habitat - - - testa angusta, detrita fasciis supra 3^{ed} lescientibus, denticulorum in labiis interstitiis subfusco

felina. 66. C. testa oblonga angusta plumbea: punctis maculis ferrugineis, fasciisque dilutoribus: maculis ad utramque finem duabus fuscis.

List. Conch. t. 680. f. 27.

Seb. mus. t. 55. f. 19. n. 7.

Martin. Conch. I. t. 28. f. 283. 284.

Habitat - - - inter c. hirundinem & asellum medio testa detrita supra cærulecente.

atomaria. 67. C. testa oblonga nivea fusco punctato ad utramque finem obscurè biguttata.

Martin. Conch. I. t. 28. f. 290. 291.

Habitat - - - testa $\frac{1}{2}$ circiter pollicem longa.

- nebulosa.* 68. *C. testa oblonga gibba fusca spadiceo maculosa.*
Lift. Conch. t. 688. f. 35.
Habitat - - - olivaceæ affinis.
- ochroleu-*
ca. 69. *C. testa tenui ochroleuca ; maculis dilutioribus.*
Bonann. recr. 3. f. 244.
Habitat - - -
- Gellata.* 70. *C. testa tenui cinerea punctata : striis transversis*
elevatis.
Bonann. recr. 3. f. 248.
Habitat - - -
- subflava.* 71. *C. testa oblongiuscula gibba lævi subflava.*
Gault. test. t. 13. f. D.
Habitat - - - an distincta vere species?
- leucogaster.* 72. *C. testa oblonga purpurea subtus alba.*
Gault. test. t. 13. f. F.
Habitat - - - an vere distincta species?
- Variolosa.* 73. *C. testa oblonga obscura : fasciis dorsi duabus macu-*
lisque albidis.
Gault. test. t. 13. f. M.
β) Gault. test. t. 13. f. N. O.
γ) Gault. test. t. 13. f. P.
δ) Gault. test. t. 13. f. Q.
ε) Gault. test. t. 13. f. TT.
Habitat - - -
- Fulva.* 74. *C. testa solida oblonga fulva : maculis fuscis seriatis*
fasciisque duabus obscuris, ad latera subtusque crocea.
Gault. test. t. 13. f. S.
Habitat - - -
- leucostoma.* 75. *C. testa oblonga gibba fusco cæruleoque nebulosa ad*
latera nigro-maculata, ore albo.
Gault. test. t. 24. f. A.
Habitat - - -
- lineata.* 76. *C. testa ovata supra lineata : limbo maculato.*
Muf. Gottwald. t. 2. f. 7. f.
β) Muf. Gottwald. t. 4. f. 14. g. I.
Habitat - - -

- cancella- 77. C. testa ovata gibba cancellatim maculata :
ta: supra horizontali.
Mus. Gottwald. t. 5. f. 18. l. m. n. & f. 19. ^{2. b.}
t. 6. f. 31. b. c.
Habitat - - -
- lutea. 78. C. testa fuscescente : fasciis duabus albis, ^{subtus} fusco punctata. *Gronov. zooph.* t. 19. f. 17.
Habitat - - - *testa oblonga, angusta.*
- badia. 79. C. testa oblonga gibba supra badia: punctis fuscis albis
Bytem. appar. t. 12. f. 57.
Habitat - - -
- punctata. 115. C. testa ovata alba : punctis testaceis. *Mant.* 2. p. 12.
Habitat - - - *testa vix marginata, magnitudine*
Ziczag, ore albo.
- zonaria. 119. C. testa ovata læviuscula lutescente : fasciis quatuor
lunulis fuscis notatis. *Chemin. Conch.* 10. p. 107. ^{3. 14.}
f. 1342.
Habitat rariſſima ad Guineæ littora.
- conoi- 121. C. labro intus dentata : tuberculorum ordinibus
dea. labio edentulo. *Scop. del. inf.* 2. p. 78. t. 24. ^{f. 3.}
***** *marginatæ.*
- cribraria. 80. C. testa umbilicata lutea : punctis rotundis albis,
Lud. Ulr. 577. n. 201.*
Argenv. Conch. t. 18. f. X. *Argus minor.*
Pet. gaz. t. 80. f. K. t. 8. f. 3?
Lift. Conch. t. 695. f. 42.
Mus. Gottwald. t. 2. f. 7. e? f. 9. g.
Regenf. Conch. I. t. 12. f. 74.
Martin. Conch. I. t. 31. f. 336.
Habitat - - - *testa oblonga, angusta, ocellata, subtus tota alba, inter digitulos labii interdum flavo maculata.*
- Moneta. 81. C. testa marginato nodosa albida. ² *Mus. Lud.*
578. n. 203.*
Argenv. Conch. t. 18. f. K. *Moneta Congo.*
Lift. Conch. t. 709. f. 59. *Moneta nigritarum.*
Rumpf mus. t. 39. f. C. *Thoracium vulgare f. caeruleum.*
Pet. gaz. t. 97. j. 8. *Concha veneris africana t. N.*
neta nigritarum.

Pet. amb. aq. t. 16. f. 14.
 Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 233.
 Barrel. rar. t. 1326. f. 26.
 Guilt. test. t. 14. f. 3-5.
 Leijer testaceoth. f. 26.
 Mus. Gottwald. t. 7. f. 42. 2-g.
 Bytem. app. t. 12. f. 59.
 Murray testaceol. t. 1. f. 11.
 Knorr Vergn. 4. t. 24. f. 4.
 Martin. Conch. I. t. 31. f. 337-340.
 Habitat frequens in mari mediterraneo, atlantico, æthiopico, indico, in primis in iugulis Maldivis a feminis lecta sub aqua per tres dies a plenilunio vel ante novilunium, unde transportatur navibus in Bengaliam, Siam, Americam, insulasque illi obversas, nigritis loco monetæ inserviens.

Andalus. 82. C. testæ dorso annulo flavo circumdato. Mus. Lud.
 Ulr. 578. n. 204.*
 Rumpf mus. t. 39. f. D. Thoracium quadratum.
 Pet. gaz. t. 6. f. 8.
 Rondel. test. 2. p. 103. f. 4.
 Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 240. 241.
 Guilt. test. t. 14. f. 1. 2.
 Mus. Gottwald. t. 7. f. 33. f. g. f. 40. c?
 Knorr Vergn. 4. t. 9. f. 4. & t. 16. f. 4.
 Martin. Conch. I. t. 24. f. 239. 240.
 Habitat ad Amboinam & Alexandriæ frequens, testa ochroleuca, intus cærulea, subtus planiuscula.

83. C. testa margine gibbo inæquali albido fusco-punctato, dorso nebulato-testaceo.
 List. Conch. t. 677. f. 24. & t. 678. f. 25.
 Rumpf mus. t. 38. f. P.
 Guilt. test. t. 15. f. AA.
 Murray testaceol. t. 1. f. 13.
 Martin. Conch. I. t. 29. f. 301. 302.
 2) Rumpf mus. t. 38. f. O.
 2) Martin. Conch. I. t. 29. f. 303.
 Habitat in Oceano indico, testa solida subtus flavescente vel alba, fasciis 4 obsoletis fuscis.

84. C. testa deroso-marginata flava albo punctata: lateribus macula subfuscæ. Mus. Lud. Ulr. 578. n. 203.*.

Rumpf mus. t. 39. f. A. Thoracium oculatum.¹
Pet. gaz. t. 97. f. 19.
Lift. Conch. t. 690. f. 37.
Gualt. test. t. 15. f. H.
Mus. Gottwald. t. 7. f. 37. a-c f. 40. a? d?
Knorr Vergn. 6. t. 20. f. 4.
v. Born. mus. Caes. Vind. test. t. 8. f. 13.
Martin. Conch. I. t. 30. f. 320. 321.
Habitat satis frequens ad insulas S. Mauritii & Ascensionis,
testa ad 1½ pollicis longa supra convexa, interdum
subfuscata aut virescente albo-punctata, nonnunquam
fusco maculata: linea media virescente subobliqua, p
tus & ad latera alba.

derosa. 85. C. testa deroso-marginata carnea: dorso cinerascente
 rufo punctato: lateribus punctis fuscis. *Gronov. Zool.*
 t. 18. f. 10.
Habitat in mari mediterraneo, erosæ affinis, testa supra
fasciis 3 obsoletis, subtus lævi rufescente.

flaveola. 86. C. testa deroso-marginata flavescente albo-punctata:
 lateribus punctis fuscis obsoletis subsparsis. *Mus. Lud.*
*Ulr. 581. n. 209.**
Habitat - - - punctis vel ocellis albis hinc inde in fine
confluentibus; erosæ proxime affinis, an vere diffinida.

spurca. 87. C. testa submarginata lutescente luteo irrorata:
 ribus fusco punctatis.
Habitat in mari mediterraneo, testa ovata, lævi, inter-
dum livida, immaculata diaphana, edentula, marginata
supra crenulato, fusco, labio interiori posterius apice
flexo.

oblonga. 88. C. testa oblongo-ovata supra cærulescente fusco punctata
 maculataque; subrus & ad latera alba.
v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 8. f. 14.
Habitat - - - spira manifesta, an hujus tribus?

stolida. 89. C. testa cinerea testaceo quadrato variegata.
*Lud. Ulr. 580. n. 207.**
Rumpf mus. t. 39. f. E.
Argenv. Conch. t. 18. f. Y.
Seb. mus. 3. t. 55. n. 19. f. 12. 14.
Mus. Gottwald. t. 5. f. 22. a. c. t. 6. f. 28?
v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 8. f. 12?
Martin. Conch. I. t. 28. f. 292. 293.

- 8) Bonann. *recre.* & *mus.* Kircher. 3. f. 237.
Rumpf mus. t. 39. f. F.
Mus. Gottwald. t. 6. f. 27.
Martin. Conch. I. t. 28. f. 294. 295.
 γ) Gualt. *test.* t. 16. f. E?
 δ) Martin. Conch. I. t. 28. f. 296. 297?
 ε) List. Conch. t. 679. f. 26?
Habitat ad Amboinam, testa $\frac{1}{2}$ pollicem longa, subtus
& ad latera alba.
90. C. testa triquetro-gibba albo-punctata posterius erosa
subtus flava immaculata. Mus. Lud. Ulr. 579. n. 206.
List. Conch. t. 691. f. 38.
Bonann. *recre.* 3. f. 247.
mus. Kircher. 3. f. 246.
Rumpf mus. t. 39. f. B.
Gualt. *test.* t. 15. f. BB.
Lesser testaceoth. f. 27.
Martin. Conch. I. t. 30. f. 326. 327.
Habitat in Oceano indico, testa flava, supra nunc albo
punctata vel ocellata, nunc inter maculas albas vel
cærulescientes stellulis spadiceis notata.
91. C. testa submarginata lutea: ocellis nigris. Mus. Lud.
Ulr. 580. n. 208.
List. Conch. t. 696. f. 43.
Bonann. *recre.* 3. f. 359.
mus. Kirch. 3. f. 352.
Pet. gaz. t. 9. f. 7.
Mus. Gottwald. t. 7. f. 32. c. d. e?
Martin. Conch. I. t. 31. f. 333. 334.
Habitat rarior - - - testa $\frac{1}{2}$ pollicem longa, margine
albo fusco-punctato, dentibus labii albis.
92. C. testa subviolacea albo-punctata. Mus. Lud. Ulr.
*581. n. 210.**
 v. Born. *mus.* Caes. Vindob. *test.* t. 8. f. 16?
Martin. Conch. I. t. 30. f. 324. 325.
 β) List. Conch. t. 694. f. 41.
Seb. mus. 3. t. 55. f. 19. n. 5.
Mus. Gottwald. t. 7. f. 33. b. c.
Martin. Conch. I. t. 24. f. 237. 238.
Habitat - - - testa pusilla, supra interdum livida, lutea,
aut subfuscæ.

- Pediculus. 93. C. testa transversim fulcata. *Mus. Lud. Ulr.* 582. n. 211.
Adans. Seneg. t. 5. f. 3. *Bitou.*
Argenv. Conch. t. 18. f. L. *Pediculus.*
zoomorph. t. 3. f. I. K.
Rumpf mus. t. 39. f. P. *Pediculus.*
Lift. anim. angl. p. 168. t. 3. f. 17. *Concha venenosa*
exigua alba striata.
Lift. Conch. t. 706. 707. f. 56. 57.
Pet. amb. aq. t. 16. f. 22.
Barrel. rar. t. 1326. f. 28.
Ginann. adr. 2. t. 13. f. 109.
Gualt. test. t. 14. f. O. P. t. 15. f. P. R.
Seb. mus. 3. t. 55. f. 22.
Mus. Gottwald. t. 5. f. 21. c. & t. 8. f. 45. a-h.
Knorr Vergn. 6. t. 17. f. 6.
Martin. Conch. 1. t. 29. f. 309-311.
 ♂) *Lift. Conch.* t. 706. f. 55.
Bonann. recr. 3. f. 239. 250.
mus. Kirch. 3. f. 239. 248.
Martin. Conch. 1. t. 29. f. 306-308.
Habitat in Oceano Europæ septentrionali, americanæ, indico, mari mediterraneo, frequens, testa minuta, ovata, aliarum nunc albarum, nunc rubellarum, nunc rosearum, nunc macularum, nunc immaculatum, dorso longitudinaliter sulcato, aliarum rubellarum subfusciorum non raro maculis rufescitibus subfuscis, cinereis variarum sulco longitudinali nullo.
 costata. 94. C. testa dilute carnea: dorso striis elevatis subtiliter mis transversis aspero.
Knorr Vergn. 6. t. 15. f. 7:
Habitat - - - c. pediculo affinis, at testa magis elongata, $\frac{1}{2}$ pollicem superante.
 Nucleus. 95. C. testa utrinque marginata subrostrata rugosa, supra punctata tuberculis. *Mus. Lud. Ulr.* 582. n. 212.
Argenv. Conch. t. 18. f. V. *Variolæ.*
Rumpf mus. t. 39. f. I. *Nux avellana granulata.*
Pet. amb. aq. t. 16. f. 11.
gaz. t. 97. f. 12.
Lift. Conch. t. 708. f. 58.
Gualt. test. t. 14. f. Q. R. S.
Mus. Gottwald. t. 8. f. 44. a, b.
Knorr Vergn. 4. t. 17. f. 7.
 Regnoph

Regenf. Conch. I. t. 12. f. 78.

v. *Born. mus. Caes. Vindob. test.* t. 8. f. 17.

Martin. Conch. I. t. 29. f. 312.

Habitat frequens ad insulam Nussatello, rarer ad littora Hiloe, testa oblonga alba, cinerea aut chalybea, ad pollicem usque longa, lateribus transversim sulcatis, labiorum dentibus acutis.

96. C. testa albida utrinque rostrata : dorso tuberculato; striis transversis undulatis.

Lift. Conch. t. 710. f. 61.

8) *Mus. Gottwald.* t. 8. f. 44. c. d.

Habitat ad Madagascar, c. nucleo affinis, at testa latiori.

97. C. testa subrostrata : punctis elevatis sine striis, extremitatibus luteis. *Mus. Lud. Ulr.* 583. n. 213.*

Argenv. Conch. t. 18. f. S. *Porcellio.*

Mus. Gottwald. t. 7. f. 33. d? e?

Knorr Vergn. 4. t. 16. f. 2.

v. *Born. mus. Caes. Vindob. test.* t. 8. f. 18.

Martin. Conch. I. t. 29. f. 313. 314.

Habitat --- testa in spadiceum vergente, tuberculis minoribus, quam in c. nucleo, labiorum dentibus reflexis.

98. C. testa utrinque rostrata adspersa punctis elevatis.

Lift. Conch. t. 710. f. 60.

Bonann. recr. 3. f. 243.

Rumpf mus. Kircher. 3. f. 242.

Gualt. test. t. 39. f. K.

v. *Born mus. Caes. Vindob. test.* t. 8. f. 19.

Martin. Conch. I. t. 24. f. 243. 244.

Habitat in mari mediterraneo & indico, testa alba vel albida : dorso convexo.

99. C. testa utrinque rostrata laevi. *Mus. Lud. Ulr.* 583.

n. 214.*

Rumpf mus. t. 39. f. L. N. Globulus.

Gualt. test. t. 14. f. M.

Mus. Gottwald. t. 8. f. 44. e. f.

Murray testaceol. t. I. f. 12.

v. *Born. mus. Caes. Vindob. test.* t. 8. f. 20.

Martin. Conch. I. t. 24. f. 242.

Knorr Vergn. 6. t. 21. f. 7.

VERMES TESTACEA. Cypræa.

Chemn. Conch. I. t. 145. f. 1349. 1350.

β) *Gualt. test.* t. 14. f. N.

*Habitat in Asia, potissimum ad Amboinam, testa globosa
alba, vel flava, rarius fusco aut sanguineo punctata.*

affinis. 100. C. testa oblonga subrostrata lœvi flava: anterius utrinque ocellata.

Knorr Vergn. 6. t. 21. f. 7.

Habitat - - - c. globulo affinis, aut magis oblonga.

squalina. 101. C. testa tenui oblonga alba: punctis maculisque rugineis.

Lift. Conch. t. 684. f. 31. & t. 686. f. 33.

Gualt. test. t. 16. f. I.

Mus. Gottwald. t. 5. f. 18. d. e. f.

Martin. Conch. I. t. 25. f. 250. 251.

β) *Mus. Gottwald.* t. 7. f. 33. a. 33. l.

Habitat - - - testa tenui, maculis interdum confluentibus, margine fusco maculato, dorsi linea nonnunquam horizontali albida.

fimbriata. 102. C. testa alba vel grisea: maculis fasciisque transversis ferrugineis obsoletis, oris labiis violaceo maculatis.

Martin. Conch. I. t. 26. f. 263. 264.

Habitat - - - testa detrita rubra.

cruenta. 103. C. testa gibba supra cærulescente rufo punctata, latera subtusque alba; labiis citrinis.

Gualt. test. t. 15. f. E.

Habitat - - -

reticula- 104. C. testa reticulata, margine maculis virgatis vana-

ta, *Rumpf mus.* t. 39. f. R.

Habitat - - -

rubiginosa. 105. C. testa oblonga alba, intus violacea dorsi litura labiis

ruginea, utroque fine luteo bimaculata, dentibus flavescensibus.

Martin. Conch. I. t. 29. f. 305.

Habitat - - -

miliaris. 106. C. testa tenui brevi ex flavicante viridi lacteo-olive-

lata: linea lateralí horizontali.

Lift. Conch. t. 700. f. 47. & t. 701. f. 48.

Martin. Conch. I. t. 30. f. 323.

Habitat - - - erosæ affinis.

107. C. testa solida supra flavescens fusco punctata : linea horizontali pallida, subtus lactea, punctis ad marginem impressis.
Martin. Conch. t. 31. f. 335.
Habitat - - - testa pollicem circiter longa.
108. G. testa crassa subflava : fasciis tribus albidis, ore cærulecente.
Lift. Conch. t. 664. f. 8.
Habitat - - - carneolæ affinis, testa ultra 4 pollices longa.
109. C. testa supra ex albo vino : ocellis purpurascenscentibus circulo nigro cinctis lineaque horizontali alba, intus cærulea.
Bonann. recr. 3. f. 253.
muf. Kirch. 3. f. 252.
Habitat in mari mediterraneo, testa margine niveo.
110. C. testa angustata fusca : maculis ad latus rufescentibus.
Gault. test. t. 13. f. QQ.
Habitat - - -
111. C. testa oblonga gibba flavicante albo punctata : macula ad marginem nigricante.
Gault. test. t. 13. f. R.
Habitat - - - erosæ affinis.
112. C. testa convexa ex albo cærulea fusco punctata subtus flava altero latere striata.
Gault. test. t. 14. f. F.
Habitat - - - testa mediæ magnitudinis.
113. C. testa oblonga solida variegata : labiis aurantiis.
Argenv. Conch. t. 18. f. Z.
Habitat - - -
114. C. testa cærulecente fusco maculata trifasciata.
Argenv. Conch. t. 8. f. I.
Habitat - - -

321. BULLA. *Animal Limax.*

*Testa univalvis, convoluta, inermis
Apertura subcoarctata, oblonga,
longitudinalis, basi integerrima.
Columella obliqua, lavis.*

- Ovum. 1. B. testa ovata obtuse subbirostri : labro dentato. *Mus. Lin.*
*Ulr. 584. n. 218.**
Argenv. Conch. t. 18. f. A. Ovum.
Rumpf mus. t. 38. f. Q. Ovum.
Valent. Abb. t. 4. f. 32.
Pet. anib. t. 8. f. 9.
gazoph. t. 97. f. 7.
Lift. Conch. t. 711. f. 65.
Bonann. recr. 3. f. 252.
mus. Kirch. 3. f. 251.
Gualt. test. t. 15. f. A. B.
Seb. mus. 3. t. 76. f. 6. 10. II.
Mus. Gottwald. t. 7. f. 43. a. b. c.
Lesser testaceoth. f. 22.
Knorr Vergn. 6. t. 33. f. 1.
Martin. Conch. 1. t. 22. f. 205. 206.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. f. 7.
β) Crumpled Cowry. Martyn univ. Conchol. 2. t. 60.
*Habitat frequens ad Amboinam, β) ad insulas amicas, ^{ad} pollicis
dia inter cypræas & bullas, testa lævi ad 4 pollutis
longa, nivea, ore luteo.*

- Volva. 2. B. testa birostri : rostris elongatis striatis acutis. *Mus. Lin.*
*Ulr. 584. n. 216.**
Argenv. Conch. t. 18. f. I. Radius textoris.
Lift. Conch. t. 711. f. 63.
Bonann. mus. Kircher. 3. f. 390.
Seb. mus. 3. t. 55. f. 13-16.
Lesser testaceoth. f. 23.
Knorr Vergn. 5. t. 1. f. 2. 3. & 6. t. 32. f. 1.
Spengl. selt. Conch. t. 1. f. C.
Martin. Conch. 1. t. 23. f. 217. a. b. & f. 218.
*Habitat rarissima ad Jamaicam, testa tenui subglobosa
transversim striata, alba, adultiore ex flavecente vir-
nerea, rostris rarius subcurvatis.*

3. B. testa birostri : margine exterius crassato, - rostris elongatis lævibus.

Lift. Conch. t. 711. f. 66.

Knorr Vergn. 6. t. 20 f. 5.

Habitat rara ad Javam, valva similis, at testa minore, fabæ magnitudine, angustiore, lævi, ex incarnato albida, rostris æqualibus, ventris fere longitudine, oblique truncatis: altero parum adscendente, rimæ subæquali versus rostrum adscendente latiori.

4. B. testa oblonga utrinque obtusiuscula æquali, labro arcuato : margine intus incrassato.

Lift. Conch. t. 712. f. 68.

Gualt. test. t. 15. f. 4.

Pet. gaz. t. 66. f. 1. 3.

Ginann. adr. 2. t. 13. f. 95.

Barrel. ic. 31. 32. 35.

Martin. Conch. I. t. 23. f. 215. 216.

Habitat rara in mari mediterraneo & adriatico, testa alba, lævi, semine tritici duplo majore, vix birostri, at magis patula, spira externa nulla, apertura longitudinali lunata cum denticulo obsoleto ad apicem columellæ.

5. B. testa transverse angulata ovata utrinque puncto osco.

Mus. Lud. Ulr. 585. n. 217. *

Rumpf. mus. t. 38. f. H. Jambos alba.

Petiv. amb. aq. t. 16. f. 22. 23. Gibba.

gaz. t. 99. f. 2.

List. Conch. t. 712. f. 67.

Gualt. test. t. 16. f. F.

Argenv. Conch. t. 18. f. M.

Seb. mus. 3. t. 55. f. 17.

Lesser testaceoth. f. 24.

Knorr Vergn. 4. t. 26. f. 7.

Martin. Conch. I. t. 23. f. 220. 221.

Habitat rara in India, cypræis affinis, testa tota alba, utroque fine rubescente, raro ultra pollicem longa, ovali.

6. B. testa angulata : cingulo elevato. *Mus. Lud. Ulr.* 585. n. 218. *

Column. purp. p. 29. t. 30. f. 5.

Lift. Conch. t. 711. f. 64.

Pet. gaz. t. 15. f. 5.

Bonanni. recr. 3. f. 249. 339.

muf. Kirch. 3. f. 249. 338. 339.

- Argenv. Conch.* t. 18. f. Q.
Seb. mus. 3. t. 55. f. 18.
Mus. Gottwald. t. 8. f. 46. a.
Lesser. testaceoth. f. 25.
Knorr Vergn. I. t. 14. f. 3. 4. & 6. t. 32. f. 4.
Martin. Conch. I. t. 22. f. 211-214.
Habitat frequens ad Brasiliam, testa elongata angusti-
alba, aut auroræ colore tincta supra alba: apertura
recta, ventre longiori.

- Naucum.* 7. B. testa rotundata pellucida transversim substriata ^{ante}
que umbilicata. Mus. Lud. Ulr. 586. n. 219.*
Rumpf mus. t. 27. f. H. Bulla.
Lift. Conch. t. 714. f. 73.
Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 4.
Gualt. test. t. 13. f. GG.
Argenv. Conch. t. 17. f. Q.
Seb. mus. 3. t. 38. f. 45.
Knorr Vergn. 6. t. 38. f. 2. 3.
Martin. Conch. I. t. 22. f. 200. 201.
*Habitat in Oceano africano & indico, testa vix ^{ante}
*pollicem longa, tenui, dorso medio interdum glaberrima**

- apertz.* 8. B. testa subrotunda pellucida transversim substriata
tota hiante.
Gualt. test. t. 13. f. EE.
Martin. Conch. I. p. 266. vign. 13. f. 3.
Schroet. Einl. in Conch. I. p. 172. t. I. f. 8. a.^b
Brit. zool. 4. t. 70. f. 85. A.
du Costa brit. zool. t. 2. f. 3.
Favann. Conch. t. 27. f. F⁷.
Chern. Conch. 10. t. 146. f. 1354. 1355.
Habitat rara ad Caput Bonæ Spei, naucu affinitate
testa hiante vix umbilicata, potius inflexa, quam invata
ta, striis semilunaribus utrinque conspicuis discernendu
Spengler.

- Hydatis.* 9. B. testa rotundata pellucida longitudinaliter substriata
vertice umbilicato.
Gualt. test. t. 13. f. DD.
Chern. Conch. 9. t. 118. f. 1019.
Habitat rara in mari mediterraneo, Pisi minoris ^{se}
magnitudine, apertæ affinis.

- Ampulla.* 10. B. testa rotundata opaca: vertice umbilicato. *Mus.*
Lud. Ulr. 586. n. 220.*

- Rumpf mus.* t. 27. f. G. Bulla.
Pet. gaz. t. 50. f. 13. & t. 99. f. 14.
Column. aq. t. 69. f. 3.
Grew. mus. t. 9. f. 7. 8.
Barrel. rar. t. 1326. f. 37.
Lift. Conch. t. 713. f. 69. t. 715. f. 74. & t. 1056. f. 8.
Gualt. test. t. 12. f. E.
Seb. mus. 3. t. 38. f. 34-44.
Mus. Gottwald. t. 8. f. 55. a. b. & f. 63. f.
Lesser testaceoth. f. 31.
Knorr Vergn. 2. t. 8. f. 1. 5. t. 17. f. 6. & 6. t. 21. f. 2.
Regenf. Conch. 1. t. 5. f. 58. & t. 8. f. 21.
Martin. Conch. 1. t. 21. f. 188-193.
 8) *Adans. Seneg.* 1. t. 1. f. 2. *Gosson.*
Lift. Conch. t. 714. f. 72.
Bonann. recr. 3. f. 3. b.
Gualt. test. t. 12. f. F-I.
Mus. Gottwald. t. 8. f. 54. a. b. f. 55. c. d. f. 56. a. b.
 c. f. 57. a. b. f. 58. 59. 61. f. 63. a-e.
Murray testaceoth. t. 1. f. 9.
Martin. Conch. 1. t. 22. f. 202-204.
Habitat frequens in Oceano indicō, æthiopico, americano,
testa solidiore subpellucida, ad 3 pollices longa alba,
cinereo, atro, rufescente, rubro, cærulecente maculata
nebulosaque, β) magis oblonga, tota opaca, vix ultra
1½ pollicem longa, γ) lineis cinereis atrisque transversis
rida.

lignaria. II. B. testa obovata oblongiuscula transverse striata : vertice
 subumbilicato.

Lift. Conch. t. 714. f. 71.

Bonann. mus. Kirch. 3. f. 406.

Knorr Vergn. 6. t. 37. f. 4. 5.

Spengl. selt. Conch. t. 3. f. H.

Martin. Conch. 1. t. 21. f. 194. 195.

Habitat in mari siculo & adriatico, testa ampullæ sere statura,
rarius 3 pollices longa, lignifere colore, intus alba,
tenui, columella flexuosa, ut oculo ad verticem usque patet.

12. B. testa rotundata glaberrima pellucida lineis crispata :
 spira retusa. *Mus. Lud. Ulr.* 587. n. 221.*

Lift. Conch. t. 715. f. 75.

Bonann. mus. Kirch. 3. f. 403.

Valent. Abh. t. 2. f. 19.

Gualt. test. t. 13. f. FF.

Physis.

Argenv. Conch. t. 17. f. I.

Klein ostr. t. 5. f. 98.

Seb. mus. 3. t. 38. f. 46-50.

Martin. Conch. I. t. 21. f. 196-198. vign. 14. f. 274.^{1/2}

3. 6.

β) *Kaenm. Cab. Rudolst.* p. 115. n. I. t. 9. f. 5.

γ) *Stripad Bulla. Martyn univ. Conch.* I. t. II.

Habitat rario in India, γ) in Oceano australi, testa tenuissima, lineis rarius fasciis spadiceis aut nigricantibus interjectis interdum punctis.

Amplus- 13. B. testa subrotunda : spira elevata obtusa, fasciis intertra. *natis. Mus. Lud. Ulr.* 587. n. 222.*
Chemn. Conch. 10. t. 146. f. 1350. 1351.
Habitat in Alia, testa alba.

Ficus. 14. B. testa obovato-clavata reticulato-striata : cauda exserta spirae oblitterata.
Mus. Lud. Ulr. 637. n. 314. *Murex Ficus.*
Rumpf mus. t. 27. f. K. *Ficus.*
Pet. amb. aq. t. 6. f. 9.
List. Conch. t. 750. f. 46. & t. 751. f. 46. a.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 15.
Gualt. test. t. 26. f. I. M.
Argenv. Conch. t. 17. f. O.
Klein ostr. t. 5. f. 93.
Seb. mus. 3. t. 68. f. 1-6.
Mus. Gottwald. t. 10. f. 70. f. 70. a. b.
Lesser testaceoth. f. 53.
Knorr delic. t. B. II. f. 7.

Vergn. I. t. 19. f. 4. 3. t. 23. f. I. & 6. t. 27. f. 1/2

Martin. Conch. 3. t. 66. f. 733-735.

Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. f. 5.

β) *List. Conch.* t. 877. f. 1.

Mart. Conch. 3. t. 66. f. 736. 737.

γ) *Seb. mus.* 3. t. 68. f. 19. 20.

δ) *List. Conch.* t. 816. f. 27.

Klein ostr. t. 4. f. 79. b.

ε) *Schroet. Einl. in Verst.* 4. t. 10. f. 8.

Habitat in Oceano indicō & americano, testa ad 3 pollices longa, cancellatim striata exalbida, maculata, lineata aut punctata, intus albā vel cāerulecente, apertura ampla, semilunari incisura, cauda intus cava,

Rapa. 15. B. testa rotundata turbinata substriata : cauda curva, spira exquisita.

Mus. Lud. Ulr. 638. n. 315. *Murex Rapa*:
Argenv. Conch. t. 17. f. K. *Rapa*.
Rumpf mus. t. 27. f. F. *Rapa*.
Valent. Abh. t. 9. f. 82.
Pet. amb. aq. t. 9. f. 8.
Gualt. test. t. 26. f. H.
Klein ostr. t. 4. f. 80.
Seb. mus. 3. t. 38. f. 13-24. & t. 68. f. 7. 8.
Knorr delic. t. B. II. f. 8.

Vergn. I. t. 19. f. 5.

Martin. Conch. 3. t. 68. f. 747-649.

β) *Schroet. Journ.* 5. f. I.
Chemn. Conch. 10. t. 146. f. 1364-1366.
Habitat in Oceano indico, cauda sua cum ficu ad murices
 accedens, testa 2-3 pollices longa, alba aut subvires-
 cente, adultiori evidenter striata.

canalicu- 16. B. testa cylindrica : spiræ anfractibus canaliculatis.
 lata.

Mus. Lud. Ulr. 588. n. 224.*

Habitat - - - testa testacea pallido nebulosa.

conoidea. 17. B. testa oblongo-turbinata lævi basi substriata : futu-
 ris crenulatis.

Habitat - - - testa ochroleuca, glandis magnitudi-
 ne ; basi emarginata, labio obtuso, columellæ plicis
 5-6, spira conica testa dimidio breviore : anfractibus
 tenuibus imbricatis, ad marginem punctis quasi crenu-
 latis.

fontinalis. 18. B. testa ovata pellucida contraria : spira obsoleta, aper-
 tura ovato-oblonga. *Fn. suec.* 2160.* *It wgoth.* 49.
Müller verm. aq. & terr. 2. p. 167. *Planorbis testa fra-*
gili sinistrorsa : vertice obtuso, apertura ovata.
Müller Naturf. 15. p. I. &c. t. I. f. I-12.

List. Conch. t. 134. f. 34.

anim. angl. t. 2. f. 25.

Gualt. test. t. 5. f. CC.

Martin. berl. Magaz. 4. t. II. f. 61.

Geoffr. engl. p. 103. n. 10.

Schroet. Flusconch. t. 6. f. 16. a. b.

β) *Chemn. Conch.* 9. t. 103. f. 177. 178.

Habitat frequentissima in Danubii littore, Galliæ, Angliæ;

Scandinaviæ fontibus, lacubus, rivis, rario in aliis Ger-
 maniæ partibus, testa tenera, $\frac{1}{4}$ pollicem longa, fragili,

nitidissima, flavicante, interdum alba: spiræ anfractibus 3; extimo ventricoso, incola albo griseo; palliolum laciniato.

hypno-
rum.

19. B. testa ovata pellucida contraria: spira prominentia, apertura ovato-lanceolata. Fn. suec. 2159.* Chemn. Conch. 9. t. 103. f. 882. 883. a. b. c.
*Habitat in Europæ muscis humentibus, nonne varieta
b. fontinalis?*

turrita.

20. B. testa nitida: spira acuminata, apertura oblonga. Planorbis Müll. verm. fluv. & terr. 2. p. 169. n. 354. *Planorbis turritus.*

Habitat in Saxonia, Danubio, Daniæ fossis campesinibus & aquaticis, testa $\frac{1}{2}$ -6 lineas longa ovata-oblonga contraria pellucida fulva, dum limacem nigerrimum (limacem niorem griseum) tentaculorum tamen apice albo, continet, nigra, spicæ anfractibus teretibus 3-6.

gelatino-21. B. testa fragilissima sinistrorsa: spira depressa, apertura caudata.

Müll. verm. fluv. & terr. 2. p. 170. n. 355. *Planorbis gelatinus.*

Habitat rarissima in Daniæ rivis, testa $2\frac{1}{2}$ lineas longa ventricosa, fulva, diaphana, tenerrima, pluma levare; spira lata; anfractibus, praeter extimum, oblongis, limitate inhabitante griseo, testa triplo majore, quodammodo pallio crasso gelatinoso involvit.

Terebel-22. B. testa cylindrica: spira subulata basi truncata. Lud. Ulr. 564. n. 178.*

Rumpf mus. t. 30. f. S. *Terebellum.*

Pet. amb. aq. t. 13. f. 24.

Lift. Conch. t. 736. f. 30. 31.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 57.

Gualt. test. t. 23. f. O.

Argenv. Conch. t. II. f. G.

Klein ostr. t. 2. f. 48. 49.

Mus. Gottwald. t. 43. f. 53. a. b.

Lesser testaceoth. f. 33.

Knorr Vergn. 2. t. 4. f. 4. 5.

Martin. Conch. 2. t. 51. f. 568. 569.

Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. f. 3-

β) Lift. Conch. t. 737. f. 32.

Petiv. amb. t. 13. f. 24.

Chemin. Conch. 10. t. 146. t. 1362. 1363.

Habitat in Oceano indico, inter conos & bullas media, distincti forsan generis, testa angusta, ultra 2 pollices longa, interdum transverse striata, alba, frequentius luteo maculata, punctata aut nebulosa, rarius quadri-fasciata.

Cypræa.

23. testa ovata : spira oblitterata ; apice prominulo, apertura posterius magis dilatata, columella torta.

Knorr Vergn. 6. t. 4. f. 5? & t. 27. f. 6?

v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 9. f. 2?

Habitat in mari mediterraneo, testa magnitudine glandis & ultra, an vere larva cyprææ spuræ ? an cono bulbato affinis.

Virginea.

24. B. testa subturrita erecta, columella truncata sanguinea.

Mus. Lud. Ulr. 612. n. 267. Buccinum virgineum.

Müll. verm. fluv. & terr. 2. p. 143. n. 333. Buccinum. testa conico acuminata glabra : fasciis angustis diversicoloribus, apertura purpurea.

List. Conch. t. 844. f. 72.

Gualt. test. t. 45. f. D.

Petiv. gaz. t. 22. f. II.

Argenv. zoomorph. t. 10. f. G.

Spengl. selt. Conch. t. I. f. G.

Schroet. Flusconch. t. 8. f. 3. 4.

inn. Bau Conch. t. 5. f. 7.

Knorr Vergn. 6. t. 28. f. 4.

Fayann. Conch. t. 65. f. G'.

$\alpha)$ cærulescens, fasciis quinque.

List. Conch. t. 15. f. 10.

Klein ostr. t. 17. f. 116.

Pet. gaz. t. 151. f. I.

Argenv. Conch. t. II. f. N.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 66.

$\beta)$ candida, fasciis octo.

Gualt. test. t. 6. f. A.

$\gamma)$ candida, fasciis septem.

Seb. mus. 3. t. 40. f. 38.

Knorr Vergn. I. t. 30. f. 7.

$\delta)$ anfractibus contrariis.

Chemin. Conch. 10. t. 173. f. 1682. 1673.

Habitat in Asiae fluviis, rarer, testa turbinis infor-

- contorta, lœvi, nitida, alba; fasciis rubris, viridis
bus flavis, nigris fuscisque varia, ventricosa, apertus
fere semilunari, spiræ anfractibus 8 sensim decrescentibus*
- fasciata. 25. B. testa conico-acuminata: fasciis maculisque undulatis
transversis, apertura alba.*
- Müll. verm. fluv. & terr. 2. p. 145. n. 334. Buccinum
fasciatum.*
- Seb. mus. 3. t. 39. f. 64-66. 69-74.
Knorr Vergn. 5. t. 25. f. 4.
Favann. Conch. t. 65. f. G². G³. G⁴. G⁵.
Chemn. Conch. 9. t. 117. f. 1004-1006.*
- α) alba. fasciis cœruleis.*
- Seb. mus. 3. t. 39. f. 62. 63.
Argenv. Conch. I. app. t. f. G.
Martin. Berl. Mag. 3. p. 125. t. 5. f. 52.*
- β) alba, fasciis fuscis.*
- Seb. mus. 3. t. 39. f. 67.
Gualt. test. t. 6. f. D.
Argenv. Conch. t. 11. f. M.*
- γ) alba, fasciis variegatis.*
- Lift. Conch. t. 12. f. 7.
Seb. mus. 3. t. 39. f. 68.
Gualt. test. t. 6. f. C.
Klein ostr. t. 2. f. 43.
Regerif. Conch. I. t. 10. f. 46.*
- δ) fasciis tribus fulva, violacea & aurea.*
- Bonann. recr. 3. f. 379.
mus. Kircher. 3. f. 366.*
- ε) Chemn. Conch. 9. t. 117. f. 1007. 1008.
Habitat in America australi & India, virginea affinis
testa crassiuscula, magis elongata, ad 27 lineas longa,
minus lœvi & nitida, fasciis non translucentibus
columella integra facile discernenda.*
- striata. 26. B. testa conico-acuminata glabra: striis undulatis
fulvis, columella recta reflexa.*
- Müll. verm. fluv. & terr. 2. p. 148. n. 336. Buccinum
striatum.*
- Habitat - - - testa alba, ultra 2 pollices longa, apertura
pallide cœrulecente, columella perforata: spiræ
anfractibus 8.*
- striatula. 27. B. testa conica alba striata, columella recta reflexa.*
- Müll. verm. fluv. & terr. 2. p. 147. n. 335. Buccinum
striatum.*

Habitat - - - *strigatae proxine affinis*, at *testa minore*,
vix 22 lineas longa, *strigis nullis spectabili distinda.*

exarata. 28. B. *testa oblonga acuminata alba sulcata*: *apertura repanda*.
Müll. verm. fluv. & terr. 2. p. 148. n. 337. Buccinum exaratum.

Chemn. Conch. 9. t. 120. f. 1031. 1032.

Habitat rarissima - - - *testa fragili*, *pellucida*, *columella reda imperforata*, *spiræ anfractibus 6-7.*

bifasciata. 29. B. *testa subturrita erecta alba*: *fasciis ad aperturam duabus latis rubellis.*

Lift. Conch. t. 16. f. 11.

Habitat terrestris - - - *an distincta species?*

ambigua. 30. B. *testa subturrita compressiuscula subincarnata*: *fasciis, duabus remotis; altera latiore fusca*, *altera cærulea.*

Knorr Vergn. 6. t. 28. f. 4.

Habitat - - - *an hujus generis?*

Zebra. 31. B. *testa ovata acuminata*: *fasciis longitudinalibus fuscis, columella inflexa integra.*

Müll. verm. fluv. & terr. 2. p. 138. n. 331. Buccinum Zebra.

Lift. Conch. t. 9. f. 4. t. 10. f. 5. t. 11. f. 6. t. 578. f. 33. & t. 580. f. 3. 4.

Pet. gazoph. t. 44. f. 7.

Seb. mus. 3. t. 39. f. 50. 51. 54. 55. & t. 71. f. 4. 5.

Argenv. zoom. t. 11. f. L.

Klein ostr. p. 34. §. 89. s. & 90. e.

v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 10. f. 1.

Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. f. 6.

β) Knorr Vergn. 5. t. 12. f. 2.

γ) Chemn. Conch. 9. t. 103. f. 875. 876.

δ) Chemn. Conch. 9. t. 118. f. 1015. 1016.

Favann. Conch. t. 65. f. M³.

Chern. Conch. 9. t. 118. f. 1014.

Habitat ad Caput Bonæ Spei, & Tranquebariæ, terrestris, achatinæ affinis, & cum ea bullas helicibus jungens, at testa minore, ad 27 lineas longa, magis ventricosa, alba, lineis confertis undulatis varia.

achatinæ. 32. B. *testa ovata*: *apertura obovata apiceque sanguineis, columella truncata.* *Mus. Lud. Ulr. 589. n. 225.**

Column. aq. c. 8. t. 15. Buccinum exoticum.

*Müll. verm. fluv. & terr. 2. p. 140. n. 132. Buccinum
testa ovato-oblonga, fascis longitudinalibus rufo fuligineo
axi truncato canaliculato.*

Lift. Conch. t. 579. f. 34.

Bonann. recr. 3. f. 192.

Seb. mus. 3. t. 71. f. 1 - 3.

Klein ostr. p. 47. t. 3. f. 60.

Knorr delic. t. B. V. f. 1.

Vergn. 3. t. 3. f. 1. & 4. t. 24. f. 1. & 5. t. 12. f. 1.

Schroet. Flusconch. t. 6. f. 1.

β) alba, apice flavo.

Gualt. test. t. 45. f. B.

Bonann. mus. Kircher. 3. f. 190.

Argenv. Conch. I. t. 10. f. E.

Seb. mus. 3. t. 71. f. 7 - 10.

Mus. Gottwald. t. 33. f. 220.

Chemin. Conch. 9. t. 118. f. 1012. 1013.

γ) fulva vel candida, columella sanguinea.

δ) alba : fasciis crebis, columella pallida.

Argenv. Conch. I. app. t. 2. f. L.

*Habitat in Oceano americano, testa ad 8 pollices longa,
sub epidermide fusca exalbita, maculis oblongis longo-
tudinalibus undatis fuscis, spadiceis, vel carmineis
centibus varia.*

hyalina. 33. B. testa oblonga cornea : spira retusa.

Mus. Gottwald. t. 8. f. 20?

Martin. Conch. I. t. 21. f. 199.

*Habitat -- physti affinis, testa tenui, vix $\frac{1}{2}$ pollicis
longa.*

ovata. 34. B. testa subovata obtuse subbifosti dorso striata melius
gibbosa spadicea : maculis fasciisque albis intus violaceis.

Bonann. recr. & mus. Kirchr. 3. f. 261.

Martin. Conch. I. t. 22. f. 207. 208.

*Habitat rario -- B. ovo affinis, at testa levior,
magis oblonga, labroque minus dentato distincta.*

ferrugino- 35. B. testa subovata æquabili grisea dilute, fusco undulata.
nola. maculis ferrugineis fasciisque durabus albis.

Martin. Conch. I. t. 22. f. 209.

*An sui generis cochlea, quam Schroeter n. Litterat. 2. p. 221. f. NN. 011
mine describit?*

- B) Mus. Gottwald. t. 8. f. 53?*
γ) Knorr Vergn. 5. t. 28. f. 1.
Habitat --- ovata affinis, testa $1\frac{1}{2}$ pollicem longa.
36. B. testa tenuissima utrinque umbilicata alba lineis capillaribus fuscis varia: fascia nivea utrinque fuscō marginata.
Martin. neuest. Mannigf. I. p. 409. t. 1. f. 10. f. 11.
Chenn. Conch. 10. t. 146. f. 1348. 1349.
β) v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 9. f. 1.
Habitat --- testa ultra pollicem longa.
37. B. testa ovato oblonga cinereo varia intus lactea solida pellucida, apertura ampla, dorso bisulcata.
Bonann. recr. 3. f. 332.
mus. Kirch. 3. f. 330.
Klein ostr. t. 5. f. 96.
Habitat ad Brasiliam, ampulla affinis.
38. B. testa cylindrica laevi alba tenuissima.
Gualt. test. t. 15. f. 1.
Favann. Conch. t. 27. f. F⁵.
Helbl. Boehm. Abh. 4. t. 2. f. 30. 31.
Chenn. Conch. 10. t. 146. f. 1356. 1357.
β) Gualt. test. t. 15. f. 2.
Habitat --- hyalinæ affinis, testa minuta.
39. B. testa cylindrica: apertura suborbiculari infra dilatata.
List. Conch. t. 714. f. 70. b. c.
Klein ostr. t. 5. f. 99. a. b.
Habitat --- spira non conspicua.
40. B. testa laevi cylindrica olivacea; apertura effusa, columella inflexa truncata. *Chenn. Conch. 9. 117. f. 1009. 1010.*
Habitat rarer --- spiræ anfractibus 7.
41. B. testa subcylindrica turrita rufescente longitudinaliter striata maculata: suturis crenulatis, columella sinuata truncata. *Chenn. Conch. 9. t. 117. f. 1011.*
Habitat in insula S. Dominici, testa longitudinaliter sulcata, angusta, ad suturas granulata, anfractibus extimis fuscis.
42. B. testa ventricosa rugosa longitudinaliter strigosa intus purpurea; columella truncata, apertura ovata labro acuto: limbo intus nigerrimo. *Chenn. Conch. 9. t. 118. f. 1017. 1018.*

Knorr Vergn. 4. t. 14. f. 1.

Habitat in Africæ campis, oryza confitis.

Spreta. 43. B. testa ovata tenui fusca scabra.

Knorr Vergn. 2. t. 5. f. 5.

Habitat - - -

Solida. 44. B. testa solida rubra violaceo varia; margine rubro
spira prominula.

Knorr Vergn. 6. t. 21. f. 2.

Habitat - - - ampullæ affinis.

Stercus 45. B. testa ventricosa glabra cornea cinnamomea quinque
pulicium. quefariam punctata, columella sinuata, labro acutus.
Chemn. Conch. 9. t. 120. f. 1026. 1027.
Favann. cat. t. 2. f. 129.
Habitat - - - testa tenuissima ovata.

Scabra. 46. B. testa ovata scabra dorso subcarinata decussatim striata
alba, alba roseo-lineata, columella sinuosa reflexa.
Chemn. Conch. 10. p. 118. t. 146. f. 1352. 1353.
Habitat rarissima in Java.

Akera. 47. B. testa ovata pellucida: vertice truncato canaliculata.
Müll. zool. dan. 2. p. 88. t. 71. f. 1-5. *prodr. n. 24*.
Chemn. Conch. 10. t. 146. f. 1358. n. 1-3.
Habitat in mari norwegico, testa 6 lineas longa.

Soluta. 48. B. testa cylindrica cornea transversim striata: vertice
retuso, anfractibus marginatis canaliculatis. *Chemn. Conch.* 10. p. 113. t. 146. f. 1359-1361.
Habitat in Zeylon.

truncata. 49. B. testa hyalina tenui oblonga: columella incurva
truncata.

Kaemmer. Cab. Rudolst. p. 128. t. 10. f. 5.

Habitat - - - testa ultra 2 pollices longa.

carnea. 50. B. testa ovata incarnata gibba: labro arcuato incisus
fato intus dentato. *Poiret. voyag. en Barbar.* 2. p. 21.
Habitat frequens ad Africæ littor. 32

322. VOLUTA. *Animal Limax.*

Testa unilocularis, spiralis.

Apertura ecaudata, subeffusa.

Columella plicata: labio umbilicove (utplurimum) nullo.

* *apertura integra.*

Auris Mi- 1. V. testa coarctata ovali oblonga: spira rugosa; columella bidentata. *Mus. Lud. Ulr.* 589. n. 226.*
Müll. verm. fluv. & terr. 2. p. 110. n. 311. *Helix testa fusiformi granulata: apertura lanceolata, labro ad axin bidentato.*

Rumpf *muf.* t. 33. f. H. H. *Auris Midæ.*
Argenv. Conch. t. 10. f. G. *Auricula Midæ;*
Lift. Conch. t. 1058. f. 6.
Gualt. test. t. 55. f. G.
Pet. aq. amb. t. 8. f. 2.
Klein oßr. t. 7. f. 122.
Seb. muf. 3. t. 71. f. 6. 21. 22.
Knorr Vergn. 6. t. 25. f. 1.
Martin. Conch. 2. t. 43. f. 436-438.
Spengl. seit. Conch. t. 1. f. L.
 $\beta)$ *Lift. Conch.* t. 577. f. 32. b.
 $\gamma)$ *Chemn. Conch.* 10. t. 149. f. 1395. 1396.
Habitat rario in Indiæ, potissimum Ceram, paludibus silvaticis flaviisque uliginosis, hélices bullis jangens, testa nonunquam ultra 4 pollices longa fusca, solida, rugosa, vel striata, spira magna: anfractibus 6-9 singulis fascia granulata terminatis, extrenis cancellatis, apertura longa, infra ampliore.

Lammea. 2. V. testa ovali oblonga: apertura ampla, columella unidentata.
Lift. Conch. t. 814. f. 24.
Martin. Conch. 2. t. 43. f. 439.
 $\beta)$ *Lift. Conch.* t. 827. f. 49. e.
 $\gamma)$ *Lift. Conch.* t. 834. f. 60.
 $\delta)$ *Lift. Conch.* t. 834. f. 61.
Habitat --- testa magis ventricosa & breviore, quam in aure Midæ, alba: maculis virgatis perpendicularibus undatis rubris, columella flavo marginata.

M m m m m m m m

- sulcata.** 3. V. testa coarctata ovali-oblonga sulcata alba ^{fusca} punctata, columella biplicata.
Martin. Conch. 2. t. 43. f. 440. 441.
Habitat --- auri Midæ proxime affinis, at testa longæ minori, vix $\frac{1}{4}$ pollicis longa, sulco inter utramque columellæ plicam profundo.
- bifasciata.** 4. V. testa tenui transversim striata incarnata : fasciæ duabus albis, columella unidentata.
List. Conch. t. 835. f. 58.
Martin. Conch. 2. t. 43. f. 442. 443.
Habitat --- testa vix pollicem longa : apertura longæ angusta.
- flava.** 5. V. testa superius coarctata flava, labro crenulato, columella biplicata.
Martin. Conch. 2. t. 43. f. 444.
Habitat --- testa $4\frac{1}{2}$ lineas longæ, rarius spadicea fasciaque obsoleta obscura ; columellaque alba tridentata, spiræ anfractibus 7 planis.
- minuta.** 6. V. testa ovali oblonga fasciata, columella triplicata.
List. Conch. t. 834. f. 59.
Martin. Conch. 3. t. 43. f. 445.
Habitat --- testa nunc fusca : fasciis 2-6 albis, numeris alba : fasciis 4, alternatum luteis & cæsareo colore tinctis, labroque tricostato.
- pusilla.** 7. V. testa tenui fusca : spiræ anfractibus cancellatis, columella tridentata.
Gualt. test. t. 55. f. F.
Martin. Conch. 2. t. 43. f. 446.
Habitat --- auri Midæ proxime affinis, at testa minima.
- glabra.** 8. V. testa oblongo-ovali glabra : labro reflexo sulcata, columella unidentata.
Martin. Conch. 2. t. 43. f. 447. 448.
Habitat --- testa ultra $1\frac{1}{2}$ pollicem longa magis ventricosa, quam in cure Midæ, apertura quoque superiorius magis coarctata, colore albo : maculis perpendicularibus undatis flavicantibus aut spadiceis vario.
- Auris Si- leni.** 9. V. testa ovali gibba umbilicata : columellæ plica unica crassa flexuosa. *v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 9 f. 3. 4. mus. Caes. Vindob. ind. I. p. 197.*

Habitat - - - testa glabra ultra 2 pollices longa ventricosa brevi, fusca : striis longitudinalibus undulatis spadiceis, apertura ovata, spira obtusa.

Auris Ju- dæ. 10. V. testa coarctata oblonga : spira lœvi, columella tridentata. *Mus. Lud. Ulr.* 590. n. 226.*

Müll. verm. fluv. & terr. 2. p. 109. n. 310. *Helix testa cylindrica subgranulata*, apertura lanceolata ; labro ad axin tridentato.

Lift. Conch. t. 32. f. 30.

Bonann. mus. Kircher. 3. f. 412.

Martin. Conch. 2. t. 44. f. 449-451.

Schroet. Flusconch. t. 9. f. 10.

Einl. in Conch. I. p. 197. t. 1. f. 91

$\beta)$ *Gronov. zooph. t. 18. f. 12.* *Voluta Auris Judæ.*

Lift. Conch. t. 1058. f. 9.

Habitat rario in Indiæ paludibüs, auri Midæ affinis ; at testa minore, angustiore, magis oblonga, fusca aut alba maculis undatis fuscis varia, spiræ anfractibus 6, primo & extremis subtilissime cancellatis.

Auris Malchi. 11. V. testa fusiformi granulata : apertura ovata, columella excisa patentissima.

Müll. verm. fluv. & terr. 2. p. 112. n. 312. *Helix Auris Malchi.*

Chemn. Conch. 9. t. 121. f. 1037. 1038.

$\beta)$ *Chemn. Conch. 9. t. 121. f. 1039. 1040.*

$\gamma)$ *Chemn. Conch. 9. t. 121. f. 1041.*

Habitat $\beta)$ *in nova Caledonia*, testa 29 lineas longa ; sub epidermide squalide fusca, alba : spiræ anfractibus sex medio convexis constatis, apertura candida ; an hujus generis ?

tenuatilis. 12. V. testa coarctata ovata substriata : spira elevata acutiuscula, columella uniplicata.

Lift. Conch. t. 835. f. 58.

Knorr Vergn. 6. t. 19. f. 4.

Martin. Conch. 3. t. 43. f. 442. 443.

Schroet. n. Litterat. 3. t. 2. f. 12. 13.

$\beta)$ *Knorr Vergn. 6. t. 19. f. 4?*

Habitat - - - testa rubicunda : fasciis albis.

tolidula. 13. V. testa coarctata oblongo-ovata opaca striata : spira elevata acutiuscula, columella subuplicata. *Mus. Lud. Ulr.* 590. n. 228.*

Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 143?

Klein oſtr. t. 3. f. 72?

Schroet. n. Litterat. 3. t. 2. f. 14. 15.

Kaemm. Cab. Rudolſt. t. 8. f. 3.

Chenn. Conch. 10. t. 149. f. 1405.

Martin. Conch. 3. t. 43. f. 440. 441.

Habitat - - - - testa albo griseoque longitudinaliter lineata.

livida.

14. *V. testa coarctata ovato-cylindrica : spira subelevata obtusiuscula, columella quinqueplicata. Mus. Lud. Ulr. 591. n. 229.**

Gualt. test. t. 25. f. B?

β) *Gualt. test. t. 25. f. C.*

Habitat rario in Africa, ad cylindroideas accedens, testa tamen magis ventricosa, vix ultra pollicem longior, livida : fasciis transversis pallidis obsoletis distincta.

Coffea.

15. *V. testa coarctata laevi : spira obtusa, apertura utrinque dentata.*

List. Conch. t. 834. f. 59.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 255.

Fayann. Conch. t. 65. f. 47.

Chenn. Conch. 9. t. 121. f. 1043. 1044.

Martin. Conch. 2. t. 43. f. 445.

Habitat - - - strudura ad conos accedens, at apertura posterius coarctata, testa lurido-livida.

** *Cylindroideæ, s. subcylindricæ emarginatae*

*porphy-
ria.*

16. *V. testa levata : spira basi oblitterata, labro medio rotundo, columella oblique striata Mus. Lud. Ulr. 592. n. 230.**

Argenv. Conch. t. 13. f. K. Porphyria.

Bonan. recr. & mus. Kirch. 3. f. 142.

Ruppf mus. t. 39. f. I.

Gualt. test. t. 24. f. P.

Seb. mus. 3. t. 53. f. E.

Mus. Gottwald. t. 42. f. 19. a.

Knorr delic. t. B. IV. f. 4.

Vergn. I. t. 15. f. I.

Regenf. Conch. I. t. 2. f. 15.

Martin. Conch. 2. t. 47. f. 485. 486. 498.

β) *List. Conch. t. 727. f. 14.*

Argenv. Conch. t. 13. f. N.

Seb. mus. 3. t. 53. f. A-D.

Mus. Gottwald. t. 42. f. 22. a. b. c.

Knorr Vergn. 2. t. 12. f. 1. 2. & 3. t. 2. f. 3.

Martin. Conch. 2. t. 45. f. 2. b. 477.

γ) *Martin. Conch.* 2. t. 48. f. 514?

δ) *Lift. Conch.* t. 724. f. 11?

Habitat in Brasilia, ol væ proxime affinis, at testa quadruplo longiore, 5 quippe pollices longa, rubella, lineis angularibus plurimis fusca varia, laevi unius sordide flavo transversissim striato, columella subfuscata: plicis albis.

Olivae.

17. V. testa laevi: spiræ basi reflexa, columella oblique striata. *Mus. Lud. Ulr.* 593. n. 231.*

α) *Rumpf mus.* t. 39. f. 2. Cylinder.

Lift. Conch. t. 739. f. 27.

Gault. test. t. 23. f. B.

Seb. mus. 3. t. 53. f. L.

Mus. Gottwald. t. 43. f. 49. 40. a.

Knorr Vergn. 5. t. 28. f. 6.

Martin. Conch. 2. t. 45. f. 472. 473.

Chemn. Conch. 10. t. 147. f. 1367-1382.

β) *Martin. Conch.* 2. t. 47. f. 502.

γ) *Knorr Vergn.* 5. t. 27. f. 4.

δ) *Knorr Vergn.* 3. t. 17. f. 3.

Regenf. Conch. 1. t. 1. f. 2.

ε) *Martini Conch.* 2. t. 45. f. 474.

ζ) *Lift. Conch.* t. 718. f. 2.

Seb. mus. 3. t. 53. f. K.

Knorr Vergn. 1. t. 15. f. 7. & 5. t. 27. f. 5:

Martin. Conch. 2. t. 47. f. 501.

η) *Lift. Conch.* t. 740. f. 29.

Martin. Conch. 2. t. 45. f. 475. & t. 47. f. 507. 508.

η) *Martin. Conch.* 2. t. 46. f. 496.

δ) *Lift. Conch.* t. 728. f. 15.

Gault. test. t. 24. f. M.

Seb. mus. 3. t. 53. f. O.

Mus. Gottwald. t. 42. f. 19. b. c. t. 43. f. 25. a. b. d.
f. 26. 27. 31. 31. a.

Martin. Conch. 2. t. 45. f. 478. 479.

ι) *Martin. Conch.* 2. t. 46. f. 497.

*^{γ)} *Lift. Conch.* t. 739. f. 28.

Rumpf mus. t. 39. f. 3.

Martin. Conch. 2. t. 48. f. 512. 513.

λ) *Valent. Abhr.* t. 8. f. 69.

μ) *Gault. test.* t. 23. f. G.

- y) *Gualt.* test. t. 23. f. P.
 z) *Gualt.* test. t. 23. f. PP.
 o) *Gualt.* test. t. 23. f. QQ.
 n) *Martini Conch.* t. 48. f. 509. 510.
 p) *List.* Conch. t. 735. f. 25.
 Rumpf mus. t. 39. f. 4.
 Valent. Abh. t. 8. f. 68.
 Klein ostr. t. 5. f. 91. a. b.
 Argenv. Conch. t. 13. f. S.
 Mus. Gottwald. t. 43. f. 37. b. c. d. f. 34.
 Seb. mus. 3. t. 53. f. M. & a.
 Knorr Vergn. 5. t. 19. f. I. & t. 26. f. 4.
 Martin. Conch. 2. t. 45. f. 480. 481. t. 47. f. 503. 504
 & t. 51. f. 563.
 e) *Martin. Conch.* 2. t. 47. f. 499. 500.
 r) *Argenv. zoomorph.* t. 11. f. A.
 Seb. mus. 3. t. 53. f. R.
 Mus. Gottwald. t. 42. f. 6. a. f. 7. a. b. f. 15. d. e.
 Knorr Vergn. 5. t. 26. f. 3.
 Martin. Conch. 2. t. 48. f. 517.
 v) *Knorr Vergn.* 3. t. 2. f. 4.
 q) *Knorr Vergn.* 6. t. 23. f. 5.
 x) *Mus. Gottwald.* t. 43. f. 30. b. f. 35. a. b.
 +) *Mus. Gottwald.* t. 37. f. d.
 o) *Mus. Gottwald.* t. 43. f. 41. b.
 o2) *Mus. Gottwald.* t. 43. f. 42. b.
 BB) *Argenv. Conch.* t. 13. f. R.
 Martin. Conch. 2. t. 49. f. 531.
 YY) *List. Conch.* t. 732. f. 21. & t. 734. f. 23. 24.
 Gualt. test. t. 23. f. M. N.
 Seb. mus. 3. t. 53. f. Y.
 Mus. Gottwald. t. 42. f. I. d. 2. a. 13. a-d.

Infinita olivæ variatio, & maxima nonnullarum varietatum cum ifpidulis
 affinitatis dubios relinquunt, an distinctæ sint varietates, & utri speciei adjunc-
 gendæ olivæ & volutæ a Martini Conch. 2. t. 99. f. 6. 7. a *Listero Conch.*
 t. 718. f. 2. a t. 725. f. 12. t. 728. f. 16. t. 730. f. 18. t. 738. f. 33 t. 746.
 f. 40. & t. 813. f. 23. a. a *Gualtieri test.* t. 23. f. R. S. SS. V. & t. 24.
 f. B. C. D. E. F. H. I. L. ab Argenville Conch. t. 13. f. L. a *Seba mus.* 3.
 t. 53. f. F. S. T. V. b. c. d. h. m. a *Bytemeister appar.* t. 12. f. 62. *Müg.*
 Gottwaldian. t. 42. f. 5. a. b. 8. 11. 12. 14. d. 15. f. 16. a. d. c. f. 16.
 b. c. f. 20. a. b. t. 43. f. 28. a. b. c. f. 29. a. b. c. f. 30. a. b. c. f. 41.
 f. 32. f. 23. f. 35. a. b. c. d. h. k. f. 38. f. 40. d. f. 43. a. f. 44. a. f. 45.
 a. b. f. 46. 47. 48. 50. a *Knorrio Vergn.* 1. t. 15 f. 7. & 6. t. 24. f. 4.
 5. & a *Schroetero Linl.* in *Vest.* 4. t. 7. f. 3. 4. delineata; an *difinitta*; *adumbrata*.
hujus tribus species fossilis ab Argenville Conch. t. 29. f. 9. *z.* adumbrata.

- Martin. Conch. 2. t. 46. f. 487. 488.
 8) Martin. Conch. 2. t. 46. f. 489.
 9) Martin. Conch. 2. t. 46. f. 490.
 10) List. Conch. t. 739. f. 26.
 Seb. mus. 3. t. 53. f. H. I.
 Martin. Conch. 2. t. 48. f. 511. 511. 2.
 11) Argenv. Conch. t. 13. f. O.
 Martin. Conch. 2. t. 48. f. 514.
 12) Martin. Conch. 2. t. 51. f. 559.
 13) Martin. Conch. 2. t. 51. f. 562.
 14) List. Conch. t. 719. f. 3. & t. 731. f. 20.
 Runipf mus. t. 39. f. 5.
 Gualt. test. t. 23. f. F. T.
 Seba mus. 3. t. 53. f. F?
 Martin. Conch. 2. t. 48. f. 515. 516. 518. 521.
 15) Seb. mus. 3. t. 53. f. G.
Habitat infinita coloris & picturæ varietate in mari indicol.

- annulata.* 18. V. testa laevi alba ; dorsi annulo carinato.
 List. Conch. t. 717. f. I.
 Martin. Conch. 2. t. 51. f. 564.
 16) Martin. neuest. Mannigfalt. I. p. 445. t. 2. f. 21 ?.
Habitat - - - 3) rufescente undulata.

- Utriculus.* 19. V. testa elongata laevi : spira prominula.
 List. Conch. t. 723. f. 10. t. 730. f. 19 ?.
 Gualt. test. t. 24. f. G.
 Argenv. Conch. t. 13. f. M.
 Knorr Vergn. 2. t. 12. f. 4. 5.
 Martin. Conch. 2. t. 49. & 50. f. 539-542.
 17) Mus. Gottwald. t. 42. f. 9. 10. 14. a. b. c. 15. a. b.
 Martin. Conch. 2. t. 48. f. 520.
 18) Knorr Vergn. 5. t. 4. f. 4.
 Martin. Conch. 2. t. 51. f. 565. 566.
 19) List. Conch. t. 733. f. 22.
 Martin. Conch. t. 725. f. 13.
 20) List. Conch. 2. t. 50. f. 543. 544.
 Mus. Gottwald. t. 25. f. 173. b.
 Martin. Conch. 2. t. 50. f. 545-547.
 21) Martin. Conch. 2. t. 50. f. 548.
 22) List. Conch. t. 722. f. 9.
 Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 14X.
 Runipf mus. t. 39. f. 9.
 Gualt. test. t. 23. f. RR. & t. 24. f. A.

Seb. mus. 3. t. 53. f. P. Q.

*Mus. Gottwald. t. 42. f. 2. b. c. & f. 4. & t. 43. f. 5.
a. b. c. f. h. i. m.*

Knorr Vergn. 3. t. 17. f. 2. & 5. t. 18. f. 1. 2.

Martin. Conch. 2. t. 50. f. 549-554.

*Habitat in Oceano indico & æthiopico, coloris & pittoresque
varietate numerosa, forma magis elongata ab aliis
discernenda.*

hiatula. 20. *V. testa tenui : dorso cinereo maculosò subtus calloso,
apertura ampla, columella ad basin dentata.*
List. Conch. t. 729. f. 17.
Martin. Conch. 2. t. 50. f. 555.
*Habitat in mari hispanico, utriculo affinis, ore crenulato
aut fusco, rarius albo, dorso callo albo aut flavicante.*

laspidea. 21. *V. testa alba virescente fusco violaccoque punctata;
spira prominente; anfractibus basi fascia maculosa.*
List. Conch. t. 726. f. 13. a.
*Habitat in mari hispanico, testa vix pollicem longa, spiram
magis prominente, quam in congeneribus.*

nivea. 22. *V. testa nivea elongata lævi fasciata.*

Martin. Conch. 2. t. 50. f. 558.

β) Martin. Conch. 2. t. 50. f. 557.

*Habitat in mari hispanico, anfractuum primo subfuscum
aut rubello: fasciis 2 albis, β) fasciis 2 cæruleis nebulosis per totam testæ superficiem dispersis; an vere
distincta ab Utriculo & Oliva?*

Ispidula. 23. *V. testa lævi : spira prominente; margine unico
columella oblique striata. Mus. Lud. Ulr. 594. n. 232.*
Adans. Seneg. 1. t. 4. f. 7. Agarou?
Bonann. recr. 3. f. 369. "
mus. Kirch. 3. f. 363.

Barr. ic. t. 1322. f. 17.

Rumpf mus. t. 39. f. 7: 8.

Petiv. gaz. t. 59. f. 8.

Gualt. test. t. 23. f. C. D. E.

Argent. Conch. t. 13. f. Q.

Seb. mus. 3. t. 53. f. X:

*Mus. Gottwald. t. 42. f. 1. a. b. c. f. 3. a. b. c. f. b.
b. c. d. & f. 7. a. & t. 43. f. 37. e. f. 40. b. c. e. f.
f. 41. a. f. 42. a. f. 43. c. f. 44. b. & f. 45. d. f.*

- Knorr Vergn. 3. t. 19. f. 3.
 Martin. Conch. 2. t. 49. f. 522-530. & f. 532-538.
 β) Seb. mus. 3. t. 53. f. g.
 γ) Seb. mus. 3. t. 53. f. I.
 δ) Seb. mus. 3. t. 53. f. k.
 ε) Lijt. Conch. t. 720. f. 4. 5.
 Rumpf mus. t. 39. f. 6.
 Gualt. test. t. 23. f. H. I. L. Q.
 Seb. mus. 3. t. 53. f. W.
 Mus. Gottwald. t. 42. f. 5. c. & ? t. 43. f. 36.
 Knorr Vergn. 2. t. 10. f. 6. 7.
 Martin. Conch. 2. t. 46. f. 491. 492.
 η) Lijt. Conch. t. 721. f. 6. 7.
 Mus. Gottwald. t. 42. f. 5. d. & f. 15. h.
 Martin. Conch. 2. t. 46. f. 493. 494.
 Habitat varietate numerosa in India, testa pollicem, ε) 2
 longa, angusta, alba aliter atque aliter pista, intus
 obscurore aut fusca.

Carnelius, 24. V. testa aurantia : fasciis cæruleis, spira complanata
 & apertura albis.
 Martin. Conch. 2. t. 46. f. 495.
 Habitat - - - -

*** Ovatæ, s. obovatæ, effusæ, emarginatæ.

Dactylus, 25. V. testa lævi decussatim striata obtusa columella sex-
 plicata.
 Lijt. Conch. t. 813. f. 23.
 Gualt. test. t. 28. f. P.
 Seb. mus. 3. t. 53. f. S.
 Favann. Conch. t. 15 f. F'.
 Chemn. Conch. 10. t. 150. f. 1411. 1412.
 β) Gualt. test. t. 28. f. O.
 Habitat rara in India, testa $\frac{1}{2}$ pollicem longa ex albido
 & incarnato varia : labio vix crenato.

Monilis, 26. V. testa subemarginata alba : spira oblitterata slaveola ;
 columella oblique striata.
 Habitat frequens in mari mediterraneo, monili affinis,
 at minor, brevior, magis ventricosa, glaberrima,
 spire lineola sliva, interdum tota mellea.
 27. V. testa integra alba : spira oblitterata alba, columella
 oblique striata.
 Mus. Gottwald. t. 8. f. 46. c.

Martin. Conch. 2. t. 42. f. 426.

) *Adans. Seneg.* I. t. 5. f. 4. Stipon.

Martin. Conch. 2. t. 42. f. 428.

Habitat in Sina, ad armillas, monilia, coronas

bita, β) in Senegal Africae, testa vix $\frac{1}{2}$ pollicis

β) $2\frac{1}{2}$ lineas longa, labro prominente, apertura ampliata

columellæ plicis 4-5, β) 8-10 tenuissimis.

exilis.

28. V. testa obovata integra flavigeante : fasciis duas

fuscis, spira prominente, columella oblique striata

Martin. Conch. 2. t. 42. f. 427.

β) *Schroet. Einl. in Conch.* I. p. 303. t. I. f. 18.

Habitat --- testa minuta, β) alba nitida : fascia lutea

Pericula. 29. V. testa laevi : spira retuso-umbilicata, columella

templicata, labro marginato crenato.

a) testa rubro punctata.

Lift. Conch. t. 803. f. 10.

Pet. gaz. t. 8. f. 2.

Barrel. ic. t. 1326. n. 33.

Bonann. recr. 3. f. 246.

mus. Kirch. 3. f. 245.

Gualt. test. t. 28. f. C. D. E.

Mus. Gottwald. t. 8. f. 48. a. b. f. 49. a. b. c. d. f. 51.

Martin. Conch. 2. t. 42. f. 421.

β) testa rubro-lineata.

Adans. Seneg. I. t. 4. f. 4. Bobij.

Lift. Conch. t. 803. f. 9.

Pet. gaz. t. 8. f. 10.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 238. male.

Gualt. test. t. 28. f. B.

Mus. Gottwald. t. 8. f. 48. a. b. f. 49. a. b. c. d. f. 51.

Knorr Vergn. 6. t. 21. f. 6.

Martin. Conch. 2. t. 42. f. 419. 420.

γ) testa rubella albo maculata, aut unicolore alba, cærulecente.

Mus. Gottwald. t. 8. f. 46. b. 47. 51. a. 62. a. b. c.

Martin. Conch. 2. t. 42. f. 416-418.

δ) testa nigro-fasciata, spira sub prominula.

Valent. Abh. t. 9. f. 78.

Habitat in mari africano, & ad Senegaliam, testa

ultra pollicem longa.

pallida.

30. V. testa integra oblongo-ovata : spira elevata, columella

quadruplicata. *Mus. Lud.* Ulr. 538. n. 223⁺

Adans. Seneg. I. t. 5. f. 2. Falier, & f. 3. Simeri.
Lift. Conch. t. 714. f. 70.

Schroet. Einl. in Conch. I. p. 211. t. 1. f. 10. a. b.
*Habitat in Oceano africano, glabellæ affinis, at testæ
 ventre superne æquali distincta, testa elongata angusta,
 vix $\frac{1}{2}$ pollicem longa, exalbida vel cerea, interdum
 pellucida.*

31. V. testa subemarginata lœvi subuplicata : spira prominente, columella quadriplicata, labro marginato crenulato.

Adans. Seneg. I. t. 4. f. 2. Narel.

Gualt. test. t. 28. f. Q.

Mus. Gottwald. t. 25. f. 170. a-d.

Knorr Vergn. 4. t. 17. f. 6.

Martin. Conch. 2. t. 42. f. 432. 433.

Habitat paulo rario in Oceano africano, testa ad pollicem usque longa, angusta, elongata, nitida, cœna, seriatim nigro punctata.

32. V. testa integerrima lœvi : spira lœvigata, columella quadriplicata, labro gibbo marginato denticulato.

*Mus. Lud. Ulr. 574. n. 233.**

Adans. Seneg. I. t. 4. f. I. Porcelaine.

Lift. Conch. t. 818. f. 29-32.

Gualt. testac. t. 28. f. A. L.

Klein ofrac. t. 5. f. 92.

Mus. Gottwald. t. 25. f. 159. a-h. 170. e. 171. a. b.

172. a-d. 173. a.

Knorr Vergn. 4. t. 21. f. 2. 3. & 5. t. 23. f. 3.

Martin. neuest. Manigf. 4. p. 425. t. 3. f. 25-28.

Conch. 2. t. 42. f. 429-431. 434. 435.

♂) testa ochroleuca atro punctata.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 49.

♀) testa angustiore badia, labro non marginato, columella triplicata.

Bonann. recr. 3. f. 326.

♂) testa alba flavis lineis picta.

Seb. mus. 3. t. 53. f. 36.

♀) testa alba purpureo nebulosa, spiræ anfractibus marginatis.

Gronov. zooph. p. 298. n. 1318. t. 19. f. 13. 14. Voluta

Pyrum.

♂) *Chemin. Conch. 9. t. 104. f. 890. 891.*

♀) *Chemin. Conch. 10. t. 150. f. 1422.*

♂) *Chemin. Conch. 10. t. 150. f. 1423. 1424.*

*Habitat in Oceano africano & americano, teſſa
pollices longa, aut unicolo alba, cinerea, vel
fusca, aut striata, undulata, maculis virgatis,
albis, lineisve angulatis picta, spiræ anfractibus*

- Prunum. 33. V. testa integerrima lævi : spira lævigata, colum
quadriplicata, labro æquali mutico.
*Adans. Seneg. I. t. 4. f. 3. Egouen.
List. Conch. t. 817. f. 28.
Martin. Conch. 2. t. 42. f. 422. 423.
Habitat frequens ad Goream, testa ad $1\frac{1}{2}$ pollicem longa,
cærulea, cærulescente, vel ex virescenii cana.*

- reticula- 34. V. testa decussatim subfulcata : labro internc
ta. columella subperforata.
*List. Conch. t. 830. f. 52-54.
Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 52.
Argenv. Conch. t. 17. f. M.
Seb. mus. 3. t. 49. f. 53. 55.
Mus. Gottwald. t. 25. f. 165. a. b.
Knorr Vergn. 5. t. 18. f. 7?
Martin. Conch. 3. t. 121. f. 1107. 1108. 1109?
β) Seb. mus. 3. t. 49. f. 56?*
*Habitat in Oceano americano & ad Guineam, teſſa
pollices longa, pruni magnitudine albo luteoqua, aut
aut fusca, albo fasciata, rarius tota fusca, aut
inflata : fulcis obſcletis in ſectionis angulo in tubo
elevatis, apertura alba, labro transversim fulcas,
lumella plicis aliquot geminatis exarata ; cauda*

- mercato- 35. V. testa striata : spira obtusata, columella retusa
ria. tata, labro gibbo denticulato.
*Adans. Seneg. I. t. 9. f. 29. Staron.
List. Conch. t. 824. f. 43.
Pet. gaz. t. 9. f. 4.
Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 36.
Gualt. test. t. 43. f. I. L.
Mus. Gottwald. t. 16. f. 120. b-d. e.
Knorr Vergn. 4. t. 12. f. 5. & 6. t. 18. f. 3.
Martin. Conch. 2. t. 44. f. 452-453.
β) List. Conch. t. 827. f. 49. E.
γ) Knorr Vergn. 6. t. 16. f. 6.
δ) Knorr Vergn. 6. t. 16. f. 7.
ε) Knorr Vergn. 6. t. 17. f. 9?*

Habitat in mari mediterraneo, æthiopico, americano, indico, rusticæ affinis, testa $\frac{3}{4}$ pollicis circiter longa, aut unicolor alba vel flava, aut aliter aliterve maculata, nebulosa vel striata, interdum fasciata, solida, brevi : striis transversis elevatis nodulosis.

36. V. testa læviuscula : spira prominente, columella retusa denticulata, labro gibbo denticulato.

Adans. Seneg. I. t. 9. f. 28. Siger.

Lift. Conch. t. 824. f. 44. t. 825. f. 46. t. 826. f. 49.

Gualt. test. t. 43. f. E. G. H.

Bytem. app. t. II. f. 41. c.

Knorr Vergn. 6. t. 18. f. 4.

Martin. Conch. 2. t. 44. f. 469-471.

β) *Lift. Conch. t. 827. f. 49. a.*

Gualt. test. t. 43. f. C.

Martin. Conch. 2. t. 44. f. 462.

γ) *Lift. Conch. t. 826. f. 48.*

Gualt. test. t. 43. f. D.

Martin. Conch. 2. t. 44. f. 465. 466.

δ) *Martin. Conch. 2. t. 44. f. 459.*

ε) *Martin. Conch. 2. t. 44. f. 463.*

ζ) *Martin. Conch. 2. t. 44. f. 467.*

η) *Martin. Conch. 2. t. 44. f. 468.*

δ) *Lift. Conch. t. 825. f. 45.*

ι) *Lift. Conch. t. 827. f. 49. b.*

Habitat numerosa coloris, picturæ, magnitudinis varietate in mari mediterraneo, æthiopico, americano, striis testæ nullis a rusticæ discernenda, testa nunc unicolo rubra vel flava, nunc alba fusco, spadiceo, luteo, maculata, striata, nebulosa.

37. V. testa integra læviuscula basi striata : spira prominula, columella quadriplicata, labro obtusato.

Lift. Conch. t. 819. f. 35.

Gualt. test. t. 54. f. L.

Knorr Vergn. 4. t. 26. f. 5.

Martin. Conch. 4. t. 149. f. 1386. 1387.

Schroet. Einl. in Conch. I. p. 217. t. I. f. II.

β) *Gualt. test. t. 43. f. O.*

δ) *Gualt. test. t. 43. f. F?*

Chemn. Conch. 10. t. 150. f. 1417. 1418.

Habitat rario in mari mediterraneo & indicu, testa solida ex ferrugineo nigra : lineis albis longitudinalibus.

- mendica- 38. V. testa substriata : spira subgranulata , columella labro gibbo denticulato.
Lift. Conch. t. 826. f. 47.
Pet. gaz. t. II. f. 5.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 50.
Gault. test. t. 52. f. E.
Knorr Vergn. 4. t. 16. f. 3.
Martin. Conch. 2. t. 44. f. 460. 461.
Habitat in mari mediterraneo & indicō , testa atra obſculis scabra , magnitudine seninis phaseoli ventris anſibus tibus fasciis 3 flavis , spira linea unica adſcendentis anfractibus ſubnodofis.

- cancella- 39. V. testa integra plicata decuſſatim reticulata , columella triplicata ſubumbilicata productiuncula.
Syst. nat. X. I. p. 751. n. 473. *Murex scabriunculus*.
Adans. Seneg. I. t. 8. f. 16. *Bivat.*
Gault. test. t. 48. f. B. C. D. E.
v. Born mus. *Caef. Vind. test.* t. 9. f. 7. 8.
Knorr Vergn. 4. t. 5. f. 5.
Habitat in Oceano africano , & ad Senegaliam , munitione ſenticoſo affinis , ſed brevior , testa ultra pollicem , non nunquam longa , rugis longitudinalibus ſtrias transversas elevatas acutas decuſſantibus ſcabra , alba : deficiens fasciis 2 ferrugineis , spira acuta , columella brevia et caudata.

- elegans. 40. V. testa lævi alba cæruleo fasciata : apertura flava ſpira ſubobliterata , columella ſexdentata.
Lift. Conch. t. 803. f. 11 ?
Bonann. mus. Kircher. 3. f. 269.
Martin. Conch. 2. t. 42. f. 424. 425.
Habitat -- testa vix pollicem longa.

- Ovum. 41. V. testa lævi virescenti-alba multifaciata : labro valvo ſlexo , columella quadriplicata.
Knorr Vergn. 4. t. 23. f. 5. & t. 27. f. 1.
Habitat -- eleganti affinis , at testa maiore ad 2 pollices usque longa.

Huic tertiae volutarum tribui accenſendæ videntur , an diſtinctæ ſpecies ? volutæ a Listero *Conch.* t. 822. b. f. 41. b. t. 823. f. 42. t. 832. f. 56. a. *Bornanni mus.* Kircher. 3. f. 395. depicte : Quartæ autem volutæ a Lillo *Conch.* t. 577. f. 32. a. t. 814. f. 23. b. t. 821. f. 39. t. 828. f. 50. a. ſed *muf.* 3. t. 49. f. 9. 10. 13. 14. 17-20. 25-32. 35-39. 42. 44.

Margina-
ta.
Ducea.
Parcella-
na.
Conus.
Ringa.
Cornicu-
la.

VERMES TESTACEA. Voluta.

3449

42. V. spira obsoleta, lateribus incrassato-marginatis, columella quadriplicata. *v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 9. f. 5-6.*
Favann. Conch. t. 29. f. E.
Chemn. Conch. 10. t. 150. f. 1421.
Habitat --- testa nivea lævi, rarius rubella, aut flavæ fasciisque 3 obscurioribus picta; apertura lanceolata.
43. V. testa substriata: spira prominula obtusata lævi, columella quinqueplicata. *Gronov. zooph. t. 18. f. 11.*
Habitat --- testa alba productiore tumidula obsoleta longitudinaliter striata, spiræ anfractibus 5.
139. V. testa ovata alba seriatim rufescente punctata: spiræ obtusa basi emarginata, columella quinqueplicata, labro gibbo denticulato. *Chemn. Conch. 10. p. 164.*
t. 150. f. 1419. 1420.
Habitat in Oceano indico.
140. V. testa conica alba: basi sulcis transversis excavato-punctatis, anfractibus crenatis, columella sexplicata. *Chemn. Conch. 10. p. 163. t. 150. f. 1415. 1416.*
Habitat ---
- **** Fusiformies.
44. V. testa integriuscula oblonga lævi: spira prominente detrita, columella triplicata, labro introrsum subdentato.
Adans. Seneg. I. t. 9. f. 27. Bigni.
Gualt. test. 43. f. B.
Schroet. Einl. in Conch. I. p. 220. t. 1. f. 12.
Habitat in mari mediterraneo, testa nitida, luteo alboque nebulosa vix pollicem longa, spiræ mucrone scapius detrito, columellæ plicis tenuissimis, labro exterius minime marginato, in medio vere introrsum gibbo, minus tamen quam in præcedentibus.
46. V. testa subemarginata oblonga lævi cornea: spiræ longiuscula, columella quadriplicata, labro æqually mutico.
Gualt. test. t. 43. f. N?
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. f. 2.
Einl. in Conch. I. p. 221. t. 1. f. 13.
Habitat in mari mediterraneo & æthiopico, iringæ affinis; at spiræ magis elongata, labro minime dentato aut incrassato, testa utplurimum lævi, rarius subtilissime

*transversim striata, atra, ex ochraceo rufescente,
flavicante fusca, maculis virgatis undatis varia,
cornu pellucidata & pictura emulante fasciis interdilatata
& exalbidis.*

- Virgo.** 47. *V. testa integra turrita plicata transverseque striata
columella triplicata perforata.*
*Habitat -- testa pollicis longitudine sulcis circiter 10
exarata, basi reticulata: spiræ anfractibus linea 10
guinea distinctis 10 bisfasciaris; fascia inferiore alba
superiore lutea, cauda stronbi jere instar produxit.*
Spengler.
- Scabricula.** 48. *V. testa emarginata striata transversim rugosa, columella quadriplicata perforata, labro crenulato.*
*Syst. nat. X. I. p. 740 n. 412. Buccinum scabriuscum.
Rumpf mus. t. 29. f. T.*
Gault. test. t. 53. f. D. H?
Martin. Conch. 4. t. 149. f. 1388. 1389. 1391?
*Habitat frequens in India, testa aspera alba: longe
fuscis, rarius cinerea: rugis albis, ad 2 pollices longe
columellam.*
- Tuffina.** 49. *V. testa integriuscula transversim rugosa: columella quadriplicata, labro crenulato.*
Gault. test. t. 54. f. G?
*Habitat in India, scabricula sinuosa, at testa angustissima
longiore, passim incarnato-maculata, cauda ab quecumque
bilico integra, labro recurvo tuberculis rotundatis pro-
nulato.*
- nubila.** 143. *V. testa integriuscula laevi lutescente rubro nebulosa
transversim striata: labro crenulato, columella quadri-
plicata. Martin. univ. Conchol. I. t. 23.*
Habitat in Oceano australi ad insulas amicas.
- Sanguifuga.** 50. *V. testa emarginata longitudinaliter sulcata
verse striata: columella quadriplicata, labro laevi-
tate.*
*Rumpf mus. t. 29. f. V. Turricula granulata.
Lift. Conch. t. 821. f. 38.*
Pet. gaz. t. 4. f. 5.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 78.
Gault. test. t. 53. f. F.
Seb. mus. 3. t. 49. f. 11. 12. 15. 16.
Knorr Vergn. 4. t. 11. f. 4.
Regenf. Conch. 1. t. 1. f. 5.
Martin. Conch. 4. t. 148. f. 1367. 1368. 1373. 1374.
β) *Adans. Seneg. 1. t. 9. f. 35? Genot.*

Habitat rario in mari mediterraneo & indico, testa $1\frac{1}{2}$ pollicem longa, in confluxu sulcorum cum striis nodulosa, sulcis rubris aut fasciis tenuibus alternatim albis fascisque pictis: spira acuta: anfractibus fascia ut plurimum duplici ex punctis sanguineis conflata exornatis.

51. V. testa emarginata tereti laevi: spirae anfractibus pliato-striatis, columella subquadruplicata. *Mus. Lud. Ulr. 595. n. 234.**

Gualt. test. t. 53. f. E.

Seb. mus. 3. t. 49. f. 21. 22. 41.

Knorr Vergn. 5. t. 19. f. 4.

Martin. Conch. 4. t. 148. f. 1369. 1370.

- β) *Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 74.*

- γ) *Knorr Vergn. 5. t. 19. f. 5.*

Habitat rario in mari atlatico, testa $2\frac{1}{2}$ pollices longa, acuta, atra, violacea, vel flava albido-fasciata, obsoletius vel evidentius plicata.

52. V. testa subemarginata tereti laevi, columella triplicata.

Habitat --- caffrae simillima, at testa duplo crassiore, fusca: ventre subtus linea alba unica cincta, spira non striata, columellae plicis tantum 3, usque parvis distincta. Spengler.

53. V. testa turrita punctorum rubrorum scribus transversis picta: spira acuminata laevi.

Martin. Conch. 4. t. 157. f. 1493. 1494.

Habitat --- testa vix pollicem longa alba, vel ex luteo fusca.

54. V. testa emarginata subangulata inermi transversim striata: columella quadriplicata, fauce striata. *Mus. Lud. Ulr. 595. n. 235.**

Rumpf mus. t. 29. f. R. Turricula.

Pet. gaz. t. 56. f. I.

Gualt. test. t. 54. f. B. C.

Seb. mus. 3. t. 49. f. 33. 34.

Knorr Vergn. 3. t. 15. f. 2. & 5. t. 16. f. 3.

- β) *Martin. Conch. 4. t. 148. f. 1266.*

Checkered Mitre. *Martyn univ. Conch. I. t. 19.*

Habitat in India, testa vix $\frac{1}{2}$ pollices longa angusta, elongata, costata, rufa vel flava: fasciis interdumi obscurioribus, labro fuscō maculato, columella alba: media macula fusca.

- plicaria. 55. V. testa emarginata angulata : angulis anterioribus spinosis, columella quadriplicata, labro laevi. Lud. Ulr. 596. n. 236.*
Rumpf mus. t. 29. f. S. Turricula plicata.
Lift. Conch. t. 820. f. 37.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 64. 65.
Gualt. test. t. 54. f. D. E. F.
Argenr. Conch. t. 9. f. Q.
Klein ostrac. t. 5. f. 87.
Seb. mus. 3. t. 49. f. 23. 24.
Knorr Vergn. 1. t. 15. f. 5. 6. 3. t. 27. f. 4. & 6. t. 12. f. 11.
Martin. Conch. 4. t. 148. f. 1362-1365.
- β) *Chemin. Conch. 10. t. 151. f. 1444. 1445.*
Habitat in Oceano iudico, testa ultra 2 pollices longa, nunc crassiori nunc tenuiori, angusta, elongata, acuminata, transversim striata, intus cærulea albo fasciata, aut alterius fasciis alterius coloris picta, extrinsecus alba, sive striisque circularibus rubris, violaceis, cinereis aut virens picta, apice utroque rubro, cæruleo, aut cinereo.
- bullata. 129. V. testa cylindrica glaberrima rufescente : cingulis lividis, spita obtusa, columella infra quadriplicata, apertura effusa. *Chemin. Conch. 10. p. 159. t. 159. f. 1409. 1410.*
Mart. Conch. 2. t. 42. f. 424. 425.
Lift. Conch. t. 803. f. 11?
Knorr Vergn. 4. t. 23. f. 1. & t. 27. f. 1.
Bonann. mus. Kirch. 3. f. 269.
Born mus. Caes. Vind. test. p. 218. ind. p. 206.
Habitat in Oceano indico.
- crenulata. 130. V. testa cylindrica decussatim striata imprepresso punctis alba lutescente nebulosa : labro anfractibusque punctis crenulatis nodulosis, columella octoplicata. *Conch. 10. p. 162. t. 150. f. 1413. 1414.*
Habitat in Oceano indico.
- scutulata. 131. V. testa turrita atra alba maculata transversim annulata anfractu primo subventricoso, columella quadriplicata. *Chemin. Conch. 10. p. 168. t. 151. f. 1413. 1414.*
Habitat in Oceano indico.
- nigra. 132. V. testa turrita emarginata nigricante : planiusculis, columella quadriplicata. *Chem. Conch. 10. p. 168. t. 151. f. 1430. 1431.*
Habitat ad Guineaæ, Indiae, Groenlandia litteris.

lubdivisa. 133. V. testa turrita emarginata longitudinaliter costata pli-
cata subtilissime transversim striata, columella triplicata.
Chenn. Conch. 10. p. 171. t. 151. f. 1434-1437.
Habitat in Oceano indico.

crocentata. 134. V. testa turrita emarginata fasciata transversim striata :
costis longitudinalibus nodosis sanguineo-maculatis, co-
lumella triplicata. *Chenn. Conch.* 10. p. 171. t. 151.
f. 1438. 1439.
Habitat in Oceano indico.

exasperata. 135. V. testa turrita emarginata granulosa, decussatim striata;
longitudinaliter collata fuscescenti fasciata; columella
quinqueplicata. *Chenn. Conch.* 10. p. 172. t. 151. f.
1440. 1441.

β) *Mari. univ. Conchol.* 1. t. 21.
Habitat in Oceano indico.

granulosa. 136. V. testa turrita emarginata transversim striata longitudi-
nraliter sulcata, elevata punctata rubetcente lineata
apice basique nigricante, columella triplicata. *Chenn.*
Conch. 10. p. 173. t. 151. f. 1442. 1443.
Habitat in Oceano indico.

137. V. testa turrita lœvi brunnea albo fasciata : columella
sexplicata basi emarginata. *Chenn. Conch.* 10. p. 174.
vign. 20. f. C. D.
Martyn Conchol. 1. f. 20.
Habitat ad Amboinæ littus septentrionale.

136. V. testa turrita spadicea : fasciis flexuosis albis, colu-
mellæ plicis obsoletis.
Martin. Conch. 4. t. 148. f. 1371. 1372.
Walch Naturf. 4. t. 1. f. 3. 4.
Habitat - - - testa 2 pollices longa.

maculosa. 137. V. testa turrita alba : fasciis fuscis reticulatis & maculatis.
Martin. Conch. 4. t. 149. f. 1377.
Habitat - - - testa pollicem circiter longa.

nodulosæ. 138. V. testa turrita fusca cancellata : sectionum angulis
nodulosis albo obumbratis, columella quadriplicata:
Gual. test. t. 52. f. F. G.
β) *Martin. Conch.* 4. t. 149. f. 1385.
Martin. Conch. 4. t. 149. f. 1390.
Habitat - - -

- spadicea.* 59. V. testa turrata spadicea luteo nebulosa maculataque spiræ anfractibus octo longitudinaliter plicatis & transverse striatis , columella quinqueplicata.
Martin. Conch. 4. t. 150. f. 1392.
Habitat - - -
- aurantia.* 60. V. testa turrata aurantia : spiræ anfractibus quatuor primis fascia alba , labro denticulato , columella quadruplicata.
Martin. Conch. 4. t. 150. f. 1393. 1394.
Habitat - - -
- decussata.* 61. V. testa flava turrata decussatim striata : striis longitudinalibus undulatis , columella subquadriplicata.
Martin. Conch. 4. t. 150. f. 1395.
Habitat - - -
- polygona.* 62. V. testa turrata punctata : anfractibus longitudinalibus costatis & transversim subtiliter striatis : primis trilobitis angulatis , labro sulcato , columella subumbilicata subquinqueplicata.
Martin. Conch. 4. t. 150. f. 1401. 1402.
Habitat - - - testa valde elongata & angusta alba fuligineo nigroque obumbrata , spiræ anfractibus 10.
- acumina-* 63. V. testa turrata cancellata : cauda brevi cancellata columella quadriplicata.
Martin. Conch. 4. t. 150. f. 1403. 1404.
Habitat Tranquebariae , testa valde elongata lutea vel violacea : fascia nonnunquam alba : apice spiræ valde acuto.
- biplicata.* 64. V. testa turrata lævi alba maculis flavis punctis nigris varia , labro acuto , columella biplicata.
Martin. Conch. 4. t. 149. f. 1375.
Habitat - - -
- Turricu-* 65. V. testa turrata : columella biplicata , anfractibus regularibus fascia punctorum nigrorum pictis ; anfractibus primo duplice.
Martin. Conch. 4. t. 149. f. 1376.
Habitat - - -
- lineata.* 66. V. testa turrata : lineis perpendicularibus nigris fasciatis albam decussantibus , columella subtriplicata.
Martin. Conch. 4. t. 149. f. 1378. 1379.
Habitat - - - minuta.

- Discors.*
67. V. testa turrita infra fusca albo-punctata supra alba maculis perpendicularibus virgatis undatis flavis varia.
Martin. Conch. 4. t. 150. f. 1400.
- 68) *Martin. Conch. 4. t. 150. f. 1405.*
Habitat - - - testa minuta, subitus ventricosa; 6) magis acuminata, cana: striis ferrugineis longitudinalibus.
- Striata.*
68. V. testa turrita subtiliter transversim striata obscura rubro punctata: fasciis duabus dilutioribus.
Martin. Conch. 4. t. 150. f. 1406.
Habitat - - - minuta.
- Fulcata.*
69. V. testa turrita longitudinaliter fulcata fusca: fascia transversa alba nodulosa, columella quadridentata.
Martin. Conch. 4. t. 150. f. 1407.
Habitat - - -
- Lævigata.*
70. V. testa turrita lævi fusca: aperturæ limbo spiræque fascia dilutioribus.
Martin. Conch. 4. t. 150. f. 1408.
Habitat - - - testa angusta, parva.
- Ocellata.*
71. V. testa turrita spadicea: ocellis albis.
Martin. Conch. 4. t. 150. f. 1409.
Habitat - - - lævigata angustior, minuta.
- Aasuta.*
72. V. testa turrita rubra: punctis nigris seriatis, labro prominente, cauda reflexa.
Martin. Conch. 4. t. 150. f. 1410.
Habitat - - -
- Marmorea.*
73. V. testa turrita albo-fuscoque varia, labro inflexo.
Martin. Conch. 4. t. 150. f. 1411.
Habitat - - -
- barbadensis.*
74. V. testa turrita rufuscente subtiliter transversim striata: apertura oblongo-ovali, spira obtusata.
Lift. Conch. t. 819. f. 33.
Habitat in Oceano americano, testa vix 1½ pollicem longa.
- clathrata.*
75. V. testa turrita cancellata: spira obtusata, labro marginato, cauda reflexa.
Lift. Conch. t. 819. f. 34.
Habitat in Oceano americano.

- tricolor. 79. V. testa turrata gibba flava : anfractibus singulis fasciis alba nigro tessellata , columella triplicata.
Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 37.
Habitat - - - testa caudata : spiræ apice obtuso.
- turrata. 77. V. testa turrata brunnea lineis undulatis fuscis variis plicis horizontalibus obsoletis subnodosis , apertura fissa , columella triplicata.
Mari'n. Conch. 4. t. 141. f. 1317. 1318.
Lift. Conch. 1. 836. f. 62?
Habitat - - - cauda prominula.
- syracusa. 78. V. testa turrata lœvi alba : maculis virgatis undulatis na. perpendicularibus ex nigro flavis.
Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 40.
Habitat in Syracusano littore , testa angustiore & magis elongata , quam surritæ.
- nitens. 79. V. testa turrata glaberrima spadicea intus alba , columella quadriplicata.
Bonann. recr. 3. f. 322.
mus. Kirch. 3. f. 323.
Habitat - - - testa paulisper ventricosa.
- citrina. 80. V. testa turrata citrina , fasciis rufis.
Valent. Abb. 2. t. 2. f. 12.
Habitat - - - testa 2½ pollices longa.
- mucrona-81. V. testa turrata dilute fusca longitudinaliter striata : spira perforata , columella perforata quadriplicata.
Gualt. test. t. 52. f. M.
Habitat - - -
- rugosa. 82. V. testa turrata subventricosa longitudinaliter rugosa transversim striata exalbida piceo lineata.
Gualt. test. t. 54. f. A.
Habitat - - - spiræ apice acuto costato , labro marginato.
- strigosa. 83. V. testa turrata cinerea rubro striata : spira glaberrima anfractibus tumidiusculis.
Argenv. Conch. t. 9. f. V.
Habitat - - -

- fossilis.* 84. V. testa turrata glaberrima, columella quinqueplicata
Argent. Conch. t. 29. f. 6. b.
Habitat - - - *haecenus modo fossilis reperta.*
- leucosticta,* 85. V. testa turrata tenui glabra fusca: lineis punctorum
 alborum cincta.
Knorr Vergn. 2. t. 3. f. 7.
- β)* Knitted Mitre. *Mart. univ. Conch.* 1. t. 22.
Habitat β) ad insulas amicas.
- Clathrus.* 86. V. testa turrata exalbida cancellata: anfractibus fascia
 macularum flavarum.
Knorr Vergn. 3. t. 27. f. 3.
Habitat - - -
- virgata,* 87. V. testa turrata transversim costata, fascia transversa
 maculisque longitudinalibus undatis fulcis varia.
Knorr Vergn. 4. t. 11. f. 2.
Habitat - - - *testa crassa 2 pollices longa: apertura alba, costis squamatis.*
- leucostoma,* 88. V. testa turrata cancellata spadiceo alboque varia: ma-
 culis undatis fuscis, apertura ochroleuca.
Knorr Vergn. 4. t. 11. f. 3.
Habitat - - -
- variegata.* 89. V. testa turrata transversim striata flava: fascia macu-
 lisque fuscis, pluribusque minoribus albis.
Knorr Vergn. 5. t. 18. f. 6.
Habitat - - -
- filatis,* 122. V. testa emarginata subturrita tereti decussatim striata
 succincta filis rubris, columella triplicata. *Mant.* 2. p.
 548.
Habitat - - - *testa pallida, fusiformi longitudine exti-
 tum pollicis, fauce alba labii simplicibus, anfractibus
 3 queſi filis rubris moniliformibus, infimo 12 cinctis.*
- Volva,* 126. V. testa cylindrica albida glabra: spira protensa obtusa
 basi emarginata, apertura effusa, columella quadriplicata.
Chemn. Conch. 10. p. 143. t. 148. f. 133q. 1390.
Habitat ad Guineæ littus, ultra 2 pollices longa testa.
- Ziervoye-* 127. V. testa ovata badia longitudinaliter ingosa, infra trans-
 versim sulcata: spira obinata ad futuram crenata, colu-
 mella quadriplicata, labro denticulato. *Chemn. Conch.*
 10. p. 156. t. 149. f. 1406.
Habitat - - -

- Rhinoce- 128. V. testa ovata-trigona rugosa, nodosa transversim / ros. sulcata umbilicata: anfractibus muricato-nodosis columella triplicata, labro dentato, fauce striata. *Chemn. Conch.* 10. p. 157. t. 150. f. 1407. 1408.
Habitat ad novæ Guineæ littora.
- costa. 90. V. testa turrita alba: spira striis subtilissimis transversis costisque rotundatis; anfractu primo fasciis tribus fuscis, columella quadriplicata. *Schroet. Einl. in Conch.* 1. p. 302. t. 1. f. 17.
Habitat -- cauda subreflexa: striis sex obliquis.
- spuria. 91. V. testa ovata alba: spira fusco maculata; anfractu primo fasciis sex fuscis, cauda emarginata, labro impresso, columella sexplicata. *Schroet. Einl. in Conch.* 1. p. 302. t. 1. f. 16.
Habitat -- anfractibus punctis nigris seriatis piatis.
- pertusa. 92. V. testa emarginata striata punctis pertusis, labro dentato, columella quinqueplicata. *Mus. Lud.* 596. n. 237.*
List. Conch. t. 822. f. 40.
Seb. mus. 3. t. 50. f. 28. 47-49.
Gualt. test. t. 54. f. H.
Knorr Vergn. 2. t. 3. f. 5.
Martin. Conch. 4. t. 147. f. 1361.
 $\beta)$ *Knorr Vergn. 2. t. 4. f. 6.*
 $\gamma)$ *Favann. Conch. t. 31. f. D³.*
Chemn. Conch. 10. t. 151. f. 1432. 1433.
Habitat rario in India, testa 3 pollices longa, angustissima fusca striis obscurioribus longitudinalibus & elevatis transversis, quibus granula planiuscula insident.
- Cardina- 93. V. testa emarginata transversim striata alba; maculosa lis. spadiceis utplurimum tessellatis seriatis, columella quinqueplicata. *List. Conch.* t. 838. f. 65.
Gualt. test. t. 53. f. G. 2.
Seb. mus. 3. t. 50. f. 50. 51, & t. 51. f. 6. 7.
Knorr Vergn. 4. t. 28. f. 3.
v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 9. f. 11, 12.
Martin. Conch. 4. t. 147. f. 1358. 1359.
Habitat in Oceano indico, pertusæ affinis, at testa magis ventricosa & obtusa.

94. V. testa emarginata lœvi : anfractuum margine integro, labro denticulato, columella quadriplicata. *Mus,*
Lud. Ulr. 598. n. 237.*
Rumpf mus. t. 29. f. K. *Mitra episcopi.*
List. Conch. t. 839. f. 66.
Bonann. recr. & mus. *Kircher.* 3. f. 120.
Gualt. test. t. 53. f. G. 1.
Argenv. Conch. t. 9. f. C. *Mitra.*
Seb. mus. 3. t. 51. f. 8-19.
Bytem. app. t. II. f. 47.
Knorr delic. t. B. III. f. 3.
Knorr Vergn. I. t. 6. f. 2.
Regenf. Conch. I. t. 3. f. 33.
Martin. Conch. 4. t. 147. f. 1360. 1360^a.
Habitat in India, instrumento venenato, ut perhibent,
tangentem & carnes edentem lœders, testa ab incolis
insulæ australis Tenna manubrio firmata securis loco
adhibita, angusta, 5 pollices longa, sub epidernide
sordide flava alba maculisque rubris, rarius flavis,
ut plurimum quadratis, interdum confluentibus varia;
spiræ anfractibus 2 primis glabris, reliquis subtiliter
transversim striatis.

95. V. testa emarginata transversim striata : anfractuum
margine labroque denticulatis, columella quatripli-
cata.
List. Conch. t. 839. f. 67. *Buccinum dentatum.*
Bonann. recr. & mus. *Kircher.* 3. f. 119. *Turbo Thiara.*
Rumpf mus. t. 29. f. I. *Mitra papalis.*
Argenv. Conch. t. 9. f. E. *Thiara.*
Gualt. test. t. 53. f. I. I.
Seb. mus. 3. t. 51. f. I-5.
Knorr Vergn. I. t. 6. f. I.
Regenf. Conch. I. t. I. f. I.
Martin. Conch. 4. t. 147. f. 1353. 1354.
List. Conch. t. 840. f. 68.
Valent. Adh. t. 5. f. 45.
Gualt. test. t. 53. f. I. 2.
Seb. mus. 3. t. 51. f. 37.
Knorr Vergn. 4. t. 28. f. 2.
Martin. Conch. 4. t. 147. f. 1355. 1356.
^{γ)} *Seb. mus.* 3. t. 50. f. 29. 30?
^{δ)} *Kaemm. Cab.* *Rudolst.* p. 145. n. 5. t. 9. f. 8.
Habitat rario in Oceano indico, potissimum ad Ceram
ex moluccis insulis, episcopali & qualis & affinis, maculis

*sæpius confluentibus, spiræ anfractibus exterioribus
raminalis pertusis.*

patriarchalis. 138. V- testa obovata solida transversim striata albida & rufescens striata, noduloso plicata ; columella coronata, anfractibus tuberculis coronatis. *Conch. 10. p. 166. t. 150. f. 1425. 1426.*

β) *Chemin. Conch. 10. p. 167. t. 150. f. 1427.*
Habitat in Oceano indico.

musica. 96. V. testa marginata : anfractibus spinis obtusis, columnæ octoplicata, labro lævi crassissimo. *Mus. Lud. Ul. n. 239.**

Argenv. Conch. t. 14. f. F. Papyrus musica.

Lift. Conch. t. 805. f. 14. & t. 806. f. 15.

Bonann. recr. 3. f. 296-298.

muf. Kircher. 3. f. 297-299.

Gualt. test. t. 28. f. x. Z. z.

Olear. muf. t. 30. f. 4. 7.

Lochner muf. Bester t. 21. f. 7.

Bytem. app. t. 8. f. 48.

*Mus. Gottwald. t. 16. f. 115. a. b. c. 117. a.
d. 118. a. b. 119. b-f.*

Seb. muf. 3. t. 57. f. 7-21-22?

*Knorr Vergn. I. t. 23. f. I. 2. t. 15. f. 4.
t. 12. f. I. & 6. t. 23. f. I.*

Murray testaceol. t. I. f. 17.

Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. f. 2.

Spengl. selt. Conch. t. 2. f. G.

Martin. Conch. 3. t. 96. f. 926-933.

β) *Lift. Conch. t. 812. f. 21?*

γ) *Lift. Conch. t. 812 f. 22.*

δ) *Chemin. Conch. 10. t. 149. f. 1403. 1404.*

ε) *Chemin. Conch. 10. t. 149. f. 1401. 1402.*

Knorr Vergn. 3. t. 12. f. I.

Habitat in Oceano americano, testa pluribus fasciis usque versis ex lineis fasciis parallelis, interstitiis punctis usque constatis, notas musicas quodammodo referentibus punctisque spadiceis varia,) nunc magis elongata & angusta, nunc acutioribus & longioribus, nunc brevioribus & rotundata obtusis, columellæ plicis interdum 9-12.

- Vespertili, 97. V. testa emarginata : anfractibus spinis acutis, columella quadruplicata , labio laevi. *Mus. Lud. Ulr.* 598, n. 240. ;
Rondel. test. 78. *Murex caracoides arabica.*
Rumpf mus. t. 32. f. H. Vespertilio.
Lift. Conch. t. 807. f. 16. & t. 808. f. 17.
Bonann. recr. 3. f. 294. 305.
mus. Kircher. 3. f. 295. 306.
Valent. Abb. t. I. f. I. & t. 7. f. 62.
Gualt. test. t. 28. f. F. G. I. M. V.
Klein ostr. t. 5. f. 89.
Mus. Gottwald. t. 17. f. 121. a. b. c. f. 122. a. b.
c. & f. 123. a. b.
Seb. mus. 3. t. 57. f. 4. 5. & t. 67.
Knorr delic. t. B. VI. f. 5.
Vergn. I. t. 22. f. 3. & 2. t. 6. f. 4.
Martin. Conch. 3. t. 97. & 98. f. 936-940.
) Gualt. test. t. 28. f. T?
) Valent. Abb. t. 7. f. 63?
Naturf. 19. t. I. f. 3. 3a.
) Spengl. selt. Conch. t. 2. f. AA.
Martin. Conch. 3. t. 97. f. 934. 935.
) Chemn. Conch. 9. t. 104. f. 888. 889.
) Chemn. Conch. 10. t. 149. f. 1397. 1398.
Chemn. Conch. 10. t. 149. f. 1399. 1400.
Habitat in mari indico , testa 3-6 pollices longa alba , vel lutescente , vel subfulva lineis angularibus maculisque spadiceis fusco-varia , nunc produciore , nunc magis ventricosa , spinis nunc longioribus & acutioribus , nunc brevioribus & magis obtusis.

rabica. 144. V. testa emarginata : anfractibus tuberculatis characteribus nigris pictis , columella quadriplicata. *Martyn univ. Conch.* 2. t. 52.
Habitat ad novam Seelandiam.

- hebræa. 98. V. testa emarginata : anfractibus spinis subacutis , columella plicis quinque validioribus tribusque obsoletis.
Argenv. Conch. t. 14. f. D. *Lignum venosum.*
Lift. Conch. t. 809. f. 18.
Bonann. recr. 3. f. 293.
mus. Kircher. 3. f. 292.
Gualt. test. t. 28. f. Z. I.
Olear. mus. t. 30. f. 5. 6.
Mus. Gottwald. t. 16. f. 115. c. 119. a.

Seb. mus. 3. t. 57. f. 1. 2. 3. 6.

Knorr Vergn. 1. t. 24. f. 1. 2. & 6. t. 15. f. 1.

Martin. Conch. 3. t. 96. f. 924. 925.

Habitat sat pretiosa in India & ad Jamaicam, testa ad pollices longa, lineis spadiceis transversis non raro longitudinales, interdum undulatas, decussantibus varia.

Turbinel- 99. V. testa integriuscula turbinata : spinis conicis eructiisculis ; superioribus majoribus, columella quadruplicata.

Mus. Lud. Ulr. 634. n. 307.* *Murex Turbinellus.*

Rumpf mus. t. 24. f. B. *Verrucosa secunda.*

List. Conch. t. 811. f. 20.

Bonann. recr. 3. f. 373.

mus. Kircher. 3. f. 367.

Gualt. test. t. 26. f. L.

Argenv. Conch. t. 14. f. P.

Seb. mus. 3. t. 49. f. 76. 77. & t. 60. f. 8.

Mus. Gottwald. t. 12. f. 79. a. b.

Knorr Vergn. 2. t. 2. f. 3. & t. 13. f. 2. 3.

Regenf. Conch. 1. t. 2. f. 18.

Martin. Conch. 3. t. 99. f. 944.

Habitat paulo rario in Oceano indico ad Amboniam & Nusaanam, testa brevi 3 circiter pollices longi alba, extrinsecus fusco fasciata.

Capitel- 100. V. testa ovata rugosa nodosa, columella triplicata.

Mus. Lud. Ulr. 633. n. 306.* *Murex Capitellum.*

List. Conch. 1. 810. f. 19.

Bonann. recr. 3. f. 270.

mus. Kirch. 3. f. 272.

Gualt. test. t. 37. f. A.

Argenv. Conch. t. 15. f. K.

Knorr Vergn. 6. t. 20. f. 6. & t. 35. f. 2.

Martin. Conch. 3. t. 99. f. 947. 948.

β) *Martin. Conch.* 3. t. 99. f. 949. 950.

Knorr Vergn. 6. t. 35. f. 4.

Habitat in Oceano indico & americano, murici truncatis affinis, testa crassa, 2½ pollices longa alba, interdum fusco fasciata, decussatim costata.

cerami- 101. V. testa ovata acuta : spinis divergentibus, columella subquinqueplicata.

Mus. Lud. Ulr. 634. n. 286.* *Murex ceramicus.*

Rumpf mus. t. 24. f. A. & t. 49. f. L. *Verrucosa ceramica.*

List. Conch. t. 829. f. 51.

- Bonann. *recre.* 3. *f.* 286.
muf. Kirch. 3. *f.* 287.
Gualt. *test.* t. 55. *f.* D.
Argenv. *Conch.* t. 15. *f.* E.
Lesser testaceoth. *f.* 76.
Knorr Vergn. 2. *t.* 2. *f.* 2.
Martin. *Conch.* 3. *t.* 99. *f.* 943.
 $\beta)$ Knorr *Vergn.* 5. *t.* 23. *f.* 2. & 6. *t.* 20. *f.* 6.
Chern. *Conch.* 10. *t.* 148. *f.* 1383. 1384.
Habitat rario ad Coromandel & insulam Ceram, turbi-
 nello affinis, testa alba lineis maculisque fuscis varia,
 crassa, spinis in anfractibus extimus in tubercula abeun-
 tibus.
- lyum.* 102. V. testa obovata subcaudata: spiræ anfractibus striatis;
 apice producto glaberrimo, columella triplicata.
Lift. *Conch.* t. 815. *f.* 25.
Bonann. *recre.* & *muf.* *Kircher* 3. *f.* 194.
Gualt. *test.* t. 46. *f.* C.
Muf. *Gottwald.* t. 33. *f.* 221. a. *f.* 222. b. & t. 34. *f.* 221. a.
Knorr Vergn. 6. *f.* 39. *f.* I.
 $\beta)$ *Martin.* *Conch.* 3. *t.* 95. *f.* 916. 917.
Lift. *Conch.* t. 816. *f.* 26.
Rumpf muf. t. 36. *f.* 7?
Klein. *ostrac.* t. 4. *f.* 79^a?
Knorr Vergn. 6. *t.* 27. *f.* 2.
 $\gamma)$ *Martin.* *Conch.* 3. *t.* 95. *f.* 918. 919.
 $\delta)$ *Chern.* *Conch.* 9. *t.* 104. *f.* 884. 885.
 $\gamma)$ *Chern.* *Conch.* 9. *t.* 104. *f.* 886. 887.
Habitat ad Tranquebar & insulam Zeylon, testa ultra
 7 pollices longa, transversim undulata, pallida, ma-
 culis minutis parallelogramnis seriatis varia, apice
 cylindrico, basi angulato glaberrimo obtuso, cauda ex-
 serta patula integra.
- lapponica.* 103. V. testa obovata laevi: spira acuminata, ventre dilata-
 to.
Rumpf muf. 3. *t.* 37. *f.* 3. *Murex lapponicus.*
Seb. *muf.* 3. *t.* 57. *f.* 25. 26:
Knorr Vergn. 6. *t.* 11. *f.* 2.
 $\beta)$ *Martin.* *Conch.* 3. *t.* 89. *f.* 872. 873. & *t.* 95. *f.* 920. 921.
 $\gamma)$ *Rumpf muf.* *t.* 37. *f.* 4.
Bonann. *muf.* *Kirch.* 3. *f.* 395.
Habitat rario in Oceano indico & americano, testa ochro-
 leuca fuscopunctata aut lineata, rarius undulata, co-
 lumella quinqueplicata.

- Vexillum*. 104. V. testa ventricosa flavicante aurantio striata : anfractibus primo reliquis triplo majore tuberculato.
Rumpf mus. t. 37. f. 2.
Argenv. zoœmorph. t. 11. f. G.
Knorr Vergn. 5. t. 1. f. 1.
Spengl. selt. Conch. t. 1. f. FF.
Martin. Conch. 3. t. 120. f. 1098.
Favan. Conch. t. 33. f. O¹.
Kaemmer. Rudolſt. Cab. t. 8. f. 1. 6.
Chemn. Conch. 10. vign. 20. f. A. B.
Habitat rarissima in Oceano indico.

- flavicans*. 105. V. testa pyriformi lævi flavicante nebulosa : spiræ myculis spadiceis varia, columella quadriplicata.
Seb. mus. 3. t. 67. f. a. b.
Martin. Conch. 3. t. 95. f. 922. 923.
Habitat rarissima.

- tupestris*. 106. V. testa elongata costata : costis lineas transversas fimbriiles decussantibus, labro marginato, columella numerically plicata, spiræ apice papillari.
Martin. Conch. 3. t. 98. f. 941. 942.
Habitat - - - testa ad 4 fere pollices longa, flavescentia subfuscō undulata.

- Nassa*. 107. V. testa ventricosa : spira costata ; costis strias transversas fimbriiles subtile decussantibus, labro marginato, columella numerically triplicata umbilicata.
Seb. mus. 3. t. 53. f. 42.
Knorr Vergn. 4. t. 26. f. 6.
Martin. Conch. 4. t. 124. 125. f. 1172. 1173.
Habitat ad insulam S. Mauritii & Guineam, testa nullum pollicem longa subfuscā : lineis teneris albī.

- eraticula*-108. V. testa turrita transversim striata alba : costis longitudinalibus spadiceis, labro denticulato striato, columella triplicata.
Lift. Conch. t. 919. f. 13. & t. 967. f. 22.
Seb. mus. 3. t. 50. f. 55. 56. & t. 51. f. 31. 32.
Knorr Vergn. 2. t. 3. f. 6.
Martin. Conch. 4. f. 1382. 383.
Habitat - - - testa vix 3 pollices longa.

- spitalis*. 109. V. testa longitudinaliter costata transversim striata : anfractibus duobus primis serie tuberculorum acutorum, columella triplicata.

Rumpf amb. t. 29. f. X. Buccinum spirale.

Habitat in mari indico, testa cinerea, fusca aut alba, phalangis digitii longitudine, basi angusta, emarginata, subreflexa.

magella- 110. V. testa subventricosa ochracea lineis albis, fuscisque varia, labro subulato: spiræ anfractibus convexis; primo reliquis triplo majore.

Knorr Vergn. 6. t. 29. f. I. 2.

Favann. Conch. t. 28. f. E.

Chenn. Conch. 10. t. 148. f. 1383. 1384.

β) Knorr Vergn. 5. t. 23. f. 2.

Habitat rarer in freto magellanico, testa $4\frac{1}{2}$ pollices longa: spiræ anfractibus 6-7; in β) testu 2 pollices longa magis elongata, in mucronem acutum terminata, spiræ anfractu primo obscurius undulato.

III. V. testa tenuissime reticulato striata: cingulis elevatis transversis, columella quadriplicata, labro crenato. v.

Born nuf. Caeſ. Vind. test. t. 9. f. 9. 10.

Habitat rarer - - - testa alba: cingulis 16 spadiceis, quorum 4 in spira, columella umbilicata.

112. V. testa rudi fusca laevi: basi transversim striata, spira obtusata; anfractu primo ventricoso fasciis quatuor angustis, reliquis fascia lata alba, columella umbilicata triplicata.

Schroet. E:nl. in Conch. I. p. 302. t. I. f. 15.

Habitat - - -

***** Ventricosæ, spiræ apice papillari.

113. V. testa emarginata: spira coronata spinis fornicatis, columella quadriplicata. Mus. Lud. Ulr. 598. n. 241.*

Bonann. recr. & nuf. Kircher. 3. t. I. Latina.

Argenv. Conch. t. 17. f. F. Corona æthiopica.

Lift. Conch. t. 797. f. 4. & t. 801. f. 7. b.

Rumpf mus. t. 31. f. A. B.

Gualt. test. t. 29. f. H. I.

Lesser testaceoth. f. 55.

Seb. mus. 3. t. 64. f. I. 2. 4. t. 65. f. I. 2. 4. 10-12. & t. 66. f. I-3. 6-10. 15.

An huic forsan tribui accensendo cochlear ab Argenville zoomorph. t. 3. f. G. a Seba nuf. 3. t. 53. f. e. a. Bytemeister appar. t. II. f. 41. a. b. & in museo Gottwaldtiano t. 8. f. 52. & 62. d. t. 16. j. 120. a. c. & t. 36. f. 239. delineata?

Mus. Gottwald. t. 9. f. 64. a. & f. 61. b.

Knorr delic. t. B. VI. f. 2.

Vergn. 2. t. 4. f. 1.

Martin. Conch. 3. i. 73-76. f. 777-788.

β) *Lift. Conch.* t. 798. f. 5?

γ) *Chemin. Conch.* 10. t. 148. f. 1387. 1388.

Habitat rario in mari perlico, ad insulam Asiæ Key,
Caput Bonæ Spei, testa ad 7-8 pollices longa ^{longa},
cante maculata, interdum fasciata, nunc breviore ^{magis}
gisque ventricosa, nunc magis elongata, spinis ^{angustioribus}
longioribus, nunc brevioribus, nunc latioribus, ^{nunc}
angustioribus, papilla nonnunquam detrita.

Cym-
bium.

114. V. testa emarginata : spiræ anfractibus canaliculis
marginatis, columella quadriplicata. *Mus. Lud. Ulr.* 599. n. 242.

Column. purp. 29. t. 30. f. 3. *Cochlea altera magna*

Adans. Seneg. t. 3. f. 1. Yet.

Lift. Conch. t. 796. f. 3. & t. 800. f. 7.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 2.

Gualt. test. t. 29. f. B.

Argenv. Conch. t. 17. f. G.

Seb. mus. 3. t. 65. f. 5. 6. 8. 9. & t. 66. f. 5.

Knorr delic. t. B. VI. f. 3.

Vergn. 2. t. 30. f. 1.

Spengl. selt. Conch. t. I. f. N.

Martin. Conch. 3. t. 70. f. 762-765.

Habitat ad Africam, in mari hispanic & americanis
rario, testa nunc breviore & latiore, nunc longior,
angustiore, lœvi, unicolore, nonnunquam maculata
fasciis, interdum undatis varia, labro calloso.

Olla.

115. V. testa emarginata : spira levigata, columella ^{lata}
triplicata. *Mus. Lud. Ulr.* 599. n. 243.

Aldrov. exsang. 560. Concha persica.

Adans. Seneg. I. t. 3. f. 2. *Philin.*

Column. aq. t. 69. f. 4. 6.

Lift. Conch. t. 794. f. 1.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 6.

Gualt. test. t. 29. f. A.

Argenv. zoomorph. t. II. f. H.

Klein ostr. t. 5. f. 97.

Leffer testaceoth. 54.

Seb. mus. 3. t. 66. f. 13. 14. 16. 18.

Mus. Gottwald. t. 10. f. 68. & 68. a. b. c.

Knorr Vergn. 6. t. 22. f. 2.

Martin. Conch. 3. t. 71. f. 766.

Schroet. Einl. in Conch. 1. p. 245. t. 1. f. 14.

Habitat ad insulas Philippinas, in mari americano, æthiopicó, hispanico, testa ad 4 usque pollices longa, flavicante aut rufescente, rarius fusco varia, latiore, quam in cymbio.

ampla. 116. V. testa elongata : apertura ampla, labro acuto, spiræ anfractibus occultis.

Martin. Conch. 2. t. 65. f. 722-724.

Habitat - - - testa alba aut fusca 1½ pollicem circiter longa.

Neptuni. 117. V. testa emarginata sub epidermide fusca rufescente : labro prominulo, columella quadriplicata.

Lift. Conch. t. 802. f. 8.

Gualt. test. t. 27. f. AA.

Seb. mus. 3. t. 64. f. 3. t. 65. f. 3. 7. & t. 66. f. 4.

Martin. Conch. 3. t. 71. f. 767.

Habitat in sinu perfico, testa ad 8 pollices longa & æque fere lata : spiræ anfractibus 4.

Kravicina. 118. V. testa emarginata : labro prominulo, columella subquadriplicata.

Lift. Conch. t. 795. f. 2.

Leb. mus. 3. t. 64. f. 10. 11. & t. 66. f. 11. 12. 17.

Knorr Vergn. 5. t. 28. f. 2.

Martin. Conch. 3. t. 71. f. 768-771.

Habitat - - - V. Neptuni satis affinis, at testa minore vix ultra 2 pollices longa, nunc unicolor ochroleuca, rufescente aut spadicea, nunc maculata aut marmorata.

Papillaris 119. V. testa elongata : apicis papilla elongata.

Seb. mus. 3. t. 64. f. 9.

Mus. Gottwald. t. 10. f. 69.

Knorr Vergn. 5. t. 28. f. 7.

Habitat - - - papilla interdum obliqua.

120. V. testa elongata flava : fasciis tribus macularum fuscarum, columella quadriplicata.

Mus. Gottwald. t. 10. f. 64.

Knorr Vergn. 5. t. 8. f. 1.

Martin. Conch. 3. t. 72. f. 772. 773.

Habitat in mari indicó, testa angusta : spiræ anfractibus 5.

Scapha. 121. V. testa rudi nebulosa : lineis angularibus columella cærulecente quadriplicata , labro subalbido fuscis.
Lift. Conch. t. 799. f. 6.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 10.

Gualt. test. t. 28. f. S.

Seb. mus. 3. t. 64. f. 5. 6.

Klein ostr. t. 5. f. 94.

Lesser testaceoth. f. 56.

Martin. Conch. 3. t. 72. f. 774-776.

*Habitat pretiosa ad Caput Bonæ Spei , testa brevi, lati-
bus alba , vel flavicante : apertura ampla , spiræ anfractu-
bus 6.*

Cymbio- 123. V. testa ovata glabra subalbida : lineis longitudinalibus sanguineis : anfractibus nodosis , columelia triplicata.
la. *Chenn. Conch.* 10. t. 148. f. 1385. 1386.
Habitat in Oceano indico , testa 2 pollices longa.

Præpu- 124. V. testa subovata testacea : maculis ex rufescente basi emarginata. *Chenn. Conch.*
tium. *10. p. 143. t. 148. f. 1391. 1392.*
Lift. Conch. t. 798 f. 1.
Seb. mus. 3. t. 66. f. 11?
Habitat ad littus Coromandel.

Glans. 125. V. testa cylindrica lutescente , columella triplicata emarginata , apertura effusa patente. *Chenn. Conch.*
10. p. 144. t. 148. f. 1393. 1394.
Seb. mus. 3. t. 64. f. 9-11. & t. 66. f. 13. 14.
Habitat ad occidentale Africæ littus.

reticulata. 141. V. testa alba lævi aureo reticulata emarginata , columella quadriplicata : spira conica ; anfractu primo cylindrico ventricoso. *Kaemn. Cab. Rudolst.* p. 68. n. 1.
t. 5. f. 1. 2.
Habitat ad Javam , testa ultra 2 pollices longa.

pectabi- 142. V. testa flavidæ-fuscescente fusco striata : columella triplicata. *Kaemn. Cab. Rudolst.* p. 69. t. 7. f. 1.
Davil. catal. 1. t. 8. f. S.
Habitat in fredo magellanico , testa 5½ pollices longa.

323. BUCCINUM Animal Limax.

Testa univalvis, spiralis, gibbosa.

Apertura ovata, definens in canaliculum (s. retusam lacunam) dextrum, cava retusum.

Labium interius explanatum.

a *Ampullacea, inflata, rotunda, tenuis, subdiaphana fragilia.*

Olearium. 1. B. testa subrotunda cincta sulcis obtusis lineola elevata interstinctis : apertura edentula.

Adans. Seneg. I. t. 7. f. 6. Minjac.

Lift. Conch. t. 985. f. 44.

Pet. gaz. t. 99. f. II.

Rumpf. mus. t. 27. f. D.

Gualt. test. t. 44. f. T.

Klein ostr. t. 4. f. 74.

Mus. Gottwald. t. 27. f. 188. a. c. & 189. a. d.

Knorr Vergn. 5. t. 12. f. I.

Martin. Conch. 3. t. 117. f. 1076. 1077.

Habitat in mari indico, testa vix ultra 4 pollices longa, fusca aut subfuscata crebro maculis nebulisque obscurioribus varia, spiræ anfractibus 5 inflatis sulco discretis.

2. B. testa obovata cincta sulcis anterius geminatis, apertura edentula.

Lift. Conch. t. 898. f. 18.

Bonann. recr. 3. f. 183.

muf. Kircher. 3. f. 179.

Gualt. test. t. 42. f. AA.

Martin. Conch. 3. t. 116. f. 1070.

Schroet. Einl. in Conch. I. p. 308. t. 2. f. I.

Bonann. recr. 3. f. 26.

muf. Kirch. 3. f. 25.

Habitat in mari mediterraneo & adriatico, testa ochro-leuca caput humanum magnitudine interdum aquante, sere globosa columella umbilicata.

- Perdix. 3. B. testa ovata inflata subsulcata alboque undulata, apertura edentula *Mus. Lud. Ulr. 600. n. 244.*^{*} *Column. aq. t. 69. f. 5.* *Cassida neritoides minor* *virens* *gata.*
Rumpf mus. t. 27. f. C. *Cochlea pennata.*
Argenv. Conch. t. 17. f. A. Perdix.
Adans. Seneg. 1. t. 7. f. 5. *Tesan.*
Lift. Conch. t. 984. f. 43.
Bonann. recr. 3. f. 191.
mus. Kircher. 3. f. 189.
Gault. test. t. 51. f. F.
Seb. mus. 3. t. 68. f. 12. 13. 16.
Mus. Gotiwald. t. 27. f. 1. 2.
Knorr Vergn. 3. t. 8. f. 1.
Martin. Conch. 3. t. 117. f. 1078.-1080.
Habitat in mari indico, æthiopico, americano, *6 pollices longa lutea albo-pennata, undulata, costis complanatis, columella umbilicata, anfractibus 5-6 prominentibus convexis, sulco parum interstinctis.*

- Pomum. 4. B. testa ovata cincta sulcis obtusis, apertura dentata
Mus. Lud. Ulr. 600. n. 245.^{*}
Rumpf mus. t. 23. j. 4. & t. 27. f. B. *Cochlea striata* *alba*
Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 22.
Gault. test. t. 51. f. C.
Argenv. Conch. t. 27. f. L.
Seb. mus. 3. t. 70. f. 3. 4.
Mus. Gotiwald. t. 27. f. 184. C.
Knorr Vergn. 6. t. 23. f. 2.
Martin. Conch. 2. t. 36. f. 370. 371.
β) Lift. Conch. t. 792. f. 45.
*Habitat ad Javam Amboinam, Mexico, testa $\frac{2}{3}$ pollicis
 circiter longa, crassa, alba, flavo vel rufescens, luteola, spiræ anfractu primo costis 12-14 luteis, inaequali, apice summo nitido.*

- Dolium. 5. B. testa ovata cincta sulcis obtusis remotis: cava minula. *Mus. Lud. Ulr. 601. n. 246.*^{*}
Rond. test. 106. Cochlea rugosa.
Rumpf mus. t. 27. f. A. *Cochlea striata S. O. 1817.*
Calceol. mus. 30. t. 41.
Lift. Conch. t. 899. f. 19.
Bonann. recr. 3. f. 16. 17. 25.
mus. Kircher. 3. f. 16. 17. 28.
Gault. test. t. 39. f. E.

Argeny. Conch. t. 17. f. C.

Seb. mus. 3. t. 68. f. 9-11. & t. 70. f. 1. 2. 5.

Mus. Gottwald. t. 27. f. 185. b. & f. 188. b.

Knorr Vergn. 3. t. 8. f. 4.

Martin. Conch. t. 3. f. 116-118. f. 1072-1075. 1082.

β) *Seb. mus.* 3. t. 70. f. 6?

Habitat in mari siculo, africano, indicu, galeæ satis æqualis, & perquam affinis, at testa multo tenuiore, alba, interdum fusco maculata, columella torta.

6. B. testa ovata cincta costis rotundatis : cauda prominula.

Knorr Vergn. 5. t. 3. f. 4.

Martin. Conch. 3. t. 118. f. 1083.

β?) *List. Conch.* t. 940. f. 36.

Klein ostr. t. 3. f. 61.

Knorr Vergn. 6. t. 29. f. 5.

Habitat - - - testa fusca umbilicata : apertura ampla, labro plicato intus dentato, spiræ anfractibus 6 brevibus inflatis, in 6) testa 1 $\frac{3}{4}$ pollicis longa, tenui, straminea, in costis fuscescente, spiræ anfractibus tenuissime horizontaliter lineatis.

7. B. testa nivea costata : spiræ anfractibus extremis vix prominulis.

Knorr Vergn. 6. t. 36. f. 5.

Habitat - - - testa vix dimidium pollicem alta lataque; an distincta hujus tribus?

8. B. testa ovata longitudinaliter rugosa transverse plicata cauda brevi recurva. v. *Born mus. Caes. Vindob. test.* t. 9. f. 17. 18.

Habitat - - - testa dilute cinerea, sectionum angulis nodulosis, spira acuta prominula, labio crenato intus sulcato; an hujus tribus?

b *Cassidea caudata, cauda exserta brevi reflexa, labro extrorsum inermi.*

9. B. testa cingulis quatuor tuberculosis, cauda prominentia.

Mus. Lud. Ulr. 601. n. 247.

List. Conch. t. 1003. f. 68.

Bonann. recr. et mus. Kircher. 3. f. 18. 19.

Rumpf mus. t. 27. f. 1.

Gualt. test. t. 43. f. 3.

Argeny. Conch. t. 17. f. P.

- Argenv. zoomorph.* t. 3. f. H.
Ginann. adr. 2. t. 5. f. 43.
Seb. mus. 3. t. 68. f. 18.
Mus. Gottwald. t. 25. f. 164. & t. 27. f. 186.
Knorr Vergn. I. t. 17. f. 1.
Martin. Conch. 2. t. 41. f. 407. 408.
 β) *List. Conch.* t. 1011. f. 71. e?
 γ) *Bonann. recr.* 3. f. 160.
 muf. Kircher. 3. f. 162.
 δ) *List. Conch.* t. 1011. f. 71. f?

Habitat frequens in mari adriatico, & mediterraneo,
 fuscescente intus tuberculisque albis transversim striatis,
 umbilicata, spira pyramidata, canda elongata in alium
 flexa, labro nitido lœvigato, cingulis nonnunquam

- plicatum.* 10. B. testa anterius subuplicata decussatim substrata
 apertura dentata, cauda recurva.
Argenv. Conch. t. 15. f. D? *Cassis.*
List. Conch. t. 1002. f. 67.
Bonann. recr. 3. f. 156.
 muf. Kircher. 3. f. 161.
Gualt. test. t. 40. f. C.
Martin. Conch. 2. t. 37. f. 379. 380.
 β) *Knorr Vergn.* 3. t. 28. f. I.
Favann. Conch. t. 25. f. D⁴.
Seb. mus. 3. t. 53. n. I. 2.
Chemn. Conch. 10. p. 191. t. 153. f. 1459. 1460.
 γ) *Scop. del. inf.* 2. t. 24. f. I.

Habitat paulo rarius ad Jamaicam, testa cinerea aut
 fescente ad spiræ basin aliquando seriatim tuberculata,
 rarius striis evidenter longitudinalibus, aut cancellata

- cornu-*
tum. II. B. testa turbinata scrobiculis punctata coronata: aperte
 dentata, cauda recurva. *Mus. Lud. Ultr.* 602. n. 249.
Rond. test. 2. 77. *Murex triangularis.*
List. Conch. t. 1006. f. 70.
Bonann. recr. & *muf. Kircher.* 3. f. 155.
Rumpf mus. t. 23. f. I.
Gualt. test. t. 40. f. D.
Jesser testaceoth. f. 46.
Seb. mus. 3. t. 73. f. 7. 8. 17. 18.
Mus. Gottwald. t. 24. f. 159. aa. bb.
Knorr Vergn. 3. t. 2. f. I.
Martin. Conch. 2. t. 33. f. 348. 349.

- ^{12.}) *List. Conch.* t. 1008. f. 71. b.
Rumpf mus. t. 23. f. A.
Martin. Conch. 2. t. 35. f. 362.
²⁾ *List. Conch.* t. 1009. f. 71. c.
Habitat in India, testa ad 9, β.) 12 pollices longa, alba,
maculis rufescensibus aut spadiceis, interdum undatis.
- ^{12.} B. testa decussatim striata: cingulis nodosis interstinctis
linea gemina, apertura dentata, cauda recurva. *Mus.*
*Lud. Ulr. 603. n. 250.**
Rumpf mus. t. 23. f. B. *Cassida rubra.*
Barrel. rar. t. 1325. f. 29.
Bonann. recr. 3. f. 328. 329.
mus. Kircher. 3. f. 326. 327.
Gualt. test. t. 40. f. F.
Seb. mus. 3. t. 73. f. 3. 4. 9.
Knorr Vergn. 2. t. 9. f. 2? & 4. t. 1.
Regenf. Conch. 1. t. 12. f. 69.
Martin. Conch. 2. t. 32. f. 341. & t. 33. f. 346. 347.
Habitat rario in mari americano & indicu, testa fusca
rufescente alboque varia, apertura coccinea: dentibus
longis albis: sulcis intermediis nigris.
- ^{13.} B. testa cingulis duobus tuberculosis, cauda recurva.
*Mus. Lud. Ulr. 602. n. 249.**
Labat it. 5. p. 262.
List. Conch. t. 1004. f. 69?
Bonann. recr. 3. f. 323.
mus. Kirch. 3. f. 322.
Gualt. test. t. 41. f. A. A. A.
Seb. mus. 3. t. 73. f. 5. 6. 10. 11. 14. 15.
Mus. Gottwald. t. 23. f. 159. a. b.
Knorr Vergn. 3. t. 10. f. 1. 2.
Martin. Conch. 2. t. 34. f. 359. & t. 38. f. 381. 382.
Schroet. inner. Bau Conch. t. 4. f. 4.
²⁾ *Seb. mus. 3. t. 73. f. 2?*
²⁾ *Knorr Vergn. 6. t. 18. f. 1.*
Habitat in Oceano americano, testa ad 10 pollices longa,
rubro aut fuscō maculata & undata, adulta subtriangu-
lari, decussatim striata: cingulis interdum 3-4, aper-
turæ dentibus albis: in medio nigro.
- ^{14.} B. testa subuplicata subcoronata: apertura dentata, cau-
da recurva. *Mus. Lud. Ulr. 603. n. 251.**

- List. Conch.* t. 1003. f. 72.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 156.
Rumpf mus. t. 23. f. 2.
Valent. Abh. t. 11. f. 99. 100.
Seb. mus. 3. t. 73. f. 19. 20.
Mus. Gottwald. t. 23. f. 160.
Knorr Vergn. 4. t. 4. f. 1.
Martin. Conch. 2. t. 34. f. 353. 354.
Spengl. selt. Conch. t. 3. f. D.
β) *Seb. mus.* 3. t. 73. f. 16.
γ) *Gronov. zooph.* t. 19. f. 9. *Buccinum spinosum.*
Habitat in Oceano americano, testa 5 fere pollices longit-
alba, maculis fuscis undatis varia: apertura maculata
nigris notata; dentibus validis obtusis, columella
transversim albo costata.

- Testiculus.* 15. B. testa obovata decussatim striata levigata: striis elevatis longitudinalibus, apertura dentata, cauda recurva.
Mus. Lud. Ulr. 604. n. 252.*
List. Conch. t. 1001. f. 66.
Bonann. recr. 3. f. 162.
mus. Kirch. 3. f. 163.
Rumpf mus. t. 23. f. 3.
Valent. Abh. t. 7. f. 59.
Gualt. test. t. 39. f. C.
Seb. mus. 3. t. 72. f. 17-21.
Mus. Gottwald. t. 22. f. 145-149.
Knorr Vergn. 3. t. 8. f. 2. & 4. t. 6. f. 1.
Bytem. app. t. 11. f. 46.
Martin. Conch. 2. t. 37. f. 375-376.
β) *Martin. Conch.* 2. t. 37. f. 377. 378.
Habitat in mari indico & americano, testa ad 4 pollices
longa alba, aut rufescente, vel plurimum flavo-maculata,
labio interiore obliterato, exteriori ochroleuco suffuso;
maculata, columellæ plicis dentibusve albis.
- decussatum.* 16. B. testa decussatim striata levigata: squamulis quadratis
apertura dentata, cauda recurva. Mus. Lud. Ulr. 604. n. 253.*
Rondel. test. 83. f. 1. *Buccinum parvum.*
List. Conch. t. 1000. f. 65.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 157.
Gualt. test. t. 40. f. B.
Mus. Gottwald. t. 23. f. 154. b. c. f. 156. a. 157. a. b.

Knorr Vergn. 2. t. 10. f. 3. 4.

Martin. Conch. 2. t. 35. f. 360-361. 367. 368.

Habitat in mari mediterraneo & africano, testa alba, frequenter fusco aut tessellata aut undulata; labio exteriori rugoso, valido, lato, interius crenato, interiore punctis eminentibus aspero.

Areola. 17. B. testa substriata maculis quadratis quadrifariam cincta: apertura dentata, cauda recurva. *Mus. Lud. Ulr.* 605. n. 254.*

Rumpf mus. t. 25. f. B. C. 1. 2. 5. *Areola.*

Adans. seneg. 1. t. 7. f. 8. *Saburon.*

Lift. Conch. t. 1012. f. 76.

Bonann. recr. & mus. *Kircher.* 3. f. 20. 21. 154?

Valent. Abh. t. 9. f. 77.

Klein. ostr. t. 6. f. 102? 103.

Gualt. test. t. 39. f. G. H. & t. 40. f. E.

Argenv. Conch. t. 15. f. I.

Seb. mus. 3. t. 70. f. 7-9.

Mus. Gottwald. t. 22. f. 150-152. b. & t. 23. f. 156. b. 157. c.*

Knorr Vergn. 3. t. 8. f. 5.

Martin. Conch. 2. t. 32. f. 344. 345. & t. 34. f. 350. 351. 352. 355.

Schroet. Einl. in Verst. 4. t. 9. f. 7.

β) *Lift. Conch.* t. 1056. f. 9.

Habitat in mari mediterraneo & indico, testa vix ultra 3 pollices longa, nunc laevi, nunc magis minusve evidenter striata: labio exteriori interiore margine dentato.

tigginam. 188. B. testa ovata laevi cærulecente: fasciis transversis luteis fusco maculatis characteribusque fuscis intermixtis. *Martyn univ. Conchol.* 1. t. 8.

Habitat ad novam Seelandiam.

undulatum, 18. B. testa rarius transversim striata undatim maculata: spira obtusa labroque interiori glaberrimis.

Lift. Conch. t. 996. f. 61.

β) *Bonann. recr. & mus.* *Kirch.* 3. f. 159.

Gualt. test. t. 39. B.

γ) *Seb. mus.* 3. t. 68. f. 14. 15. 17.

Habitat - - - Areolæ affine, at testa magis producata:

cicatrico-sum, 19. B. testa ovata scrobiculis punctata laevi: spira elongata, labiis dentatis, cauda recurva. *Gronov. zooph.* t. 19. f. 1. 2.

Habitat in India, areolæ affine, at testa magis ovali, spiræ cancellata, labio exteriori dentato, interiori rugosæ.

- tessella-** 20. B. testa tenui cinerea : fasciis albis fusco tessellatis tum. anfractibus quinquesariam tuberculatis.
Seb. mus. 3. t. 73. f. 1. 12. 13.
Martin. Conch. 2. t. 36. f. 369. & t. 37. f. 374.
Habitat rarissimum in Oceano australi, testa ultra 6^{1/2} lices longa.
- penna-** 21. B. testa alba : fasciis flavescente spadiceo alboque variabilis tum. cauda recurva.
Rumpf mus. t. 23. f. C.
Martin. Conch. 2. t. 36. f. 372. 373.
Habitat rarum in India.
- maculo-** 22. B. testa fasciis quatuor maculosis : anfractibus prominentibus. longitudinaliter costatis : primo corona tuberculorum.
List. Conch. t. 997. f. 62.
Habitat - - - pennato affine, testa 3 $\frac{1}{2}$ pollices longa.
- bilinea-** 23. B. testa transversim striata : spiræ obtusæ anfractibus cilia maculosa lineisque duabus.
List. Conch. t. 998. f. 63.
Habitat - - -
- gibbum.** 24. B. testa rudi transversim striata undatum maculosa : spiræ acuta pyramidalis.
List. Conch. t. 999. f. 64.
Habitat - - - testa 2 pollices longa.
- ventrico-** 25. B. testa ventricosa striata : labio tenui, cauda brevi tum.
List. Conch. t. 1007. f. 71.
Habitat - - - an distincta species ?
- strigosum.** 26. B. testa transversim striata : spira acuta ; anfractu secundoque spinis coronato. labio exteriori intus rotulato extrinsecus emarginato.
List. Conch. t. 1011. f. 71. f.
Habitat - - -
- rugosum.** 27. B. testa lœvi undulatum maculata : spira rugosa striataque cauda quinqueplicata, labio exteriori valido recto.
List. Conch. t. 1014. f. 78.
Habitat rarum - - - testa 3. fere pollices longa.

- Ponderosum. 28. B. testa rudi : spira prominula acuta ; anfractu primo tuberculis coronato , labio exteriori intus costato.
Lift. Conch. t. 1016. f. 74.
Habitat - - - testa 1½ pollicem longa.
- recurvirostrum. 29. B. testa lævi fasciis macularum rufarum notata : spira prominula ; anfractu primo inflato.
Lift. Conch. t. 1016. f. 75.
Habitat ad Barbados , testa 2½ pollices longa.
- infasciatum. 30. B. testa transversim striata hinc inde maculosa, fasciis tribus æqualibus notata : apertura intus cærulescente, labio exteriore dentato , interiore seriatim tuberculato.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 158.
Habitat - - - testa 3 pollices longa.
- Senegalium. 31. B. testa subtiliter transversim striata : fasciis macularum tribus, spiræ anfractu secundo annulo turgido cincto , labio exteriore crenato.
Adans. Seneg. 1. p. 111. t. 7. f. 7. Fafin.
Habitat ad Senegal.
- Ochroleuca. 32. B. testa ochroleuca transversim striata : spiræ anfractu primo spinis coronato , labio exteriori dentato , interiori repando.
Gault. test. t. 43. f. 2.
Habitat - - - testa ultra 2½ pollices longa.
- Azatum. 33. B. testa transverse striata : spira depressa ; anfractu extimo margine subnodoso , apertura dentata , cauda recurva. *Gronov. zooph. t. 19. f. 18.*
Habitat in America.
- Cassis. 178. B. testa obovata umbilicata fulva transversim dense striata : cauda recurva , labio menibranaceo adnato , labro acuto. *Chemn. Conch. 10. p. 183. t. 152. f. 1456.*
Habitat in mari mediterraneo Neapoli vicino.
- Reticulatum. 179. B. testa ovata transversim sulcata albida rufescens fasciata varicosa : spira conica decussatim striata , apertura oblonga dentata , labio interiore plicato granulato , labro simbriatio maculato. *Chemn. Conch. 10. p. 189. t. 153. f. 1457. 1458.*
Favann. Conch. t. 24. f. D.
Mort. Conch. 2. t. 34. f. 356.
Habitat in Oceano Indico.

- tyrrhe-** 180. B. testa globosa flavescente sulcata striata : ^{spira}
num. nica , apertura alba , labro marginato intus subdente
Chemn. Conch. 10. p. 192. t. 153. f. 1461. 1462.
Bonann. recr. 3. f. 160.
mus. Kirch. 3. f. 162.
Ginann. op. posth. 2. t. 5. f. 44. & t. 6. f. 45.
Habitat in mari tyrrheno.

- abbrevia-** 181. B. testa ovata albida transversim striata sulcata :
tum. ^{dentato, 1463.} spira conica scalaris , labro duplicato intus
replicato rugoso , cauda brevissima. *Chemn. Conch.* 10.
p. 194. t. 153. f. 1463. 1464.
 $\beta)$ *Chemn. Conch.* 10. t. 153. f. 1465. 1466.
Habitat in Oceano indico , $\beta)$ americano.

c *Cassidea unguiculata , labro posterius exponit
sum aculeato , ceterum similia cassidea.*

- Exina-** 34. B. testa subplicata papillis coronata. *Mus. Lud.* 1465.
Lift. Conch. t. 1015. f. 73.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 153.
Rumpf mus. t. 25. f. D. & 6. 7.
Gualt. test. t. 39. f. D. I.
Argenv. Conch. t. 14. f. G.
Seb. mus. 3. t. 53. f. 8. 11-16. 29. 30.
Mus. Gottwald. t. 23. f. 155. b. 156. a. 158. 161. b.
162. a. b. d. 163. a. b. c.
Martin. Conch. 2. t. 35. f. 363. & t. 38. f. 183-386.
 $\beta)$ *Lift. Conch.* 2. t. 1013. f. 77?
 $\gamma)$ *Seb. mus.* 3. t. 53. f. 21?
*Habitat in mari americano & indico , ad Alexandrianum
testae ochroleuca , cærulecente aut alba , rarius undulata
tim maculosa , frequentius fascia 1-2 transversis , non
obsoletis , nunc manifestis tessellatis.*

- glaucum.** 35. B. testa lœvi papillisque coronata. *Mus. Lud.* 1466.
606. n. 256.*
Rumpf mus. t. 25. f. A. & f. 4. *Cassis cinerea lavis.*
Lift. Conch. t. 996. f. 60.
Gualt. test. t. 40. f. A.
Seb. mus. 3. t. 71. f. 11-16.
Mus. Gottwald. t. 22. f. 153. & t. 23. f. 154. ²
Knorr Vergn. 3. t. 8. f. 3.
Martin. Conch. 2. t. 32. f. 342. 343.

Schroet. inner. Bau d. Conch. t. 3. f 4.

Habitat in mari indico, testa ad 5 polices longa, cinerea: fasciis 4-6 obscurioribus notata intus fusca, rarius extrinsecus obsolete transversim striata: spira acuta pyramidali, anfractibus extimis cancellatis, labro exteriore dentato spinis subtus 3-4 armato, interiore infra rugoso subpunctato, supra glaberrimo albo.

Vibex.

36. B. testa tota lævi. *Mus. Lud. Ulr. 606. n. 257.**

Rumpf mus. t. 25. f. E. & 8. 9. Fimbriata lævis.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 31. f. 152.

Gualt. test. t. 39. f. F. L.

Argenv. Conch. t. 14. f. H.

Seb. mus. 3. t. 53. f. 3-7. 10. 17-20. 23. 31.

Mus. Gottvald. t. 25. f. 166. a. b. 167. a. b. 168. a. b.

Knorr Vergn. 6. t. 11. f. 3.

Regenf. Conch. 1. t. 10. f. 40.

Martin. Conch. 2. t. 35. f. 364. 366.

ε) *Seb. mus. 3. t. 53. f. 9.*

γ) *Seb. mus. 3. t. 53. f. 26. 27.*

δ) *Seb. mus. 3. t. 53. f. 22.*

Habitat ad Alexandriam, in mari americano & indico, testa maculis undatis ex fusco luteis varia, columellæ plicis 2, nonne mera erinacei varietas?

testula-
tum.

37. B. testa subventricosa: spiræ anfractibus basi fascia nigro tessellata.

Lift. Conch. t. 975. f. 30. b.

Martin. Conch. 2. t. 38. f. 387. 388.

Habitat - - - testa ut plurimum maculis undatis aliisque spadiceis varia.

nodulo-
sum.

38. B. testa subplicata papillis coronata: labro lævi superius maculato, posterius bifariam acute spinoso.

Schroet. Einl. in Conch. 1. p. 383. t. 2. f. 9.

Habitat - - - erinaceo affine, testa pollicem circiter longa.

Fimbria.

39. B. testa sulcata: spira acuta, anfractibus seriatim tuberculatis.

Seb. mus. 3. t. 53. f. I. 2.

Habitat - - - testa grandi ex cinereo flava: sulcis albis-

Papillo-
sum.

40. B. testa undique tuberculata. *Mus. Lud. Ulr. 607. n. 258.**

Rumpf mus. t. 29. f. M. Buccinum granulatum rotundum.

Lift. Conch. t. 969. f. 23.

Gualt. test. t. 44. f. C.

Argenv. Conch. t. 9. f. I.

Seb. mus. 3. t. 49. f. 57-59.

Knorr Vergn. 2. t. 27. f. 2.

Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1204. 1205.

Habitat rarius in mari indico, testa $2\frac{1}{2}$ pollices fere $10\frac{1}{2}$ ¹⁰
flavicante : maculis spadiceis, tuberculis in series, gestis, labro spinis 6 armato.

Glans. 41. B. testa lævi : labio interiore bidentato. *Mus. Lud.* 607. n. 259.*

Lift. Conch. t. 981. f. 40.

Rumpf mus. t. 29. f. P.

Seb. mus. 3. t. 39. f. 56. 57. 60.

Knorr Vergn. 3. t. 5. f. 5.

Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1196-1200.

Habitat rarius in mari indico, testa lævi, subventrictu^{rum}
paulisper ultra 2 pollices longa alba : lineis obliquis^{rum}
flavis vel ex luteo fuscis, maculis fuscis, apice rubris^{rum}

* d **Callofa, columellæ labio dilatato incrassato*

Arcularia. 42. B. testa plicata papillisque coronata. *Mus. Lud.* 608. n. 260.*

Rumpf mus. t. 27. f. M. *Arcularia major.*

Lift. Conch. t. 970. f. 24. 25.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 175. 340.

Gualt. test. t. 44. f. O. Q. R.

Argenv. Conch. t. 14. f. C.

Seb. mus. 3. t. 53. f. 28. 32-35. 37-41.

Mus. Gottwald. t. 26. f. 178. d. f. 183. a. b. c.

Knorr Vergn. 6. t. 22. f. 3.

Martin. Conch. 2. t. 41. f. 409-412.

Schroet. inn. Bau Conchyl. t. 5. f. 10.

β) *Rumpf mus.* t. 27. f. N.

Gualt. test. t. 44. f. n.

Seb. mus. 3. t. 53. f. 44. 45.

Martin. Conch. 2. t. 41. f. 413.

γ) *Bonann. recr. & mus.* Kircher. 3. f. 59.

δ) *Gronov. zoophyl.* t. 19. f. 7. 8. *Buccinum fasciolatum*

ε) *Chemin. Conch.* 10. t. 154. f. 1474.

Habitat in Oceano indico, Malacis ornamento arcuato^{rum}
inserviens, testa nunc alba, nunc cinerea, nunc subfuliginea^{rum}
aut fusca fascia interdum alba, rarius rubea, cancellata, labro costato.

43. B. testa gibba oblique striata.

Adans. Seneg. I. t. 8. f. 11? Totombo.

Lift. Conch. t. 971. f. 26.

Gualt. test. t. 44. f. N.

Knorr Vergn. 6. t. 22. f. 5.

Schroet. Einl. in Conch. I. p. 328. t. 2. f. 2.

Habitat in mari mediterraneo, arcularia dimidio minor,

*testa ferruginea decussatim striata, fascia una aut 2 albis
transversis, labio exteriori rotundato dentato, interiori
nitido albo.*

44. B. testa gibba lœvi.

Lift. Conch. t. 972. f. 270. t. 973. f. 28.

Bonann. recr. 3. f. 383.

mus. Kirch. 3. f. 369.

Gualt. test. t. 44. f. L.

Mus. Gottwald. t. 26. f. 178. c.

Seb. mus. 3. t. 53. f. 46.

Knorr Vergn. 6. t. 22. f. 6.

Martin. Conch. 2. t. 41. f. 414. 415.

Schroet. Einl. in Conch. I. p. 329. f. 3. a. b.

β) *Knorr Vergn. 6. t. 22. f. 4.*

γ) *Knorr Vergn. 6. t. 22. f. 5.*

δ) *Knorr Vergn. 6. t. 36. f. 5?*

*Habitat rarius in mari mediterraneo & indico, testa nivea,
aut tincta maculatave.*

45. B. testa lœvi, adultiore rugosa : spira exserta, labio
intiori subexplanato.

Gualt. test. t. 44. f. B.

*Habitat in mari mediterraneo, testa tenera, lœvi, pallida,
alba, aut ex luteo fuscescente, fasciis intetdum 2 obso-
letis : spira exquisita ; anfractibus distinctissimis longi-
tudine testæ margine superiore obsoleto albis rufisque ;
adultiore longitudinaliter rugosa cinerea opaca, labio
intiori antorsum extenso crassiusculo.*

46. B. testa convexa obtusa lœvi : labio intiori obsoleto.

Gualt. test. t. 65. f. C. I.

v. *Born mus. Caes. Vindob. test. t. 10. f. 3. 4.*

*Habitat rarius in mari mediterraneo, testa pist magnitu-
dine, neritæ facie, at apertura posterius emarginata
a neritis distincta, fere orbiculata, pallida, subitus
planiuscula, alba, gibbosa : sutura superiori secundum
anfractus linea purpurascente vermiculari.*

e Detrita, columellæ labio quasi abrasi planis

Harpa. 47. B. testa varicibus æqualibus longitudinalibus mucronatis : columella lævigata. *Mus. Lud. Ulr. 609. n. 261.**

Rumpf mus. t. 32. f. K. L. M. Harpa.

Argenv. Conch. t. 17. f. D. Harpa nobilis.

Lift. Conch. t. 992. 993. 994. f. 55-57.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 185.

Gualt. test. t. 29. f. C. D. E. G.

Klein ostr. t. 6. f. 105.

Lesser testaceoth. f. 59.

Seb. mus. 3. t. 70. fig. innom. omn.

Mus. Gottwald. t. 15.

Knorr Vergn. I. t. 9. f. 3. & 2. t. 8. f. 2. & t. 19. f. 1.³

Murray testaceol. t. 1. f. 14.

Regenf. Conch. I. t. 2. f. 14.

Martin. Conch. 3. t. 119. f. 1090-1092. 1094-1097. Buccinum

β) Pallas spic. zool. 10. p. 33. t. 3. f. 1. 2. Geverianum.

γ) Chenin. Conch. 10. t. 152. f. 1451.

δ) Chenin. Conch. 10. t. 152. f. 1453.

Habitat in mari indico, testa 4-5 pollices longa, ovata, nunc majore, nunc minore, subitus ut plurimum ballo, aut fusca, costis obliquis nunc latioribus, nunc angustioribus, ut plurimum, nunc rarius, nunc confertissimis striis transversis nigris notatis, aliquando macularis, maculis nonnunquam tessellatis, costarum intersticio creberrime albo, maculis pennatis picco; in β) 1094 grisea undulatim maculata, intus ex purpura violacea.

costatum. 48. B. testa varicibus æqualibus longitudinalibus mucronatis, columella lævigata.

Argenv. zoomorph. t. 11. f. F.

Martin. Conch. 3. t. 119. f. 1093.

Favann. Conch. t. 28. f. A.*

Chenin. Conch. 10. t. 152. f. 1452.

*β) Fimbriata Buccinum. Mart. univ. Conch. I. t. 6. Habitat rarissimum - - - β) ad insulas Falkland, *cotul* approximatis, rarius striatis & maculatis ab *herpet* distinctum, an forsitan mera ejus varietas?*

Perficum. 46. B. testa scabra : labro crenulato, columella plana

*Mus. Lud. Ulr. 609. n. 262.**

Rumpf mus. t. 27. f. E. Cochlea patula.

Argenv. t. 17. f. E. Concha persica.

Lift. Conch. t. 987. f. 46. 47.

Gualt. test. 51. f. H? L.

Seb. mus. 3. t. 72. f. 10. 11.

Knorr Vergn. 3. t. 2. f. 5. & 4. t. 5. f. 4.

Martin. Conch. 3. t. 69. f. 760.

8) Valent. Abb. t. 3. f. 20.

?) Seb. mus. 3. t. 72. f. 12-16.

Favann. Conch. t. 27. f. D'.

Chemin. Conch. 10. t. 154. f. 1467. 1468.

Habitat in mari indico, sinu persico rarius, testa 4 fere pollices longa aut fusca transversim striata alboque maculata vel filis albo fuscoque maculatis cincta, aut fasciis ejusmodi picta.

50. B. testa scabra, labro crenulato, columella plana spinam subulatam oblique exferente.

Pallas spic. zool. 10. p. 33. t. 3. f. 3. 4.

Knorr Vergn. 4. t. 30. f. 1.

Martin. Conch. 3. t. 69. f. 761.

Regenf. Conch. 2. t. 7. f. 2.

Favann. Conch. t. 27. f. D'.

Martyn Conch. 1. t. 10. 2. f. 50.

Chemin. Conch. 10. t. 154. f. 1469. 1470.

Habitat rarum in mari Americam a. luente, persico affine; testa grisea, intus alba.

51. B. testa muricata: labro extus crenato, columella fal- cata. Mus. Lud. Ulr. 610. n. 263.*

Adans. Seneg. 1. t. 7. f. 3. Pakel.

Lift. Conch. t. 989. f. 49.

Bonann. recr. 3. f. 368.

Mus. Kircher 3. f. 361.

Gualt. test. t. 51. f. D. E.

Mus. Gottwald. t. 26. f. 179. a.

Knorr Vergn. 6. t. 24. f. 1.

Martin. Conch. 3. t. 69. f. 757. 758.

Habitat rarius in mari æthiopico & americano, murici neritoideo affine, testa ad 4 usque pollices longa, solida striis transversis nigris internuediisque lineis albis varia, fasciis crebro & albis, ventris anfractibus cingulo triplici nodoso acuto, & duplice inferiore magis obtuso.

52. B. testa submuricata; labro intus striato, columella planiuscula, fauce fulva.

Lift. Conch. t. 988. f. 48.

Gualt. test. t. 51. f. A.

Mus. Gottwald. t. 11. f. 80. a? b? e? f?

Martin. Conch. 3. t. 101. f. 964. 964.

Habitat in mari mediterraneo & æthiopico, *testa ad*
pollices longa, ovata, rudi, transversim striata, fusca
vel cinerea interdum fusco lineata, labro intus crenulatum
spira obtusa, anfractibus fascia duplice nodosa cincta

Lapillus. 53. B. testa ovata acuta striata lævi: columella. *Fn. sup.*

2167. *It. wgoth.* t. 5. f. 4.

Adans. Seneg. 1. t. 7. f. 4. *Sadot.*

Müll. zool. dan. prodr. 2944. *O. Fabr. Fn. groent.* 39³?
Tritonium Lapillus.

Lift. Conch. t. 965. f. 18. 19. & t. 975. f. 30.³?
anim. angl. t. 3. f. 5. 6.

Añ. paris. 1711. p. 199. t. 6. f. 5-7.

Knorr Vergn. 6. t. 29. f. 4.

Stroeni. sondm. 183.

Besch berl. Naturf. 4. n. 13.

Ferber. n. Beytr. 2. *Mineralg.* I. p. 449.

Martin. Conch. 3. t. 121 f. 1111. 1112. & 4. t. 122,
1124. 1125. 1128. 1129. 1136. 1137.

Habitat ad Oceani europei littora, *testa vix ultra 1½ rotundata*,
licem longa clba, cinerea vel flavicante, interdum
transversim fasciata, nunc tenuiore: apertura edentula,
nunc solidiore: apertura dentata; incolae feminini maxima
ratio succo glutinoso albo flavo fuscoque farta, qui late
aut linteo affricatus & ad solem siccatus nitido evanescit
stabili colore purpureo comparet: Ova olim pro hydriis
triticea habita.

Smaragdulus. 54. B. testa ovata, acuta glaberrima, columella subplicata
planiuscula. *Mus. Lud. Ulr.* 670. n. 264.*

Argenv. Conch. t. 6. f. P. *Smaragdus minor.*

Habitat - - - *testa sulcata matris periarum inservienti*
nitente, & viridi quoque colore nitente.

Tuba. 55. B. testa subfusciformi ex fusco lutea: spira cancellata;
anfractu primo sublaevi reliquis triplo longiore.

Martin. Conch. 3. t. 94. f. 908.

Habitat rarissimum in India, *testa supra subrectangulis*
infra angusta.

Pyrum. 56. B. testa turbirata: apertura rubra, columella levigata;
spira brevi; anfractu primo ventricoso.

Martin. Conch. 3. t. 94. f. 909. 910.

8) Scop. del. inf. 2. t. 24. f. 2?

Habitat rariissimum in India & mari rubro.

57. B. testa oblongo turbinata spadicea : lineis transversis undulatis albis.

Martin. Conch. 3. t. 94. f. 911.

Habitat - - -

58. B. testa convexa transversim plicata : spira brevi, columella callosa.

Martin. Conch. 3. t. 94. f. 912-914.

Habitat - - - haecenus modo fossile & calcinatum sat frequens prope Oedenburg Hungariae.

59. B. testa oblonga turbinata plicata : spira nodosa, apertura intus sulcata, columella subumbilicata.

Martin. Conch. 3. t. 94. 915. 915. a.

Habitat - - -

60. B. testa oblonga turbinata solida laxe alba.

Martin. Conch. 3. sign. 31. 2. 3. p. 198.

Habitat - - -

61. B. testa oblonga : apertura ovali emarginata quadridentata, basi alba, spira acuta ; anfractibus distantibus, primo costis quatuor glabris.

Martin. Conch. 3. t. 118. f. 1089. a. b.

Schroet. Einl. in Conch. I. p. 360. t. 2. f. 8.

8) Knorr Vergn. 3. t. 7. f. 2.

2) List. Conch. t. 1059. f. 2.

Habitat - - - testa nunc alba, nunc fusca.

62. B. testa ventricosa rudi grisea glabra : apertura ovali, columella callosa, basi bicallosa.

Cui libui accensenda, si quidem distinctae sint hujus generis species ab Argenville zoomorph. t. 4. f. A. a Listero Conch. t. 37. f. 36. t. 560. f. 34. a. t. 792. f. 45. t. 827. f. 49. d. t. 857. f. 17. a. t. 912. f. 3. t. 924. f. 16. a. b. t. 962. f. 15. a. t. 954. f. 49. e. f. t. 965. b. f. 20. t. 968. f. 22. b. c. t. 976. f. 32. t. 983. f. 42. b. & t. 992. f. 54. a Seba mus. 3. t. 50. f. 31. t. 60. f. 36. 50. & t. 39. f. 61. ab Argenvillio Conch. t. 10. f. I. & zoomorph. t. 4. f. E. a Gualtieri test. t. 44. f. H. I. D. P. t. 55. f. C. & t. 43. f. P. a Bonanni Mus. Kircher. 3. f. 33. 63. 71. 398. 191. & mus. Gottvaldtian. 1. 26. f. 175. c. & f. 181. delineata? an buccini species testa a Knorio Vergn. 1. t. 15. f. 5. delineata? a Listero anim. angl. t. 3. f. 10.

Martin. Conch. 3. t. 120. f. 1099. 1100.

*Habitat - - - spira vix prominula : anfractibus 5.
margina- 63. B. testa globosa glaberrima : apertura ovali utrinque
tum, marginata, labro dentato, columella substriata,
spira vix prominula.*

Martin. Conch. 3. t. 120. f. 1101. 1102.

*Habitat - - - haec tenus modo fossile repertum in Pedo
montio, testa subfuscata, basi striis nonnullis obliquis ex-
rata.*

*Labyrin- 64. B. testa ponderosa convexa glaberrima : anfractibus
thus. distantibus marginatis, apertura ampla ovali, color
mellae plicis obliquis.*

Seb. mus. 3. t. 57. f. t.

Martin. Conch. 3. t. 120. f. 1103.

Habitat ad Scheveningen Hollandiae, testa ex luteo subfuscata.

*rusticum. 65. B. testa rudi ovato-oblonga alba : striis transversis fuscis
apertura ovali, cauda prominula, anfractuum primo
ventricoso.*

Adans. Seneg. 1. t. 9. f. 25. Tafon.

Lift. Conch. t. 831. f. 55.

Gualt. test. t. 43. f. X.

Seb. mus. 3. t. 54. f. 14-16.

Knorr Vergn. 3. t. 14. f. 5.

Martin. Conch. 3. t. 120. f. 1104. 1105.

*Habitat in India & Africa, striis transversis interdum ful-
co laetevque variis, in colorem cæruleum viridemque
vergentibus.*

*varium. 66. B. testa ovata rudi flava : costis transversis obscurior-
ibus elevatis nodulosis, apertura ovata edentula.*

Knorr Vergn. 6. t. 23. f. 3.

Martin. Conch. 3. t. 121. f. 1106.

Habitat - - -

*filosum. 67. B. testa ovata albida, rubris filis cincta : spira prominula,
apertura ovali, labro rubro striato, columella
subumbilicata.*

Martin. Conch. 3. t. 121. f. 1113. 1114.

Habitat - - -

*corona- 68. B. testa ovata striata exalbida spadiceo obumbrata :
tum. fascia media alba, maculis utrinque fuscis stipata.*

Martin. Conch. 3. t. 121. f. 1115. 1116.

β) *List. Conch.* t. 986. f. 45.

Klein ostr. t. 4. f. 75.

Habitat - - - *testa medio gibba.*

69. B. testa subglobosa albida maculis porraceis luridisque tessellatis in series digestis varia.

Bonann. recr. 3. f. 393.

Mus. Kirch. 3. f. 379.

Habitat - - - *spiræ anfractibus* 4.

185. B. testa subcylindrica transversim striata rufescente spadiceo fasciata labro denticulato. *Kaemm. Cab. Rudolft.* p. 119. t. 7. f. 2. 3.

Habitat ad Zeylon.

186. B. testa striata fusca albo maculata fasciataque : anfractibus canaliculatis quadrispariam nodulosis. *Kaemmerer Cab. Rudolft.* p. 120. n. 14. t. 9. f. 1.

Habitat - - - *testa 1½ pollicem longa.*

* *Lævigata* (*nec præcedenti cuidam tribui inserta.*)

70. B. testa lævi : anfractibus canali plano distinctis , columella abrupta perforata. *Mus. Lud. Ulr.* 611. n. 265.

Column. purp. 15. t. 16. f. 2.

α) *Argenv. Conch.* t. 17. f. N. *Contabulata.*

List. Conch. t. 983. f. c.

Bonann. recr. 3. f. 370.

Mus. Kircher. 3. f. 362.

Rumpf mus. t. 49. f. D.

Gualt. test. t. 51. f. B.

Seb. mus. 3. t. 73. f. 21. 22. 24? 25?

Knorr Vergn. 2. t. 6. f. 5. & 3. t. 3. f. 4.

Regenf. Conch. 1. t. 10. f. 41.

Martin. Conch. 4. t. 122. f. 1118.

β) *Schroet. inn. Bau Conch.* t. 4. f. 3.

List. Conch. t. 981. f. 41.

Bonann. recr. & *Mus. Kircher.* 3. f. 70.

Rumpf mus. t. 49. f. C.

Klein ostr. t. 2. f. 46.

Martin. Conch. 4. t. 122. f. 1120. 1121.

Habitat in India. β. (*rarius*) *in Sina* , *testa 2 circiter pollices longa* , β) *paulo longiori* , *alba* , *maculis lineisque spadiceis aliter cliterque varia* , *spiræ anfractibus 6-7* : *primo ventricoso* , *apertura ovata emarginata supra-*

in canalem terminata, umbilico profundo quasi bipartita, tenui, basi in a) cærulea.

- pyrozo- 71. B. testa transversim plicata & undulatim striata : ^{bipartita}
nias. spiraque prominulis ; anfractibus singulis fascia fulva,
primo duplice.
Martin. Conch. 3. t. 109. f. 1017.
Habitat - - -
- læve. 72. B. testa oblonga tenuissime striata dilute fusca oblique
curius fasciata ; apertura ovali in canalem definente,
anfractu primo gibbo maximo.
Martin. Conch. 4. t. 124. f. 1150.
Habitat in India, spiræ anfractibus 5-6.
- ocella- 73. B. testa lævi atra : guttis maculisque albis feriatis
tum. spiræ prominula ; anfractu primo ventricoso.
Martin. Conch. 4. t. 124. f. 1160. 1161.
Habitat - - -
- pyrami- 74. B. testa obtuse pyramidali transversim striata alba
dale. nebulis maculis virgatis aliisque nigris & subfuscis varia.
List. Conch. t. 676. f. 31.
Martin. Conch. 4. t. 124. f. 1170. 1171.
β) *List. Conch. t. 980. f. 39.*
Habitat ad Tranquebar.
- glaberrimi- 75. B. testa glaberrima minuta.
ma. *Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1177. 1180.*
ε) *Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1178.*
γ) *Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1179.*
δ) *Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1181.*
ε) *Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1182.*
*Habitat - - - β) anfractibus 2 primis fascia tenuissima
cinctis, γ) anfractu primo serie macularum cincto, δ)
testa fusco undulata, ε) maculata & punctata.*
- strigo- 76. B. testa minuta transversim striata.
sum. *Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1183.*
β) *Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1184.*
γ) *Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1185.*
δ) *Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1186-1188.*
*Habitat - - - testæ apertura in β) & δ) dentata, ipso
hoc maculata.*

- trifascia-
tum.* 77. B. testa glabra : fasciis intus tribus latis rubris , spiræ
anfractu primo ventricoso.
Gault. test. t. 44. f. A.
Habitat - - - testa ultra pollicem longa.
- leucozo-
nias.* 78. B. testa glabra : fascia alba lineisque spadiceis varia.
Seb. mus. 3. t. 39. f. 37.
Habitat - - - testa minuta.
- cancella-
tum.* 79. B. testa glabra fasciis lineisque decussantibus varia.
Seb. mus. 3. t. 39. f. 38.
Habitat - - - testa minuta.
- obtusum.* 80. B. testa glabra ochroleuca : spiræ apice obtuso cæruleo ;
anfractu primo ventricoso.
Knorr Vergn. 5. t. 18. f. 3.
Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1193.
Habitat - - - testa 2 pollices longa.
- glabra-
tum.* 81. B. testa glaberrima : anfractibus obsoletis ; infimo basi
subcanaliculato producto. *Mus. Lud. Ulr. 611. n. 266.**
Lift. Conch. t. 974. f. 29.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 149.
Gault. test. t. 43. f. T.
Argenv. Conch. t. 9. f. G.
Knorr Vergn. 2. t. 16. f. 4. 5.
Martin. Conch. 4. t. 122. f. 1117.
β) *Klein ostr. t. 2. f. 47. Dipsacus.*
Lift. Conch. t. 982. f. 42.
— *Martin. Conch. 4. t. 122. f. 1119.*
Chemn. Besch. berl. Naturf. 3. t. 8. f. B.
γ) *Martyn univ. Conch. 2. t. 48.*
*Habitat in mari americano & africano rarius , testa $3\frac{1}{2}$ -4
pollices longa nitida , aurantia albo intermixta , β) alba
spadiceo maculata apice rubella.*
- Aromboi-
des.* 82. B. testa glabra : anfractibus distinctis , ventre retro la-
brum superne solutum portato ad basin oblique striato.
Hermann Naturf. 16. p. 53. t. 2. f. 5. 6.
*Habitat - - - Strombo gibberulo affine , testa ex fusces-
cente lutea , spiræ anfractibus 5-6 convexis.*
- prae-
sum,* 83. B. testa ovata lævi atra : spira cariosa ; columella glaber-
rima.
Lift. Conch. t. 124. f. 24?
Chenin. Conch. 9. t. 120. f. 1035. 1036.

*Habitat in Europa magis australi v. g. ad aquæductum
Sevillæ, testa fabæ fere magnitudine rudi; vertice quæ
præmorso.*

australe. 173. B. testa oblonga lævitenui fasciata: apertura ovali inter-
gra. *Chemn. Conch.* 9. t. 120. f. 1033. 1034.
Favann. Cat. t. I. f. 46.
*Habitat in novæ Seelandiæ fluviis, inter buccina, bullæ
& helices quasi media, testa 3 pollices longa.*

Orbitas 183. B. testa ovata crassa albida transversim costata sulcata-
que: apertura ovali, labro intus plicato, labio plane-
Chenn. Conch. 10. p. 199. t. 154. f. 1471. 1472.
Martyn Conchol. 2. f. 45.
β) *Martyn Conchol.* I. f. 7.
Chenn. Conch. 10. t. 154. f. 1473.
Habitat ad novæ Seelandiæ littora.

turgitum. 184. B. testa obovata subumbilicata flavescente maculis san-
guineis seriatim notata: labro sinuato. *Chenn. Conch.*
10. p. 201. t. 154. f. 1475. 1476.
Zorn n. danz. Abh. I. t. 3. f. 4.
Martyn Conch. 2. f. 49.
Habitat ad novæ Seelandiæ littora.

* g* Angulata (*neque prægressis tribubus adscripta.*)
undosum, 84. B. testa ovata: striis transversis elevatis glabris, ventre
obtuse quinquangulari, labro intus striato. *Mus. Linn.*
*Utr. 612. n. 268.**
Rumpf mus. t. 29. f. O. *Buccinum undosum.*
Lift. Conch. t. 938. f. 33.
Argenv. Conch. t. 9. f. N.
Seb. mus. 3. t. 52. f. 26.
Knorr Vergn. 2. t. 14. f. 4. 5.
Martin. Conch. 4. t. 122. f. 1126. 1127. & t. 123. f.
1146. 1146a.
β) *Bonann. mus. Kirch.* 3. f. 399?
- *Habitat rarius in freto Malaccensi, testa 2 circiter pollices
longa flavicante; striis fuscis: angulis nonnunquam 7-8,
cauda canaliculata reflexa.*

affine. 85. B. testa ovata: striis transversis elevatis glabris, ventre
cylindrico, labio intus striato.
Martin. Conch. 4. t. 123. f. 1135.
Habitat - - - an seorsim diffinatum ab undoso?

86. B. testa ovata : spira 12angulata transversim striata, apertura dentata, labro aurantio, columella perforata.
Mus. Gottwald. t. 26. f. 175. 175. a. b.
Martin. Conch. 4. t. 123. 1147-1149.
Habitat ad Coromandel.
87. B. testa rudi sordide fusca transversim striata : striarum intersticiis bifariam nigro maculatis, spiræ anfractibus quatuor canaliculatis.
Martin. Conch. 4. t. 123. f. 1145.
Habitat in India, testa brevi : apertura ampla oblonga in canalem brevem definente, testa interdum tenuiore longiuscula lineis angularibus picta.
88. B. testa transversim striata : maculis rubellis parallelogrammis.
Martin. Conch. 4. t. 123. f. 1143. 1144.
Habitat - - -
89. B. testa ovata fusca, maculis niveis varia; spiræ anfractibus sulcatis, fauce striata, labro crenulato.
v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 10. f. 5. 6.
Habitat - - -
90. B. testa tenui ventricosa angusta : spira conico-depressa, anfractu primo & secundo spinis coronato.
Rumpf mus. t. 25. f. 3.
Habitat - - - testa 4 fere pollices longa.
91. B. 91. testa subrotunda rugosa : anfractibus anterius lamellatis, columella perforata.
Argenv. Conch. t. 15. f. G.
Martin. Conch. 3. t. 68. f. 754-755.
Spengl. Selt. Conch. t. 2. f. H.
Habitat in Sina, testa sordide ochroleuca fusco varia, intus flava, rudi, decussatim rugosa vel striata, canda solida flexa rugosa imbricatim squamosa, spira angulata lateribus redit, anterius planiuscula plicata aut superne dentata.
92. B. testa lævi substriata ovato-oblonga : anfractu infimo subcarinato. *Fn. suec. 2162.**
Müll. zool. dan. prodr. 2942. O. Fabr. Fn. groenl. p. 397. n. 397. Tritonium glaciale.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 270. t. 3. f. 20. 21.

Chenin. Schr. berl. Naturf. 6. t. 6. f. 4. 5. *Conch.*
t. 152. f. 1446. 1447.
Habitat ad Oceani septentrionalis a Groenlandia ad
mam Asiam littora, testa ad 2 pollices longa
lapidea leví pallide rubicunda, intus alba polli-
spiræ anfractibus 7 curvato multangulis.

- undatum. 93. B. testa oblonga rudi transversim striata: anfracti-
 curvato - multangulis. *Fn. succ.* 2263.^{*}
Müll. zool. dan. 2. t. 50. *prodr.* 2938. *rar.* 2. p. 28. 0.
Fabr. Fn. groenl. 394. *Tritonium testa oblonga trans-*
versim striata, anfractibus oblique carinatis.
List. Conch. t. 962. f. 14.
animi. angl. t. 3. f. 2.
Bonann. recr. f. 189.
mus. Kirch. 3. f. 191.
Petiv. gaz. p. 83.
Rumpf mus. t. 29. f. H.
Seb. mus. 3. t. 39. f. 76-80.
Knorr delic. t. B. VI. f. 6.
Vergn. 4. t. 19. f. 1.
v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 9. f. 14. 15.
Martin. Conch. 4. t. 126. f. 1206-1211.
 $\beta)$ *Bonann. mus. Kirch.* 3. f. 399.
 $\gamma)$ *Seb. mus.* 3. t. 39. f. 81. 82.
 $\delta)$ *v. Born mus. Caes. Vind. test.* t. 9. f. 15. 16. *ind. p.*
Chenin. Conch. 9. t. 105. f. 892. 893.
Habitat in Oceano europæo, potissimum septentrionis
mari quoque glaciali & indico, testa 4½ pollices
scabra, minus spectabilis cinerea vel subfuscæ
spadicea albo fasciata aut cærulea, transversim & obli-
que undulata, spiræ anfractibus 8-9, apertura lante-
operculo corneo extrinsecus striis subtilissimis concav-
tricis notato, testa, incola nigro maculata albo fulvo-
fusco, tentaculis subulatis oculisque binis, stipula-
canalem mentiente.

- ciliatum. 94. B. testa turrita patulo subcaudata angulata longitudine
 liter ciliata, columella subuplicata. *O. Fabr. Fn. groenl.*
p. 401. n. 402.
Habitat rarius in maris Groenlandiam alluentis profundi-
ribus, undato affine, sed magis amplum, testa 6 set-
lineas longa albida, intus glabra, epidermide ciliata
subuplicata munita, apertura ampla, spiræ anfractibus
minus convexis, mucrone glabro.

95. B. testa oblonga lœvi glabra acuminata transversim minute striata, longitudinaliter costata. *O. Fabr. Fn. groenl.* p. 402. n. 403.
Habitat in maris Groenlandiam alluentis profundioribus undato proximum, testa 4 lineas longa tenera subdiphana ex albo virescente, cauda brevi obtusa vix reflexa, labio acuto, spiræ anfractibus 6-7 minus ventricosis.
96. B. testa oblongo-conica transversim striata: anfractibus superioribus oblique obtuseque multangulis; inferioribus unicarinatis. *Phipps it. p. 197. t. 13. f. 2.*
Habitat in Oceano septentrionali, ad portum Smeerenberg.
97. B. testa ovata: varicibus ventris longitudinalibus inæqualiter distantibus, labro canaliculo subsoluto. *Hermann Naturf. 16. p. 52. t. 2. f. 3. 4.*
Habitat - - - undato affine, testa exalbida flavo mixta, spira obtusa, anfractu primo secundo quintuplo latiori, 6 costis inæquali.
98. B. testa oblonga glabra fusca: anfractu primo fascia flavicante media.
Knorr Vergn. 5. t. 10. f. 3.
Habitat - - -
99. B. testa cinerea: striis longitudinalibus undulatis transversisque interruptis fuscis, margine albo fusco maculato, apertura alba.
Knorr Vergn. 3. t. 14. f. 4.
Habitat - - - undoso affine, at testa non multangula.
100. B. testa oblonga maculis undatis nebulisque picta; spira brevi; anfractu primo gibbo, cauda angusta subprominula.
Valent. Abh. t. 11. f. 97.
Habitat ad fanum S. Maclovii.
101. B. testa tenui: spira brevi acuta tenuiter costata: anfractu primo subgloboso.
Rumpf mus. t. 29. f. Y.
Habitat in India ad arborum fruticumque maritimorum folia ramisque, testa polliceni circiter longa ex virecente cinerea atro punctata.
102. B. testa ventricosa caucellata: anfractibus distantibus.
Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1201. 1202.
Habitat - - - testa pollicem longe.

Strigosum. 103. B. testa oblonga longitudinaliter plicata transversim striata : striis fuscis albo nigroque striatis.
Bonann. Mus. Kirch. & recr. 3. f. 38.
Chemn. Conch. 4. p. 49. vign. 38. f. a. b.
Habitat - - - testa vix 2 pollices longa subventrica apertura costata, columella subuplicata ; an ad muricis relegandum ?

anglicum. 104. B. testa oblonga : striis transversis elevatis , spiræ sex fuscis.
Lift. Conch. t. 663. f. 17.
Bytcm. app. t. 11. f. 43.
Martin. Conch. 4. t. 126. f. 1212.
Habitat ad Angliae littora , testa parum ventricosa.

porcatum. 105. B. testa ventricosa costata fusca : anfractu primo terum subtegente.
Knorr Vergn. 6. t. 33. f. 3?
Martin. Conch. 4. t. 126 f. 1213. 1214.
β) Lift. Conch. t. 963. f. 16.
Habitat ad Angliae littora.

lævissimum. 106. B. testa glaberrima alba : spiræ apice obtuso caroli cente , anfractu primo ventricoso reliquis duplo majoribus.
Martin. Conch. 4. t. 127. f. 1215. 1216.
β) Lift. Conch. t. 978. f. 35.
Habitat - - -

igneum. 107. B. testa oblonga angusta glabra flavicante : maculis undatis nebulisque rubris , anfractibus extimis perpter diculariter striatis.
Martin. Conch. 4. t. 127. f. 1217.
Habitat - - - an muricis potius species ?

plumatum. 108. B. testa oblonga angusta spadicea : cingulis obscurioribus , fauce angusta atra cæruleave ; dentibus albis labroque intus striato.
Lift. Conch. t. 822. b. f. 41.
Knorr Vergn. 4. t. 21. f. 6.
Martin. Conch. 4. t. 127. f. 1218-1220.
Habitat in insulis americæ australi obversis , spiræ apice acuto ; an ad murices potius referendum ?

lyratum. 109. B. testa oblonga angusta horizontaliter costata : costis transversim striatis.

- Martin. Conch. 4. t. 127. f. 1221. 1222.
 β) Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 34. ?
Habitat — — — *testa subturrata, naso subprominulo, columella laevi.*
- I10. B. testa cana ovato-ventricosa : rugis longitudinalibus plicas transversas decussantibus, labro intus sulcato.
v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 9. f. 17. 18.
Habitat — — — *spira acuta, cauda brevi recurva.*
- III. B. testa ovato-oblonga transversim striata longitudinaliter rugosa, apertura dentata.
Lift. Conch. t. 966. f. 21.
Petiv. gaz. t. 64. f. 8. & t. 75. f. 4.
Ad. Paris. 1710. p. 463. & 1711. p. 199. t. 6. f. 9.
Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 62.
Gualt. test. t. 44. f. C.
Knorr Vergn. 5. t. 10. f. 3. ?
v. Born. mus. Caes. Vind. test. t. 9. f. 16.
Martin. Conch. 4. t. 124. f. 1164.
Schroet. Eint. in Conch. I. p. 346. t. 2. f. 5.
Habitat frequens in mari mediterraneo, anglico, æthiopico, testa omnibus fere coloribus variante, avellanæ magnitudine.
112. B. testa ovata cancellata alba : anfractu primo ventricoso.
Martin. Conch. 4. t. 122. f. 1122. 1123.
Habitat Tranquebariæ, testa ad pollicem usque longa, cauda sub prominula, spiræ anfractibus 7.
113. B. testa flava fasciis dilute fuscis : spira cancellata ; anfractibus distantibus planis, primo subconvexo, apertura triangulari; labro dentato, columella plicata verrucosa umbilicata.
Chemn. Conch. 4. p. I. vign. 37. f. a. b. c.
Meussch. mus. Leens. f. b.
 β) *Knorr Vergn. 6. t. 17. f. 7.*
Martin. Conch. 4. t. 122. f. 1130.
Habitat pretiosum — — testa interdum rubella, spiræ anfractibus 6, umbilico infundibuliformi.
114. B. testa decussatim striata fusca intus alba.
Martin. Conch. 4. t. 123. f. 1138. 1139.
Habitat in India.

- nodulo-** 115. B. testa alba fusco varia transversim striata hinc in
sum.
Mus. Gottwald. t. 26. f. 175. d. e?
Martin. Conch. 4. t. 123. f. 1140.
Habitat ad insularum Americæ australi obversarum littoribus.
- piscato-** 116. B. testa cancellata in sectionis angulis nodulosa:
rium. tura utrinque dentata acuta.
List. Conch. t. 1024. f. 89.
Habitat in India, an ad volutas referendum?
- S. Mau-** 117. B. testa alba intus flavescente: labro sexdentato,
ritii. fractibus spinis; primo quadrifariam coronatis.
Martin. Conch. 4. t. 124. f. 1253. 1154.
Habitat in insula S. Mauritii.
- armilla-** 118. B. testa oblonga: apertura ampla edentula, an-
- tum. tibus singulis tuberculorum serie coronatis.
List. Conch. t. 954. f. 5.
Knorr Vergn. 4. t. 26. f. 2.
v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 11. f. 6. 7.
Martin. Conch. 4. t. 124. f. 1155-1157.
Habitat - - - testa tenui.
- plicatu-** 119. B. testa oblonga perpendiculariter plicata transver-
- lum. que striata fasciis albis fuscisque alternis varia iure
violacea.
Martin. Conch. 4. t. 124. f. 1158. 1159.
B) Gualt. test. t. 44. f. E?
Habitat in India.
- vulga-** 120. B. testa ventricoso-oblonga: striis longitudinalibus decan-
- tum. plici-formibus transversas subtiliores undulatas deca-
- fantibus.
Seb. mus. 3. t. 49. f. 61. 62.
Martin. Conch. 4. t. 124. f. 1162. 1163.
B) Gualt. test. t. 44. f. V?
Martin. Conch. 4. t. 124. f. 1165. 1166.
Habitat frequentissimum in mari mediterraneo, ad Ar-
giliæ insularumque canariensem & Azorum littoribus,
testa mediae magnitudinis, coloris varii, striis albis &
cæruleis alternis, subfuscis & flavidantibus.
- stolatum.** 121. B. testa fasciis discoloribus transversim striatis varia
spira horizontaliter costata; ansiactus primi alterna-

Martin. Conch. 4. t. 124. f. 1167-1169.

β) Seb. mus. 3. t. 53. f. 43?

Habitat frequens ad Tranquebariae littora, testa nunc fusca vel rubella fasciis albis, nunc alba fasciis fusciis vel rubellis, apertura intus dentata, columellæ plica simplici.

122. B. testa minuta alba cancellata: spira acuta.

Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1176.

Habitat - - -

123. B. testa parva angusta cancellata: apertura ampla crenata maculata.

Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1189-1191.

Habitat - - -

124. B. testa cancellata: costis perpendicularibus: interstitiis lœvibus planis, apertura ovata.

Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1192.

Habitat - - - testa minuta, spira vix prominula.

125. B. testa decussatim striata in sectionum angulis nodosa subventricosa lutea: anfractibus singulis fascia cœrulecente.

Gault. test. t. 43. f. M.

Habitat - - - testa $1\frac{1}{4}$ pollicem longa.

126. B. testa gibba decussatim striata in sectionum angulis nodosa: striis transversis undulatis, labro alato.

Gault. test. t. 43. f. Z.

Habitat - - - testa circiter pollicem longa.

127. B. testa angusta rugosa: rugis albo tuberculatis & nigro punctatis.

Gault. test. t. 44. f. F.

Habitat - - - testa $\frac{3}{4}$ pollicis circiter longa.

128. B. testa ovato-oblonga nitida fasciata longitudinaliter striato rugosa: labro intus subdentato.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 60?

Gault. test. t. 52. f. C.

Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1194? 1195.

Habitat in mari mediterraneo, testa colore fasciisque variz, sœpe cingulo nigro circumdata, columellæ labio minime replicato.

129. B. testa ovato oblonga nitida fusco-striata lœvi: aper-
tura edentula unilabiata.

Gault. test. t. 52. f. B.

Habitat in mari mediterraneo, nitidulo affine, at pupura minime dentata, columellæ labio nullo : spira plicis nullis distincta, testa pallida obsoleta maculosa striis obscurioribus.

lamello- 173. B. testa subplicata transversim costata sulcata tuberculata lamellosa brunneo alboque fasciata. *Chenn. Conch. 10. p. 179. vign. 21. f. A. B.*

Martyn Conchol. 2. f. 44.

Habitat in freto novæ Seelandiæ insulis interjecto.

scutula- 174. B. testa lævi brunnea venosa; anfractibus planiusculatum. cauda obtusa. *Chenn. Conch. 10. vign. 21. f. C.*

Martin. Conchol. 2. f. 55.

Habitat ad novæ Seelandiæ littora.

Hausto- 175. B. testa ovata ventricosa atra : spira brevi, columella depressa alba, sauce alba, labro introrsum striato crenulato. *Chenn. Conch. 10. p. 183. t. 152. f. 1449. 1450 v. Zorn n. Danz. Abb. 1. p. 272. n. 95.*

Martyn Conchol. 1. f. 9.

Habitat ad novæ Seelandiæ littora.

ventrico- 187. B. testa ovato-oblonga fusca albo striata subplicata sum. *Martyn univ. Conch. 2. t. 47.*

Habitat ad Sinum R. Georgii.

testudine- 176. B. testa ovata lævi maculis albicantibus fulcescentibus. busque alternis interrupte seriatis. *Chenn. Conch. 10. p. 187. t. 152. f. 1454.*

Zorn n. Danz. Abb. 1. t. 3. f. 5.

Habitat ad novæ Seelandiæ littora.

Catarrhac- 177. B. testa ovata scabra transversim confertim sulcata : tia. flammeo undulata. *Chenn. Conch. 10. p. 188. t. 153. f. 1455.*

Habitat ad novam Seelandiam.

tahiten- 182. B. testa turrita transversim costata sulcataque : tia. anfractuum suturam spirali nodulosa, apertura ovalis. labro subplicato. *Chenn. Conch. 10. p. 202. t. 154. f. 1477.*

Habitat ad Tahiti littora.

lamella- 187. B. testa imperforata lamellata alba intus purpurea : tia. labio albo. *Kaenim. Cab. Rudolst. p. 134. n. 43. t. 9. f. 2.*

Habitat ~ ~ ~ testa 1½ pollicem longa. th Tu*

h Turrita, *lævia subulata*.

130. B. testa subfusiformi : anfractibus lævibus indivisis integrerimis. *Mus. Lud. Ulr.* 613. n. 269.*

Rumpf mus. t. 30. f. A. *Strombus* I.

Lift. Conch. t. 846. f. 74.

Bonann. recr. 3. f. 317.

muf. Kircher. 3. f. 313.

Gualt. test. t. 56. f. I.

Argenv. Conch. t. II. f. A.

Seb. mus. 3. t. 56. f. 4.

Knorr Vergn. 3. t. 23. f. 2. & 6. t. 19. f. 6.

Martin. Conch. 4. t. 153. f. 1440.

β) *Knorr Vergn.* 3. t. 23. f. 3?

γ) *Rumpf mus.* t. 30. f. D.

Seb. mus. 3. t. 56. f. II.

Martin. Conch. 4. t. 153. f. 1442.

Schroet. Einl. in Conch. I. p. 349. t. 2. f. 6.

Habitat in Afriæ Africæque maribus frequens, γ) rarius
in Indiæ, testa 8 pollices longa flavescente albo
fasciata seriatim spadiceo maculata, spiræ anfractibus
14 & pluribus lævibus, extimis modo transversim striatis;
in γ) omnibus striatis: striis horizontalibus arcuatis.

131. B. testa subulata lævi indivisa integerrima.

Adans. Seneg. I. t. 4. f. 5. *Favat.*

Lift. Conch. t. 842. f. 70.

Bonann. recr. & *muf. Kirch.* 3. f. 118.

Rumpf mus. t. 30. f. B.

Gualt. test. 56. f. B.

Argenv. Conch. t. II. f. X.

Seb. mus. 3. t. 56. f. 16. 23. 24. 27. 28.

Martin. Conch. 4. t. 153. f. 1441.

β) *Knorr Vergn.* I. t. 23. f. 4.

γ) *Martin. Conch.* 4. t. 154. f. 1443.

γ) *Lift. Conch.* t. 184. f. 69.

δ) *Martin. Conch.* 4. t. 154. f. 1446.

ε) *Martin. Conch.* 4. t. 154. f. 1447.

ζ) *Seb. mus.* 3. t. 56. f. 39.

v. *Born mus. Caes. Vindob.* test. t. 10. f. 9.

Habitat frequens in Oceano indicō, testa 5 sc̄ere pollices
longa pallida maculis subquadraitis ferrugineis in singulis
anfractibus per paria adjacentibus, testa minime gibba
a maculae distinđum,

- renula- 132. B. spiræ anfractibus bifidis margine crenatis. ^{M. 14}
 sum. *Lud. Ulr.* 613. n. 270.*
Lst. Conch. t. 846. f. 75.
Rumpf mus. t. 30. f. E.
Gault. test. t. 57. f. L.
Seb. mus. 3. t. 56. f. 9. 10.
Knorr Vergn. 1. t. 8. f. 7.
Martin. Conch. 4. t. 154. f. 1445.
 β) v. *Born. mus. Caes. Vindob. test.* t. 10. f. 8. *Buccinum*
 candidum.
 γ) *Seb. mus.* 3. t. 56. f. 35?
 δ) *Seb. mus.* 3. t. 56. f. 36?
 ε) *Argenv. Conch.* t. 11. f. Y?
Habitat in mari, Africam & Indiam alluente, testa ultra-
5 pollices longa, ex carneo subfuscâ sèpius exalbidâ,
anfractuum marginè inferiori callo crenato cincto, crenar-
rum fusco striatarum lateri nodulis subquadratis adjacenti-
tibus, singulis quoque punctorum fuscorum serie du-
plici primo triplici cinctis.

- tecticum. 133. B. spiræ anfractibus bifidis : margine superiore com-
 pressa attenuato.
Gault. test. t. 56. f. C.
Seb. mus. t. 56. f. 21.
 β) *Gault. test.* t. 56. f. D.
Habitat in mari, Africam alluente, testa 4 pollices longa
& longiori, alba, anfractibus singulis fascia obsoletâ
luteo maculata cinctis.

- vittatum. 134. B. testa substriata : futura anfractuum duplice crenulatum
Adans. Seneg. 1. t. 4. f. 2. *Rafel.*
Lst. Conch. t. 977. f. 34.
Klein ostrac. t. 7. f. 121.
Knorr Vergn. 6. t. 36. f. 4.
Martin. Conch. 4. t. 155. f. 1461-1463.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. f. 8.
Einl. in Conch. 1. p. 352. t. 2. f. 7.
 β) *Adans. Seneg.* 1. t. 4. f. 1. *Miran.*
Lst. Conch. t. 977. f. 33.
Martin. Conch. 4. t. 155. f. 1468. 1469. & t. 157. f. 149.
 γ) *Martin. Conch.* 4. t. 155. f. 1470.
 δ) *Knorr Vergn.* 5. t. 22. f. 5.
Martin. Conch. 4. t. 155. f. 1471.
Habitat in mari Africam & Indiam alluente, testa ultra-
pollices longa, nunc ex carulescente cinerea : cingulata

*albis, nunc alba : anfractibus extremis rubellis, cinereis
aut cærulescensibus, ovato-turrita, striis transversis
remoris, apertura angula : margine nitido albo.*

135. B. spiræ anfractibus bifidis oblique striatis. *Mus. Lud.*
Ulr. 614. n. 271.

Rumpf mus. t. 30. f. H. Strombus nonus granulatus,
Lift. Conch. s. 845. f. 73.

Knorr Vergn. 6. t. 22. f. 8. 9.

Martin. Conch. 4. t. 155. f. 1456.

♂) *Lift. Conch. t. 979. f. 36.*

Gault. test. t. 57. f. O.

Argenv. Conch. t. II. f. R.

♀) *Born. mus. Caes. Vindob. test. t. II. f. 10.*

Chemn. Conch. 4. p. 235. vign. 40. f. I.

♀) *Lift. Conch. t. 979. f. 37?*

♂) *Argenv. Conch. t. II. f. S?*

Habitat in mari Asiam australem alluente, testa straminea aut fusca, 2 $\frac{3}{4}$ pollices longa, spiræ anfractibus 16-20, & ultra.

136. B. spiræ anfractibus bipartitis striatis. *Mus. Lud. Ulri-*
*614. n. 272.**

Lift. Conch. t. 837. f. 64.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 110.

Gault. test. t. 57. f. N.

Knorr Vergn. 6. t. 18. f. 6. & t. 24. f. 5.

Martin. Conch. 4. t. 155. f. 1455.

♂) ♀) *Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 10. f. 13?* *Buccinum pertusum.*

Habitat in India, testa ultra 4 pollices longa, fusca, cingulis dilutionibus & anfractibus primi fascia angusta alba, aut chalybea, aut rufescente, longitudinaliter striata, anfractibus singulis cingulo lato piano bipartitis.

137. B. testa lævi : anfractibus integris ; lineis longitudinalibus testaceis.

Rumpf mus. t. 30. f. G.

Argenv. Conch. t. II. f. Z.

Knorr Vergn. 6. t. 24. f. 4.

Martin. Conch. 4. t. 134. f. 1450.

Habitat raro in India, testa tenui pellucida ad apicem levissime striata cana, spira acuta, cauda vix retusa.

138. B. spiræ anfractibus bifidis lævibus.

Lift. Conch. t. 843. f. 71.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 107

Rumpf. mus. t. 30. f. C.

Gault. test. t. 57. f. M.

Seb. mus. 3. t. 56. f. 15. 19.

Knorr Vergn. I. t. 23. f. 5. & 6. t. 18. f. 5.

Martin. Conch. 4. t. 154. f. 1444.

β) *Gault. test. t. 57. f. I?*

γ) ν. *Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 10. f. 7. Buccinum ferrugineum.*

Habitat in mari Africam & Indiam alluente, testa ultra pollices longa, lateritia maculis undatis fasciisque albis

murinum. 139. B. spirae anfractibus subangulatis: striis tribus muricatis

Gault. test. t. 57. f. P.

Habitat ad Africam, testa nigra basi gibba, anfractibus sepe basi albis.

tigrinum. 140. B. testa pellucida alba rufescens-punctata: anfractibus singulis dorso subemarginatis.

Gault. test. t. 56. f. G.

Seb. mus. 3. t. 56. f. A.

Martin. Conch. 4. t. 154. f. 1448.

Habitat - - - testa minuta.

Acus. 141. B. testa acuta exalbida lineis undulatis horizontaliter anfractibus bifidis crenulatis rugosis, columella spiculata liter torta.

Martin. Conch. 4. t. 154. f. 1449.

Habitat - - - testa $1\frac{1}{2}$ pollicem circiter longa.

succinctum. 142. B. testa subulata horizontaliter striata: anfractibus singulis cingulatis.

Martin. Conch. 4. t. 154. f. 1451.

Habitat frequens in Oceano indico, testa alba vel straminea

commaculatum. 143. B. testa subulata lituris flavis & rufescens anfractibus planiusculis transversim striatis cingulatis.

Martin. Conch. 4. t. 154. f. 1452.

β) *Knorr Vergn. 6. t. 22. f. 8. 9?*

Habitat - - - testa alba aut cana.

hastatum. 144. B. testa subventricosa: anfractibus perpendiculariter striatis; fasciis alternis fascis albisque.

Martin. Conch. 4. t. 154. f. 1453. 1454.

Habitat - - - testa vix $1\frac{1}{2}$ pollicem longa.

- acicula-
tam.
Phallus.
Domi-
neum.
ziperum.
murici-
num.
lebercu-
latum.
Punctula-
tum.
Acicula-
lam.
145. B. testa alba : fasciis fuscis punctorum excavatorum.
Martin. Conch. 4. t. 155. f. 1457.
Habitat - - -
146. B. spiræ anfractibus longitudinaliter costatis basi sutura rugosa , labro prominulo superne emarginato.
Martin. Conch. 4. t. 155. f. 1464. 1465.
Schroet. Flusconch. p. 401. n. 194.
Habitat in Indiæ , an fluvilis ? testa tenui sub epidermide fusca flavicante , subsufca aut rufescente diaphana , costis albis , intus lævis ; spiræ anfractibus 9 , costis subincurvis.
147. B. spiræ aufractus convexis distantibus transversim striatis : superioribus horizontaliter costatis.
Lift. Conch. t. 118. f. 13.
Martin. berl. Mag. 4. t. 10. f. 52.
Habitat in - - - aquis dulcibus , testa $3\frac{1}{2}$ pollices longa.
148. B. spiræ anfractibus costatis transversim striatis : primq gibbo , cauda prominula.
Lift. Conch. t. 925. f. 17.
B) Lift. Conch. t. 925. f. 18.
Habitat - - - testa $1\frac{1}{2}$ pollicem longa.
149. B. testa reticulata rugosa : spira incurvata , apertura crenata ; columella rugosa , labro incrassato. *Gron. zooph. p. 308. n. 1381.*
Lift. Conch. t. 926. f. 19.
Habitat - - - murici clathrato affine , an hujus tribus?
150. B. spiræ anfractibus singulis tuberculorum serie cinctis.
Lift. Conch. t. 958. f. 11. b.
Habitat - - - testa exili.
151. B. testa subulata punctata transversim striata ; apertura obovata , spiræ anfractibus fascia cinctis ; primo ventricoso.
Lift. Conch. t. 979. f. 38.
Habitat - - - testa vix pollicem longa.
152. B. testa subulata lævi tenuissima subtilissime transversim striata : spiræ anfractibus contiguis.
Lift. Conch. t. 1055. f. 7.
Habitat in - - - aquis dulcibus , testæ apertura ovali.

- fasciola-** 153. B. testæ apertura ovato-oblonga : anfractibus ^{v. 20} tricosis distantibus horizontaliter striatis : striis elevatis fascia intermedia sejunctis.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 45.
Klein ostr. t. 7. f. 123.
Habitat - - -
- niveum.** 154. B. testa subulata lævi nivea bifasciata : spiræ anfractibus contiguis.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 109.
Klein ostr. t. 7. f. 117.
Habitat - - -
- mucrona-** 155. B. testa subventricosa alba fusco undulata : apertus tum. ovali.
Bonann. mus. Kirch. 3. f. 400.
Habitat - - - testa ultra 3 pollices longa, spiræ anfractibus 5.
- Digitel-** 156. B. testa rudi apice obtusa subincurva.
 Ius. *Rumpf mus. t. 29. f. Q.*
Habitat in India, testa $\frac{1}{2}$ pollicem longa, nunc granulata grisea & fasciata, nunc lævissima nivea.
- obli-** 157. B. spiræ anfractibus integris oblique decussatimque
quum. striatis.
Rumpf mus. t. 30. f. E. Strombus septimus.
Habitat in India, striolato affine, testa digiti longitudo, calami crassitie.
- chaly-** 158. B. testa subangulata sulcata.
beum. *Rumpf mus. t. 30. f. 1. Strombus chalybeus.*
Habitat in India, testa $1\frac{1}{4}$ pollicis longa chalybea, aliis albo nigroque punctata.
- fluviatile.** 159. B. testa tenui : anfractibus contiguis, cauda submarginata.
Rumpf mus. t. 30. f. P. Strombus fluviatilis.
Mart. berl. Mag. 4. t. 9. f. 39.
Habitat in Indiæ fluviorum ostiis limosis, testa opaca cinereo viridi, 4-5 pollices longa, interdum nigritate.
- radiatum.** 160. B. testa subulata albida rufescenti-radiata : anfractibus convexis striis granulatis cinctis ; primo ventricole secundo duplo majore.
Gualt. test. t. 52. f. D.
Habitat - - -

161. B. spiræ anfractibus longitudinaliter rugosis transversim granulato-striatis : anfractu primo altero duplo majore.
Gualt. test. t. 56. f. F.
Habitat - - - testa pollicem circiter longa.
162. B. anfractibus maculatis, apertura elongata edentula, columella plicata.
Argenv. Conch. t. II. f. O.
Habitat - - -
163. B. testa longitudinaliter striata : fasciis punctatis maculatis inter anfractus intermediis.
Argenv. Conch. t. II. f. Q.
Habitat - - - strigilato affine.
164. B. testa maculata : spiræ anfractibus canaliculatis.
Argenv. Conch. t. II. f. T.
Habitat - - - spiræ anfractibus 17.
165. B. spiræ anfractibus convexis coronatis bifariam, primo trifariam punctatis.
Seb. mus. 3. t. 56. f. 17.
Habitat - - - testa 3½ pollices longa.
166. B. testa subulata maculata : anfractibus convexis subremotis.
Seb. mus. 3. t. 56. f. 20.
Habitat - - -
167. B. testa subulata lœvi cinerea obsolete fasciata : anfractibus indivisis ad suturam longitudinaliter striatis.
v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 10. f. II. 12.
Habitat - - - testa parum infra 2 pollices longa ; spiræ anfractibus 14.
168. B. testa ex virescente flava : fasciis duabus sanguineis, spiræ anfractibus planiusculis, apertura ampla ovali.
List. Conch. t. 113. f. 7.
Martin. berl. Magaz. 4. p. 347. t. 10. f. 48.
Habitat in Virginie fluviis.
169. B. spiræ anfractibus bifidis inferiore substriato, superiore filiformi. *Mant. 2. p. 550.*
Habitat - - - testa subulata nitida.
170. B. spiræ anfractibus bifidis : inferiore sulcato, superiore moniliformi. *Mant. 2. p. 550.*
Habitat - - - testa subulata albida subflavescente.

cingula- 171. *B. cingulis tribus elevatis supra infraque canaliculatum.* *Mant.* 2. p. 550.

Habitat in Islandia, murici dolario affine, testa orata, nerea, transversim striata, pruni minoris magnitudini cingulis levibus, ventris 3, spirae 2, anfractibus super planiusculis, apertura obovata, columella planiuscula.

geminum. 172. *B. spirae anfractibus bifidis: inferiore substriato, superiore protuberantio.* *Mant.* 2. p. 550.
Habitat - - - testa subulata alba.

324. STROMBUS. *Animal Limax.*

Testa univalvis, spiralis, laterale ampliata.

Apertura labro saepius dilatato, definens in canalem sinistrum.

* *Digitati, labio in lacinias lineares exeunte.*

Fusus. 1. *Str. testa turrita levii: cauda subulata, labro dentato.*
Mus. Lud. Ulr. 638. n. 316. *Murex Fusus.*
Lift. Conch. t. 854. f. 12.

Seb. mus. 3. t. 56. f. 1.

Knorr Vergn. 5. t. 6. f. 1. & t. 7. f. 1.

Martin. Conch. 4. t. 158. f. 1495. 1496.

Spengl. selt. Conch. t. 3. f. B.

Chemn. Naturf. 9. t. 6. f. 2.

Schroet. Journ. 5. t. 1. f. 2.

β) *Seb. mus.* 3. t. 56. f. 3.

Martin. Conch. 4. t. 158. f. 1497.

γ) *Lift. Conch.* t. 854. f. 11. & t. 916. f. 9.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 121.

Argenv. Conch. t. 10. f. D.

Klein. ostr. t. 4. f. 77.

Seb. mus. 3. t. 56. f. 2.

Martin. Conch. 4. t. 159. f. 1500.

Chemn. Conch. 4. p. 344. vign. 41.

Habitat frequens in mari rubro, γ) rariissimus, celsa fusca, levii, ad basin transversim striata, columella alba, cauda extrinsecus nigra, dubii generis, labro dentato.

*cum strombis conveniens, cauda magis recta recedens,
a muricibus testa levata.*

- Pelec. cani. 2. Str. testa labro tetradactylo palmato digitis angulato, fauce lœvi. *Fn. succ. 2164.* Mus. Lud. Ulr. 615. n. 273.**
Lift. Conch. t. 865. f. 20. t. 866. f. 21. b. & t. 1059. f. 3.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 85. 87.
Gualt. test. t. 53. f. A. B. C.
Argeny. Conch. t. 41. f. M.
Klein ostr. t. 2. f. 41. 42.
Lesser testaceoth. f. 80.
Seb. mus. 3. t. 62. f. 17.
Mus. Gottwald. t. 18. f. 130. a. b.
Knorr Vergn. 3. t. 7. f. 4.
Murray testaceol. t. 1. f. 21.
Müll. zool. dan. 3. p. 10. t. 87. f. I. 2.
Martin. Conch. 3. t. 85. f. 848-850.

Habitat frequens in Oceano europæo, norwegico, mediterraneo, americano, testa vix 2 pollices longa mucronata, exalbida, cinerea aut rufescente, intus alba lœvi nitida, anfractibus trifariam, rarius bifariam tuberculatis.

- Chiragra. 3. Str. testæ labro hexadactylo : digitis curvis, cauda recurvata. *Mus. Lud. Ulr. 615. n. 274.**
Rumpf mus. t. 35. f. A. Harpago.
Lift. Conch. t. 870. f. 24.
Gualt. test. t. 35. f. B.
Lesser testacenth. f. 81.
Beßl. gezoph. t. 22. f. 2.
Lochn. mus. Beßler t. 21. f. 6.
Seb. mus. 3. t. 82. f. 1. 6. 7. 9. 10. 12.
Mus. Gottwald. t. 20. f. 141. b.
Knorr delic. t. B. II. f. I.
Vergn. I. t. 27. f. I.
Martin. Conch. t. 86. f. 853. 854. & t. 87. f. 856. 857.

Strombi junioris testæ carent labro, & turbinatam figuram referunt, perperam hinc ab autoribus ad distincta genera relate: Cui stromborum tribui adscribendæ
1st a Liftero Conch. t. 848. f. 2-4. & t. 859. f. 15. a Bonanni recr. 3. f. 292. & mus. Kirch. 3. f. 294. a Gualtieri test. t. 28. f. H. t. 31. f. L. & t. 32. f. C. Seb. mus. 3. t. 52. f. 17. 18. t. 61. f. 26. 27. 40. 48. 49. 54. t. 62. f. 42. 43. Knorr Vergn. 5. t. 22. f. 4. & minus adulta a Liftero t. 890. f. 10. a. a Bonanni recr. 3. f. 291. & mus. Kirch. 3. f. 293. a Seba mus. 3. t. 61. f. 22. 23. t. 62. f. 33. & t. 83. f. 8. 9. II. duncatæ?

b) junior.

List. Conch. t. 875. f. 31. & t. 883. f. 6.
Bonann. recr. 3. f. 314. 315.
muf. Kircher. 3. f. 317.
Rumpf muf. t. 35. f. B. C. & t. 37. f. 1. *Harpag*
femina.
Gualt. test. t. 26. f. B. & t. 35. f. A.
Seb. muf. 3. t. 62. f. 34. t. 73. f. 29. & t. 83 f. 1.
Mus. Gottwald. t. 21. f. 144. b.
Martin. Conch. t. 85. f. 851. 852. & t. 92. f. 895.
Habitat pretiosus in Oceano indico, testa grandi, suffusa, varia, dorso tuberculis coronata, fauce sanguinolenta, labio interiore substriata, labio subtus antrorum distinctorum, inter digitos posteriores ad caudam hispida, digitis una cum cauda 6, antrorum incurvatis, longissimis duobus furcæ instar divergentibus, subtus fascia coalitis.

Scorpius. 4. Str. testæ labro heptadactylo : digitis nodosis ; posteriores longissimo. *Mus. Lud. Ulr.* 616. n. 275.
Rumpf muf. t. 36. f. K. *Cornuta nodosa.*
Argenv. Conch. t. 14. f. B. *Scorpio.*
List. Conch. t. 867. f. 22.
Bonann. recr. 3. f. 312. 313.
muf. Kirch. 3. f. 316.
Valent. Abh. t. 3. f. 28.
Gualt. test. t. 36. f. C.
Seb. muf. 3. t. 82. f. II. 15.
Mus. Gottwald. t. 21. f. 144. a.
Knorr Vergn. 2. t. 3. f. I.
Murray testaceol. t. I. f. 29.
Martin. Conch. t. 88. f. 860.
Habitat rario in Oceano indico, testa ad 4 pollices longa, crassa, dorso transversim striata & trifariam tuberculata, fauce violacea striata, utrinque dentibus albis armata.

Lambis. 5. Str. testæ labro heptadactylo : digitis rectiusculis, fainte lœvi. *Mus. Lud. Ulr.* 617. n. 276.*
Rondel. test. 79. f. 71. *Aporrhais.*
Barrel. rar. 1326. f. 7.
Rumpf muf. t. 35. f. F. H.
Gualt. test. t. 36. f. A. B.
Lesser testaceoth. f. 82.
Seb. muf. 3. t. 82. f. 8.
Mus. Gottwald. t. 20. f. 141. a.

- Martin. Conch. 3. t. 86. f. 855. & (a) t. 91. f. 888.
 Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. f. 1.
 Chemn. Naturf. 9. t. 6. f. 1. (a).
 β) Rumpf mus. t. 35. f. E: Cornuta.
 Argenv. Conch. t. 14. f. E. Lambis.
 Gualt. test. t. 35. f. C.
 Seb. mus. 3. t. 81. f. 2. 3. 5. 16. 17. 20.
 Knorr Vergn. 1. t. 28. f. 1.
 Mus. Gottwald. t. 21. f. 139. a. f. 142.
 Regenf. Conch. 1. t. 4. f. 45.
 Martin. Conch. 3. t. 87. f. 858. 859.
 α) Rumpf mus. t. 35. f. D.
 Gualt. test. t. 30. f. A.
 Seb. mus. 3. t. 61. f. 9. 10. & t. 83. f. 10.
 Knorr Vergn. 2. t. 27. f. 4.
 Mus. Gottwald. t. 28. f. 205. a. b.
 Martin. Conch. 3. t. 90. f. 884. & t. 91. f. 889.
 Schroet. Einl. in Verstein. 4. t. 8. f. 4.
 β) List. Conch. t. 866. f. 21.
 Rumpf mus. t. 36. f. G.
 Seb. mus. 3. t. 82. f. 18. 19.
 Mus. Gottwald. t. 18. f. 128. b. t. 20. f. 140. t. 21. f.
 139. b. & f. 143.
 Knorr Vergn. 3. t. 7. f. 1.
 Martin. Conch. 3. t. 52. f. 902. 903.
 γ) Knorr Vergn. 5. t. 4. f. 3.
 Chemn. Conch. 10. t. 158. f. 1508. 1509.
 Schroet. Einl. in Conch. I. p. 469. t. 2. f. 15. & 2. t. 7. f. 4.
 δ) Chemn. Conch. 10. p. 205. t. 155. f. 1478.
 Habitat in mari Asiam australem alluente, testa saepius
 grandi fusca albo varia : fauce rufescente, digitis non
 nodosis.
- Millepeda* 6. Str. testæ labro decadastylo : digitis inflexis, fauce
 substriata, dorso gibbere compresso. Mus. Lud. Ulr.
 618. n. 277.*
 Rumpf mus. t. 36. f. I. Cornuta millepeda.
 Argenv. Conch. t. 15. f. B. Millepeda (b.)
 List. Conch. t. 868. f. 23. & t. 869. f. 23.
 Bonann. recr. 3. f. 311.
 mus. Kirch. 3. f. 315.
 Martin. Conch. 3. t. 88. f. 861. 862. & (a) t. 93. f. 906. 907.
 β) Chemn. Conch. 10. p. 207. t. 155. f. 1479. 1480.
 γ) Chemn. Conch. 10. t. 157. f. 1494. 1495.
 Habitat paulo rarer in mari Asiam australem alluente.

Clavus. 7. Str. testa territa lævi: cauda subulata, labro simplici
Mant. 2. p. 549.
Argenv. *Conch.* t. 10. f. A.
Martin. *Conch.* 4. t. 159. f. 1501. 1502.

** Lobati.

Lentigino- 8. Str. testæ labro anterius trilobo incrassato, dorso verrucosus.
Rondel. *test.* 91. *Turbo auritus.*
Rumpf *mus.* t. 37. f. Q. *Lentiginosa.*
Barrel. *rar.* 1326. f. 4. & 1327. f. 5.
List. *Conch.* t. 861. f. 18.
Bonann. *recr.* & *mus.* *Kirch.* 3. f. 300.
Gualt. *test.* t. 32. f. A.
Argenv. *Conch.* t. 15. f. C.
Seb. *mus.* 3. t. 62. f. 11. 30.
Mus. *Gottwald.* t. 17. f. 128. b. †. c. †. d. †.
Knorr Vergn. 3. t. 13. f. 2. & t. 26. f. 2. 3.
Martin. *Conch.* 3. t. 80. 81. f. 825-828.
 a) *Seb.* *mus.* 3. t. 61. f. 7.
Mus. *Gottwald.* t. 17. f. 128. a. †.
Martin. *Conch.* 3. t. 78. f. 800-802. & t. 91. f. 892.
 β) *Seb.* *mus.* 3. t. 52. f. 17. 18.
Knorr Vergn. 3. t. 26. f. 2. 3.
Chemn. *Conch.* 10. t. 158. f. 1510. 1511.

Habitat in Asia australi & Africa, testa fusca aut rufa, cente, ranæ instar varia, $3\frac{1}{2}$ pollices longa, ponderosa, apertura glabra, rarius ex atro violacea, crebrius cunctis labro & columella matris perlarum instar nitente; operculum inter blattas byzantinas.

fasciatus. 9. Str. testæ labro integro, dorso trifariam verrucis coronato inter verrucas roseo.
List. *Conch.* t. 860. f. 17.
Bonann. *recr.* 3. f. 306.
mus. *Kircher.* 3. f. 307.
Klein ostr. t. 6. f. 107.
Seb. *mus.* 3. t. 62. f. 6-8.
Mus. *Gottwald.* t. 17. f. 127.
Knorr Vergn. 3. t. 17. f. 1.
Martin. *Conch.* 3. t. 82. f. 833. 834.
 a) *List.* *Conch.* t. 883. f. 5.
Knorr Vergn. 3. t. 16. f. 4.

Martin. Conch. 3. t. 90. f. 880. & t. 91. f. 893.
 8) Chemn. Conch. 10. t. 155. f. 1483. 1484.

Habitat in Africa, testa tenuiore, duplo longiori, labro magis prominulo a lentiginoso distinctus, testa ceterum alba, anfractibus plurimis simplici verrucarum corona cinctis.

10. Str. testae labro tenui rugoso superne repando, dorso aurantio transversim striato verrucis coronato, apertura alba nitida.

Knorr Vergn. 6. t. 29. f. 8.

Habitat - - -

11. Str. testae labro anterius mucronato longissimo, dorso coronato, cauda recta. Mus. Lud. Ulr. 619. n. 279.*

Rumpf mus. t. 37. f. 5. Laphoon.

List. Conch. t. 874. f. 30.

Bonann. recr. 3. f. 309. 310.

mus. Kirch. 3. f. 310. 311.

Gualt. test. t. 32. f. M.

Seb. mus. 3. t. 62. f. I.

Mus. Gottwald. t. 18. f. 129. a.

Knorr delic. t. B. IV. f. 3.

Vergn. 4. t. 12. f. I.

Martin. Conch. 3. t. 84. f. 841. 842. & t. 85. f. 846.

8) List. Conch. t. 871. f. 25.

Bonann. recr. 3. f. 307. 308.

mus. Kirch. 3. f. 308. 309.

Valent. Abh. t. 10. f. 91.

Gualt. test. t. 32. f. F.

Klein ostr. t. 6. f. 108.

Seb. mus. 3. t. 62. f. 4. 5. 9. 10. 12. 14. 15. 27.

Mus. Gottwald. t. 19. f. 133. a.

Knorr Vergn. 3. t. II. f. I.

Martin. Conch. 3. t. 83. f. 836. 837.

2) List. Conch. t. 891. f. II.

Mus. Gottwald. t. 28. f. 199. a. 201.

Seb. mus. 3. t. 62. f. 35 - 37.

Knorr Vergn. 5. t. 9. f. 5.

7) Martin. Conch. 3. t. 89. f. 871. & t. 91. f. 891.

Seb. mus. 3. t. 63. f. 6.

8) Martin. Conch. 3. t. 84. f. 843-845.

2) List. Conch. t. 873. f. 29.

Martin. Conch. 3. t. 85. f. 847.

2) Argenv. Conch. t. 14. f. K.

Martin. Conch. 3. t. 91. f. 890.

ζ) *Schroet.* Einl. in Conch. I. p. 453. t. II. f. 13.

η) *Seb. mus.* 3. t. 62. f. 3?

δ) *Seb. mus.* 3. t. 62. f. 2.

Spengl. selt. Conch. t. 3. f. A.

Chemn. Conch. 10. t. 158. f. 1506. 1507.

Habitat in mari Asiam Americamque australem alluentem
etiam rubro, testa cum mucrone bipollicari 6 pollici
longo, nunc unicolor fusca, flava aut violacea, ^{rum}
maculis radiisque varia lata, dorso costis laceribus, ^{rum}
simplicibus, nunc duplicitibus cincto, anfractu primo capi-
na tuberculorum, in sequentibus vix conspicuorum.

Auris Di- 12. Str. testae labro mucronato, dorso muricato, cauda ^{en}cauda
anæ. acuta. *Mus. Lud.* Ulr. 620. n. 280.*

Rumpf *mus.* t. 37. f. R. *Pugiles.*

Argenv. Conch. t. 14. f. O. *Auris Dianaæ.*

Lift. Conch. t. 872. f. 28.

Bonann. recr. 3. f. 301. 302.

mus. Kircher. 3. f. 302. 303.

Gualt. test. t. 32. f. D. H.

Klein ostr. t. 6. f. 106.

Lesser testaceoth. t. 79.

Mus. Gottwald. t. 19. f. 131.a-k. f. 132. f. 133. b. f. 134.

Seb. nius. 3. t. 61. f. 3 - 6. & t. 62. f. 13.

Knorr Vergn. 2. t. 15. f. 1. 2.

Martin. Conch. 3. t. 84. f. 838. 839.

Schroet. inn. *Bau Conch.* t. 2. f. 9.

β) *Seb. mus.* 3. t. 61. f. 1. 2. & t. 62. f. 16.

Martin. Conch. 3. t. 84. f. 840.

γ) *Lift.* Conch. t. 871. f. 26.

δ) *Favann.* Conch. t. 21. f. A².

Martyn Conch. I. f. I.

Chemn. Conch. 10. t. 156. f. 1485. 1486.

ε) *Lift.* Conch. t. 872. f. 27.

Chemn. Conch. 10. t. 156. f. 1487. 1488.

Habitat in mari Asiam australem altuente, testa viridulæ
3 pollices longa, crassa, rarius unicolo, quam varia
gata, dorso trifurcata vel quadrifurcata tuberculis ^{rum}
tis coronato, intersticiis seriatum transversim collatis ^{rum}
anfractibus extinis cancellatis, fance incarnata, co-
lumella alba.

Pugilis. 13. Str. testæ labro anteriori prominente rotundato ^{rum}
spira spinosa, cauda triloba obtusa. *Mus. Lud.* Ulr.
620. n. 281.*

Lift. Conch. t. 864. f. 19.

Bonann. recr. 3. f. 229. 299.

muf. Kircher. 3. f. 229. 301.

Gualt. test. t. 32. f. B.

Argenv. Conch. t. 15. A.

Mus. Gottwald. t. 17. f. 125. 125. a. b. 126. a. b.

Knorr Vergn. I. t. 9. f. 1. & 3. t. 16. f. 1.

Martin. Conch. 3. t. 81. f. 830. 831.

2) Rumpf mus. t. 36. f. 6.

Gualt. test. t. 31. f. G.

Seb. mus. 3. t. 62. f. 44. 50.

Mus. Gottwald. t. 28. f. 202. a. b. c. 203. 204. a. b. 207. a.

Knorr Vergn. I. t. 30. f. 1. & 6. t. 29. f. 6. 7.

Mart. Conch. 3. t. 90. f. 882. 883.

Schroet. Einl. in Verstein. 4. t. 8. f. 9.

3) Chemin. Conch 10. t. 156. f. 1493.

Habitat in Oceano, Jamaicam & australem Americam
alluente, testa incarnata, rufescente aut subfuscata, intus
spiraque dilutiore nitida, labro intus subdentato, dorso
laevi, spiræ anfractu primo spinis coronato, in sequen-
tibus sensim evanidis, anfractibus extimis cancellatis.

14. Str. testæ labro anteriori prominente rotundato laevi,
spira inermi, cauda triloba obtusa.

Martin. Conch. 3. t. 91. f. 894.

Schroet. Einl. in Conch. I. p. 454. t. 2. f. 14.

Habitat - - - testa fusca : fascia alba fusco macu-
lata, spira alba fusco radiata & undulata, ventre &
columella dilute badiis, cauda incarnata, fauce alba,
labro intus fusco cæruleo rubroque nitente, ad margi-
neni incarnato, dorso laevi ad basin tuberculis subacu-
tis coronato.

15. Str. testæ labro prominulo, dorso marginato laevi,
cauda integra.

Martin. Conch. 3. t. 79. f. 816.

Schroet Einl. in Conch. I. p. 431. t. 2. f. 10.

Chemin. Conch. 10. t. 156. f. 1489. 1490.

Habitat rarius - - - testa ex fusco lutea : fasciis angustis
albis filis fuscis interruptis, anfractibus primis dilute
subfuscis extimis roseis, labro columellaque niveis,
intus dentatis, dorso laevi, anfractibus & primis mar-
ginatis.

16. Str. testæ labro prominulo, dorso laevi, anfractibus
rotundatis æqualibus. Mus. Lud. Ulr. 621, n. 282.*

Rumpf mus. t. 37. f. S. Luhuana.

Lift. Conch. t. 850. f. 5. & t. 851. f. 6.
Gualt. test. t. 31. f. H. I.

Argenv. Conch. t. 14. f. N. (descr.)

Seb. mus. 3. t. 61. f. 11. 12. 20. & t. 62. f. 31.

Knorr Vergn. 5. t. 16. f. 5. & 6. t. 15. f. 3.

Martin. Conch. 3. t. 77. f. 789-791. 799.

a) *Lift. Conch.* t. 849. f. 4. a.

Seb. mus. 3. t. 61. f. 13. 14.

Mus. Gottwald. t. 28. f. 191. a. b.

Martin. Conch. 3. t. 88. f. 865-869.

β) *Knorr Vergn.* 6. t. 17. f. 2.

γ) *Chenin. Conch.* 10. t. 157. f. 1499. 1500.

*Habitat frequens in mari Asiam australem alluente,¹⁰
 alba crebro radiata aut transversim fasciata,²¹ pollicis
 circiter longa, columella nigro-lineata, sauce rubra
 labro rufescente.*

gibberulus. 17. Str. testæ labro prominulo, dorso lævi, ^{anfractuosa}
 gibbosus inæqualibus. *Mus. Lud. Ulr.* 621. n. 20.

Rumpf mus. t. 37. f. V. *Canarium.*

Lift. Conch. t. 847. f. 1.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 150.

Valent. Abh. t. 7. f. 64.

Gualt. test. t. 31. f. N.

Argenv. Conch. t. 14. f. N. (ic.)

Seb. mus. 3. t. 61 f. 17-19. 51-53. & t. 62. f. 48.

Mus. Gottwald. t. 28. f. 190. a. b. c. f. 195.

Knorr Vergn. 2. t. 14. f. 3. & 3. t. 13. f. 4.

Martin. Conch. t. 27. f. 792-798.

Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. f. 3.

a) *Mus. Gottwald.* t. 28. f. 190. d.

Seb. mus. 3. t. 61. f. 21.

Martin. Conch. 3. t. 88. f. 863. 864.

*Habitat in mari, Asiam australem alluente,¹⁰
 crebro fasciata, maculata, aut nebulosa, testa alba
 striata & columella inius partim nunc cærulezis vel
 cæruleofuscis, nunc rubellis, vel rubris.*

Oniscus. 18. Str. testa obovata cingulis nodosis, mucrone subiugata
 lævi.

Lift. Conch. t. 791. f. 44.

Valent. Abh. t. 4. f. 33.

Gualt. test. t. 22. f. 1.

Mus. Gottwald. t. 26. f. 179. b. 180.

Seb. mus. 3. t. 55. f. 23.

Knorr Vergn. 4. t. 12. f. 4. & 6. t. 15. f. 4.

Martin. Conch. 2. t. 34. f. 357. 358.

Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. f. 8.

Habitat in Oceano, Americam australem alluente, testa vix ultra pollicem longa, avellanæ magnitudine, pallida maculis nigricantibus, nodis trifariam longitudinaliter dispositis, cauda nulla basique vix manifeste emarginata, spira obtusissima cingulo solitario noduloso, apertura alba longitudinali, columella lœvi, labro exteriori vix repando; an hujus generis?

**** Ampliati.

19. Str. testæ labro anteriori rotundato integro, ventre dupliciter striato, spira coronata: tuberculis superioribus minutis.

Lift. Conch. t. 887. f. 8. & t. 888. f. 9.

Bonann. recr. 3. f. 288. 303.

muf. Kircher. 3. f. 289. 305.

Barrel. rar. t. 1327. f. 7.

Rumpf muf. t. 49. f. M.

Valent. Abh. t. 10. f. 88.

Gault. test. t. 54. f. M. & t. 55. f. A. B.

Argenv. Conch. t. 14. f. I.

Klein. ostr. t. 4. f. 85.

Lesser testaceoth. f. 75.

Seb. muf. 3. t. 61. f. 8? & t. 62. f. 38-40.

Muf. Gottwald. t. 28. f. 199. b. 200. a. b. c. & t. 31.
f. 215-217.

Knorr Vergn. 2. t. 29. f. 1. & 3. t. 5. f. 4. & t. 16. f. 4.

Martin. Conch. 3. t. 90. f. 878. 879. 881. 885. 886.

β) *Valent. Abh.* t. 10. f. 90.

γ) *Gault. test.* t. 48. f. F?

δ) *Bonann. recr.* & *muf. Kirch.* 3. f. 86?

ε) *Lift. Conch.* t. 886. f. 7?

ζ) *Gault. test.* t. 54. f. M.

Habitat in Oceano, Americam australem alluente, testa variegata, tenuiori, spinisque longè minoribus armata, quam in Str. Gigante; nonne ætate minore solummodo ab hoc diversus?

20. Str. testæ labro rotundato maximo, coronata ventre spiraque spinis conicis patentibus.

Aldrov. exang. Rondel. pisc. 76. *Murex marmoreus.*

Gesn. aq. 340. *Conchylium.*

Lochn. muf. Beijer. t. 20. *Murex aculeata.*

Column. aq. t. 60. f. 5.

Bonann. recr. 3. f. 304. 321. 404. 405.
mus. Kircher. 3. f. 304. 321. 385. 386.
Gualt. test. t. 33. f. A. & t. 34.
Clear. mus. t. 32. f. 5.
Mus. Gottwald. t. 18. f. 128. a.
Martin. Conch. 3. t. 80. f. 824.
Schroet. inn. *Bau Conch.* t. 1. f. 1.
Habitat in Oceano, Americam australem alluente,
ad 11 pollices longa, 9 lata nitente alba, intus
vide rosea, perquam solida.

latissi-
mus.

21. Str. testae labro rotundato maximo, ventre inerni, fijo
 subnodosa. *Mus. Lud. Ulr.* 622. n. 284.*
Rumpf mus. t. 36. f. L. Alata lata.
Lift. Conch. t. 856. f. 12. c. & t. 862. f. 18. a.
Seb. mus. 3. t. 63. f. 1-3.
Martin. Conch. 3. t. 82. f. 832. & t. 83. f. 835.
 a) *Seb. mus.* 3. t. 83. f. 12-14.
Martin. Conch. 3. t. 89. f. 874.

β) *Martin. Conch.* 3. t. 89. f. 875. 876.
Habitat rario in mari, Asiam australem alluente,
solida, ad 14 pollices longa, fusco alboque varia, v-
ternum radia: a, labro intus albo, fauce rosea.

Epidro-
mis.

22. Str. testae labro rotundato brevi, ventre levavi, spirae lati
 nodosa. *Mus. Lud. Ulr.* 622. n. 285.*
Rumpf mus. t. 36. f. M. Epidromis.
Lift. Conch. t. 853. f. 10.
Seb. mus. 3. t. 62. f. 21. 22. 26.
Knorr Verga. 6. t. 33. f. 2.
Martin. Conch. 3. t. 79. f. 821.
 β) *Bonann. recr. & mus. Kircher.* 3. f. 342.
Habitat in mari, Asiam australem alluente,
pollices longa, nunc alba, nunc variegata, testa 3. p.
nodosis inaequali, extima-cancellata, labro seminigro,
lari intus columellaque niveis.

minimus. 23. Str. testae labro retuso gibbo, ventre spiraque pliata
 nodosis, apertura bilabiata levavi. *Mant.* 2. p. 34.
Rumpf mus. t. 36. f. P. Epidromis minima.
Valent. Abb. t. 5. f. 46.
Gualt. test. t. 31. f. L.
Schroet. Einf. in Conch. 1. p. 439. t. 2. f. II.
Chemn. Conch. 10. t. 156. f. 1491. 1492.

Habitat in India, urceo affinis, sed testa minore vix $1\frac{1}{2}$ pollicem longa, nunc testacea, nunc alba, fasciis superne 2 flavescenti punctatis, inferne 2 spadiceis, radiisque per anfractibus recurrentibus, labio utroque albido, fauce lœvi flava nec striata.

24. Str. testa subcordata : labro rotundato brevi retuso spiraque lœvi. *Mus. Lud. Ulr. 623. n. 287.**

List. Conch. t. 853. f. 9.

Petiv. gazoph. t. 98. f. 11.

Bonann. recr. & nus. Kirch. 3. f. 146. 147.

Rumpf mus. t. 36. f. N.

Argenv. Conch. t. 14. f. Q.

Klein ostr. t. 4. f. 73.

Seb. nus. 3. t. 62. f. 23-25. 28. 29.

Mus. Gottwald. t. 19. f. 137. a. b. c.

Knorr Vergn. I. t. 18. f. 5.

Martin. Conch. 3. t. 79. f. 817. 818.

2) *Seb. mus. 3. t. 61. f. 16?*

2) *Knorr. Vergn. 3. t. 13. f. 3?*

2) *Mus. Gottwald. t. 19. f. 135. b?*

Habitat in mari, Asiam australem alluente, testa $2\frac{1}{2}$ pollices circiter longa flava vel fusca, lineis transversis fuscis angulatis interdum notata, valde gibba, columella nivea.

25. Str. testæ labro rotundato brevi, ventre lœvi, spiræ elongatae anfractibus futura elevata distinctis. *Mus. Lud. Ulr. 623. n. 287.**

Rumpf mus. t. 36. f. O. Epidromis.

List. Conch. t. 852. f. 8. t. 855. f. 12. a. b:

Argenv. Conch. t. 9. f. F.

Seb. mus. 3. t. 62. f. 18-20.

Mus. Gottwald. t. 19. f. 136. 138. & t. 28. f. 206.

Knorr Vergn. 3. t. 20. f. 2.

2) *Martin. Conch. 3. t. 79. f. 815. 819. 820.*

2) *Walch. & Knorr Petref. 2. t. C. II. f. 1?*

2) *Favann. Conch. t. 20. f. A⁸.*

2) *Chemn. Conch. 10. t. 155. f. 1481. 1482.*

Chemn. Conch. 10. t. 157. f. 1496.

Habitat rario in mari Asiam australem alluente, testa 4 circiter pollices longa, rarius unicolo, quem albidæ, fasciis fuscis, aut fusca fasciis albis maculatis, spiræ longiore, anfractibus magis distantibus & longitudinaliter plicatis ab epidromide distinctus.

- Saccinctus.** 26. Str. testæ labro rotundato retuso, ventre lævi cingulis quatuor pallidis linearis-punctatis.
List. Conch. t. 859. f. 16.
Rumpf mus. t. 37. f. X.
Gault. test. t. 33. f. B.
Argenv. Conch. t. 10. f. C.
Sib. mus. 3. t. 61. f. 15.
Mus. Gottwald. t. 19. f. 134. a. b.
Martin. Conch. 3. t. 79. f. 815. 816.
 a) v. *Born mus. Caes. Vindob. test.* t. 10. f. 14. 15.
Martin. Conch. 3. t. 89. f. 877.
*Habitat in mari, Asiam australem alluente, testa lævi te-
 cea: dorso lævi subcarinato, cincto lineis bigeminis
 albo-punctatis, spiræ anfractibus striatis: carinula cre-
 nata, labio exteriori intus striato, interiori adnata
 lævi gibbo, anterius substriato.*
- spiniferus.** 27. Str. testæ labro attenuato integro subplicato coronato spinis argutis, spira aculeata.
Syst. nat. XI. p. 715. n. 271. *Conus spiniferus.*
Gault. test. t. 55. f. E?
Pet. gaz. t. 78. f. II.
Argenv. Conch. t. 29. f. 10.
*Habuit - - - haecenus modo fossilis inventus, fissa
 voluta vespertilionis, basi tamen minime emarginata,
 nec columella semper plicata, testa albida lineata
 purpurascens in parallelis numerosis varia superne &
 gulata, & spinis acutissimis coronata.*
- Fissurella.** 28. Str. testæ labro continuato in carinam fissam longior dinalem.
Argenv. Conch. t. 33. lin. 2. n. 6. *Mitra.*
Pet. gaz. t. 73. f. 7. 8.
Murray testaceol. t. I. f. 30.
Martin. Conch. 4. t. 158. f. 1498. 1499.
*Habitat in India, frequentius fossilis in Campania Galli-
 testa alba, magnitudine & statura Turbinis Clathri
 anfractibus costis carinatis, excepto maximo tubus
 lævi, apertura oblongiscula, labro exteriore parum
 dilatato, inferiore adnato, cauda brevi redita.*
- Urceus.** 29. Str. testæ labro attenuato retuso brevi striato, spiraque plicato-nodosis, apertura bilabiata inermis.
Mus. Lud. Ulr. 624. n. 288.*
Rumpf mus. t. 37. f. T. *Cauarium.*

Petiv. gazoph. t. 98. f. 19.

List. Conch. t. 857. f. 13.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 144.

Valent. Abh. t. 7. f. 65.

Gualt. test. s. 32. f. E? G.

Seb. mus. 3. t. 60. f. 28. 29. t. 61. f. 24-30. 31. 57-59;
62-64. 66. 68. & t. 62. f. 41. 45. 46. 47?

Mus. Gottwald. t. 28. f. 193. 194. a. b. 196. a-d. 197.
198. a-e.

Knorr Vergn. 3. t. 13. f. 5.

Martin. Conch. 3. t. 78. f. 803-806.

a) Mus. Gottwald. t. 28. f. 194. b.

Martin. Conch. 3. t. 80. f. 870.

$\beta)$ Rumpf mus. t. 37. f. W. f. 870.

$\gamma)$ Seb. mus. 3. t. 61. f. 28. 29. 36. 37.

$\delta)$ Seb. mus. 3. t. 61. f. 32. 33.

$\epsilon)$ Seb. mus. 3. t. 61. f. 35.

$\zeta)$ Seb. mus. 3. t. 61. f. 38. 39.

$\eta)$ Seb. mus. 3. t. 61. f. 50.

$\vartheta)$ Seb. mus. 3. t. 61. f. 60. 61.

Habitat in Oceano indico frequens ad Amboinam & in-
sulam S. Mauritii, testa ad $2\frac{1}{2}$ pollices longa, utplu-
rimum minore, colore pictura mirifice varia.

bidenta- 30. Str. testa tenui alba aurantio maculata & nebulosa,
tus. dorso, lævi plicato, cauda violacea, anfractibus ca-
naliculatis, labro triacantho.

List. Conch. 1. 858. f. 14.

Gualt. test. t. 33. f. C. D.

Seb. mus. 3. t. 61. f. 34.

Martin. Conch. 3. t. 78. f. 810-814.

$\beta)$ Chemn. Conch. 10. t. 157. f. 1503.

Habitat rario in mari indico, urceo affinis.

dentatus, 31. Str. testæ labro attenuato brevi dentato, ventre spiræ
que plicatis.

Seb. mus. 3. t. 61. f. 25. 41-47.

Schroet. Einl. in Conch. I. p. 446. t. 2. f. 12.

$\gamma)$ Seb. mus. 3. t. 61. f. 55.

$\delta)$ Seb. mus. 3. t. 61. f. 65?

$\vartheta)$ Seb. mus. 3. t. 61. f. 56?

Habitat — — urceo affinis, at spiræ plicis obliquis &
anfractibus longius distantibus aperturæque striis eviden-
tioribus distinctus, testa ceterum $1\frac{1}{2}$ pollicem longa, nunc
varia, nunc alba ad marginem subfuscō maculata, nunc
lutea albo lineata, nunc tenui diaphana, nunc solida
opaca.

- costatus. 32. Str. testæ labro crassissimo, anfractu primo verrucis coronato : intersticiis verrucarum plicatis, altero transversim costato, reliquis transversum striatis.
Lift. Conch. t. 863. f. 18. b.
Martin. Conch. 3. t. 81. f. 829.
 a) *Mus. Gottwald.* t. 17. f. 824.
Martin. Conch. 3. t. 91. f. 887.
Habitat — — testa crassa $5\frac{1}{2}$ pollices longa, $5\frac{1}{2}$ latus,
 sèpius lutea, & inter verrucas rosea.
- Bryonia. 33. Str. testæ conicæ labro mucronato octodentato, spiræ dofa.
Lift. Conch. t. 882. f. 4.
Martin. Conch. 3. t. 93. f. 904. 905.
 a) *Seb. mus.* 3. t. 63. f. 3.
Chemin. Conch. 10. t. 159. f. 1512-1515.
Habitat rarissimus — — testa ultra 7 pollices longa,
 fusca, albò varia, hinc inde carulecenti-nebulosa;
 utrum huic, an priori cuidam tribui accensendus;
- affinis. 34. Str. testa transversim striata gibba : spiræ inermi; a
 fractu primo verrucis coronato.
Lift. Conch. t. 839. f. 10.
Habitat — — Lucifero affinis.
- latus. 35. Str. testæ labro prominulo inferne his emarginato,
 spiræ anfractu primo medio lævi utrinque transversim oblique plicata, spiræ elongatæ anfractibus inflatis rotundatae,
 striato, reliquis nodis obtusis coronatis.
Seb. mus. 3. t. 63. f. 4. 5.
Habitat — —
- ævis. 36. Str. testa lævi argentea-fusco radiata transversim oblique plicata, spiræ elongatæ anfractibus inflatis rotundatae,
 striata, reliquis nodis obtusis coronatis.
Regerf Conch. 1. t. 12. f. 67.
Habitat — — testa paulisper ultra 2 pollices longa.
- vexillum. 52. Str. testa solidula subcylindrica rufescens & ochroleuca alternatim fasciata : labro intus denticulato, cauda subadscendentem mella plana glabra-basi emarginata. *Chemin. Conch.*
 10. p. 222. t. 157. f. 1504. 1505.
Kaemmer, Rudoſt. Cabin. t. 7. f. 2. 3.
Habitat rarissimus in Oceano indico.
- norwegi- 53. Str. testa oblonga subalata alba : anfractibus teretibus, apertura patula ovata, cauda subadscendentem Chemn. Conch. 10. p. 218. t. 157. f. 1497. 1498,

Habitat ad Norwegiae litora, utrum distincta hujus generis species?

**** *Turriti, spira longissima.*

37. Str. testa ovato-oblonga tuberculata, labro incrassato.

Seb. mus. 3. t. 55. f. 21.

v. Born. mus. Cael. t. 10. f. 16. 17.

Martin. Conch. 4. t. 157. f. 1490.

Habitat in mari mediterraneo, testa rudi, quasi calce abducta, anfractibus punctis corneis eminentibus seriatim, labro sinuosa quasi gibbo, apertura ovata, cauda brevissima, recurvata.

38. Str. testa leviuscula : labro posterius soluto.

Lift. Conch. t. 837. f. 63.

Rumpf mus. t. 30. f. Q.

Seb. mus. 3. t. 50. f. 13. 14. 17. 18.

Knorr Vergn. 3. t. 18. f. 1. & 5. t. 13. f. 8.

Martin. Conch. 4. t. 156. 1472.

Habitat in Indiæ insularumque Oceani indici paludibus, testa ut plurimum crassa, lutea vel fusca : spiræ anfractibus 12-16, primo altero duplo majore, reliquis longitudinaliter plissatis & ter transversim striatis.

39. Str. testa lœvi : labro anterius & posterius soluto. *Mus.*

Lud. Utr. 624. n. 289.

Müll. hist. verm. fluv. & terr. 2. p. 188. n. 375. Nerita testa subulata lœvi, apertura antice posticeque sinuata.

Lift. Conch. t. 115. f. 10.

Petiv. gaz. t. 13. f. 16.

Rumpf mus. t. 33. f. R.

Seb. mus. 3. t. 56. f. 13. 14.

Chemn. Conch. 9. t. 135. f. 1227.

Habitat in Amboinæ paludibus, testa 26 circiter lineas longa, ex fusco atra vel badia intus alba, subtilissime transversim stricta ; apertura ovata ; spira subulata ; anfractibus 12 planiusculis contiguis.

40. Str. testa subulata : lineis septem spiralibus impressis, apertura ovata.

Müll. hist. verm. fl. & terr. 2. p. 189. n. 376. Nerita lineata.*

Lift. Conch. t. 116. f. 11.

Klein ostr. p. 54.

Martin. Berk. Magaz. 4. p. 348. t. 10. f. 59

Habitat - - - testa 18 lineas longa, glabra, fauce ^{lutea} rulecente decussatim striata.

- punctatus. 41. Str. testa subulata lutescente : fascia juxta futuram canalis striis rubris, anfractibus minoribus sulcatis.
Müll. hist. verm. fluv. & terr. 2. p. 190. n. 377. *Nerita punctata.*
Lift. Conch. t. 979. f. 36.
Pet. gaz. t. 13. f. 15.
Rumpf mus. t. 30. f. P.
Gault. test. t. 6. f. E. F?
Knorr Vergn. I. t. 8. f. 7.
Martin. Berl. Magaz. t. 9. f. 39.
Habitat - - - testa tenera, pellucida, glabra, ¹⁸ lineas longa, fauce & columella albidis, apertura obsoleta, spiræ anfractibus 12-13, majoribus 6 levibus.
- Vibex. 42. Str. testa subulata cinerea transversim striata : anfractibus nodulosis strigisque sanguineis.
Müll. hist. verm. fl. & terr. 2. p. 191. n. 378. *Nerita tuberculata.*
Lift. Conch. t. 119. f. 4.
Petiv. gazoph. t. 100. f. II.
Gault. test. t. 6. f. G.
Klein ostr. p. 34.
Martin. Berl. Mag. 4. t. 10. f. 51.
Chenin. Conch. 9. t. 136. f. 1261. 1262.
 ♂) Crinchled. Club. Martyn. univ. Conch. I. t. 12. ¹² ins. ¹⁴ lineas longa, labio interiori glabro β) ad insulas amicabili candido, apertura ovata, anfractibus 8-II, singulis bifariam nodulosis.

- guritus. 43. Str. testa fusco-fasciata : anfractibus muricatis, apertura ovata.
Müll. hist. verm. fl. & terr. 2. p. 192. n. 379. *Nerita aurita.*
Lift. Conch. t. 121. f. 16.
Klein ostr. p. 30.
Martin. Berl. Magaz. 4. t. 10. f. 55.
Chenin. Conch. 9. t. 136. f. 1265. 1266.
Habitat in Africa, testa duriuscula, 36 lineas longas, nunc lutea, nunc alba, nunc flava, fauce columella que albis, labio exteriore repando, spiræ anfractibus 7, insulis tuberculis 7 luteis, crassis, obtusis, compressissimis,

44. Str. testa fusca tuberculosa : anfractibus muricatis ; labro depresso crenulato.

Müll. hist. verm. fluv. & terr. 2. p. 193. n. 380. Nerita aculeata.

Adans. Seneg. I. t. 10. f. 1. Popél.

Lift. Conch. t. 121. f. 17. & t. 122. f. 20.

Klein ostr. t. 2. f. 39.

Argeny. Conch. t. 11. f. &c.

Martin. Berl. Mag. 4. t. 11. f. 58.

Chemn. Conch. 9. t. 136. f. 1267. 1268.

β) Hercules Club. Mart. univ. Conch. I. t. 13.

Habitat in Africæ torridæ paludosis, testa duriuscula, 18 lineas longa, fauce columellaque albis, spiræ anfractibus 12, singulis quinquefariam nodosis : nodis in 5 extimis conicis acutis.

45. Str. testa læviuscula : labro valde prominulo posterius emarginato.

Seb. mus. 3. t. 50. f. 19.

Habitat - - -

46. Str. testæ anfractibus transversim striatis nigris, extimus lævibus & labri columellaque margine albis.

Seb. mus. 3. t. 56. f. 13. 14.

Habitat - - -

47. Str. testa fusca, anfractibus multifariam tuberculatis ; labro anterius posteriusque soluto, intus fusco striato.

Knorr Vergn. 5. t. 13. f. 8.

Habitat - - - tuberculato affinis.

48. Str. testa fusca : anfractus infimi margine albo.

Knorr Vergn. 5. t. 22. f. 5.

Habitat - - - an hujus generis ?

49. Str. testa subangulata nodoso-spinosa, labro anterius soluto. Mus. Lud. Ulr. 625. n. 290.*

Müll. hist. verm. fl. & terr. 2. p. 149. n. 338? Buccinum (torridum) testa elongata fusca transversim striata, anfractibus muricato dentatis,

Schroet. Flusconch. p. 314. n. III.

Chemn. Conch. 9. t. 136. f. 1269. 1270.

Habitat - - -

- striatus** 50. Str. testa convexa striata alba : strigis raris foliatis columella sinuata inflexa.
Müll. hist. verm. fluv. & terr. 2. p. 149. n. 339. Bucinum striatum.
Habitat rarus - - - testa tenera, pellucida, 3-7 linneas ultra 2 pollices longa, apertura ovato-oblonga, spirae anfractibus 7-8 : marginibus incumbentibus utrum hujus generis, an potius ad helices relegandus.
- gnister.** 51. Str. testa contraria tenui longitudinaliter striata. *Chemn. Conch. 9. t. 114. f. 982. 983.*
Habitat - - - hactenus modo fusilis repertus in Helvetia, testa 1 $\frac{1}{4}$ pollices longa : anfractibus 10.

325. MUREX. *Animal Limax.*

Testa univalvis, spiralis, exasperata futuris membranaceis. Apertura desinens in canalem integrum rectum s. subascendentem.

* α^* spinosus, cauda exserta.

- Haustel- Jum:** I. M. testa ovata tuberculata, cauda elongata subulata recta muricata. *Mus. Lud. Ulr. 626. n. 291.*
Rumpf mus. t. 26. f. F. Haustellum.
Argenv. Conch. t. 16. f. B. Haustellum.
Lift. Conch. t. 903. f. 23.
Bonann. recr. 3. f. 268.
mus. Kircher. 3. f. 270.
Gualt. test. t. 30. f. E.
Klein ostr. t. 4. f. 81.
Lesser litkoth. f. 71.
Seb. mus. 3. t. 78. f. 5. 6.
Knorr Vergn. 1. t. 12. f. 2. 3.
Martin. Conch. 3. t. 115. f. 1066.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. f. 1.
 $\beta)$ *Martin. Conch. 3. t. 115. f. 1063.*
 $\gamma)$ *Knorr Vergn. 3. t. 9. f. 4.*
 $\delta)$ *Martin. Conch. 3. t. 115. f. 1067.*
Habitat paulo rario in mari rubro, omnique Asiam Amer. sicamque australi alluente, colore caudaeque obliquis

*tuberculorum ordinibus armatæ longitudine varians,
apertura rotundata ut plurimum rosea, fauce nunc alba,
nunc cærulescente.*

Tribulus. 2. M. testa ovata spinis setaceis trifatiis, cauda elongata
subulata recta similiter spinosa. Mus. Lud. Ulr. 626.
n. 292.*

α) Column. aq. t. 60. f. 6. Purpura clavata.

Bonann. recr. 3. f. 269. Hystrix marina,

mus. Kirch. 3. f. 271.

Lift. Conch. t. 902. f. 22.

Rumpf mus. t. 26. f. G.

Gualt. test. t. 31. f. A. 1 - 3.

Seb. mus. 3. t. 78. f. 4.

Olear. mus. t. 29. f. 1.

Lesser testaceoth. f. 72.

Knorr delic. t. B. V. f. 5.

Vergn. I. t. II. f. 3. 4:

Murray testaceol. t. I. f. 15.

β) Martin. Conch. 3. t. 113. f. 1053-1056.

Rumpf mus. t. 26. f. 3. Tribulus.

Gualt. test. t. 31. f. A. 4.

Argenv. Conch. t. 16. f. A.

Seb. mus. 3. t. 78. f. 1-3.

Knorr Vergn. 4. t. 27. f. 1.

Martin. Conch. 3. t. 113. f. 1052.

Habitat in mari rubro, omnique Asiam Americamque auf-
tralem alluente, testa exalbida vel rufescente transver-
sim striata, spinis in β) rariore multo longioribus.

Cornutus. 3. M. testa subrotunda spinis subulatis obliquis cincta, cauda
elongata subulata recta spinis sparsis. Mus. Lud. Ulr.
627. n. 293.

Column. aq. t. 60. f. 3. Purpura cornuta.

Adans. Seneg. I. t. 8. f. 20. Bolin.

Petiv. gaz. t. 68. f. 12.

Lift. Conch. t. 901. f. 21.

Bonann. recr. 3. f. 283.

mus. Kirch. 3. f. 284.

Rumpf mus. t. 26. f. 5.

Gualt. test. t. 30. f. D.

Seb. mus. 3. t. 78. f. 7-9. 10? 11?

Knorr Vergn. 6. t. 17. f. 1.

Martin. Conch. 3. t. 114. f. 1057.

Habitat pretiosus in mari Africam, polissimum occidentalem,

*alluente, testa ad 8 pollices longa, transversim striata
alba flava vel subspadicea intus rosea, spinis ad 2 pol-
lices longis, anfractibus rotundis inflatis.*

- Branda- 4. M. testa subovata spinis rectis cincta, cauda mediocri-
ris.
subulata recta spinisque oblique circumdata.
Rondel. test. 64. Murex Purpura.
Petiv. gaz. t. 68. f. 12.
Ginann. adr. 2. t. 8. f. 61. 62.
List. Conch. t. 900. f. 20.
Argenv. zoomorph. t. 4. f. C.
Bytem. app. t. 12. f. 60.
Mus. Gottwald. t. 38. f. 262. a-d. 263. a-c. & 264.
Knorr Vergn. 2. t. 18. f. 1. 2. & t. 22. f. 4. 5.
Regenf. Conch. I. t. 6. f. 67.
Martin. Conch. 3. t. 114. 115. f. 1058-1065.
β) Bonann. recr. 3. f. 282.
mus. Kirch. 3. f. 283.
Gault. test. t. 30. f. F.
γ) Bonann. recr. 3. f. 281.
mus. Kirch. 3. f. 282.
Rumpf mus. t. 26. f. 4.
δ) Favann. Conch. t. 38. f. E.
Chemn. Conch. 10. t. 164. f. 1571.
ε) Chemn. Conch. 10. t. 161. f. 1530. 1531.
ζ) Chemn. Conch. 10. t. 161. f. 1532-1535.
η) Chemn. Conch. 10. t. 164. f. 1571.
Habitat frequens in mari mediterraneo & adriatico, rufa-
alba, cinerea aut subfuscata, triplici spinarum, curvata,
que minorum serie, tertia ex brevioribus composita, dupli-
cili, γ) spinis conicis, rarius serie simplici, cauda
que inermis.

- Truncu- 5. M. testa ovata nodosa anterius spinis cincta: cauda bre-
lus. viore truncata perforata. Mus. Lud. Ulr. 627. n. 294.
Column. purp. t. 13. f. I.
List. Conch. t. 947. f. 42. t. 952. f. 1? & t. 1010. f. 71. dt.
Bonann. recr. 3. f. 271. 272. 274. 277?
mus. Kirch. 3. f. 273. 274. 276.
Klein ostr. t. 6. f. 104.
Gault. test. t. 31. f. C.
Seb. mus. 3. t. 52. f. 15. 16.
Mus. Gottwald. t. 38. f. 256. c. 258? 259 a-f. & 261. a, b.
Knorr Vergn. 3. t. 13. f. 1. & 5. t. 13. f. 4. & t. 19. f. 6.
Martin. Conch. 3. t. 109. f. 1018-1020.

- ♂) *Walch Petref.* 2. I. p. 119. t. C. II. f. 2?
 ♀) *Walch Petref.* 2. I. p. 122. t. C. III. f. 7?
 ♂) *Spengl. catal. raif.* t. 2. f. 2. 3.
 ♂) *Chenn. Conch.* 9. t. 105. f. 897. 898.
 ♀) *Chenn. Conch.* 10. t. 161. f. 1528. 1529.
 ♂) *Kaemm. Cab. Rudoljt.* p. 107. n. 112. t. 9. f. 4.

Habitat in mari mediterraneo, & Jamaicam alluente testa colore varia, interdum fasciata transversim striata, cauda nunc recta, nunc sinistrorum flexa.

- Pomum. 6. M. testa ovata nodosa : varicibus tribus ad septem, cauda latiore.

Adans. Seneg. I. t. 9. f. 22.

List. Conch. t. 944. f. 39. a.

Argenv. zoom. t. 3. f. E.

Knorr Vergn. 3. t. 9. f. I.

Martin. Conch. 3. t. 109. 110. f. 1021-1025.

Habitat in mari, Africam occidentalem alluente, testa ponderosa, trunculo affinis.

- decussan- 7. M. testa ovata transversim sulcata costata : costis con-
tus, vexis nodos perpendiculares decussantibus, cauda im-
perforata.

Adans. Seneg. I. t. 9. f. 21. Jaton.

Seb. mus. 3. t. 49. f. 65?

Knorr Vergn. 4. t. 23. f. 3.

Martin. Conch. 3. t. 110. f. 1026.-1028.

Chenn. Conch. 118. t. 161. f. 1540. 1541.

*Habitat in mari, Africam occidentalem alluente, labri
marginē membranaceo, spiræ anfractibus 7 discretis.*

- melana- 8. M. testa turgida nodosa transversim striata trifariam
mathos, spinosa.

Walch Petref. 2. I. p. 118. t. C. I. f. 5.

*Habitat - - - hacdenus modo inter fossilia inventus,
testa ficus figura, cingulis 5-6 horizontalibus strias
decussantibus inæquali : canda ultra pollicem longa,
anfractibus 3 extimis nodosis prominulis.*

- Radix. 9. M. testa transversim striata octofariam spinosa : spinis
cavis nigris, spira subnodosa aculeata, cauda subulata.

Martin. Conch. 3. t. 108. f. 1015.

Habitat rarus - - - testa abbreviata.

10. M. testa alba multifariam frondoso-spinosa : frondibus
nigris undulatis.

Argenv. zoom. t. 11. f. K.

Habitat rarisimus - - - an hujus tribus?

candidus. 11. M. testa alba. seriatim spinosa cauda brevissima.
Argenv. Conch. t. 16. f. G.
Habitat - - - testa 2. pollices longa, spinarum non nullis nigris.

fasciatus. 12. M. testa instata seriatimi spinosa alba fusco fasciata spirae anfractibus quatuor discretis turgidis.
Knorr Vergn. 6. t. 40. f. 6.
Habitat - - -

* β^* Frondosi, futuris crispato-frondescentibus cauda abbreviata, vulgo Purpura di-

ramosus. 13. M. testa trifariam frondosa : spira contigua, cauda truncata. *Mus. Lud. Ulr. 628. n. 295.**
Rumpf mus. t. 26. f. A. & I. Murex ramosus.
Argenv. Conch. t. 16. f. C. E. Purpura ramosa.
zoomorph. t. 4. f. D.
Column. aq. t. 60.
Lift. Conch. t. 946. f. 41.
Bonann. recr. 3. f. 275. 276.
mus. Kirck. 3. f. 280. 281.
Valent. Abh. t. 4. f. 38. & t. 9. f. 85.
Gualt. test. t. 37. f. H. & t. 38. f. A.
Klein ostr. t. 4. f. 82.
Seb. mus. 3. t. 52. f. 21. & t. 77. f. 1-4. 7. 8. II. 11.
Bytem. app. t. II. f. 45.
Mus. Gottwald. t. 37. f. 255. a. & 256. b. & 38. f. 257.
Knorr Vergn. I. t. 25. f. 1. 2. & t. 26. f. 1. 2. 3. t. 9. f. 3.
& 5. t. II. f. 1.
Regenf. Conch. I. t. 7. f. 6.
Martin. Conch. 3. t. 102-105. f. 980-989. 992. 995-997.
Spengl. felt. Conch. t. 3. f. I.
 $\beta)$ *Rumpf mus. t. 26. f. C.*
Valent. Abh. t. 5. f. 42.
Gualt. test. t. 37. f. D. G. I. L.
Argenv. Conch. t. 16. f. H.
Seb. mus. 3. t. 77. f. 9. 10.
Knorr Vergn. 2. t. 7. f. 4. 5.
Martin. Conch. 3. t. 105. f. 990. 991.
 $\gamma)$ *Martin. Conch. 3. t. 105. f. 993. 994.*
 $\delta)$ *Bonann. recr. 3. f. 278.*
mus. Kirch. 3. f. 277.
Martin. Conch. 3. t. 110. f. 1029. 1030.
 $\epsilon)$ *Martin. Conch. 3. t. 110. & III. f. 1031. 1037?*

Schroet. *Einl. in Conch.* 1. p. 550. t. 3. f. 8.

β) Martin. *Conch.* 3. t. 111. f. 1038?

μ) Valent. *Abh.* t. 1. f. 5?

Habitat in mari rubro, sinu Persico, omnique fere mari,

Asiam Americamque australem alluente, testa transversa
sint striata, ceterum forma, colore, frondium sinibus
quam maxime varia.

174. M. testa trifariam frondosa : apertura unidentata. Mar-
tin. *univ. Conchol.* 2. t. 66.

Chemn. *Conch.* 10. f. 153.

Habitat ad Americæ septentrionalis littus occidentale.

14. M. testa quadrifariam frondosa : spira capitata, cauda
truncata. *Mus. Lud. Ulr.* 628. n. 296.*

Rumpf *muf.* t. 26. f. D. Scorpio.

Valent. *Abh.* t. 4. f. 36. 37.

Gualt. *testi.* t. 37. f. M.

Argenv. *Conch.* t. 16. f. D.

Seb. *muf.* 3. t. 77. f. 13-16.

Knorr *Vergn.* 2. t. II. f. 4. 5.

Martin. *Conch.* 3. t. 106. f. 998-1003.

Spengl. *selt.* *Conch.* t. 2. f. C.

Habitat pretiosus & rarus in mari, Asiam australem alluente,
testa alba fusca aut nigra, apertura orbiculari, spiræ
anfractu altero turgido & reliquis majore.

15. M. testa quinquefariam frondosa, spira contigua, cauda
abbreviata. *Mus. Lud. Ulr.* 629. n. 297.*

Rumpf *muf.* t. 26. f. 2. *Murex minor.*

Klein *ostr.* t. 6. f. 109.

Seb. *muf.* 3. t. 77. f. 5. 6.

Mus. Gottwald. t. 38. f. 255. aa. bb. 256. a. 257. b. c.

Knorr *Vergn.* 3. t. 9. f. 2. &. 6. t. 19. f. 1. & t. 40. f. 7.

Regenf. *Conch.* I. t. 1. f. 6. & t. 9. f. 26.

Murray. *testac.* t. 1. f. 26.

Martin. *Conch.* 3. t. 107. 108. f. 1004-1014.

Schroet. *Journ.* 5. p. 418. f. 4.

β) Martin. *Conch.* 3. t. 108. f. 1013.

γ) Walch *Peref.* 2. I. p. 116. t. C. f. 3. 4.

Habitat in mari mediterraneo & Asiam australem alluente,
varietate multiplice.

16. M. testa alba diaphana sexfariam frondosa : frondibus
apice nigris.

Argent. Conch. t. 16. f. F.

Habitat - - -

Cichore- 17. *M. testa ochroleuca transversim striata multifariam frontum.*

dosa.

Argent. Conch. t. 16. f. K.

Habitat - - - frondibus minus prominentibus minutis

crispis.

versicolor. 18. *M. testa albo rubroque varia, frondibus planis acutis*

acie nigris.

Knorr Vergn. 5. t. 4. f. I.

Habitat - - -

Erina- 19. *M. testa multifariam subfrondosō spinosa: spiræ anfractibus*

retuso coronatis, cauda abbreviata.

Gualt. test. t. 49. f. H.

v. Born mus. Caes. Vind. test. t. II. f. 3. 4?

Habitat in mari mediterraneo.

striatus. 20. *M. testa septifariam frondosa alba: striis transversis*

elevatis fuscis.

Gualt. test. t. 30. f. C?

Martin. Conch. 3. t. 109. f. 1016.

Habitat in India, spiræ anfractibus 7.

tripterus. 21. *M. testa elongata trigona: angulis alato-membranaceis*

Born mus. Caes. Vindob. test. ind. p. 287. t. 10. f. 18. 19.

Habitat - - - fossilis in Campania gallica, testa nivea

transversim rugosa: rugis strias longitudinales decussantibus,

tibus, apertura oblongo-ovata granulata, spiræ anfractibus

tibus 7, inter suturas granulatis; an distincta a ramojo

species?

Sacellum. 164. *M. testa umbilicata muricato costata: anfractibus supra-*

late planiusculis margine acutis, labro crenato, cauda supra-

recta adscendente. Chemn. Conch. 10. p. 267. t. 163.

f. 1561. 1562.

Habitat ad insulas Nicobaricas.

Motacil- 165. *M. testa triangulari nodosa transversim sulcata trifariam*

la.

varicosa, cauda subulata elongata recta, fauce alba-

Chemn. Conch. 10. p. 268. t. 163. f. 1563.

Habitat in Oceano indico.

triqueter. 22. *M. testa elongata triquetra subulata reticulatum costata:*

rostro recto clauso. v. Born mus. Caes. Vind. test.

ind. p. 288. t. II. f. I. 2.

Habitat

Habitat — — testa alba rubro maculata, apertura elliptica, labro crenato, testa pyramidalis anfractibus sex; an hujus tribus?

γ Varicosi, suturis rotundatis torosis crassisque. |

175. M. testa varicibus cingula laevia decussantibus, apertura ovata. *Martyn univ. Conch.* 2. t. 43.
Habitat ad sinum R. Georgii.

23. M. testa varicibus oppositis compressis scabra: cingulis muricatis, apertura tubedentula ovata. *Mus. Lud. Ulr.* 629. n. 298.*

*) *Rumpf mus. t. 24. f. G. Rana.*

Pet. gazoph. t. 100. f. 12.

Lift. Conch. t. 995. f. 58.

Bonann. recr. 3. f. 182.

muf. Kirch. 3. f. 183.

Gualt. test. t. 49. f. L.

Seb. mus. 3. t. 60. f. 13. 15-18.

Mus. Gottwald. t. 36. f. 232. a. b. 233. a?

Knorr Vergn. 2. t. 13. f. 6. 7.

Regenf. Conch. 1. t. 6. f. 64.

Martin. Conch. 4. t. 133. f. 1268-1273.

β) *Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. f. 9.*

Lift. Conch. t. 949. f. 44.

Seb. mus. 3. t. 60. f. 19.

Knorr Vergn. 3. t. 7. f. 5.

Martin. Conch. 4. t. 133. f. 1274-1276.

γ) *Lift. Conch. t. 995. f. 59.*

Bonann. recr. 3. f. 350.

Bonann. mus. Kirch. 3. f. 346.

Habitat in mari, Asiam australem alluente, testa alba, cinerascente aut subfuscata, cingulo muricato in α) duplo, in β) simplici, striis transversis elevatis, in α) granulatis.

24. M. varicibus oppositis continuatis, punctis tuberculosis fasciata, apertura orbiculari.

Adans. Seneg. 1. t. 8. f. 13? Jabick.

Lift. Conch. t. 939. f. 34.

Gualt. test. t. 49. f. L.

Argenv. Conch. t. 9. f. P.

Seb. mus. 3. t. 60. f. 21-27.

Mus. Gottwald. t. 35. f. 228. a. & t. 36. f. 231. a. b.

235. a. b. 236. 237. a. b. 238.

Knorr Vergn. 6. t. 25. f. 5. 6.

Martin. Conch. 4. t. 127. f. 1224-1227. & t. 128. p.
1229-1235.

B) *Valent. Abb.* t. II. f. 93?

B) *Martin. univ. Conch.* 2. t. 41.

Habitat in mari mediterraneo, atlantico, americano,
indico, testa alba, subfuscæ aut fusca, quadruplicata
terdum avellanae magnitudine, cingulis ex punctis ele-
vatis compositis, alternis minoribus, a tertio ad eximium
num spiræ anfractuum in singulis anfractibus dupliciti-

affinis. 25. M. testa turgida: varicibus oppositis continuatis, spira
ra acuminata, anfractibus tuberculorum corona in primis
tis eximis glabris.

Valent. Abb. t. II. f. 95.

Habitat — — tuberculorum teretium corona in primis
spiræ anfractu tripliei vel quadruplici.

Lampas. 26. M. testa varicibus suboppositis, gibbosa tuberibus loco
girudinaliter tuberculosis. *Mus. Lud. Ulr.* 630. n. 294
Rondel. test. 2. p. 81.

Rubo. B) *Rumpf mus.* t. 28. f. C. *Hector.*
List. Conch. t. 1023. f. 88.

Gualt. test. t. 50. f. D.

Mus. Gottwald. t. 25. f. 174. x. a. b.

Martin. Conch. 4. t. 129. f. 1238. 1239.

Rubeta. y) *Rumpf mus.* t. 28. f. D. *Ajax.*
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 103.

Argenv. Conch. t. 9. f. D.

Keil offr. t. 3. f. 59.

Mus. Gottwald. t. 26. f. 174. a. b.

Knorr Vergn. 2. t. 28. f. I.

Martin. Conch. 4. t. 128. f. 1236. 1237.

Habitat in Oceano indico, testa rubra, aut spadices,
apertura ovali utrinque dentata ex albo incarnata, lim-
bo intus ovali aurantio.

Olearium. 27. M. testa varicibus subalternis numeroso tuberculata,
dorso posterius mutico striato, apertura edentula.

Rondel. test. 2. p. 88.

Column. aq. t. 53.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 105.

Gualt. test. t. 49. f. G.

Knorr Vergn. 3. t. 9. f. 5:

Martin. Conch. 4. t. 130. f. 1242?

Schroet. n. Litterat. 3. p. 267.

Einl. in Conch. I. p. 492. t. 3. f. 1.

2) Walch Petref. 2. I. p. 119. t. C. II. f. 5?

2) Seb. mus. 3. t. 57. f. 34?

Habitat in mari mediterraneo, africano.

Femora-
le. 28. M. testa varicibus decussatis trigona rugosa anterius
nodulosa, apertura edentula anterius transversa. Mus.
Lud. Ulr. 630. n. 300.

Grew. mus. t. II. f. 7. 8.

List. Conch. t. 941. f. 37.

Bonann. recr. 3. f. 290.

mus. Kirch. 3. f. 291.

Gualt. test. t. 50. f. C.

Argenv. Conch. t. 10. f. B.

Seb. mus. 3. t. 63. f. 7-10.

Mus. Gottwald. t. 32. f. 218. a-i.

Knorr del. t. B. IV. f. 2.

Vergn. 4. t. 16. f. 1.

Regens. Conch. I. t. 2. f. 21.

Martin. Conch. 3. t. III. f. 1039.

Habitat in mari, Asiam australem, Guineam, Americam
alliente, testa nonnunquam ultra 7 pollices longa fusca,
costis transversis aperturam versus albis : sulcis interme-
diis transversim striatis, apertura ovali, cauda intorta.

Cataceus. 29. M. testa varice solitaria nodis angulata subrugosa, aper-
tura dentata, columella perforata.

List. Conch. t. 942. f. 38?

Seb. mus. 3. t. 49. f. 63. 64. 71-73. & t. 52. f. 10? 11.

Mus. Gottwald. t. 27. f. 187. b.

Knorr Vergn. 2. t. 24. f. 5.

Martin. Conch. 3. t. 118. f. 1085? 1086? 1087. 1088.

Schroet. inn. Beu Conch. t. 5. f. 5.

Chemn. Conch. 10. t. 163. f. 1559. 1560.

Habitat ad Barbariae; Guineae, Americae australis & in-
sularum obversarum littora, testa subfuscata, perfici-
florum colore tincta aut alba, lineis perpendicularibus
undulatis, 2½-3 pollices longa.

Lotoria-
nia.

30. M. testa varicibus decussatis angulata : nodis longitudi-
naliter tuberculosis, cauda flexuosa, apertura dentata.

Mus. Lud. Ulr. 631. n. 301.

List. Conch. t. 934. f. 29. t. 937. f. 32. & t. 948. f. 43.

Rumpf mus. t. 26. f. B.

Argeny. Conch. t. 10. f. M.

Martin. Conch. 4. t. 130. f. 1246. 1247. 1249.

Schroet. Einl. in Conch. I. p. 493. t. 3. f. 2.

β) *Seb. mus.* 3. t. 57. f. 30.

Knorr Vergn. 5. t. 21. f. I.

Martin. Conch. 4. t. 131. f. 1252. 1253.

Chemn. Conch. 10. t. 169. f. 1634.

Habitat - - -

Pileare.

31. M. testa varicibus decussatis subnodoso rugosa: apertura dentata, cauda subadscendente.
- Adans.* Seneg. I. t. 8. f. 12? Vojet.
- Rumpf mus.* t. 49. f. I.
- Gualt.* test. t. 49. f. A.
- Seb. mus.* 3. t. 52. f. I. 2. & t. 57. f. 23? 24?
- Mus.* Gottwald. t. 35. f. 227. a.
- Martin.* Conch. 4. t. 130. & 131. f. 1243. 1248. 1250.
1151?
- Schroet.* Einl. in Conch. I. p. 493. t. 3. f. 3.
neue Litterat. 3. p. 267.
- β) *Seb. mus.* 3. t. 52. f. 3?
- Habitat* in mari mediterraneo.

bufonius.

32. M. testa varicibus sex oppositis continuatis forniciatis, cingulis nodosis, cauda obliqua.
- Argeny.* Conch. t. 9. f. R.
- Seb. mus.* 3. t. 60. f. 14. 20.
- Mus.* Gottwald. t. 39. f. 234. b.
- Martin.* Conch. 4. c. 129. f. 1240. 1241.
- Habitat* rario - - - gyriño affinis.

Pyrum.

33. M. testa varicosa ovata transversim sulcata nodosa, crux longiore flexuosa subulata.
- Rumpf mus.* t. 26. f. E. Pyrum exsiccatum.
- Gualt.* test. t. 37. f. F.
- Argeny.* Conch. t. 10. f. O. & t. 16. f. I.
- Klein ostr.* t. 6. f. 110.
- Knorr Vergn.* 2. t. 7. f. 2. 3. & 6. t. 26. f. 2.
- Regenf.* Conch. I. t. 6. f. 60.
- Martin.* Conch. 3. t. 112. f. 1040-1044.
- β) *Rumpf mus.* t. 24. f. H.
- Klein ostr.* t. 3. f. 64.
- Regenf.* Conch. I. t. 5. f. 50.
- Martin.* Conch. 3. t. 112. f. 1048. 1049.
- γ) *Martin.* Conch. 3. t. 67. f. 743. a.

a) *List. Conch.* t. 935. f. 29. a.
Rumpf. mus. t. 24. f. I.

b) *Martin. Conch.* 3. t. 112. f. 1050. 1051.
Mart. Concholog. 2. t. 56.

*Habitat in Oceano indicō australi, testa alba interdum
 fusco varia, aut spadicea, aut ex luto fusca angulata;
 longitudinaliter striata, transversim sulcata, apertura
 ovali dentata, columella nunc dentata, nunc edentula.*

tandatus. 34. M. testa tenui transversim striata fusca albo varia,
 cauda subulata, spira prominula apice fusca: anfractu-
 tibus canaliculatis; primo gibbo.

B) *Martin. Conch.* 3. t. 112. f. 1045-1047.
List. Conch. t. 893. f. 13?

Habitat - - -

Rubecula. 35. M. testa varicibus decussatis, obtusa rugis nodosis;
 ventre æquali, apertura dentata. *Mus. Lud. Ulr.*
 631. n. 302.*

Gault. test. t. 49. f. F? I.

Argenv. Conch. t. 9. f. K.

Seb. mus. 3. t. 49. f. I-6.

Mus. Gottwald. t. 36. f. 228. b-d. 229. a. b. 230. a. b.

Knorr Vergn. 1. t. 13. f. 3. 4. & 3. t. 5. f. 2. 3.

Martin. Conch. 4. t. 132. f. 1259-1267.

Chemn. Conch. 10. t. 162. f. 1546. 1547.

Habitat ad Indiæ, Africæ, americæ australis littora;
rarior, testa rubra vel flava, fasciata.

Scrobiculato-
lato- 36. M. testa varicibus scrobiculatis suboppositis, lævigata,
 apertura dentata.

Gault. test. t. 49. f. B.

List. Conch. t. 943. f. 39?

Petiv. gaz. t. 100. f. 12.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 257. t. 2. f. 16. 17.

Favann. Conch. t. 32. f. E.

Chemn. Conch. 10. t. 163. f. 1556. 1557.

Habitat in mari mediterraneo.

reticula-
tis, 37. M. testa varicibus suboppositis reticulata, maculis tu-
 berculatis, columella subedentula, cauda adscendente.

Mus. Lud. Ulr. 632. n. 303.

List. Conch. 925. f. 30.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 193.

Gault. test. t. 49. f. M. & t. 50. f. A.

Leffer testaceanth. f. 64.

Murray testaceol. t. I. f. 18.

v. *Born. mus. Caes. Vindob.* test. t. II. f. 5.

Martin. Conch. 2. t. 41. f. 405. 406. & 4. t. 128. 129.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 263. t. 3. f. 18. 19.

*Habitat in mari mediterraneo, & Ameicam alluentem
rario, testa interdum 6 pollices longa, transversim cufata
longitudinaliter striata, nodis in decussatione diversis
coloribus, apertura limbo rubro, labro dentato.*

lamello- 174. *M. testa varicibus membranaceis per spiram continuatis
sus. spina terminatis. Martyn univ. Conchol.* 2. t. 42.

Habitat ad insulas Falkland.

nodatus. 177. *M. anfractibus nodosis, cauda recta apertura violacea,
labio dentato. Martyn univ. Conch. 2. t. 51.*

Habitat ad novam Hollandiam.

Anus. 38. *M. testa varice labiisque dilatato-membranaceis, gibbosae reticulato-tuberculata, apertura sinuosa, cauda erecta. Mus. Lud. Ulr. 632. n. 304.**

Rumpf mus. t. 24. f. F. Auris hirsuta.

Argeny. Conch. t. 9. f. H. Distorlio s. Grimace.

List. Conch. t. 833. f. 57.

Pet. gaz. t. 74. f. 9. vel t. 99. f. 10.

Bonann. recr. 2. f. 279. 280.

muf. Kirch. 3. f. 278. 279.

Gualt. test. t. 37. f. B. E.

Seb. mus. 3. t. 60. f. 4. 6. 7.

Mus. Gottwald. t. 26. f. 177. 178. a. b.

Knorr Vergn. 3. t. 3. f. 5.

Martin. Conch. 2. t. 41. f. 403. 404.

Spengl. seit. Conch. t. 3. f. G.

Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. f. 7.

B) Gualt. test. t. 31. f. D.

*Habitat in mari mediterraneo & Asiam australem alluentem
testa vix ultra 3 pollices longa, ut plurimum fusca : sub-
ciliis albis ; apertura subtriangulari.*

miliaris. 39. *M. testa varicosa : cingulis tuberculatis, apertura sub-
dentata, cauda elongata, anfractibus ventricolis.*

Valent. Abh. t. 2. f. 14. a. 15. b. 16. c. 17. d. 18. e.

Knorr Vergn. 3. t. 29. f. 5.

Martin. Conch. 3. p. 303. vign. 36. f. 1-5.

Chemin. Conch. 10. t. 161. f. 1532-1535.

*Habitat - - - testa nunc cinerea, nunc ex virescente
alba, nunc rufa, nunc alba, tuberculis utplurimum
nigris, rarius rufis.*

*Senegalen-
fis.* 40. M: testa transversim striata varicosa: vaticibus spinosis;
spinis apicem versus decrescentibus.

Adans. Seneg. I. p. 125. t. 8. f. 19. Sirat.

*Habitat ad Senegal, testa circiter 2½ pollices longa, vari-
cibus 9, alternatum minoribus, singulis 8 spinis arma-
tis, spiræ anfractibus 8:*

♂ Ecaudati subechinati.

Ricinus. 41. M: testa obovata: spinis subulatis, apertura dentata;
labro dentato. *Mus. Lud. Ulr. 633. n. 305.**

Rumpf mus. t. 24. f. E. Os luteum.

Gault. test. t. 28. f. N.

Seb. mus. 3. t. 60. f. 37. 39. 42.

Murray testaceol. t. I. f. 19.

*Habitat in Oceano asiatico, testa 1½ pollicem circiter lon-
ga, spinis seriatis, spira prominula, fauce violacea.*

42. M: testa obovata: spinis conicis, labro dentato, co-
lumella. laevi colorata. *Mus. Lud. Ulr. 635. n. 309.**

Knorr Vergn. 6. t. 24. f. 7?

*Habitat - - - testa longiore, quam ricini, ad 3½ pol-
lices longa, utplurimum tamen minore, apertura intus
incarnata.*

43. M: testa nodosa plurimis ordinibus: labro angulato,
columella planiuscula.

Syst. nat. X. I. p. 777. n. 628. Nerita nodosa.

Lift. Conch. t. 804. f. 12. 13.

Bonann. recr. & nius. Kirch. 3. f. 173.

Klein. ostr. t. I. f. 30.

Seb. mus. 3. t. 60. f. 41. 48;

Mus. Goettwald. t. II. f. 81. a? b? c.

Knorr Vergn. t. 25. f. 5. 6.

Martin. Conch. 3. t. 101. f. 972. 973. & t. 102. f. 976-979.

*Habitat in India, structura neritæ, habitu muricis, testa
nunc alba tuberculis nigris, fauce violacea, nunc lu-
teo-fusca, tuberculis fuscis, apertura flava: anfractus
primi dorso tuberculorum ordinibus 4, labro subalato,
spinis 3-4 armato, columellæ dentibus 2-4.*

- Fucus. 44. M. testa rudi ventricosa nodorum ordinibus quatuor transversim striata, columella impressa & anfractibus extimis planiusculis.
Lift. Conch. t. 990. f. 50.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 174.
Gualt. test. t. 66. f. B, o.
Martin. Conch. 3. t. 100. f. 959-962.
Habitat rario - - - testa vix ultra $\frac{1}{2}$ pollicem longa, columella guttis 2-3 nigris notata.
- Loco. 45. M. testa obovata anterius nodosa : apertura edentula suborbiculata. *Molin. hist. nat. Chil.* p. 180.
Habitat in mari regnum Chilense alluente, testa 4-5 pollices alta, incola in vesicula collari succum purpureum continente, carne duriuscula, sapida, eduli.
- Hystrix. 46. M. testa subovata : spinis acutis, apertura edentula repanda. *Mus. Lud. Ultr.* 635. n. 310.*
Argenv. Conch. t. 14. f. A. *Hericins.*
Gualt. test. t. 28. f. R. & t. 44. f. S.
Seb. mus. 3. t. 52. f. 29? 30. 31. & t. 60. f. 33. 38? 43. 47.
Regenf. Conch. 1. t. 3. f. 32.
Martin. Conch. 3. t. 101. f. 974. 975.
β) Walch. Petref. 2. I. p. 120. t. C. II. f. 9?
Habitat - - - testa nunc badia alboque varia, nunc ex luteo fusca, unicore vel maculata, spinarum ordinibus 4, apertura ampla.
- Mancinella. 47. M. testa ovata : spinis obsoletis, apertura edentula, columella transversim striata. *Mus. Lud. Ultr.* 636. n. 311.*
Lift. Conch. t. 956. f. 8. & t. 957. f. 9. 10.
Rumpf mus. t. 24. f. 5.
Argenv. Conch. t. 17. f. H.
Seb. mus. 3. t. 60. f. 45.
Mus. Gottwald. t. II. f. 80. c. d. & t. 26. f. 176.
Knorr Vergn. 3. t. 29. f. 6.
Born mus. Caes. Vindob test. t. 9. f. 19. 20.
Martin. Conch. 3. t. 101. f. 966-968. 970. a. b. 971.
Schroet. Einl. in Verst. 4. t. 7. f. 7.
β) Lift. Conch. t. 956. f. 7.
Martin. Conch. 3. t. 100. f. 963.
γ) Adans. Seneg. I. p. 100. t. 7. f. 1 *Sakum.*
Habitat rario in mari, Asiam australem, β) Africam occidentalem alluente, testa alba, interdum subfuscata albo-

varia, spinis aliquando nigricantibus, nunc magis, nunc minus turgida.

Rippocastanum. 48. M. testa ovata striata quadrifariam subspinosa, apertura transversim striata. Mus. Lud. Ulr. 636. n. 312.*

Rumpf mus. t. 24. f. C. Pimpeltjes e Banda,

Lift. Conch. t. 958. f. 11?

Bonann. recr. 3. f. 346?

mus. Kircher. 3. f. 345?

Gualt. test. t. 37. f. C. & t. 43. f. V.

Argenv. Conch. t. 14. f. L.

Klein ostrac. t. 3. f. 58. & t. 7. f. 112.

Seb. mus. 3. t. 52. f. 22. 23. 27. 28. & t. 60. f. 12. 30. 31?

32?

Knorr Vergn. 5. t. 4. f. 2. & 6. t. 24. f. 2. & t. 35. f. 3.

Mus. Gottwald. t. 38. f. 260. a? b?

Martin. Conch. 3. t. 99. f. 945. 946. & t. 100. f. 951?

8) 952? 953?

Adans. Seneg. I. t. 7. f. 2. Laborin.

Lift. Conch. t. 991. f. 52. 53.

Seb. mus. 3. t. 60. f. 11.

Martin. Conch. 3. t. 100. f. 956-958.

7) Martin. Conch. 3. t. 100. f. 954. 955.

8) Lift. Conch. t. 896. f. 16.

Chemn. Conch. 10. t. 160. f. 1518. 1519.

9) Lift. Conch. t. 896. f. 16. a. b.

10) Seb. mus. 3. t. 67. f. d.

11) Martin. Conch. 3. t. 101. f. 969.

12) Lift. Conch. t. 955. f. 6. & t. 990. b. f. 51.

Bonann. recr. 3. f. 381.

mus. Kirch. 3. f. 368.

13) Mus. Gottwald. t. 26. f. 182.

14) Martin. Conch. 3. t. 121. f. 1110.

Rumpf mus. t. 24. f. D.

Habitat in Guinea, India, insulisque Oceani indici, testa dorso transversim striato, spinarum obtusarum ordinibus numero variantibus armata, spirae anfractibus distantibus.

49. M. testa subturrata longitudinaliter costata transversim cancellata, apertura striata.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 35.

Rumpf mus. t. 29. f. N.

Gualt. test. t. 51. f. G.

Argenv. Conch. t. 9. f. O.

Seb. mus. 3. t. 49. f. 45-48.

Knorr Vergn. 4. t. 23. f. 4. 5.

Martin. Conch. 4. t. 155. f. 1466. 1467.
Habitat in Oceano indicō, testa ad 2 pollices usque longā
 flavicante, anfractibus singulis fascia fusca cinctis, coquī
 aculeatis, apertura oblonga, columellæ plica solitaria
 spira acuminata: anfractibus distantibus.

Melonge- 50. M. testa obovata glauca, anfractu subspinosa,
 na. prominula, apertura lœvi. *Mus. Lud. Ulr.* 637. n. 31st

Lift. Conch. t. 904. f. 24.

Bonann. recr. 3. f. 186. 295.

muf. Kircher. 3. f. 186. 296.

Rumpf muf. t. 24. f. 2. 3.

Gualt. test. t. 26. f. F.

Argenv. Conch. t. 15. f. H.

Seb. muf. 3. t. 72. f. 1-9.

Mus. Gottwald. t. 11. f. 71. 72. 73. a. b.

Knorr Vergn. I. t. 17. f. 5. & 2. t. 10. f. 1.

Regenf. Conch. I. t. 5. f. 49. & t. 10. f. 36.

Martin. Conch. 2. t. 39. & 40. f. 389-397.

β) *Knorr Vergn.* 5. t. 4. f. 2.

γ) *Knorr Vergn.* 6. t. 33. f. 3?

δ) *Rumpf muf.* t. 24. f. 6.

Martin. Conch. 2. p. 76. n. 2.

ε) *Rumpf muf.* t. 23. f. D. & t. 24. f. 4.

Gualt. test. t. 31. f. F.

Seb. muf. 3. t. 49. f. 80-82. t. 52. f. 19. 20. & ^b 60.
 f. 10.

Mus. Gottwald. t. 11. f. 74. t. 27. f. 187. a. & ^b 287.
 b.

Knorr Vergn. 3. t. 7. f. 3.

Martin. Conch. 2. t. 40. f. 398-401.

ζ) *Seb. muf.* 3. t. 60. f. 9.

Mus. Gottwald. t. 11. f. 75. 77. 78.

Martin. Conch. 2. t. 40. f. 402.

η) *Chemn. Conch* 10. t. 164. f. 1568.

Habitat in Oceano indicō & Americam australē insulōff
 obversas alluente, testa ad 5½ pollices usque longā, uper
 rimum fusca, albo fusiata, apertura ovali ampla, spira
 anfractibus rarius lœvibus, quam nodosis, anfractu
 mo maximo turgido, spinarum ut plurimum coronis cinctis;

Consul. 159. M. testa crassa ventricosa alba transversim sulcata nodosa;
 apertura repando-ovata, labro sinuoso intus plicato de-
 ticulato. *Chemn. Conch.* 10. p. 236. t. 160. f. 1516. 1517.

Habitat in Oceano indicō.

176. M. testa fusca subovata subcaudata : cingulis confertis nodulosis dilutioribus. Martyn univ. Conch. 2. t. 46.
Habitat ad sinum a R. Georgio denominatum.

? Caudigeri, cauda subulata clausa reda elongata, testa inermi.

51. M. testa ecaudata subplicata ovata acuminata, apice cariofo.

Habitat in aqueductu ad Sevillam, testa magnitudine fabæ, oblonga, acuminata, cinerea, subdiaphana, longitudinaliter sulcata, basi emarginata; an vere distincta integraturus generis & hujus tribus species? Alstroamer.

52. M. testa turrita cingulis acutis maculatis recto-caudata, labro fisso. Mus. Lud. Ulr. 639. n. 317.

Ruppf mus. t. 29. f. L. Turris babylonica.

Argenv. Conch. t. 9. f. M. Turris babylonica.

Lift. Conch. t. 917. f. II.

Valent. Abh. t. I. f. 8.

Gualt. test. t. 52. f. N.

Knorr delic. t. B. IV. f. 6.

Vergn. 4. t. 13. f. 2.
Regenf. Conch. I. t. I f. 9.

Martin. Conch. 4. t. 143. f. 1331. 1332.

8) Schroet inn. Bau Conch. t. 2. f. 8.

2) Chemn. Conch. 4. p. 143. Vign. 39. f. C.

2) Argenv. zoomorph. t. 4. f. b.

2) Chemn. Conch. 4. p. 143. Vign. 39. f. B.

2) Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 46.

Mus. Gottwald. t. 34. f. 221. f.

Knorr Vergn. 6. t. 27. f. 3.

*) Martin. Conch. 4. t. 143. f. 1334. 1335.

5) Martin. Conch. 4. t. 145. f. 1345. 1346.

Favann. univ. rais. t. 4. f. 997.

Chenin. Conch. 10. t. 162. f. 1550. 1551.

Habitat in Oceano indicō γ) rarior quoque in mari insulas

Americæ oppositas circumfluente, testa ad 4 usque pollices longa, cingulis albis: maculis quadratis fuscis vel atris.

53. M. testa turrita : cingulis nodosis immaculatis, labro sinu separato.

Lift. Conch. t. 915. f. 8.

Martin. Conch. 4. t. 143. f. 1336-1338.

Habitat in Oceano indicō, babylonico sinuillimus, at testa alba, immaculata, radiis modo interdum ex fusco luteis

*varia, cauda nunc longiore, nunc breviore, anfractibus
nunc carinatis, nunc tuberculis carinatis, substriatis.*

- finensis.** 54. M. testa ventricosa acuminata, cauda canaliculata ^{transversim}
flexa, apertura ovali, anfractibus granulatim transversim striatis, basi spinis coronatis.
Adans. Seneg. I. t. 10. f. 3. Goumier.
Lift. Conch. t. 1018 f. 80.
Gualt. test. t. 56. f. M. N.
Argenv. Conch. t. 11. f. F.
Seb. mus. 3. t. 50. f. 23. 24.
Martin. Conch. 4. t. 157. f. 1489.
β) *Martin. Conch. 4. t. 157. f. 1487?*
γ) *Lift. Conch. t. 122. f. 18?*
Klein ostr. t. 2. f. 40?
Martin. berl. Mag. t. 10. f. 57?
δ) *Schroet. Flusconch. t. 9. f. 9.*
ε) *Martyn univ. Conch. 2. t. 58.*
Habitat in mari Senegaliam alluente, testa ut plurimum maculata, columellæ plica unica, an hujus tribus?

- stramineus.** 55. M. spica annulis elevatis : intersitti bacillis repletis anfractibus singulis basi tuberculis coronatis, apertura violacea, labro undulato columellaque niveis.
Spengl. Naturf. 17. t. 2. f. A. B.
Chemin. Conch. 10. t. 160. f. 1520. 1521.
Favann. Conch. t. 79. f. S.
Martyn Conch. 2. f. 53. 54.
Habitat in Oceano australi, testa straminea, 3 pollices longa,

- australis.** 56. M. testa ovata longitudinaliter striata ; labro undulato spiræ anfractibus canaliculatis : primo turgido quatuor duplicato, altero triplicato.
Spengl. Naturf. 17. t. 2. f. C. D.
Habitat in Oceano australi, stramineo affinis, testa quoque straminea, at. 1½ pollicem longa, columella labio niveo, an hujus tribus?

- uncinatus.** 57. M. spira acuminata transversim striata : anfractibus quatuor primis callo medio uncis armato, quinto sexto toque collatis, reliquis glabris.
Schroet. Flusconch. t. 8. f. 15.
Habitat - - - testa pollicem longa, apertura ovali, labro dentato, spiræ anfractibus novem.

58. M. testa turrata : spiræ anfractibus tuberculis coronatis cinguloque granulato cinctis ; primo subtiliter transversim striata.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 79.

Habitat - - - bablyosio affinis, at labro integro, testa alba fascia anfractuum coloris inter vinosum & rufum intermedii.

59. M. cauda subreflexa oblique striata, spiræ anfractibus tribus primis costatis, reliquis quatuor cancellatis, primo obconico, columellæ plica unica.

Argenv. Conch. 1. 29. n. 10. f. 3.

Knorr Petref. 2. t. C. II. f. 7.

Schroet. Einl. in Verstein. 4. t. 8. f. 3. 8.

Habitat - - - haecenus modo fossilis prope Courtagnon Campaniæ gallicæ repertus, costis primorum anfractuum superne in spinas terminatis ; an hujus tribus ?

60. M. testa longitudinaliter plicata transversim costata : spiræ parum prominula, apertura ovata, labro crenulato.

Martin. Conch. 4. t. 150. f. 1396. 1397.

Habitat - - - testa rufescente, spiræ anfractibus 5 - 6, costis acutis.

61. M. testa turrata subrecto-caudata striata nodosa carinata, labro crenulato. *Mus. Lud. Ulr. 639. n. 317.**

Rumpf mus. t. 29. f. F. Fusus.

Lift. Conch. t. 917. f. 10. & t. 918. f. 11. a.

Bonann. recr. 3. f. 360?

muf. Kircher. 3. f. 353?

Gualt. test. t. 52. f. L.

Argenv. Conch. t. 9. f. B.

Klein ostr. t. 4. f. 78?

Knorr Vergn. 3. t. 5. f. I.

Martin. Conch. 4. t. 144. f. 1342.

Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. f. 6.

β) Regenf. Conch. 1. t. 12. f. 62?

γ) Favann. Conch. t. 33. f. A¹.

Chemn. Conch. 10. t. 160. f. 1523.

δ) Favann. Conch. t. 35. f. C¹.

Chemn. Conch. 10. t. 161. f. 1536. 1537.

Habitat paulo rarius in Oceano indicō, testa alba transversim striata nunc terete, nunc angulata, spiræ anfractibus sulco discretis nodis coronatis superioribus fuscis, cauda 3 fere pollices longa, infra subfuscā.

- Morio. 62. M. testa patulo caudata nigra : fascia alba, spiræ anfractibus subnodosis, columella rugosa. *Mus. Lud. Ul.*
 640. n. 319.*
Adans. Seneg. I. t. 9. f. 31. Nivar.
List. Conch. t. 928. f. 22.
Bonann. recr. 3. f. 357.
mus. Kircher. 3. f. 350.
Seb. mus. 3. t. 80. f. fere omnes.
Mus. Gottwald. t. 29. f. 209. a. & t. 31. f. 209.
Knorr delic. t. B. V. f. 4.
Vergn. I. t. 20. f. 1. & 2. t. 6. f. 2.
Regenf. Conch. I. t. 11. f. 61.
Martin. Conch. 4. t. 139. f. 1300. 1301.
Schroet. Journ. 5. f. 5.
inn. Bau der Conch. t. 2. f. 4.
 β) *Martin. Conch. 4. t. 140. f. 1302. 1303.*
Habitat in mari Africani, potissimum occidentalem, rufus
te, testa ad 6 pollices longa, ex auro fusca, subfuscā,
β) cinerea, transversim striata.

- Cochlidium. 63. M. testa patulo-caudata : spiræ anfractibus supra planis
 um. *Mus. Lud. Ul. 640. n. 320.**
Argenv. Conch. t. 9. f. A.
Seb. mus. 3. t. 52. f. 6. t. 57. f. 27. 28.
Favann. Conch. t. 35. f. B.
Chemn. Conch. 10. t. 164. f. 1569.
Habitat in Oceano indicō.

- Spirillus. 64. M. testa caudata : spiræ mucronatæ anfractibus supra
 convexis.
Knorr Vergn. 6. t. 24. f. 3.
Martin. Conch. 3. t. 115. f. 1069.
Spengl. Selt. Conch. t. 3. f. E.
Schroet. Einl. in Conch. I. p. 517. t. 3. f. 4.
Habitat Tranquebariae, haustello & canaliculato effusis, anfractibus fulco non distinctis, corpore subitus ventriūlo supra convexo, spiræ centro mucrone prominente et atra, anfractibus supra margine acuto cinctis, cauda subelevata, dorsum aperturam ventris non dilata, columella ruga transversa a ventre distincta.

- canaliculatus. 65. M. testa patulo-caudata : spiræ anfractibus supra canali-
 latus. *liculo distinctis. Mus. Lud. Ul. 641. n. 321.**
Valent. Abb. t. II. f. 92.

Gualt. test. t. 47. f. A.

Seb. mus. 3. t. 68. f. 21? 22?

Knorr delic. t. B. VI. f. 4.

Martin. Conch. 3. t. 66. f. 738-740. & t. 67. f. 742. 743.

Habitat ad Canadam & in mari glaciali, testa fusca nunc
majore unicolor, nunc minore radiata lœvi aut trans-
versim striata, dorso margine nodoso.

66. M. testa patulo-caudata striata : anfractibus canaliculo
distinctis, extimis fuscis, primo basi nodis coronato.

Martin. Conch. 3. t. 66. f. 741.

β) Gualt. test. t. 26. f. N.

γ) Chemn. Conch. 10. t. 163. f. 1564. 1565.

Habitat γ) in mari rubro.

67. M. testa patulo-caudata transversim striata : spiræ
prominulæ anfractibus basi spinis coronatis.

Lift. Conch. t. 880. f. 3. b.

Gualt. test. t. 47. f. B.

Knorr Vergn. I. t. 30. f. 4. & 6. t. 27. f. I.

Martin. Conch. 3. t. 67. f. 744. & t. 69. f. 756. 757.

Habitat - - - testa ad 8 pollices & ultra longa.

68. M. testa solida umbilicata trifariam nodosa transversim
striata : apertura ampla striata.

Knorr Vergn. 5. t. 21. f. 2.

Martin. Conch. 3. t. 68. f. 750-753.

β) Spengl. felt. Conch. 3. f. C.

γ) Lift. Conch. t. 894. f. 14?

δ) Lift. Conch. t. 895. f. 15?

Habitat in India, minor Tranquebariæ, Bullæ Rapæ
affinis.

69. M. testa patulo-caudata nivea diaphana : spiræ anfrac-
tibus canaliculo distinctis ; primo costis transversis cari-
natis.

Bonann. recr. 3. f. 338.

mus. Kircher. 3. f. 337.

Habitat in mari Brasiliæ alluente.

70. M. testa hemisphærica glabra diaphana, cauda recta
patula, vertice papillari. Syst. nat. X. 1. p. 752. n. 477.

Lift. Conch. t. 881. f. 3. c.

Mus. Gottivald. t. 30. f. 2. 5.

Ellis corall. t. 33. f. Aa.

Habitat - - - anfractibus convexis, apicem versus sen-
sim decrescentibus.

aruanus. 71. M. testa patulo - caudata : spira spinoso - coronata
Mus. Lud. Ulr. 641. n. 322.*
Rumpf mus. t. 28. f. A. *Buccinum aruanum.*
Bonann. recr. & mus. *Kirch.* 3. f. 101.
Chenin. Conch. 4. p. 143. vign. 39. f. D.
Habitat rarus ad insulam Am, & novam Guinea
testa ponderosa rudi sæpius atra aut cærulescens annularis
cincta, apertura angulata, cauda satis longa, spinosum
mucronata.

perven- 72. M. testa patulo-repandoque caudata : spira continua
fus. subcoronata. *Mus. Lud. Ulr.* 642. n. 323.*
Argenv. Conch. t. 15. f. F. Unique.
List. Conch. t. 907. f. 27.
Gualt. test. t. 30. f. B.
Mus. Gottwald. t. 32. f. 219. a. 219. b.
Ellis corall. t. 33. f. B.
Bast. op. subsec. t. 6. f. I. B.
Chemn. Conch. 9. t. 107. f. 906. 907.
v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t. II. f. 8. 9.
 β) *List. Conch.* t. 908. f. 28?
 γ) *Chenin. Conch.* 9. t. 107. f. 904. 905.
Habitat rarissimus in mari americano, spinis nunc
minatis, nunc magis obtusis.

antiquus. 73. M. testa patulo-caudata oblonga : anfractibus oblongo-
 retibus *Fn. succ.* 2165.
Müll. zool. dan. 3. p. 64. t. 118. f. 1-3. *prodr.* 293. f. 1.
Fabr. Fn. groenl. p. 397. n. 396. *Tritonium antiquum.*
Jonst. exsang. t. II. *Turbo longus.*
List. Conch. t. 962. f. 15.
 anim. angl. t. 3. f. I. 3.
Bonann. recr. 3. f. 190.
 mus. *Kircher.* 3. f. 192.
Seb. mus. 3. t. 39. f. 75. t. 83. f. 3-6. & t. 93. f. 3.
Martin. Conch. 4. t. 138. f. 1292-1294. 1296.
Hermann Naturf. 16. t. 2. f. 7.
 β) *Seb. mus.* 3. t. 83. f. 7?
 γ) *Martin. n. Mannigf.* 4. p. 419. t. 2. f. 14?
 δ) *List. Conch.* t. 913. f. 4.
Habitat frequens in Oceano septentrionali, mari quoque greci-
ciali, buccino undato affinis, testa squalida, ad 6 usque
pollices longa, subillissime cancellata, vel transversim
striata, vel longitudinaliter obsolete plicata, spiræ
fractibus

fractibus sulco discretis, medio nonnunquam tuberculis coronatis, rarius contrariis.

despectus. 74. M. testa patulo-subcaudata oblonga: anfractibus octo lineis duabus elevatis. Fn. suec. 1266. It. wgoth. t. 5. f. 8.
Müll. zool. dan. prodr. 2940. O. Fabr. Fn. groenl. p. 396.
n. 395. Tritonium despectum.

Martin. Conch. 4. t. 138. f. 1295.

Schroet. Einl. in Conch. I. p. 523. t. 3. f. 5.
β) Litt. Conch. t. 1057. f. 1?

γ) Martin. Conch. I. f. 5.

Favann. cat. raf. t. A. f. 946.

Chemn. Conch. 10. t. 163. f. 1558.

Habitat in Oceano septentrionali, testa rudi, cana: anfractibus extimis ut plurimum fuscis, apertura interdum aurata.

75. M. testa patulo-caudata ovato-oblonga: anfractibus ventricolis striatis longitudinaliter anguato subfornicatis.
O. Fabr. Fn. groenl. 399. Tritonium fornacatum.
Habitat in mari, australem Groenlandiam allente, incola eduli, testa ultra 3 pollices longa subtriangularis larviuscula flava, intus alba & glabra, spirae anfractibus 7 late transversim striatis; ea distincta a despecto species?

76. M. testa oblonga transversim rugosa longitudinaliter striata: labro intus denticulato extus incrassato.
Müll. zool. dan. prodr. 2946. Tritonium incrassatum.
Ad. Nidros. 4. p. 96. t. 16. f. 25.
Habitat --- an hujus generis?

77. M. testa oblonga longitudinaliter costata: cauda subreflexa emarginato-truncata.
Müll. zool. dan. prodr. 2947.
Ad. Nidros. 4. p. 97. t. 16. f. 26.
Habitat --- an hujus generis?

78. M. testa gibba transversim tuberculato-costata fusca obscurius fasciata intus albâ, apertura ovata.
Rumpf mus. I. 49. f. B.
Klein ostr. t. 7. f. 128.
Lesser tefticeoth. f. 62.
Knorr Vergn. 5. t. 3. f. 3. "
Martin. Conch. 4. t. 127. f. 1223.
β) Seb. mus. 3. t. 37. f. 33.
Martin. Conch. 4. t. 131. f. 1255. 1256.

Chenn. Conch. 10. t. 160. f. 1522.

γ?) *Flag-Buccinum. Martyn univ. Conchol.* I. t. 3' *Habitat rarus in India, γ) ad insulas amicas & sociale*

maculo- 79. *M. testa cancellata flava : fasciis albis litorisque spadiceis alternis, columella laevi, spirae anfractibus undicim teretibus.*

Lift. Conch. t. 1022. f. 86.

Rumpf mus. t. 49. f. G.

Seb. mus. 3. t. 51. f. 20. 21.

Martin. Conch. 4. t. 132. f. 1257. 1258.

Fayenn. Conch. t. 33. f. X?

Chenn. Conch. 10. t. 163. f. 1552. 1553.

β) *Bonann. recr. & mus. Kircher.* 3. f. 48.

Habitat rarissima in India.

magella- 80. *M. testa ventricosa umbilicata transversim striata cinerea : intus violacea : spirae anfractibus parallele collatis ; primo prægrandi.*

Knorr Vergn. 4. t. 30. f. 2.

Martin. Conch. 4. t. 139. f. 1297.

β) *Chenn. Conch.* 10. t. 164. f. 1570.

Habitat in freto magellanico, Buccino Harpæ strigatus similis, apertura ovali, anfractuum costis altis, cerasis, foliaceis.

cancella- 81. *M. testa ovata solida opaca cinerea : spirae anfractibus cancellatis sulco distinctis.*

Knorr Vergn. 2. t. 27. f. 3.

Habitat - - -

scolopa- 82. *M. testa fusca : spirae anfractibus sulcis cinctis supra tuberculis cinctis ; tuberculorum apice & apertura albiceus.*

Knorr Vergn. 3. t. 26. f. 4.

β) *Knorr Vergn.* 3. t. 26. f. 5?

Habitat - - - testa β) magis elongata sordide latera, anfractuum fascia obsoleta, tuberculis magis globosis,

litteratus. 83. *M. testa ventricosa turrita nigro maculata : columella uniplicata, cauda brevi. v. Born mus. Caes. Vinlobi test. p. 327. t. II. f. 14. 15.*

Habitat - - - testa nivea, apertura ampliata, spirae anfractibus octo aculeatis.

VERMES TESTACEA. Murex.

3549

trigonous. 84. M. testa subtrigona cancellata : spiræ anfractibus inflatis contiguis ; primo tuberculo magno distincto.

Adans. Seneg. I. p. 122. t. 8. f. 14. Samier.

Habitat in Senegal, testa 2 circiter pollices longa : spiræ anfractibus 7 ; an hujus tribus ?

semilunaria. 85. M. testa longitudinaliter costata subtiliter transversim striata : spiræ anfractibus planiusculis distantibus seriatim tuberculatis, apertura semilunari.

Adans. Seneg. I. p. 122. t. 8. f. 15. Solat.

Habitat in Senegal, testa pollicem longa, spiræ anfractibus tuberculorum serie simplici, secundo duplici vel triplici, primo 6-7 plici.

costatus. 86. M. testa annulatim striata : spiræ anfractibus teretibus inflatis; singulis costis novem rotundatis parallelis spinosis.

Adans. Seneg. I. p. 125. t. 8. f. 19. Sirat.

Habitat in Senegal, testa 2½ pollices circiter longa.

laticatus. 87. M. testa rotundata annulatim sulcata, apertura ovali, spiræ anfractu primo turgido.

Adans. Seneg. I. p. 133. t. 9. f. 25. Tafon.

Habitat in Senegal, testa 1½ pollicem circiter longa, spiræ anfractibus novem subcontiguis, nunc subinflatis, nunc planiusculis, an hujus generis ?

tubifer- 88. M. testa elongata : tuberculis minimis confertis multiformis aspera.

Adans. Seneg. I. p. 132. t. 9. f. 23. Loset.

Habitat in Senegal, testa 6 circiter lineas longa, spiræ anfractibus circiter 8, primo tuberculorum ordinibus 12-15, secundo 5.

Tritonis. 89. M. testa ventricosa oblonga laevi : anfractibus rotundatis, apertura dentata, cauda brevi. *Mus. Lud. Ulr. 642: n. 324.**

Rondel. test. 81. Buccinum.

Rumpf mus. t. 28. f. B. & 1. Buccinum Tritonis.

Valent. Abh. t. 8. f. 66-67.

Lift. Conch. t. 959. f. 12.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 188.

Gualt. test. t. 48. f. A.

Seb. mus. 3. t. 81. fig. ann.

Mus. Gottwald. t. 34. f. 224. a. & t. 35. f. 225. b;

Knorr delic. t. B. VI. f. 1.

- Knorr Vergn. 2. t. 16. f. 2. 3. & 5. t. 5. f. 1.
 Martin. Conch. 4. t. 134. 135. f. 1277-1283.
 ♂) Litt. Conch. t. 960. f. 13.
 Mus. Gottwald. t. 35. f. 224.
 Martin. Conch. 4. t. 136. f. 1284. 1285.
 γ) Klein ostr. t. 7. f. 127?
- Habitat in Oceano indicō & australi, β) in mari mediterraneo, testa a novæ Seelandiaæ incolis tibicæ nufle loco, ab Orientis & Africæ pastoribus pro cornu militari adhibita vehementiori sono quam tubæ sennoreæ vulgaris, aut cornu capri:

Buccina jam priscos cogebat ad arma Quirites, testa ad 16 usque pollices longa alba, fusco, flavo & nigro quasi squamata, apice ut plurimum laesa, columella alba: striæ transversis nigris, spiræ anfractibus futura nodulosa distinctis, hinc inde quasi absclisis & nodo agglutinatis, primo sulcis striatis notato.

- Fusio. 90. M. testa ventricosa oblonga laevi: spira striata; anfractibus rotundatis, apertura laevi, cauda brevi.
 Adans. Seneg. I. t. 4. f. 3. Nifat.
 Litt. Conch. t. 914. f. 7.
 Rumpf mus. t. 49. f. E.
 Gualt. test. t. 52. f. I.
 Martin. Conch. 4. t. 147. f. 1357.
 Habitat rarisserius in mari mediterraneo, & ad Africæ littora, testa avellanca magnitudine, raro $\frac{1}{2}$ pollicem superante, alba maculis fuscis aut fulvis interdum ferruginea.
- Tulipa. 91. M. testa ventricosa oblonga laevi: anfractibus rotundatis futura geminata, columella biplicata, cauda patula striata.
 Argenv. Conch. t. 10. f. K. Tulipa.

An hujus generis distinctæ species & cuius tribus sunt vñstæ, quas Lister Camb. t. 905. f. 24. a. t. 906. f. 26. t. 929. f. 23. & 24. t. 950. f. 4. & t. 954. f. 4. & t. 962. f. 15. a. a Bonanni recr. & mus. Kircher. t. 51. 58. 61. 77. 81. & 343. recr. 3. f. 273. 284. 185. 289. & 328. 62. 63. 66. Kircher. 2. f. 275. 285. 286. 290. & 237. a Kleinio (Jlr. t. 3. f. 57. 58. 59. f. 85. t. 7. f. 120. a Rumpf mus. t. 24. f. 1. a Gualtieri test. t. 31. f. 1. 2. 3. t. 43. f. R. 8. t. 49. f. C. D. t. 51. f. I. t. 54. f. I. t. 56. f. L. 57. f. B. C. F. ab Argenville Conch. t. 9. f. L. a Seba mus. 3. t. 49. 51. 52. 53. t. 51. f. 36. t. 52. f. 8. 12. 13. 14. 24. 25. & t. 57. f. 29. 31. 32. a Knorr Vergn. 6. t. 26. f. 3. t. 35. f. 1. t. 40. f. 6. & Petref. 2. t. C. I. f. 8. & C. II. f. 11. et mus. Gottwald. t. 24. f. 223. o. et t. 36. f. 231. c. depictas dederunt?

Lift. Conch. t. 910. f. 1. & t. 911. f. 2.

Bonann. recr. 3. f. 187.

mus. Kircher. 3. f. 186.

Rumpf mus. t. 49. f. H.

Gualt. test. t. 46. f. A.

Seb. mus. 3. t. 71. f. 23-31.

Mus. Gottwald. t. 29. f. 220. a. b.

Knorr Vergn. 5. t. 18. f. 5. & 6. t. 29. f. 1.

Regenf. Conch. 1. t. 9. f. 35.

Martin. Conch. 4. t. 136. 137. f. 1286-1291.

8) *Gualt. test. t. 46. f. E.*

Habitat in mari, Americam australem alluente, testa ut plurimum maculata & nebulosa, intus transverse striata, anfractibus ut plurimum bicinctis, rarius unicinctis.

92. *M. testa oblonga caudata : plicis longitudinalibus submembranaceis, fulcata.*

Lift. Conch. t. 926. f. 19.

Klein. ostr. t. 3. f. 67.

Habitat in mari, Islandiam alluente, testa magnitudine & facie Turbinis Clathri, at brevissime caudata, plicis plurimis erectis, compressis, superne inclinatis.

93. *M. testa solida nigra vel dilute fusca : fascia alba subdiaphana, anfractibus nodosis, columella subplicata.*

Lift. Conch. t. 828. f. 50.

Valent. Abh. t. 8. f. 71.

Knorr Vergn. 6. t. 20. f. 7.

Martin. Conch. 4. t. 122. 123. f. 1131-1134.

Regenf. Conch. 1. t. 7. f. 1.

Spengl. felt. Conch. t. 3. f. F.

Habitat rarus - - - inter volutas & murices quasi intermedius.

94. *M. spiræ anfractibus plicatis nodosisque.*

Lift. Conch. t. 939. f. 34. a.

Klein ostr. t. 3. f. 56.

Seb. mus. 3. t. 49. f. 70.

Martin. Conch. 4. t. 123. f. 1141. 1142.

Habitat paulo rario in India.

95. *M. testa umbilicata : spiræ anfractibus distantibus cu-*

neatis costatis transversim striatis, apertura cordata,

Mus. Leeff. f. b.

Chemin. Conch. 4. p. 1. vign. 37. f. a. b. c.

*Habitat rarus - - - testa ex rufescente alba, frequenter
tius flava fasciis dilute fuscis varia.*

- Fiscellum. 160. M. testa angulata longitudinaliter plicata transversim striata : labro dentato, fauce violacea, cauda recta brevi.
Cheinn. Conch. 10. p. 242. t. 160. f. 1524. 1525.
Habitat ad insulam Pulo Condore, prope Sinam.
- Corona. 161. M. testa saltigiata fusco & flavescente fasciata : anfractibus supra planiusculis ; lamellis undosim imbricatis, cauda recta integra. *Cheinn. Conch. 10. p. 243. t. 161. f. 1526. 1527.*
Davil. catal. rais. 1. t. 9. f. A.
Habitat in sinu mexicano.
- Dolarium. 96. M. testa patulo-caudata ovata : anfractibus cingulis aliquot elevatis obtusis.
Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 347.
Seb. mus. 3. t. 49. f. 74? 75?
Knorr Vergn. 5. t. 3. f. 5.
Habitat in Oceano, testa cornea, juglandis magnitudine, utrinque attenuata, cingulis pluribus obtusis maxime elevatis cincta, duobus in spira anfractibus, columella perpendiculata, apertura ovata, anterius subtransversa, ad marginem exteriorem secundum cingula excavata, posterius canalem vix manifestum vixque emarginatum attenuata.
- corneus. 97. M. testa oblonga : rudi anfractuum marginibus complicatis, apice tuberculoso, apertura edentula, canda ascendentē. *It. wgoth. t. 5. f. 6. (fossilis.)*
Lift. anim. angl. t. 3. f. 4.
Gualt. test. t. 46. f. F?
Habitat in mari septentrionali & britannico, testa digito breviore, sub cornea epidermide alba, pellucida, transversim striata, spirae anfractibus 8 teretibus.
- lignarius. 98. M. testa oblonga rudi : anfractibus obtuse nodosis apertura edentula, cauda brevi rectiuscula.
Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 32?
Seb. mus. 3. t. 52. f. 4.
Knorr Vergn. 6. t. 26. f. 5.
Habitat in Oceano septentrionali, testa vix digitum longa, laevi, rudi, anfractibus simplici nodorum serie.
- Trapezium. 99. M. testa oblonga obtuse angulata : anfractibus nodosis, apertura dentata, cauda breviorie recta. *Mus. Lud. Ulr. 643. n. 325.*

Rumpf mus. t. 29. f. E. & t. 49. f. K. *Pseudopurpura.*

Lift. Conch. t. 935. f. 26.

Bonann. recr. 3. f. 287.

nus. *Kirch.* 3. f. 288.

Gualt. test. t. 46. f. B.

Argenv. Conch. t. 10. f. F.

Mus. Gottwald. t. 28. f. 208. & t. 29. f. 210. 210. a. b.

Knorr Vergn. 4. t. 20. f. I.

Martin. Conch. 4. t. 139. f. 1298. 1299.

β) *Lift. Conch.* t. 920. f. 12.

Rumpf mus. t. 29. f. G. & t. 49. f. F.

Gualt. test. t. 52. f. T.

Argenv. Conch. t. 10. f. H.

Mus. Gottwald. t. 34. f. 22. a. b.

Knorr Vergn. 2. t. 15. f. 3.

Martin. Conch. 4. t. 140. f. 1310. 1311.

Schroet inn. Bau Conch. t. 2. f. 10.

Habitat in Oceano indico, testa interdum ultra 6 pollices longa, apertura intus transversim striata, columella plicata, cauda extus rugosa, anfractibus singulis linea gemina fusca, & tuberculorum obtusorum serie notatis.

Vespertilio 100. *M. testa solida ventricosa lævi: apertura oblongo-ovali, cauda spiraque coronata striatis: anfractibus extimis canaliculatis.*

Lift. Conch. t. 884. f. 6. a. & t. 885. f. 6. b.

Valent Abh. t. 6. f. 57. 58.

Mus. Gottwald. t. 31. f. 213. a.

Martin. Conch. 4. t. 142. f. 1323. 1324. 1326. 1327.

Schroet. Einl. in Verst. 4. t. 8. f. 2.

β) *Seb. mus.* 3. t. 52. f. 6?

γ) *Chemin. Conch.* 10. t. 164. f. 1566. 1567.

Habitat in Oceano indico, testa ultra 4 pollices longa spadicea, intus incarnata.

101. *M. testa tenui diaphana ventricosa transversim striata, dorsi medio lævi, spiræ obtuse undulatimque nodosa, columella triplicata.*

β) *Martin. Conch.* 4. t. 142. f. 1325.

Gualt. test. t. 52. f. R?

Habitat - - - inter volutas & murices quasi medius, testa alba: spiræ anfractibus 9-10, tuberculis intus carvis, cauda annulata.

Harpa. 102. M. testa ventricosa longitudinaliter costata : ^{cepsis} transversim striatis, spira prominula; anfractibus distantibus.

Martin. Conch. 4. t. 142. f. 1328-1330.
Habitat - - -

Tuba. 103. M. testa fusiformi transversim striata alba : spiræ apice subfuscō, anfractibus distantibus basi nodis coronatis.
Martin. Conch. 4. t. 143. f. 1333.
Habitat rarus in Sina, testa 6 fere pollices longa, cauda satis longa, spiræ anfractibus 8.

Syracusa- 104. M. testa oblonga : anfractibus striatis plicatis tuberosus. culoso-carinatis, apertura edentula, cauda brevi.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 80.
Habitat rarissimus in mari mediterraneo, anfractuum testis testaceis, parietibus albis, cauda mediocri extrinsecus oblique striata.

craticula. 105. M. testa oblonga : anfractibus rotundatis plicatis transversim reticulatis, apertura dentata, cauda brevi.
Rondel. test. 89. *Turbo angulatus.*
Habitat in mari mediterraneo, testa albida longitudinaliter subplicata : angulis elevatis ferrugineis, anfractibus striis elevatis, apertura intus striata.

scriptus. 106. M. testa subcaudata fusiformi lœvi pallida : striis fuscis longitudinalibus variis, labio dentato.
Habitat in mari mediterraneo, testa oblonga, semine hordei paulo majore, striis flexuosis subpiceis notata.

ternata- 107. M. testa transversim striata anfractibus distantibus undulatim tuberculatis, apertura oblonga, cauda recta longiuscula.

Lift. Conch. t. 892. f. 12.

Valent. Abh. t. I. f. 2.

Seb. mus. 3. t. 52. f. 5.

Mus. Goettwald. t. 31. f. 211. a. b. c. f. 212. a. b. & f. 214.

Knorr Vergn. 6. t. 15. f. 4. & t. 26. f. 1.

Martin. Conch. 4. t. 140. f. 1304. 1305.

Habitat ad littora insulæ Ternate, testa slava, ad 4 usque pollices longa.

Infundi- 108. M. testa umbilicata undulatim nodosa, striis elevatis bulum. fuscis varia, umbilico infundibuliformi columella biplicata.

Lift. Conch. t. 921. f. 14.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 104.

Seb. mus. 3. t. 50. f. 54.

Chenin. Conch. 4. p. 143. vign. 39. f. A.

Habitat rarissimus - - - testa 4 pollices longa, spiræ anfractibus 9.

109. M. testa subventricosa undulatim tuberculata striata sulcataque obtuse multangula atra : apertura ovali, cauda brevi.

Lift. Conch. t. 922. f. 15.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 75.

Gualt. test. t. 52. f. P.

Argenv. Conch. t. 10. f. L.

Mus. Gottwald. t. 34. f. 222. g.

Knorr Vergn. 5. t. 10. f. 4. & 6. t. 15. f. 5. & t. 37. f. 1.

Martin. Conch. 4. t. 140. f. 1306-1309. & t. 141. f. 1314-1316.

Habitat in Oceano indicō, insundibulo affinis, testa $3\frac{1}{2}$ pollices longa, nunc unibilicata, nunc umbilico nullo, columella nunc plicata, nunc lævissima.

110. M. testa transversim striata sub epidermide fusca nivea, spiræ apice papilloso, anfractibus teretibus; primo prægrandi ventricoso.

Martin. Conch. 4. t. 141. f. 1312. 1313.

Habitat frequens ad Islandicæ littora, testa ad 5 fere pollices longa, spiræ anfractibus 6-9, apertura oblonga, cauda brevi, labro acuto, columella lævi.

111. M. testa fusiformi : spiræ transversim striatæ anfractibus distantibus planiusculis; primo tereti lævi, cauda longiuscula.

Argenv. Conch. t. 29. n. 6. f. 4.

Martin. Conch. 4. t. 141. f. 1319. 2320.

Schroet. Einl. in Verst. 4. t. 10. f. 7.

Habitat - - - hæcenus modo fossilis in Campania gallica inventus, testa ad $3\frac{1}{4}$ pollices longa, apertura ovali.

112. M. testa fusiformi tenui cancellata : cauda longa.

Martin. Conch. 4. t. 141. f. 1321. 1322.

Schroet. Einl. in Verst. 4. t. 8. f. 5.

Habitat - - - fossile modo repertus prope Courtagnon Campanicæ gallicæ, testa $1\frac{1}{4}$ pollicem longa, anfractibus nunc magis nunc minus distantibus, columella nunc plicata, nunc lævi,

- candidus.* 113. M. testa nivea transversim striata; spiræ anfractibus distantibus medio carinatis tuberculis coronatis, apertura ovali, labro intus sulcato margine denticulato.
Martin. Conch. 4. t. 144. f. 1339.
Habitat - - - testa 9½ pollices longa.
- ansatus.* 114. M. testa fusca transversim striata: spira mucronata anfractibus convexis distantibus basi nodosis, cauda longa.
Regenf. Conch. 1. t. 12. f. 62.
Martin. Conch. 4. t. 144. f. 1340.
Habitat - - - testa 5½ pollices longa, striis alternati minoribus.
- undatus.* 115. M. testa solida ventricosa undato-multangula tenui illata transversim striata, spira mucronata: anfractibus basi nodosis, labro denticulato.
Martin. Conch. 4. t. 145. f. 1343.
Habitat rarus in India, testa alba, 8½ pollices longa, ponderosa, spiræ anfractibus 14, cauda subincurva,
- longissimus.* 116. M. testa tenui striata: spira obtusa nodosa, cauda longissima.
Martin. Conch. 4. t. 145. f. 1344.
Habitat rarus in India, testa alba 9 pollices longa, spiræ anfractibus 10; nodis crebrioribus humilioribus, quibus in undato.
- Lancea.* 117. M. testa angusta: spiræ anfractibus transversim costata longitudinaliter crenatis, apertura ovata intus alba costata margine dentata, columella biplicata.
Martin. Conch. 4. t. 145. f. 1347.
Habitat in Amboina, testa inter murices tenuissima, juniorum rubella, adulorum alba, columella interstiliis & apertura violaceis, spiræ anfractibus 15-16.
- angustus.* 118. M. testa angusta: spiræ anfractu primo longitudinaliter plicato transversim costato; reliquis lævibus teretibus cauda transversim costata.
Valent. Abh. t. 1. f. 6.
Habitat - - - Lanceæ affinis.
- versicolor.* 119. M. testa subcylindrica: spira obtusa; anfractibus tertib; striatis inferioribus ceterum glabris.
Knorr Vergn. 3. t. 14. f. 1.
Martin. Conch. 4. t. 146. f. 1348.

Habitat in India, testa fusca varia, rarius nivea, spiræ anfractibus 9.

120. M. testa umbilicata cingulis, mediis elationibus, cincta: anfractibus tuberculis fusco maculatis coronatis, cauda inflexa.

Martin. Conch. 4. t. 146. f. 1349. 1356.

α) Martin. Conch. 4. t. 144. f. 1341.

β) Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 88.

γ) Mus. Gottwald. t. 43. f. 221. e?

Habitat in mari rubro.

121. M. testa tenui transversim striata: spira mucronata; anfractibus teretibus, cauda longa, apertura ovata, labro crenulato.

Mus. Gottwald. t. 34. f. 221. c. d.

Martin. Conch. 4. t. 146. f. 1351. 1352.

Habitat --- testa & pollices longa: epidermide fusca.

122. M. testa rotundata alba violaceo maculata longitudinaliter costata transversim striata: spira obtusa, cauda elongata.

Knorr Vergn. 2. t. 3. f. 4.

Martin. Conch. 4. t. 149. f. 1384.

β) Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 145.

Habitat ---

123. M. spiræ anfractibus turgidis gibbis nodosis annulatis, cauda reflexa, labro inferne denticulato.

List. Conch. t. 931. a.

Habitat --- testa 21 pollices longa.

124. M. testa albida: spira obtusa: anfractibus subcoronatis tuberculis rugolis inæqualibus, cauda transversim striata.

Gualt. test. t. 52. f. O.

Habitat --- testa 1½ pollicem longa.

125. M. testa turrita aurantia: spira obtusa; anfractibus distantibus longitudinaliter costatis transversim flexuose striatis, cauda brevi.

Knorr Vergn. 5. t. 10. f. 4.

Habitat rarus --- an varietas polygoni?

126. M. testa turrita: spiræ anfractibus contiguis linea flexuosa discretis; primo ventricoso.

Knorr Vergn. 5. t. 14. f. 4.

Habitat in mari adriatico.

- Vexillum. 127. M. testa turrata transversim costata : spiræ anfractibus convexis, apertura ovali, labro denticulato, cauda brevi
Knorr Vergn. 6. t. 26. f. 5.
Habitat — — testa aurantia : cingulis fuscis.
- vulpinus. 128. M. testa oblonga ventricosa : anfractuum marginatum striato, apertura glabra, cauda brevi extorsum distans.
v. Born mus. Cæs. Vindob. test. I. p. 318. 319. t. II. 10. II.
Habitat — — testa spadicea mediae magnitudinis, spiræ anfractibus 8.
- afer. 129. M. testa ovata transversim striata : spiræ anfractibus planiusculis tuberculorum rotundatorum serie coronata.
Adans. Seneg. 1. p. 125. t. 8. f. 18. Lipin.
Habitat ad Senegal, testa ad $1\frac{1}{2}$ pollicem longa, fulva aut alba fuscoque varia, spiræ anfractibus 9.
- campani- 130. M. testa ventricosa : spira obtusa cancellata ; anfractibus carinatis, primo ventricoso caudaque longa laevibus.
Argenv. Conch. t. 29. n. 6. f. 5.
Schroet. Einl. in Verst. 4. t. 8. f. 7.
Habitat — — hædenus modo fossile in Campania fabrica inventus, testa 3 pollices longa.
- arenosus. 131. M. spiræ anfractibus decussatim costatis : primo per grandis, tribusque extimus laevibus, cauda acuta, apertura ovali, labro exterius dentato.
Spengl. n. Samml. Schr. daen. Ges. I. F. 373. t. 2. f. 3.
Habitat in arena littorea Indiæ, testa minuta.
- maroccensis. 132. M. testa angustata subsufca transversim striata : spiræ mucronata : anfractibus distantibus contrariis terrena longitudinaliter costatis, cauda prominula, apertus ovali.
Martin. n. Mannigfalt. 4. p. 422. t. 2. f. 17-19.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. f. 6.
Chemn. Conch. 9. t. 105. f. 896.
Habitat frequens ad littus maroccense, testa $1\frac{1}{4}$ Pollicem longa.

*An distinctæ hujus tribus species testæ, quæ Lister Conch. t. 913. f. 5. t. 914. f. 6.
t. 921. f. 14. t. 924. f. 16. t. 926. f. 20. t. 927. f. 21. t. 920. f. 25. & t. 922.
f. 27. t. 935. f. 28. t. 926. f. 31. t. 950. f. 44. b. & t. 1057. f. 72. 76. &
estr. t. 3. f. 62. & 68. Bonanni recr. & mus. Kircher. 3. f. 47. 53. 72. 76. &
& 143. Gaaltieri test. t. 46. f. D. t. 50. f. B. t. 52. f. A. H. Q. S. Afric.
ville Conch. t. 9. f. 8. 3 t. 10. f. N. Seba mus. 3. t. 49. f. 60. & t. 122.
7. & 9. & Mus. Gottwald. t. 31. f. 210. c. & 213. b. t. 34. f. 221. b. 213.
d. 222. e. 222. f. 222. h. 222. i. & 223. a. b. delineatis fissuris*

166. M. testa oblonga albida transversim rufescente striata, cauda brevi recta. *Chemn. Conch.* 10. p. 278. t. 164. f. 1572.

Habitat ad novam Seelandiam.

167. M. testa subturrita : anfractibus supra carinatis, marginatis, complanatis, cauda recta elongata. *Chemn. Conch.* 10. p. 278. t. 164. f. 1573. 1574.

Davil. cat. rais. I. t. 5. f. L.

Habitat in Oceano australi.

168. M. testa cylindrica : spira cingulo calloso-crenato; anfractibus superioribus plicato-nodosis, inferioribus planinsculis, cauda recta brevi emarginata. *Chemn. Conch.* 10. p. 280. t. 164. f. 1575. 1576.

Habitat - - -

169. M. testa solida crassa rudi : spira exserta anfractibus transversim striatis, apertura semiorbiculata striata, cauda brevi recta. *Chemn. Conch.* 10. p. 280. t. 165. f. 1577. 1578.

170. M. testa ovato-angulata longitudinaliter sulcata plicataque iridescente, cauda recta, labro denticulato. *Chemn. Conch.* 10. p. 282. t. 169. f. 1635. 1636.

Martyn Conch. I. f. 2.

Habitat in Oceano indicō & australi.

171. M. testa longitudinaliter plicato-costata transversimque sulcata angulata spinosa, carinata alternatim albo fuscōque varia, anfractibus gradatis, cauda recta brevi, fance violacea. *Chemn. Conch.* 18. p. 284. t. 169. 1637. 1638.

Martyn Conch. I. f. 4.

Habitat ad insulam Pulo Condore.

172. M. testa fusco, flavo alboque varia costata; anfractibus obliquis margine tuberculatis : fascia media fusca, altera alba cauda brevi dilatata adscendente. *Kaemm.* *Cab. Rudolst.* p. 137. n. 4. t. 9. f. 7.

Habitat - - - testa ē fere pollices longa.

173. M. testa alba badio undulata sulcata : fulcis elevato-striatis, anfractibus margine nodulosis, cauda recta. *Kaemm. Cab. Rudolst.* p. 138. n. 5. t. 10. f. 1.

Habitat in mari rubro, testa ultra 4 pollices longa.

η *Turriti subulati*, cauda brevissima.

- Vertagus.** 133. M. spiræ anfractibus superne plicatis, cauda adscende
dente, columella intus plicata.
Rumpf mus. t. 30. f. K. *Strombus caudatus albus.*
Petiv. gaz. t. 56. f. 4.
Lift. Conch. t. 1020. f. 83.
Bonann. recr. & mus. *Kirch.* 3. f. 84.
Gualt. test. t. 57. f. D.
Argenv. Conch. t. II. f. P.
Klein ostr. t. 7. f. 118.
Seb. mus. 3. t. 50. f. 22. & 42. & t. 51. f. 24.
Knorr Vergn. 6. t. 40. f. 4. 5.
Murray testaceol. t. I. f. 28.
Martin. Conch. 4. t. 156. 157. f. 1479. 1480.
 β) *Lift. Conch.* t. 1021. f. 85. b.
Gualt. test. t. 57. f. F. H.
Seb. mus. 3. t. 50. f. 43. 44.
Knorr Vergn. 3. t. 20. f. 3. & 5. t. 15. f. 6.
Martin. Conch. 4. t. 157. f. 1481. 1482.
 Habitat in India, testa alba 3 circiter pollices longioribus,
 forma digitii, spiræ anfractibus teretibus, 15 & plio
 bus, sulco discretis, inferioribus altera parte levioribus
 cauda brevissima.

- Aluco.** 134. M. spiræ anfractibus tuberculatis : stria media spinosæ
 columella uniplicata, cauda adscendente. *Mus. Lind.*
Ulr. 643. n. 326.
Rumpf mus. t. 30. f. O. *Strombus angulosus.*
Adans. Seneg. I. t. 10. f. 2. *Cerite.*
Lift. Conch. t. 1025. f. 87.
Bonann. recr. & mus. *Kircher.* 3. f. 67. 69.
Gualt. test. t. 57. f. G.
Seb. mus. 3. t. 50. f. 15. 16. 36.
Knorr Vergn. I. t. 16. f. 4.
Martin. Conch. 4. t. 156. f. 1473-1477.
Schroet. Flusconch. t. 8. f. 13.
 β) *Argenv. Conch.* t. II. f. H. *Eruca contabulata.*
Lift. Conch. t. 1017. f. 79.
Rumpf mus. t. 30. f. N.
Gualt. test. t. 57. f. A.
Seb. mus. 3. t. 50. f. 37. 39. & t. 51. f. 22. 23 25.
Knorr Vergn. 3. t. 16. f. 5.
Martin. Conch. 4. t. 156. f. 1478.
 γ) *Spengl. Naturf.* 9. t. 5. f. 3.

Favann. Conch. t. 79. f. N.

Chemin. Conch. 10. t. 162. f. 1548. 1549.

§) Schroet. Flusconch. t. 8. f. II. 12.

¶) Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 82.

ξ) Gualt. test. t. 57. f. B?

Habitat in Oceano australi indico, mari rubro, atlantico,
testa ad 4 pollices longa, ut plurimum ex albida, guttis
cæruleis vel subfuscis conspersa, anfractibus transversim
striatis, labro rotundato, apertura ovali.

135. M. spiræ anfractibus cingulatis: eingulis longitudinali-
ter, anfractu primo transversim striato, cauda adscen-
dente.

Martin. Conch. 4. t. 157. f. 1486.

Habitat - - -

136. M. testa ventricosa: spira transversim striata; anfracti-
bus longitudinaliter nodoso-plicatis, apertura ovali.

Martin. Conch. 4. t. 157. f. 1488.

Habitat - - - testa flavicante: plicis albis, spiræ an-
fractibus 8, columellæ ruga solitaria.

137. M. testa ventricosa transversim striata nodis atris co-
ronata: labro subalato.

Martin. Conch. 4. t. 157. f. 1490.

Habitat - - - testa ut plurimum cærulecente, cauda vix
prominula; an forsitan strombi tuberculati varietas?

138. M. spira transversim striata sulcataque: anfractibus
granulis trifariam cinctis; primo subnodoso.

Martin. Conch. 4. t. 157. f. 1492.

Habitat Tranquebariæ.

139. M. testa fusca rotundata: spiræ anfractu primo gibbo,
sequentibus varicosis, extimis multifariam spinosis.

Lift. Conch. t. 120. f. 15.

Klein ostr. t. 2. f. 38.

Martin. berl. Magaz. 4. t. 10. f. 54.

Habitat in - - - fluviis.

140. M. testa transversim striata: spira coronata.

Lift. Conch. t. 121. f. 16.

Martin. berl. Magaz. 4. t. 10. f. 55.

¶) Lift. Conch. t. 121. f. 17.

Klein ostr. t. 2. f. 39.

Martin. berl. Mag. 4. t. 10. f. 56.

Habitat in Africæ fluviis.

- fluviati- 141. M. testa fusca : spiræ anfractibus primis spinis, religio
• lis. nodis coronatis, apertura repanda.
List. Conch. t. 122. f. 20.
Martin. berl. Magaz. 4. t. 11. f. 58.
Habitat in - - - fluviiis.
- alatus. 142. M. testa reticulata : spira mucronata ; anfractu pro
falcato & transversim striato, labro alato.
Martin. Conch. 4. t. 159. f. 1503. 1504.
*Habitat - - - spira annulata : anfractibus 6 fascia striata
cinctis.*
- nodulo- 143. M. testa transversim striata alternatim fusco albore
fus. fasciata : spira mucronata ; anfractibus distantibus ma
dulato-nodosis.
Martin. Conch. 4. t. 159. f. 1505. 1506.
Habitat - - - labro prominulo.
- Terebel- 144. M. spiræ anfractibus singulis cingulo triplici monili
ta. mi, apertura ovali intus arcuatim striata.
Knorr Vergn. 3. t. 15. f. 3.
Martin. Conch. 4. t. 155. f. 1458-1460.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. f. 2.
ε) Bonann. recr. 3. f. 327.
mus. Kircher. 3. f. 328.
γ) v. Born. mus. Caes. Vindob. test. p. 329. t. II. f. 16.
Habitat - - - testa pollicem ad $2\frac{1}{2}$ longa, nunc spadicea
nunc fusca, nunc ex spadiceo alba, nunc unicolor, ne
spadicea cingulis albis, nunc alba cingulis spadiceis
apertura interdum ex cæruleo alboque viria.
- fuscatus. 145. M. spiræ anfractibus crenulatis : stria superiore dentata
lata.
Gual. test. t. 56. f. II.
Argenv. Conch. t. II. f. ult.
Habitat in mari mediterraneo, testa sub epidermide fusa
ba, basi obtusa, anfractibus singulis medio cingulo nudo
so, utrinque fascia altera granulata, altera crenulata
- An hanc muricum fainiam quoque spedant teste a Listero Conch. t. 1019. f. 83
t. 1024. f. 90. & 91. a Boniani recr. & mus. Kircher. 3. f. 81. 82. 83.
& 344. a Klein oſtr. t. 7. f. 120. a Gualtieri teſt. t. 56. f. B. L. & B. 84.
f. F. & a Seba mus. 3. t. 50. f. 20. 21. 26. 27. 32-36. 38. 40. 41. 45. 85.
& 53. & t. 51. f. 26-30. an diſtinctæ species ? 146. b.

- torulosus.* 146. *M. spiræ anfractibus superne zona torulosa, cauda brevi.*
Habitat - - - testa alba lœvi vel obsolete longitudinaliter
striata, apice plicata, anfractuum zona elevata, globosa,
obtusa.
- Radula.* 147. *M. spiræ anfractibus tuberculatis : striis duplii serie*
punctatis.
Schroet. Einl. in Conch. I. p. 539. t. 3. f. 6.
Habitat in mari africano, testa rubella, fusca, vel subfusc-
ca, tuberculis saepe apice albis, apertura ovali.
- Apert.* 148. *M. spiræ anfractibus sulcatis transversim striatis muri-*
catis, cauda adscendente.
Schroet. Einl. in Conch. I. p. 540. t. 3. f. 7.
Habitat ad Guineam, testa laetea, seriatim fusco punctata,
solida : sulcis longitudinalibus 12-14, apertura subovali,
columellæ plica solitaria.
- Granula-*
tus. 149. *M. testa tuberculis decussatim adspersa : cauda acuta*
adscendente.
Rumpf mus. t. 30. f. L. Strombus caudatus angulosus.
Lift. Conch. t. 1020. f. 84.
Argenv. Conch. t. II. f. K.
Klein ostr. t. 7. f. 119.
Seb. mus. 3. t. 51. f. 35.
Martin. Conch. 4. t. 157. f. 1483.
Habitat in India, testa 2 pollices longa, alba anfractibus
longitudinaliter costatis transversim striatis, apertura
ovali, columellæ plica unica.
- decolla-*
tus. 150. *M. spiræ anfractibus longitudinaliter plicato sulcatis :*
apice decollato.
Habitat - - - helici decollatae similis, at basi emarginata,
apertura obovata, anfractuum margine superiori
attenuato : striis longitudinalibus plicis imbricatis : sulcis
ipsis atris opacis.
- Molucca-*
nus. 151. *M. testa striata : spiræ anfractibus transversim sulcatis*
longitudinaliter undulatum plicatis, labro subulato
crenulato, cauda tubulosa.
Lift. Conch. t. 1021. f. 85.
Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 68.
Rumpf mus. t. 30. f. T.
Gualt. test. t. 57. f. E.

Martin. Conch. 4. t. 157. f. 1484. 1485.

Habitat in insularum moluccarum uliginosis.

minimus. 152. *M. testæ striis transversis undulatis lineas longitudinalēs decussantibus , apertura orbiculata.*

Lift. Conch. t. 1018. f. 81.

Habitat in mari Jamaicam circumfluente.

strigilatus. 153. *M. testa longitudinaliter striata : anfractibus indivisiū cingulo futurali niveo rufo maculato. v. Born mus.*

Caes. Vind. test. ind. p. 260. t. 10. f. 10.

Habitat - - -

tuberculatus. 154. *M. testa transversim striata nodis glabris cincta : laevis incrassato. v. Born mus. Caes. Vindob. test. p. 282. t. 10. f. 16. 17.*

Habitat - - - testa solida , subgibba , obtusa : nodis his gris , apice albis.

gibbosus. 155. *M. spiræ anfractibus marginatis , ventre gibbo, labio fissio denticulato , cauda brevi. v. Born mus. Vindob. test. p. 325. t. 11. f. 12. 13.*

Habitat - - - spiræ anfractibus 9 transversim striatis longitudinaliter plicatis , cauda recta alba , maculis 12 bellis varia.

atratus. 156. *M. testa atra : anfractibus transversim striatis tuberosi latis , columella uniplicata , cauda recta. v. Born mus.*

Caes. Vindob. test. p. 329. t. 11. f. 17. 18.

Habitat - - - spiræ anfractibus 10 , labro crenulato.

contrarius. 157. *M. testa patulo-caudata contraria , striis geminis.*

Mant. p. 551.

Lift. Conch. p. 950. f. 44. b. c.

Bonann. mus. Kirch. 3. n. 399.

Regenf. Conch. 2. t. 4. f. 36.

Mant. n. Mannigf. 4. t. 2. f. 14.

Favann. Conch. t. 32. l. N. t. 79. l. F. 1. 80. 1. 1.

Chemin. Conch. 9. t. 105. f. 894. 895.

Habitat in mari septentrionali.

eburneus. 158. *M. testa contraria hyalina : anfractibus sex subtilissimi crenulatis. Chemin. Conch. 9. p. 66. t. 105. f. 896.*

Habitat in mari - - -

- conditus.* 174. M. testa turrita granulis scaberrima : labro duplicato utrinque emarginato intus dentato, apertura ovali striata. *Chenn. Conch.* 10. p. 254. t. 162. f. 1544. 1545.
Habitat - - - *Aluconi affinis.*
162. M. testa transversim striata maculata, anfractibus pli-
 cato-nodosis, cauda adscendente, labro duplicato di-
 latato, labio replicato glabro. *Chenn. Conch.* 10. p.
 256. *Vign.* 22. f. A. B.
Martyn Conch. 2. f. 57.
Habitat ad insulam Pulo-Condore prope Sinam.
163. M. testa flavescente hexagona transversim granulatim
 striata : anfractu primo tuberculato, apertura subro-
 tunda, labro dilatato. *Chenn. Conch.* 10. t. 162. f.
 1554. 1555.
Habitat in mari australi, frequentior inter petrefacta.

326. TROCHUS. *Animal Limax.*

Testa univalvis spiralis subconica.
Apertura subtetragono-angulata
*f. rotundata superius transver-
 sa coarctata ; columella obli-
 quata.*

* *Umbilicati eredi, columellæ perforata.*

- testa conica laeviuscula subumbilicata.*
Ol. mus. t. 29. f. 5.
Lift. Conch. t. 617. f. 3. t. 619. f. 5. & t. 620. f. 6.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 102.
Rumpf mus. t. 21. f. A. & 3. 4.
Gualt. test. t. 59. f. B. C.
Argenv. Conch. t. 8. f. C.
Mus. Gottwald. t. 39. f. 265. a. b. c.
Regenf. Conch. I. t. 4. f. 42.
Knorr Vergn. I. t. 12. f. 4. & 2. t. 5. f. I. & t. 6. f. I.
*Chenn. Conch. 5. p. 3. vign. 42. f. C. t. 167. f. 1605-
 1609. & t. 168. f. 1614.*

*Habitat rario in Oceano indico, congeneribus major, testa
 ponderosa, striis oblique perpendicularibus rubris, etiam
 subtus picta, detracta extima turica tota argentea ; apice*

*obsolete noduloſo, anfraſtibus minime nodofis, aperitio
argentea, labro interiore obſolete bilobo; a maculato
teſtæ fauce lœvi, columella non denticulata, baſi ventri
convexa lœvi diſtinctus.*

- macula- 2. Tr. teſta conica tuberculata: umbilico obliquo, labio in-
tus. teriore obſolete bilobo. *Mus. Lud. Ulr. 644. n. 327.*
Rumpf mus. t. 21. f. B. Trochus maculosus.
Lift. Conch. t. 632. f. 20?
Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 96.
Gualt. teſt. t. 61. f. DD.
Mus. Gottwald. t. 39. f. 266. a? b?
Murray teſtaceol. t. 1. f. 20.
Chemin. Conch. 5. t. 168. f. 1615-1618.
Schroet. Einl. in Conch. 1. p. 648. t. 3. f. 9.
β) *Chemn. Conch. 5. t. 169. f. 1623. 1624.*
γ) *Rumpf mus. t. 21. f. C?*
*Habitat in mari, Asiam Americamque australem alludente,
teſta magnitudinis variae, ponderosæ, tuberculis ſeriatim
variae altitudinis cinctæ, radis rubris, fuscis, ab his
viridibus varia, spiræ anfraſtibus 9 planiusculis.*
- perspecti- 3. Tr. teſta convexa, obtusa marginata: umbilico per-
vus, crenulato. *Mus. Lud. Ulr. 646. n. 329.*
Rumpf mus. t. 27. f. L. Umbilicata.
Argeny. Conch. t. 8. f. M. Solarium.
Lift. Conch. t. 636. f. 24.
Pet. amb. t. 2. f. 14.
Bonann. recr. 3. f. 27. 28.
 muf. Kircher. 3. f. 26. 27.
Gualt. teſt. t. 65. f. O.
Lesser teſtaceoth. f. VII.
Seb. mus. 3. t. 40. f. 1. 2. 13. 14. 28. 41. 42.
Knorr Vergn. 1. t. II. f. 1. 2.
Regenf. Conch. 1. t. 6. f. 61.
v. *Born mus. Caef. Vindob. teſt. p. 326. vign. f. b.*
Chemin. Conch. 5. p. 3. vign. 42. f. E. t. 172. f. 1691-1696.
Schroet. Journ. 5. p. 431. f. 8.
β) *Lift. Conch. t. 633. f. 21.*
γ) *Gualt. teſt. t. 65. f. D.*
δ) *Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 196?*
ε) *Bonann. recr. 3. f. 211?*
 muf. Kirch. 3. f. 210?
ζ) *Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 213?*

Habitat ad Asie australis & Africæ littora, testa 2 $\frac{1}{4}$ pollices ex diametro, & pollicem alta, altero latere plana, umbilico infundibuliformi cingulo granulato duplice, suspendo naturæ artificio.

4. Tr. testa convexa, columella bidentata, umbilico crenulato. *Mus. Lud. Ulr. 646. n. 330.**

Chemn. Conch. 5. t. 173. f. 1702? - 1705?

Habitat in mari mediterraneo, perspectivo affinis, at testa minore albo fuscoque varia, subtus tota alba, umbilico angustiore.

5. Tr. testa convexa : striis calloso-punctatis, columella unidentata. *Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1674.*

Schroet. Einl. in Conch. I. p. 653. t. 3. f. 10.

Habitat in mari mediterraneo, testa ferruginea aut rubella, avellana minore, fasciis albidis, spiræ anfractibus 4-5.

6. Tr. testa subovata striata : punctis concatenatis globosis, columella aperturaque dentata, umbilico crenato. *Mus. Lud. Ulr. 647. n. 331.**

Rondel. test. 104. Umbilicus varius.

Argenv. Conch. t. 8. f. L. Q. Camisole.

Adans. Seneg. I. t. 12. f. 3. Vassat.

Lift. Conch. t. 637. f. 25.

Petiv. gaz. t. 14. f. 10.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 222. 223.

Gualt. test. t. 63. f. B.

Knorr Vergn. I. t. 30. f. 6. & 4. t. 26. f. 3. 4.

β) *Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1672. 1673.*

Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1678.

Habitat rarer in mari rubro, mediterraneo, & ad Brasiliæ littora, testa rubra, striis ex punctis concatenatis obsita, alternatim ex albis nigrisque, & ex rubris.

7. Tr. testa oblique umbilicata convexa : anfractibus obtuse nodulosis. *Mus. Lud. Ulr. 647. n. 332.**

Argenv. Conch. t. 8. f. S. Sorciera.

Lift. Conch. t. 641. f. 32.

Gualt. test. t. 62. f. L. t. 64. f. C?

Seb. mus. 3. t. 41. f. 4-6.

Knorr Vergn. 6. t. 27. f. 4.

β) *Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1656-1660.*

Adans. Seneg. I. t. 12. f. 8? Datat.

*Habitat rario in mari mediterraneo & rubro, testa cinerea
aut rubra nebulosa, spiræ anfractibus 4-5 longiusculis
ter nodosis, obsolete striatis.*

- Modulus. 8. Tr. testa striata supra plicata, subtus convexiore : apertura obovata unidentata.
List. Conch. t. 653. f. 52.
Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1665.
Schroet. Einl. in Conch. I. p. 656. t. 3. f. II.
 β) *List. Conch. 653. f. 53.*
 γ) *List. Conch. t. 654. f. 54.*
Habitat in mari rubro, pharaonii magnitudine, testa sublenticulari, albida, purpurascenti-maculata : fauce striata.
- Muricatus.* 9. Tr. testa subumbilicata ovata : tuberculis muricatis. *Muf. Lud. Ulr. 648. n. 333.**
Goult. test. t. 64. f. H.
Habitat in mari mediterraneo, testa avellanae magnitudine alba : apertura ovata, laevi ; umbilico minuto oblongo.
- Scaber.* 10. Tr. testa subovata : fulcis alternis majoribus moniliformibus. *Muf. Lud. Ulr. 648. n. 334.**
Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1667?
Habitat --- mago affinis, testa nigricante : apertura flavescente.
- Varius.* 11. Tr. testa oblique umbilicata convexa : anfractibus submarginatis.
Habitat in mari mediterraneo, testa pallida : fasciis cinereis centibus, obsoleto margine cincta.
- Cinerarius.* 12. Tr. testa oblique umbilicata ovata : anfractibus rotundatis. *Fn. suec. 2167. Müll. zool. dan. 3. p. 35. t. 102.
f. 1-4. prodr. 2925. O. Fabr. Fn. groenl. p. 399. n. 383.*
Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1686.
Habitat in mari mediterraneo & norwegico, testa cinerea : fasciis obliquis pallidis, aut alba : maculis subspadiceis.
- Divaricatus.* 13. Tr. testa subumbilicata ovata : anfractu insimo remotores umbilico subconsolidato. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 399. n. 389.*
Habitat in mari mediterraneo & groenlandico, testa viridis punctis sanguineis fasciata.
- Umbilicaris.* 14. Tr. testa cylindrico-umbilicata conica-convexa, anfractu subemarginato.

Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1666.

Habitat in mari mediterraneo, testa cinerea aut ferruginea nebulosa: umbilico pervio exalte cylindrico, intus albo.

15. Tr. testa convexo conica: anfractibus spinoso radiatis, apertura semicordata. *Mus. Lud. Ulr.* 645. n. 328.
Rumpf mus. t. 20. f. K. *Zonnehooren.*
Marijn. *neuest. Mannigf.* 1. p. 419. t. 2. f. 15.
Chemn. Conch. 5. t. 173. f. 1700. 1701.
- β) *Lift. Conch.* t. 622. f. 9.
Bonann. recr. 3. f. 366. 367.
mus. 3. f. 359. 360.
Klein ostr. t. 1. f. 19.
Lesser testaceoth. f. 15.
Seb. mus. 3. t. 59. f. 1-4.
Knorr Vergn. 4. t. 8. f. 2. & C. t. 26. f. 4.
Chenin. Conch. 5. t. 174. f. 1716. 1717.
Schroet. Journ. 5. f. 9. (*Operc.*)
Habitat rarissimus in India, β) minus rarus in mari Americam australem alluenie, testa diametri 2 pollicum, transversim striata, basi arcuatim, albida, β) aurata fusco radiata.
16. Tr. testa deppressa obliqua alba fusco lineata: spira transversim striata longitudinaliter costata; anfractu primo ventricoso, apertura orbiculari.
Lift. Conch. 1. 653. f. 51.
Gualt. test. t. 64. f. 6.
Knorr Vergn. 4. t. 6. f. 5.
Chemn. Conch. 5. t. 165. f. 1567. 1568.
β) *Chemn. Conch.* 5. t. 165. f. 1569. 1570?
γ) *Lift. Conch.* t. 654. f. 54.
Favann. Conch. 2. t. 8. f. D.
Kaemn. Cab. Rudolst. t. 12. f. 1.
Chemn. Conch. 10. t. 165. f. 1583. 1584.
Habitat --- turbini cfinis columelle linib[us] fusco, anfractu primo reliquis duplo majore: an helicis potius species?
17. Tr. testa conica alba rubro maculata: spiræ anfractibus teretibus: cingulis granulorum moniliformibus.
Chemn. Conch. 5. t. 167. f. 1610.
Habitat in India, umbilico ianum spiræ primum anfractum transeante,

Vvv vvvvvvvv v. 4.

spinofus. 18. Tr. testa subæquali mucronata : spiræ anfractibus inferet spinosis, fascia utrinque albo nigroque lineata, cincta loque nodorum triplici.

Chemn. Conch. 5. t. 167. f. 1611.

Habitat rarissimus — — testa media magnitudinis rotulae & nigricante, spiræ anfractibus 9.

jujubinus. 19. Tr. testa lateritia albo-maculata : basi plana lineis concentricis punctorum concatenatorum : anfractibus canaliculatis margine inferiore albo spadiceoque tessellatis, utrinque punctis elevatis cinctis.

Mus. Gottweld. t. 39. f. 269?

Chemn. Conch. 5. t. 167. f. 1612. 1613.

Habitat rarus ad insulam S. Mauritiū, & in mari Americam australēm a'luente, zizyphino affinis.

Alveare. 20. Tr. testa plicato-nodulosa granulatim transversim striata cingulisque punctorum concatenatorum exornata, umbilico infundibuliformi, columella crenulata.

Chemn. Conch. 5. t. 168. f. 1619.

Gualt. test. t. 60. f. P.

β) Chemn. Conch. 5. t. 168. f. 1622.

Habitat in India, testa dilute viridi & alba, intus marginiteracea, subtiliter annulata.

concavus. 21. Tr. testæ basi & umbilico continuo infundibuliforme spiræ anfractibus contiguis undulatim plicatis, apertura margine denticulata.

Chemn. Conch. 5. t. 168. f. 1620. 1621.

β) Gualt. test. t. 63. f. A.

γ) List. Conch. t. 627. f. 13.

Klein ostr. t. I. f. 20.

Huic tribui trochorum adscribendæ quoque, an distinctæ ejus species, quæas Litter Conch. t. 61. f. 58. t. 583. f. 37. t. 585. f. 44. t. 616. f. 2. t. 618. f. 4. t. 621. f. 7. & 8. t. 623. f. 9. a. t. 626. f. 11. a. t. 629. f. 15. & 630. f. 16. t. 621. f. 18. t. 632. f. 19. t. 633. f. 21. t. 638. f. 26. t. 648. f. 42. 27. & 28. t. 640. f. 29. t. 641. f. 31. t. 643. f. 35. t. 646. f. 39. t. 648. f. 9. t. 648. f. 43. & t. 654. f. 54. Bonanni recr. & mus. Kirscher. 3. f. 89. 92. 94. 97. 98. 170. 171. 195. 196. 202. 207. 213. 3+2. 396. recr. 3. f. 211. nr. 1. Kircher. 3. f. 210. Klein ostr. t. 2. f. 35. Rumpf mus. t. 21. f. 1. 2. nr. 1. f. 211. nr. 2. f. 5. nr. 3. f. 6. nr. 6. t. 21. f. 8. nr. 8. f. 9. nr. 9. 10. f. 10. M. Agassizii test. t. 60. f. A. C. R. t. 61. f. A. H. I. L. & t. 65. f. L. Seba nr. 2. f. 2. Conch. t. 8. f. K. R. & t. 27. f. 4. zoomorph. t. 3. f. D. Seba nr. 2. f. 2. f. 2. Knorr Vergn. 1. t. 12. f. 1. 2. t. 2. f. 4. 5. 4. t. 8. f. 2. f. 2. & t. 23. f. 2. & 6. t. 27. f. 5. & Regensas Conch. 1. t. 3. f. 27. delineatur.

Habitat in India, testa 2 circiter pollices lata & alta, ex thalassino, rubro & violaceo mixta, apertura utrinque compressa.

22. Tr. testa granulis nodisque cincta vitidi apicem versus albicante, apice ipso guttis nigris vario.

Chemn. Conch. 5. t. 169. f. 1625. 1626.
Habitat in India.

23. Tr. testa maculis albis, virentibus & cervinis, apice rubris nigrisque varia, intus margaritacea, basi alba sanguineo maculata anfractibus multifariam nodulosis margine inferiori glabris.

Grahl. test. t. 60. f. B.

Chemn. Conch. 5. t. 169. f. 1627.

Habitat in India.

24. Tr. testa rugoso plicata sub epidermide hyalina thalassina intus margaritacea, anfractibus inferne nodulosis, medio punctis concatenatis.

Chemn. Conch. 5. t. 169. f. 1628.

Habitat in India, anfractibus 2 primis quam maxime distans, umbilico insundibuliformi.

25. Tr. testa plicato rugosa oblique crenata transversim striata, basi plana alba sanguineo guttata.

Chemn. Conch. 5. t. 169. f. 1629.

- β) *Chemn. Conch. 5. t. 169. f. 1632.*

Habitat in India.

26. Tr. testa plicato-rugosa thalassina : spiræ anfractibus punctis concatenatis : supremis margine radiato-spinosis.

Chemn. Conch. 5. t. 169. f. 1630.

Habitat in India.

27. Tr. nodulis granisque ochroleucis rubro undatis multifariam cincta, basi altera parte laevi.

Chemn. Conch. 5. t. 169. f. 1631.

Habitat - - -

28. Tr. testa punctis elevatis concatenatis : anfractibus infra nodis oblongis albis : fulcis intermediis purpureis.

Argeny. Conch. t. 8. f. T.

Chemn. Conch. 5. t. 169. f. 1633. 1634.

Habitat - - - testæ basi alba striata punctataque, spiræ versus rubro radiata.

- inæqua- 29. Tr. testa nodis granisque inæqualibus aspera : anfractibus multifariam nodosis : ordine utroque marginali tuberculatis.
Gualt. test. t. 60. f. O.
Chenn. Conch. 5. t. 170. f. 1635. 1636.
Habitat - - - testa ut plurimum viridi spadiceo nebulosa & radiata, basi alba granulosa, radiis roseis.
- regius. 30. Tr. testa transversim striata multifariam nodosa alboreo obumbrata, anfractuum margine utroque prominulo umbilico infundibuliformi.
Chenn. Conch. 5. t. 170. f. 1637.
Habitat - - - testa basi plana alba, striis concentricis granulatis cincta.
- verruco- 31. Tr. testa conica alba purpureo radiata, umbilico infundibuliformi immaculato, anfractuum margine noduloso.
Chenn. Conch. 5. t. 170. f. 1638.
Habitat - - -
- cylindri- 32. Tr. testa cylindrica subfuscata : anfractibus convexis, annulis transversis crenulatis, umbilico subcrenato.
Chenn. Conch. 5. t. 170. f. 1639. a. b.
Habitat rarus - - - testa mediae magnitudinis.
- radiatus. 33. Tr. testa pyramidali rubro radiata : anfractibus punctis concatenatis, umbilico infundibuliformi.
Chenn. Conch. 5. t. 170. f. 1640.
β) Chenn. Conch. 5. t. 170. f. 1641.
γ) Chenn. Conch. t. 170. f. 1642. α. β.
δ) Gualt. test. t. 61. f. E.
Habitat in America australi, insulisque obversis.
- viridis. 34. Tr. testa viridi : anfractu primo quinquefariam, secundo quadrifariam nodulosam, reliquis glabris.
Chenn. Conch. 5. t. 170. f. 1643. 1644.
Habitat - - - testa mediae magnitudinis, umbilico infundibuliformi, secundum spiræ anfractum non afferente.
- rufisticus. 35. Tr. testa obtuse pyramidali ex atro fusca.
Chenn. Conch. 5. t. 170. f. 1645. 1646.
Habitat in Sina.
- nigerri- 36. Tr. testa nigerrima : spiræ transverse striata ; anfractibus mus. planiusculis, columella unidentata.

Chemn. Conch. 5. t. 170. f. 1647.

Habitat in Sina, testa mediæ magnitudinis.

Panulum. 37. Tr. spiræ anfractibus ochroleucis plicato-tuberculatis sulco maculato rugoso discretis.

Bonann. recr. 3. f. 396.

mus. Kircher. 3. f. 372.

Knorr Vergn. 4. t. 25. f. 5.

Chemn. Conch. 5. t. 170. f. 1648. 1649.

Habitat in aquis sernambucensibus.

Nigofus. 38. Tr. testa pyramidalis transversim striata ochroleuca sanguineo varia apice nigra : spiræ anfractibus planiusculis margine sanguineo maculato tumidiusculis.

Chemin. Conch. 5. t. 170. f. 1650.

β) Chemn. Conch. 5. t. 170. f. 1651.

Habitat ad littus Maroccense, testa minuta.

Pyramis. 39. Tr. testa pyramidalis spadiceo maculata & nebulosa : anfractibus margine fornicato-nodulofis.

Chemin. Conch. 5. t. 170. f. 1652.

β) Chemn. Conch. 5. t. 170. f. 1653.

Habitat - - - testa ultra dimidium, in β) integrum pollicem alta, inter nodulos marginis granulato striata.

Crenifus. 40. Tr. testa depressa albo spadiceo que varia : basi convexa annulo coccineo obscurius maculata.

Chemin. Conch. 5. t. 171. f. 1661. 1662.

Habitat ad Caput Bonæ Spei.

41. Tr. testa depressa alba rubro maculata : anfractibus dis tantibus transverse striatis plicatisque : columella unidentata.

Chemin. Conch. 5. t. 171. f. 1663. 1664.

Habitat rarer in mari rubro prope Suez, testa $\frac{3}{4}$ pollicis alta.

depressus. 42. Tr. testa depressa albida rubello radiata apice rubra : anfractibus cingulo punctorum moniliformi.

Chemin. Conch. 5. t. 171. f. 1668.

β) Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1669.

Habitat - - - testa mediæ magnitudinis.

lavigatus. 43. Tr. testa dilute fusca basi subconvexa : spiræ anfractibus lœvibus obsolete transversim striatis, umbilico infundibuliformi albo.

Chemin. Conch. 5. t. 171. f. 1670.

Habitat - - - testa minuta.

- groenlan- 44. Tr. testa pellucida incarnata basi convexa : anfractibus
dicus. convexis subtilissime transversim striatis.
Chenn. Conch. 5. t. 171. f. 1671.
*Habitat ad Groenlandiae littora, spiræ anfractibus 6, aperte
tura suborbiculari.*
- roseus. 45. Tr. testa convessa rosea sulcata : umbilico minimo.
Chenn. Conch. 5. t. 171. f. 1675.
Habitat frequens ad Caput Bonæ Spei, testa exili.
- pathola- 46. Tr. testa depressa fusca albido maculata.
tus. *Chenn. Conch.* 5. t. 171. f. 1676.
Habitat - - - testa minima.
- viridulus. 47. Tr. testa virente oblique albo radiata : spiræ anfractibus
convexitatibus cingulo granorum moniliformi instructis, color
mella dentata.
Chenn. Conch. 5. t. 171. f. 1677.
Habitat - - - testa mediae magnitudinis.
- barbanus. 48. Tr. testa convessa multifariam granulata, umbilico der
ticulato, apertura crenulata.
Chenn. Conch. 5. t. 171. f. 1679.
*Habitat - - - granulis vel nodulis partim albis, partim
. incarnatis.*
- guineen- 49. Tr. testa fusco canoque nebulosa, multifariam granulata,
sis. & nodulosa ; apertura crenata, umbilico dentato.
Chenn. Conch. 5. t. 171. f. 1680.
Habitat ad Guineam, testa 8 lineas lata, & ultra 6 alt.
- Nodulus. 50. Tr. testa cinerea : cingulis granorum moniliformibus
umbilico albo dentato, apertura crenata.
Chenn. Conch. 5. t. 171. f. 1681.
Habitat - - - guinenſi minor.
- carneus. 51. Tr. testa depressa subcarnea : cingulis granorum monili
formibus confertis, umbilico amplio unidentato.
Chenn. Conch. 5. t. 171. f. 1682.
Habitat - - - nodulo minor.
- tessella- 52. Tr. testa transversim striata : spiræ anfractibus distantibus
tus. maculis quadratis multifariis.
Chenn. Conch. 5. t. 171. f. 1683.
Habitat frequens in mari mediterraneo.
- eroceus. 53. Tr. testa convessa spadicea : spiræ anfractibus convexis
extimus croccis.

Chemn. Conch. 6. t. 171. f. 1684.

Habitat frequens ad Africæ, præfertim Marochii littora.

54. Tr. testa convexo-depressa radiis obliquis subviolaceis varia; spiræ anfractibus convexis.

Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1685.

Habitat in mari mediterraneo.

55. Tr. testa convessa spadicea: anfractibus margine superiore vitta ex rubro alboque varia.

Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1687.

Argenv. Conch. 5. t. 9. f. E?

Habitat - - -

56. Tr. testa depresso-pyramidalis basi concava: spiræ anfractibus transverse striatis oblique costatis; primo margine carinato, umbilico infundibuliformi.

Schroet. Einl. in Conch. 1. p. 716. 2. t. 7. f. 2. 3.

Habitat - - - haecenus modo fossilis in Campania gallica inventus.

57. Tr. testa convexo-conica: anfractibus muticis, apertura semicordata.

Chemn. Conch. 5. t. 172. f. 1697. 1698.

Habitat in India, testa vix pollicem alta subtilissime oblique striatus umbilico spirali, spiræ anfractibus 5 hyalinis;

58. Tr. testa decessa spadicea: spiræ anfractibus planiusculis multifariam granulatis transversim striatis, crenatis, umbilico pervio crenulato.

Chemn. Conch. 5. t. 173. f. 1706. 1707.

Habitat rarissimus - - -

59. Tr. testa straminea: anfractibus convexis crenatis decus-
satim striatis sulco discretis, umbilico pervio.

Lift. Conch. t. 635. f. 23.

Chemn. Conch. 5. t. 172. f. 1699.

Habitat ad Tranquebariæ littora, spiræ anfractibus 5-6.

60. Tr. testa alba subfuscō radiata striis crenatis exarata; umbilico pervio crenato.

Chemn. Conch. 5. t. 173. f. 1708. 1709.

Habitat - - -

61. Tr. testa convexa transversim striata alba maculis quadratris rubellis varia; umbilico crenulato.

Chenn. Conch. 5. t. 173. f. 1710. 1711.
Habitat - - - *anfractibus sīria alba discretis.*

inermis. 62. Tr. testa ex viridi lutea : costis longitudinalibus plicatis
 spina terminatis, apertura compressa umbilico ingeñuo
Chenn. Conch. 5. t. 173. f. 1712. 1713.
Habitat - - -

imperialis. 63. Tr. testa conica olivacea, squamis violaceis seriatim fornicatis tecta : anfractibus inflatis margine spinoso radiatus, umbilico infundibuliformi albo.
Chenn. Conch. 5. t. 173. 174. f. 1714. 1715.
Habitat in mari australi, testa satis magna : spiræ anfractibus 7.

planus. 64. Tr. testa depressa straminea obscurius costata : spiræ anfractibus plicatis, umbilico pervio.
Chenn. Conch. 5. t. 174. f. 1721. 1722.
Habitat - - -

albidus. 65. Tr. testa conica alba : fasciis obliquis fusciis, anfractibus prope futuram canaliculariatis.
v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 11. f. 19. 20. Trochus cinerarius.
Habitat - - -

fuscatus. 66. Tr. testa conica : basi ex viridi cinerea fusco maculata, anfractibus teretibus, umbilico cylindrico.
v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 12. f. 1. 2. Trochus umbilicaris.
Habitat - - -

fasciatus. 67. Tr. testa conica lævi alba fusco maculata reseco fasciata : anfractibus teretibus ad futuram planiusculis.
v. Born mus. Caes. Vindob. test. ind. I. p. 336. t. 12. f. 3. 4.
Habitat - - - turbini affinis.

corallinus. 68. Tr. testa conica rubra albo punctata subumbilicata : anfractibus teretibus ; primo 15fariam, altero sexfariam tuberculatis.

Adans. Seneg. I. t. 12. f. 4. Fujet.

β) *Adans. Seneg.* I. t. 12. f. 5. Sari.

Habitat in Senegal, testa 4 lineas longa, spiræ anfractibus 6; an hujus tribus?

griseus. 69. Tr. testa grisea albido maculata : spiræ anfractibus planiusculis transversim sulcatis.

*Adans. Seneg. I. t. 12. f. 6. Lonier.
Habitat in Senegaliam.*

70. Tr. testa convexa : spiræ anfractibus contrariis.
*Martin. neuest. Manigf. 4. p. 404. t. I. f. I. 2.
Chemn. Conch. 9. t. 114. f. 977. a. b.
Habitat - - - in mineram ferri conversus prope Scaphur-
siam.*
71. Tr. testa pyramidali : anfractibus contrariis teretibus ;
 tribus quatuor trifariam tuberculatis , quarto maximo-
 pere distante.
*Spengl. n. Samml. daen. Ges. Wissensch. I. t. I. f. 5.
Chemn. Conch. 9. t. 113. f. 970.
Habitat - - - basi plana , apertura compressa.*
72. Tr. testa tenuissima cerea : spiræ anfractu primo magno ;
 fascia media fusca.
*Schroet. Flusconch. p. 281.
Einl. in Conch. I. p. 754. t. 3. f. 16.
Habitat - - - testa minima.*
73. Tr. testa obtuse pyramidali : spiræ anfractibus quatuor
 elevatis contiguis margine tumidis.
*Chemn. Conch. 9. t. 122. f. 1051.
Schroet. Flusconch. t. 6. f. 10.
β) Schroet. Flusconch. t. 6. f. 12.
Habitat - - - apertura compressa , umbilico pervio.*
74. Tr. testa convexa grisea albido maculata : spiræ anfrac-
 tibus planiusculis.
*Adans. Seneg. I. t. 12. f. 6. Lonier.
Habitat in Senegaliam , testa 6 circiter lineas longa , at
duplo fere latiori.*
123. Tr. testa subovata convexo depressa lævi rubicunda
 glabra. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 393. n. 391.
Habitat frequens ad Groenlandiæ littora , cinerario affinis ,
testa 2 lineas longa , incola ex nigro cærulecente.*
128. Tr. testa rubescente punctis elevatis inæqualiter costata :
 spiræ depresso ; anfractibus convexis. *Kaenm. Cab. Run-
dolst. p. 163. n. 20. t. 12. f. 1.
Habitat - - - testa 7 lineas aliae.*

** Imperforati , eredi , umbilico clauso.

- vestiarius. 75. Tr. testa conico-convexa , basi gibbosso-callosa , apertură
subcordata.
List. Conch. t. 649-652. f. 44-50.
Petiv. gal. t. 11. f. 6.
Bonann. recr. 3. f. 208-210. 355. 356.
muf. Kircher. 3. f. 208. 209. 211. 348. 350.
Gualt. test. t. 65. f. E-H.
Klein oſtr. t. 1. f. 13-15.
Knorr Vergn. 4. t. 21. f. 4. & 6. t. 22. f. 7.
Chemn. Conch. 5. t. 166. f. 1601. a-h.
 β) *Bonann. recr. & muf. Kirch.* 3. f. 212.
Chemn. Conch. 5. t. 166. f. 1602. n. 1-3
 γ) *Gualt. test.* t. 65. f. A.
 δ) *Schroet. Einl. in Conch.* 1. p. 666. t. 3. f. 12.
 ε) *Schroet. Einl. in Conch.* 1. p. 666. t. 3. f. 13.
 ζ) *Gualt. test.* t. 65. f. B.
Habitat in mari mediterraneo , & Asiam australem alluentis
testa lœvi , minuta , statura pharaonii supra glauca lineis
transversis undatis pallidis , sœpe varia , subteus capi-
convexo lato albido notata.

- . Labio. 76. Tr. testa ovata substriata : columella unidentata. *Mari-*
Lud. Ulr. 649. n. 335.*
Rumpf muf. t. 21. f. E. *Labio.*
Adans. Seneg. 1. t. 12. f. 2. *Retan.*
List. Conch. t. 584. f. 42. & t. 645. f. 37.
Argenv. Conch. t. 6. f. N.
v. Born muf. Cœf. Vindob. *test.* t. 12. f. 7. 8.
Chemn. Conch. 5. t. 166. f. 1579-1581.
 β) *Knorr Vergn.* 1. t. 10. f. 7.
 γ) *Martyn univ. Conchol.* 1. t. 34.
Habitat in Oceano , Asiam australem , Africam , noram
Seelandiam alluente ; nonne ad turbines relegundus ?

- Tuber. 77. Tr. testa depresso-ovalis : anfractibus subcarinatis marginis.
Seb. muf. 3. t. 74. f. 12.
Argenv. Conch. t. 8. f. I. .
Knorr Vergn. 1. t. 3. f. 2. & 4. t. 4. f. 3. 4.
Regenf. Conch. 1. t. 12. f. 76.
Chemn. Conch. 5. t. 164. f. 1561. & t. 156. f. 1572-1576.
 β) *Regenf. Conch.* 1. t. 3. f. 27.
Habitat in mari mediterraneo , & Americam australem al-
luente , testa ponderosa , viridi , varia , diæctri aliquando

do 2 pollicum, anfractibus longitudinaliter costatis; nonne potius turbinis species?

78. Tr. testa conica: anfractu infimo subangulato, apertura obovata.

Gualt. test. t. 61. f. N.

Chemn. Conch. 5. t. 162. f. 1527. 1528.

Habitat in mari mediterraneo, testa minuta alba: lineis obliquis nigris.

79. Tr. testa conica lœvi: anfractibus linea elevata interstitiis.

List. anim. angl. t. 3. f. 15.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 91. 93. 99?

Gualt. test. t. 61. f. B. G. M.

Chemn. Conch. 5. t. 166. f. 1588-1591.

Habitat in mari mediterraneo aliisque europæis, an varietas zizyphini? testa rubra vel flava, crebro spadiceo varia, fasciata aut radiata, apice tuberculata, anfractibus planisculis, extimis nodulosis.

80. Tr. testa conica livida lœvi: anfractibus marginatis.

Fn. suec. 2 168. Mus. Lud. Ulr. 650. n. 336.* Müll. zool. dan. prodr. 2926.

List. Conch. t. 616. f. I.

an. angl. t. 3. f. 14.

Gualt. test. t. 61. f. C.

Argenv. Conch. t. 8. f. N.

Klein ostr. t. 2. f. 36.

Knorr Vergn. 3. t. 14. f. 2. 3. & 6. t. 27. f. 5.

v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 12. f. 9. 10.

Chemn. Conch. 5. t. 166. f. 1592-1594. 1597. 1598.

?) Chemn. Conch. 5. t. 165. f. 1595. 1596:

Rumpf mus. t. 21. f. I?

Habitat in mari mediterraneo & omni europæo, etiam ad Africæ littorâ frequens, testa sub turica extima plumbea, transversè striata; anfractibus contiguis, superioribus subtiliter granulatis.

81. Tr. testa conica granulis albis vel viridibus moniliformibus multifariani cincta, columelia unidentata.

Knorr Vergn. 1. t. 12.

Chemn. Conch. 5. t. 160. f. 1510-1512.

Habitat rario in India, testa 2 pollices alta, & ejusdem diametri;

- distortus.* 82. Tr. testa alba solida nitida striata distorta apice obtusa : spiræ anfractu primo gibbo, apertura compressa ovata : *Pall. Spic. zool.* 10. t. 3. f. 7. 8. *Helix hyonetiana* : *Martin. berl. Saniml.* 7. t. 1. f. 4. 5. *Chenm. Conch.* 5. t. 160. f. 1513. a. b. *Habitat* - - - *spiræ anfractibus 7, an hujus tribus?*
- virgatus.* 83. Tr. testa pyramidali roseo alboque virgata multi-riam nodulosa : basi circulis concentricis albis rubrisque : *Lifl. Conch.* t. 631. f. 17. *Chenm. Conch.* 5. t. 160. f. 1514 1515. *(β) Mus. Gottwald.* t. 39. f. 268. 270. *Habitat in India.*
- foveola-* 84. Tr. testa cinereo, virente albido rubelloque varia : spiræ anfractibus margine inferiori tuberculatis; extremitas circum circa scrobiculatis. *Chenm. Conch.* 5. t. 161. f. 1516. 1517. *(β) Chenm. Conch.* 5. t. 161. f. 1518. 1519. *Habitat in mari rubro, testa satis spectabili, spiræ anfractibus 13, columella unidentata.*
- diaphanus.* 85. Tr. testa tenui pellucida : cingulis granulorum moniliformibus alternatim spadiceis & albis, anfractibus convexis. *Spengl. Naturf.* 9. p. 152. t. 5. f. 2. a. b. *Chenm. Conch.* 5. t. 61. f. 1520. 1521. *Habitat ad novæ Seelandiæ littora, testa 1½ pollicem altius & perinde lata, apertura ampla.*
- Iris.* 86. Tr. testa sub epidermide glaberrima cœrulecente lineis rubellis angulatis undulatisque varia iridis coloribus micante striata. *Walch Naturf.* 4. p. 42. t. 1. f. 5. 6. *Zorn Naturf.* 7. p. 161. t. 2. f. C. I. C. 2. *Chenm. Conch.* 5. t. 161. f. 1522. 1523. *(β) Martyn univ. Conchol.* I. t. 24. *Habitat in Oceano australi, spira acuta : anfractibus 7, 9 contiguis.*
- rostratus.* 87. Tr. testa pyramidali transversim striata albo rubroque varia apice viridi pellucida. *Chenm. Conch.* 5. t. 161. f. 1524. 1525. *Habitat in Oceano australi, testa pollicem alta, spiræ anfractibus 7,*

VERMES TESTACEA: Trochus.

3,81

- totatus. 88. Tr. testa decussatim striata intus sulcata apice ruberrima.
Schroet. Journ. 5: p. 438. f. 10. II.
Einl. in Conch. 1. p. 682. t. 3. f. 14.
Habitat in Oceano australi?
- elegans. 89. Tr. testa pyramidalis striata ex purpureo subfuscata.
Zorn Naturf. 7. p. 167. t. 2. f. D. 1. 2.
*Habitat in Oceano australi, nonne cum notato varietas
 rostrata?*
- melanostoma. 90. Tr. testa obtuse pyramidalis virente maculata; aper-
 tura intus nigerrima.
Chemn. Conch. 5. t. 161. f. 1526. a. b.
Habitat in Oceano australi, vix avellanæ magnitudine;
- erythro- leucos. 91. Tr. testa minuta pyramidalis albo rubroque striata;
Chemn. Conch. 5. t. 162. f. 1529. a. b.
Habitat ad Marochii littora.
- punctula- tus. 92. Tr. testa minima rubra punctulata.
Chemn. Conch. 5. t. 162. f. 1530.
Habitat ad Marochii littora, erythroleuco minor.
- imbricatus. 93. Tr. testa pyramidalis oblique sulcata plicata & costata;
 anfractibus margine prominulis.
Lift. Conch. t. 628. f. 14.
Gualt. test. t. 60. f. Q.
v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 12. f. 19. 20.
Chemn. Conch. 5. t. 162. f. 1531.
 B) Knorr Vergn. 3. t. 29. f. I. 2.
Chemn. Conch. 5. t. 162. f. 1532. 1533.
Habitat in mari, Americam australem alluente.
- america- nus. 94. Tr. testa longitudinaliter sulcata ochroleuca: anfrac-
 tibus transversim striatis, labio denticulato.
Chemn. Conch. 5. t. 162. f. 1534. 1535.
*Habitat in mari, Americam australem alluente, testa
 mediae magnitudinis: spiræ anfractibus 6.*
- celatus. 95. Tr. testa thalassina varicibus plicisque squamosis obli-
 quis inæquali; spiræ anfractibus medio transversim
 sulcatis striatisque, anfractus primi margine inferiori
 spinis fornicatis aspero.
Lift. Conch. t. 646. f. 38. t. 647. f. 40.
Bonann. recr. 3. f. II. 167. 394.
mus. Kircher. 3. f. II. 12. 167. 380.
Seb. mus. 3. t. 60. f. I. 2.

- Knorr Vergn.* 5. t. 12. f. 3.
Chenn. Conch. 5. t. 162. f. 1536. 1537.
 8) *Favann. Conch.* t. 79. f. 1?
Martyn Conch. I. f. 33.
Chenn. Conch. 10. t. 165. f. 1581. 1582.
Habitat in mari, Americam australeni alluente, testa bisp
subconvexa, spiræ anfractibus teretibus, apertura argentea,
- purpu-** 96. Tr. testa purpurea : anfractibus plicato tuberculatis,
reus. cingulis granulorum minimorum moniliformibus, aper-
tura suborbiculata.
Chenn. Conch. 5. t. 162. f. 1538. 1539.
Habitat rarissimus - - - testa mediae magnitudinis.
- Cookii.** 97. Tr. testa thalassina multifariam tuberculata oblique &
 undulatim plicata : spiræ anfractibus utrinque canali-
 culatis ; primo supra convexo, subtus planiusculo.
Spengl. Naturf. 9. p. 156. 203. t. 3. f. 6.
Chenn. Conch. 5. t. 163. f. 1640. & f. a. b. & t. 164. f.
 1551.
Habitat in Cookii freto ad novam Seelandiam, testa 4
pollices alta, & equalis diametri, operculo corneo.
- nodulo-** 98. Tr. testa subfuscæ basi convexa : anfractibus unifariis,
 fus. primo bifariam tuberculato, utroque labio marginato.
Chenn. Conch. 5. t. 163. f. 1545. 1546.
Habitat in Oceano australi, & (minor) mari, Americam
meridionalem alluente, tuberculis minutis albis.
- mauritiae** 99. Tr. testa pyramidali albo, rubello viridiisque varia-
 nus. anfractibus margine inferiori obtuso spinosis, columella
 emarginata plicata.
Lift. Conch. t. 625. f. 11.
Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 90.
Gualt. test. t. 61. f. D. F.
Chenn. Conch. 5. p. 3. vign. 42. f. C. & t. 163. f. 1547.
 1548.
Habitat frequens ad insulas Barboniæ & S. Mauritiæ
spiræ anfractibus 10-12.
- feneſtra-** 100. Tr. testa alba pyramidali : spiræ anfractibus longitudi-
 nis costatis ; cingulis granulorum viridium monilifor-
 mib[us] transversis.
Rumpf mus. t. 21. f. 7.
Gualt. test. t. 60. f. N.
Regenf. Conch. I. t. 2. f. 13.
Mus. Gottwald. t. 39. f. 267.

Chemin. Conch. 5. t. 163. f. 1549. 1550.

Habitat in Oceano indico & australi, testæ dicometro circiter $\frac{1}{2}$ pollicis, columella subincurvata: dente excavato.

helicinus. 101. Tr. testa utrinque convexa solida: spira lævi, anfractibus duobus primis oblique costatis medio excavatis, apertura subsemilunari.

Knorr Vergn. 4. t. 6. f. 2.

Chemin. Conch. 5. t. 164. f. 1560.

Habitat in Oceano Americanum australem alluente?

Argyrosomus. 102. Tr. testa ovata undulatim costata transversim striata: apertura subcompressa, spiræ anfractibus ventricosis; primo basi subcarinato.

Chemin. Conch. 5. t. 165. f. 1562. 1563.

Habitat in Oceano australi, testa 2 pollices lata & alta nigra, costis in primo anfractu serie tuberculorum terminatis, columella viridissima.

lunensis. 103. Tr. testa obtuse pyramidali nigra: baseos fascia purpurea, columella alba, spiræ anfractibus omnibus rotundatis.

Knorr Vergn. 5. t. 3. f. 1.

Chemin. Conch. 5. t. 165. f. 1564. 1565.

Habitat in Sina, spiræ anfractibus 5-6, fascia baseos sepe albo flavo que maculata.

longibr. 104. Tr. testa nigra basi subconvexa granulata: anfractibus sulcatis; cingulis granulorum alternatim alborum nigrorumque moniliformibus.

Chemin. Conch. 5. t. 165. f. 1571.

Habitat in Oceano australi, testa minuta: anfractibus 5:

105. Tr. testa obtusa: spiræ anfractibus teretibus multifariam tuberculatis sulcatis transversim striatis, columella dentata, apertura lunata.

Chemin. Conch. 5. t. 166. f. 1582.

Habitat - - testa media magnitudinis cinerea vel testacea, labio intus plicato rugoso que.

leptella- 106. Tr. testa conico-convexa transversim striata maculis oblongo-quadratis seriatis varia, apertura ampla subcompreressa, labio nigro maculato, columella alba dentiformi.

v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 12. f. 5. 6.

107) Chemin. Conch. 5. t. 166. f. 1583.

Chemn. Conch. 5. t. 166. f. 1585.

γ) Chemn. Conch. 5. t. 166. f. 1586. 1587.

δ) Adans. Seneg. I. t. 12. f. 1. Ostlin.

Lift. Conch. t. 642. f. 33. 34.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 201.

Gault. test. t. 63. f. D. E. G.

Klein ostr. t. 2. f. 53. 54.

Knorr Vergn. I. t. 10. f. 6.

Chenin. Conch. 5. t. 166. f. 1584.

Habitat in mari mediterraneo, δ) etiam in mari Africam occidentalem alluentie, spiræ anfractibus tereiibus, maculis nigricantibus, cinereis, rarius rubellis.

citrinus. 107. Tr. testa conico-convexa citrina lineis angulatis nigris picta : anfractibus duobus primis fusco obscuratis, Knorr Vergn. I. t. 10. f. 7.

Habitat in Asia, an dislinda species?

Grana-tum. 108. Tr. testa pyramidalis alba coccineo varia basi subcon-vexa : spiræ anfractibus convexis ; cingulis granorum moniliformibus, primis duobus maximis.

Chemn. Conch. 5. t. 170. f. 1654. f. 1655.

Habitat in Oceano australi, testa 2 fere pollices alta, pene perinde lata, spiræ anfractibus 9-10.

crocatus. 109. Tr. testa laevi conica alba apice crocea : spiræ anfractibus teretibus sulco ad futuram discretis.

v. Born. mus. Caes. Vind. test. t. 12. f. II. 12.

Habitat - - -

conchylio-110. Tr. spiræ anfractibus teretibus obsolete plicatis, fauce fratre primo aperturaque compressa subfuscis, basique concava fuscis.

Martin. Besch. berl. Naturf. 2. t. 12. f. 2. 3. 22.

v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 12. f. 21. 22.

Chemn. Conch. 5. t. 172. f. 1688-1690.

Habitat rarus in Oceano, Americam australem alluentem, scipius lapides, testacea, corallia, accrescentia sibi habentes, testa 2 pollices alta, & diametri baseos 2*ii* pollicum, spiræ anfractibus 6.

pantheri- III. Tr. testa convexa alba viridi fusco fulvoque macula-nus. ta : spiræ anfractibus bifariam tuberculatis ; anfractu secundo plicato carinato.

Adans. Seneg. I. t. 12. f. 9. Kachin.

β) Adans. Seneg. I. t. 12. f. 10. Gor.

Habitat in Senegalia, testa 8 circiter lineas longa, & paulo latiori.

- Grandinatus.* 126. Tr. testa globulis concatenatis scaberrima basi convexa concentrica granulatum striata: labio duplicato dentato. *Chmn. Conch. 10. p. 291. t. 169. f. 1639.*

Martyn Conch. 1. f. 38.

Habitat ad Palmerstoni insulam.

- inaequalis.* 127. Tr. testa depressa subtus cingulis albo-punctatis varia, anfractibus spinis duplique punctorum eminentium ordine coronatis. *Mart. univ. Conch. 1. t. 31.*

Habitat ad insulas amicas.

- Tigridis.* 128. Tr. testa subovata grisea sanguineo virgata transversim albo striata. *Mart. Conchol. 2. t. 75.*

Habitat ad novam Seelandiam.

- Pulligo.* 131. Tr. testa conica fusca oblique nigro striata. *Martyn univ. Conchol. 2. t. 76.*

Habitat ad sinum a R. Georgio denominatum.

- Teleco-
pium.* 112. Tr. testa imperforata striata: columella spiratli; *Mus. Lud. Utr. 650. n. 337.* *

Argenv. Conch. t. 11. f. B. Telescopium.

Lift. Conch. t. 624. f. 10.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 92.

Rumpf mus. t. 21. f. 12.

Gault. test. t. 60. f. D. E.

Seb. mus. 3. t. 50. f. 1-12.

Knorr delic t. B. IV. f. 9.

Vergn. 3. t. 22. f. 2. 3.

Murray testaceol. t. 1. f. 27.

Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. f. 8.

v. Born mus. Caes. Vind. test. p. 326. vign f. d.

Chmn. Conch. 5.p. 3. vign. 42. f.A. B.t. 160. f. 1507-1509.

Habitat in Oceano indico, testa 4 pollices longa, nunc fusca aut hepatica, nunc nigricante: anfractu primo plurimi abeo-fuscicio, columellæ prominulae dente plicave media: spiræ anfractibus planiusculis.

- glabra-
tus.* 113. Tr. testa umbilicata glabra; columella recurvato contorta plicata, *Mus. Lud. Utr. 651. n. 338.* *

Müll. hist. verm. 2. p. 121. n. 318. Helix testa turrita perforata polita : axi contorto-triplicato, apertura dentata.

List. Conch. t. 844. f. 72.

Argenv. Conch. t. 11. f. L.

Knorr Vergn. 6. t. 29. f. 2.

Walch Naturf. t. 3. f. 3.

Chemn. Conch. 5. t. 167. f. 1603. 1604.

(β) List. Conch. t. 844. f. 72. b.

(γ) Pet. gaz. t. 118. f. 15.

(δ) Müll. hist. vermi. 2. p. 123. n. 319. Helix Terebella.

Gualt. test. t. 4. f. M.

Habitat in mari, Americam australem alluente, ¹⁷⁸² alba, lineis ut plurimi nati flavis, non nullis fuscis cincta; anfractibus teretiusculis sulco subtili discrevis, apertura dentata, columella triplicata.

perversus. 114. Tr. testa imperforata glabra : anfractibus contrariis serie duplii excavato-punctatis.

Habitat in mari mediterraneo, testa parva fere cornuta: anfractibus cylindricis praeter margines etiam crenata: punctatis, apertura quadrata, columella basi prominula.

pusillus. 115. Tr. testa basi plana : striis subtilibus transversis subtiliores obliquas decussantibus, apertura compressa, anfractibus contrariis.

Spengl. n. Schrift. daen. Ges. 1. t. 1. f. I.

Chern. Conch. 9. t. 113. f. 966.

Habitat in arena testaceis majoribus maris indici introita: testa vix $\frac{1}{4}$ pollicis longa; nonne mera perverse varietas?

undula- 116. Tr. testa basi plana : costis longitudinalibus strias transversas flexuosa decussantibus, apertura semilunaria: anfractibus contrariis.

Spengl. n. Schr. der daen. Ges. 1. t. 1. f. 2.

Chern. Conch. 9. t. 113. f. 967.

Habitat in arena maris indici, pusillo minor.

ventrico- 117. Tr. testa cancellata basi glabra : apertura subovata: anfractibus contrariis, primis ventricosis turgidis.

Spengl. n. Schrift. der. daen. Ges. 1. t. 7. f. 3.

Chern. Conch. 9. t. 113. f. 968.

Habitat in arena maris indici, aequalis cum undulatio magnitudinis.

118. Tr. spiræ anfractibus contrariis utrinque costatis, apertura subtetragona.
Spengl. n. Schr. daen. Ges. 1. t. 1. f. 4.
Chemn. Conch. 9. t. 113. f. 969.
Habitat in arena maris indici, æqualis cuni ventericoſo magnitudinis, spiræ anfractibus 12-15. Ad posteriores 5 species accedit Trochites contrarius, in Dania repertus, & a Chemnizio Conch. 9. t. 114. f. 981. delineatus?
119. Tr. testa subpyramidalis umbilicata lævi alba apice rubella, anfractibus sulco distinctis, apertura semilunaria.
Schroet. Flusconch. t. 6. f. 12.
Habitat in humo conchacea; an hujus tribus?
120. Tr. testa imperforata: anfractibus serie triplici punctorum prominentium.
Habitat in mari, Europam australem & Africam alluente, testa ferruginea, magnitudine greni hordei, tota granis obtusa obsoleta, apertura quadrata, columella vix manifeste canaliculata.
121. Tr. testa imperforata: striis longitudinalibus parallelis obliquatis.
Habitat in mari mediterraneo, testa admodum parva, subalata, alba, apice violacea.
122. Tr. testa substriata lineis angulatis obscurioribus picta: apertura suborbiculata.
Chemn. Conch. 5. t. 166. f. 1599. a. b.
Lift. Conch. t. 583. f. 38.
Chemn. Conch. 5. t. 166. f. 1600. a. b.
Habitat - - - spiræ anfractibus 5-6, an hujus tribus & generis?
123. Tr. testa contraria modice convexa lævi subumbilicata.
Chemn. Conch. 9. t. 113. f. 971.
Habitat - - - anfractibus 5, turbini affinis.
124. Tr. testa pyramidalis subimperforata candida: fascia rufescente. *Chemn. Conch. 9. t. 122. f. 1055. 1056.*
Müll. hist. verm. t. 2. p. 79. n. 275. Helix-Trochus.
Habitat in terrarum calidiorum hortis.

337. TURBO. *Animal Limax.*

*Testa univalvis, spiralis, solidis,
Apertura coarctata, orbiculata,
integra.*

* *Neritoidei, aperturæ margine columnari plana
imperforato.*

- obtusatus. 1. *T. testa subrotunda lœvi superne ventricosiore obtusata.*
Knorr *Vergn.* 6. t. 23. f. 8.
Chemin. Conch. 5. t. 185. f. 1854. n. a - f?
Müll. *Zool. dan. prodr.* 2928?
Habitat in Oceano septentrionali, testa fusca albo varia-
- neritoides. 2. *T. testa ovata glabra obtusiuscula.*
Knorr *Vergn.* 6. t. 23. f. 9.
Chemin. Conch. 5. t. 185. f. 1854. n. I-II?
Habitat numerosissimus in mari mediterraneo, mari Ante-
ricam australem alluente, *testa minuta nunc unicolor*,
flava, rubra vel subfusca, nunc variegata, fasciata,
lineata, apertura ovata; nonne potius ad neritas rebus
gandus?
- littoreus. 3. *T. testa subovata acuta striata.* Fn. *suec.* 2169.
wgoth. 169. 199. t. 5. f. 4.
Bafter. opusc. subsec. 3. p. 110. t. 14. f. 1. *Turbo*
littoralis.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 403. n. 405. Nerita littoralis.
List. Conch. t. 585. f. 43.
anim. angl. t. 3. f. 9.
Gualt. test. t. 45. f. A. C. G.
Argenv. Conch. t. 6. f. L.
zoomorph. t. 3. f. A.
Swammerd. bibl. nat. 183.
v. Born *mus. Caes. Vind. test.* t. 12. f. 13. 14.
Chemin. Conch. I. t. 185. f. 1852. n. 1-8.
Schroet. Flusconch. t. 8. f. 5. & t. 11. min. C. f. 5.
β) *Chemin. Conch.* 5. t. 185. f. 1853.
γ) *Chemin. Conch.* 5. t. 185. f. 1855. a-g.
Schroet. Flusconch. t. 9. f. 6. 7. 16. 18. 19. 7. a-b.
δ) *List. Conch.* t. 1059. f. 6.
ω) *List. Conch.* t. 1059. f. 7.
Habitat in Oceano europæo, frequens ad Groenlandia &
Norwegia littera, littorum scopulos adscendendo ventum
impetuosum, descendendo quietem prænuncians, testa 12

pollicis alta, subtiliter transversim striata, nunc atra lineis albis, nunc fusca lineis obscurioribus, nunc grisea aut lutea lineis fuscis, nunc flavicante lineis fuscis & apice virescente, anfractibus 7 contiguis, primo reliquis majore, apertura subovata.

4. T. testa umbilicata subovata acuta cincta striis punctis eminentibus, margine columnari obtusiusculo.

Adans. Seneg. I. t. 12. f. 2. Boson.

List. Conch. t. 30. f. 28.

Gualt. test. t. 45. f. E.

v. *Born mus. Caes. Vind. test. t. 12. f. 15. 16.*

Chemn. Conch. 5. t. 177. f. 1752. 1753.

Schroet. inn. Bau. Conch. t. 2. f. 2.

Habitat in mari, Europam Americamque australem & Africam alluente, testa vix polliceni magna ex albido cærulecente: fauce fusca, anfractibus transversim striatis distantibus, primo reliquis simul summis minore.

- III. T. testa subovata lævi, apertura laterali marginata, umbilico recto. *Martyn univ. Conch. I. t. 27.*

Habitat ad Pulo Condore; an hujus generis?

- II. 3. T. testa subovata lævi fusca: cingulis dilutioribus planis obscurius punctatis, apertura margaritacea. *Mant. univ. Conchol. I. t. 36.*

** *Solidi iniperforati.*

5. T. testa oblongo ovata striis decussatis: punctis eminentibus.

Adans. Seneg. I. t. 10. f. 6? Soni?

Gualt. test. t. 44. f. X.

Habitat in mari mediterraneo, testa niuita albida, labio intus albo limbato, spiræ anfractu primo sequentibus 4-5 majore.

6. T. testa ovata lævi: apertura anterius diducta.

v. *Born mus. Caes. Vind. test. t. 12. f. 17. 18.*

Habitat in mari mediterraneo, periholato testæ apertura postissimum antrorsum angulata affinis, testa nitida, magnitudine seminis carthami fasciis maculisve purpurascientibus fuscis albidisve picta.

7. T. testa convexa lævi; apertura diducta. *Mus. Lud. Ulr.*

*632. n. 339.**

Rumpf mus. t. 19. f. 1.

VERMES TESTACEA. Turbo.

Habitat in India, testa cinerea fusco punctata, avellanae magnitudine, neritæ simili.

- pethola- 8. T. testa ovata lœvinitida : anfractibus sursum subangulis
tus.
*Mus. Lud. Ulr. 652. n. 340.**
Bellon. aq. 340. Cochlus s. Umbilicus.
Rumpf mus. t. 19. f. D. & 5. 6. 7. Cochlea petholæ.
Argenv. Conch. t. 6. f. K. Cochlea variegata,
zoomorph. t. 10. f. D.
Lift. Conch. t. 584. f. 39.
Valent. Abh. 6. f. 55.
Gualt. test. t. 64. f. F.
Klein ostr. t. 2. f. 51.
Seb. mus. 3. t. 74. f. 17-19. 23-29.
Knorr delic. t. B. T. III. f. 7.
Knorr Vergn. I. t. 3. f. 4. 2. t. 22. f. I. 2. 3.
3. f. 3. & t. 23. f. 4. & t. 28. f. 2-5.
Regenf. Conch. I. t. 8. f. 18. & t. 9. f. 27.
Chenin. Conch. 5. t. 183. & 184. f. 1826-1839.
β) Seb. mus. 3. t. 74. f. 3.
γ) Seb. mus. 3. t. 74. f. 5.
δ) Seb. mus. 3. t. 74. f. 7. 8.
ε) Seb. mus. 3. t. 74. f. 16.
ζ) Gualt. test. t. 63. f. I.
η) Valent. Abh. t. 2. f. 27.
δ) Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 320?
*Habitat ad insulas maris indici & Americam australem ad
luentis, testa spectabilis, nitida, glaberrima, spadicea,
fasciata : anfractibus teretibus, columella ex flavescente
viridi.*

- Cochlus. 9. T. testa ovata striata : stria unica dorsali crassiore.
Lift. Conch. t. 584. f. 40.
Valent. Abh. t. 6. f. 53. 54. 56.
Klein ostr. t. 2. f. 55.
Seb. mus. 3. t. 74. f. 30.
Knorr Vergn. I. t. 3. f. 5.
Regenf. Conch. I. t. 1. f. 12.
Chemn. Conch. 5. t. 182. f. 1805. 1806.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 12. t. 3. f. 17.
β) Lift. Conch. t. 586. f. 45.
γ) Argenv. Conch. t. 6. f. C?
δ) Knorr delic. t. B. III. f. 6?
Vergn. I. t. 3. f. 3?
*Habitat rarus in India, testa viridi, interdum ex viridi fusco
albo varia : fasciis albis fusco-maculatis apertura argentea.*

tea, striis longitudinalibus subtilissimis, transversa unica crassa dorso.

10. T. testa subovata rugosa : anfractibus bifariam spinulis fornicatis cincta. *Mus. Lud. Ulr. 653. n. 341.* Rumpf mus. t. 19. f. E. Cochlea lunaris aspera. Argenv. Conch. t. 6. f. D. Os aureum. Gualt. test. t. 62. f. H. Klein. ostr. t. 7. f. 126. Seb. mus. 3. t. 74. f. 9-11 Knorr Vergn. 2. t. 14. f. 2. & 5. t. 13. f. 3. Chem. Conch. 5. t. 178. f. 1766. Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. f. 4. Habitat rarer in India, testa flavicante fusco radiata intus aurata, labio & columella albis, anfractibus distantibus transversim striatis, longitudinaliter lineatis, superioribus plicatis.*

110. T. testa subovata rugosa, anfractibus spinulis obtusis fornicatis, labio expanso crenato. *Mart. univ. Conch. I. t. 26.*
β) *Martyn univ. Conch. I. t. 30.*
Habitat in Oceano australi, ad insulas amicas.

11. T. testa ovata : spinis obtusis depresso-pilosae. *Mus. Lud. Ulr. 653. n. 342.* Argenv. Conch. t. 8. f. P?*
Chenin. Conch. 5. t. 163. f. 1543. f. 1544.
Gualt. test. t. 60. f. M?
Habitat in India, testa cinerea fusco fasciata, spiræ anfractibus 6, transversim rugosæ, bifariam spinosis, spinis in β) acuminatis, fauce alba sulcata.

12. T. testa conica : spinis obtusis concatenatis, subtus papilloso-striata. *Mus. Lud. Ulr. 654. n. 343. Rumpf mus. t. 21. f. D. Trochus papuanus f. longævus. Argenv. Conch. t. 8. f. A. Pagodus. List. Conch. t. 644. f. 36. Klein ostr. t. 2. f. 37. Seb. mus. 3. t. 60. f. 3. Knorr Vergn. I. t. 25. f. 3. 4. Chemn. Conch. 5. t. 163. f. 1541. 1542. Spengl. Conch. t. 2. f. K.
Habitat rarus in India, testa ad 3 pollices altæ, aspera, undulatim plicata & rugosæ, testacea : apertura ochro-leuca, spiræ anfractibus 8-9, primo bifariam spinoso,*

Sulcatus. 112. T. testa subconica atro griseoque varia fornicate squamosa : apertura margaritacea crenulata. *Marg. univ. Conch. I. t. 35.*
Habitat ad insulas amicas.

Calcar. 13. T. testa subimperforata deppressa : anfractibus supra spinis fornicate-compressis. *Mus. Lud. Ultr. 654 n. 344.*
Rumpf mus. t. 20. f. I. Calcar.

Argenv. Conch. t. 6. f. R. & t. 8. f. H. Calcar.
List. Conch. t. 608. f. 46? 46. a.

Gualt. test. t. 65. f. N. P.

Klein ostr. t. I. f. 21? 27.

Seb. mus. 3. t. 59. f. 5. 6.

Knorr Vergn. 4. t. 4. f. 2. & t. 6. f. 2.

Chemn. Conch. 5. t. 164. f. 1552. & t. 124. f. 1718-1720.

$\beta)$ *Chemn. Conch. 5. t. 164. f. 1553.*

$\gamma)$ *Knorr Vergn. 4. t. 4. f. 3?*

$\delta)$ *Knorr Vergn. 4. t. 4. f. 4?*

$\epsilon)$ *Knorr Vergn. 4. t. 7. f. 1?*

$\zeta)$ *Chemn. Conch. 5. t. 180. f. 1786. 1787.*

Martin. neuest. Mannigf. I. p. 435. t. 2. f. 16. 17.

$\eta)$ *Chemn. Conch. 10. t. 165. f. 1585. 1586.*

*Habitat paulo rario in India, $\beta)$ in Oceano australi,
 $\zeta)$ in mari mediterraneo, testa virescente : anfractibus
 5 nodosis distantibus.*

Rugosus. 14. T. testa subovata striata : anfractibus superne rugosus.
List. Conch. t. 647. f. 41.
Bonann. recr. 3. f. 12. 13.

mus. Kirch. 3. f. 12. 13? 14.

Gualt. test. t. 63. f. F. H.

Argenv. Conch. t. 8. f. O.

Klein ostr. t. 2. f. 50.

Knorr Vergn. 3. t. 20. f. 1.

Chemn. Conch. 5. t. 180. f. 1782-1785.

$\beta)$ *Chemn. Conch. 5. t. 181. f. 1803. 1804?*

$\gamma)$ *Gualt. test. t. 63. f. C.*

*Habitat in mari mediterraneo & adriatico, $\beta)$ ad novam
 Seelandiam, testa virescente, cinereo albove ombrae
 columella rubra, fauce argentea, anfractibus latere su-
 periore rugis obsolete nodosis : Operculum hujus un-
 bilici veneris nomine notum.*

marmorata. 15. T. testa subovata laevi : anfractibus trifariam marginato nodulosa, cauda posterius explanata. *Mus. Lud. Ultr. 655. n. 345.*

Lift. Conch. t. 587. f. 46.

Gualt. test. t. 64. f. A.

Seb. mus. 3. t. 74. f. 1. 2.

Knorr Vergn. 3. t. 26. f. 1. & t. 27. f. 1.

Chenn. Conch. 5. t. 179. f. 1775. 1776.

Habitat rario in mari, Asiam australem alluente, oleario affinis, at testa tenuiori, nodulorum ordinibus binis incompletis distinctibus, testa ceterum obscure viridi fasciis ex maculis albis, fuscis & rubellis conflatis.

16. T. testa convexa obtusa : anfractibus supra nodosis canali interstinctis.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 166?

Argenv. Conch. t. 8. f. V.

Regenf. Conch. 1. t. 1. f. 7.

Chenn. Conch. 5. t. 179. f. 1777. 1778. 1781.

8) Schroet. Journ. 5. f. 12.
Knorr delic. t. B. III. f. 2.

Vergn. 1. t. 3. f. 1.

Habitat rarus in mari, Asiam Africamque australem al- luente, testa sub epidernide aurantia flavicante, sub hac nigerrima, intus argentea, anfractibus multifaria- riam nodosis, nodis supremæ seriei maximis.

17. T. testa convexa obtusa angulato-lævi.

Rondel. test. 96.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 9. 184.

Rumpf mus. t. 19. f. A. B.

Gualt. test. t. 68. f. A.

Klein ostr. t. 7. f. 124.

Knorr Vergn. 2. t. 9. f. 1.

Chenn. Conch. 5. t. 178. f. 1771. 1772.
Bonann. recr. 3. f. 406.

mus. Kircher 3. f. 386.

Regenf. Conch. 1. t. 5. f. 52?

Chenn. Conch. 5. t. 178. f. 1773. 1774?

Habitat in India, testa dorso trifariam nodosa, anfractu primo obliquo gibbo.

18. T. spiræ anfractibus teretibus decussatim striatis : pri-
mo trifariam imbricato-spinoso.

Chenn. Conch. 5. t. 179. f. 1779. 1780.

Habitat in Sina, testa satis magna, olivacea.

- radiatus*. 19. *T. testa rugosa : anfractibus teretibus distantibus transversim striatis imbricatum spinulosum.*
Chenin. Conch. 5. t. 180. f. 1788. 1789.
Habitat in mari rubro, testa albida spadiceo radiata vel subfuscata albo radiata, intus argentea.
- imperialis*. 20. *T. testa glaberrima nitida viridi, intus nivea : apertura argentea, columellæ labio superne calloso.*
Chenin. Conch. 5. t. 180. f. 1790.
Habitat rarus in Sina, testa spectabilis : anfractibus convexis.
- coronatus*. 21. *T. testa rugosa alba virescente-nebulosa, apice aurata : anfractibus spinis nodisque coronatis, columella caudata.*
List. Conch. t. 575. f. 28?
Chenin. Conch. 5. t. 180. f. 1791. 1792.
β) Argent. Conch. t. 6. f. Q.
Chenin. Conch. 5. t. 180. f. 1793.
Habitat rarissimus in freto Malaccensi.
- canaliculatus*. 22. *T. testa sulcata transversim striata alba viridi hinc inde spadiceo varia : anfractibus valde convexis.*
Regenf. Conch. I. t. 10. f. 44.
Chenin. Conch. 5. t. 181. f. 1794.
Habitat in India, testa ponderosa : anfractibus sex-
- fetosus*. 23. *T. spiræ anfractibus cylindricis sulcatæ transversim striatis, labio externo crenato.*
Runipf. Mus. t. 19. f. C.
Gualt. test. t. 64. f. B.
Chenin. Conch. 5. t. 181. f. 1795. 1796.
Habitat rarissimus in India, testa maculis piceis, radiis que albis & spadiceis, alternis varia, anfractibus sex-
- spiniferius*. 24. *T. testa oblonga transversim striata : striis spinosis apertura argentea.*
Chenin. Conch. 5. t. 181. f. 1797.
Habitat in India, chrysostoma affinis, testa albida lutea que nigro radiata, anfractibus 6.
- garverius*. 25. *T. testa oblonga late & glabre striata flavicante fulvo maculata.*
Chenin. Conch. 5. t. 181. f. 1798.
Habitat in India, striis inæqualibus, anfractibus 6 tertib. apertura matris perlarm in star nitente.

Moltkia-
nus. 26. T. testa ex argenteo cana : fasciis luteis & aurantiis
transversis : spiræ anfractibus cingulis granorum monili-
formibus superne plicatis , nodosis & fornicate spinosis.

Chemn. Coneh. 5. t. 181. f. 1799. 1800.

Habitat - - - apertura matis perlarum inflar nitente ,
columella argentea.

Spengle-
rianus. 27. T. testa alba flavicante varia : spiræ anfractibus tere-
tibus transversim striatis canali interstinctis.

Chemn. Conch. 5. t. 181. f. 1801. 1802.

β) Hermann Naturf. 16. p. 51. t. 2. f. 1. 2.
Habitat rarissimus in Oceano Índico , apertura intus ař-
gentea.

Castanea. 28. T. testa transversim striata fusca b. albo maculata :
anfractibus nodulorum ordinibus cinctis.

Chemn. Conch. 5. t. 182. f. 1807. 1808.

γ) Chemn. Conch. 5. t. 182. f. 1809. 1810.

δ) Chemn. Conch. 5. t. 182. f. 1813. 1814.

δ) Regenf. Conch. 1. t. 12. f. 70 ?
Habitat in mari , Americam australem alluente , spiræ
anfractibus 5.

tenuila-
tus. 29. T. testa ex argenteo cana nodulis multifariam cincta :
apertura intus lactea.

Chemn. Conch. 5. t. 182. f. 1811. 1812.

Habitat - - - Castaneæ affinis.

Smarag-
dus. 30. T. testa ponderosa subdepressa læviuscula oblique ru-
gosa : spiræ anfractibus quatuor ; primo terete ampliore.

*Hoc tribui inferendæ videntur , an distinctæ species ? et siæ a Listero Conch. t. 583.
f. 35. t. 384. f. 41. t. 1059. f. 8. a. Bonanni recr. & mus. Kircher. 3. f. 100.
149. 333. mus. Kirch. 3. f. 389. 397. a Rumpf mus. 1. 21. f. 11. a. Gaultieri
151. t. 45. f. F. t. 62. f. E. F. G. I. M. N. & t. 63. f. L. M. N. ab Aigen-
ville Conch. t. 6. f. G. I. T. & zoomorph. t. 8. f. 4. a Seba mus. 3. t. 39.
f. 25-28. & f. 47. t. 40. f. 44. & a Knorr Vergn. 3. t. 4. f. 3. delineatae ? qui-
æ autem tribui , quas Lister Conch. t. 18. f. 13. t. 19. j. 14. & 14. A. t. 20. f.
f. 15. t. 21. f. 17. 18. t. 22. f. 19. t. 31. f. 29. t. 588. f. 52. t. 589. f. 53. t. 591.
3. t. 37. t. 592. f. 60. t. 593. f. 61. Klein ostr. t. 2. f. 44. Mattini bert. Mag.
j. 5. f. 37. 58. 60. 64. 65. & 4. t. 9. f. 44. Bonanni recr. & mus. Kircher. 34.
L. 39. 42. & 106. Valentyn Abb. t. 1. f. 7. Gaultieri test. t. 4. f. F. G. H. 1.
f. 15. R. 1. 44. f. Z. Argenville Conch. t. 11. f. 1. t. 27. n. 3. f. 32. & t. 28.
Knorr Vergn. 3. t. 15. f. 7. & 6. t. 39. f. 2. Quartæ d. nique tribui testæ &
Gaultieri t. 58. f. G. & I. ultima etiam a Schroetero Einl. in Verstein. 4. t.
10. f. 5. delineatae.*

Y y y yyy yyy y

v. Zorn. Naturf. 7. p. 157. t. 2. f. A. 1. A. 2.

Chemn. Conch. 5. t. 182. f. 1815. 1816.

Habitat ad novam Scandaniam, testa viridi ultra 2 pollices lata & alta.

papyraceus. 31. T. testa pellucida tenuissima subtilissime annulata: ad 20' fructu primo maximo, fascia ad alterum albo rubroque varia, apertura ovali.

Chemn. Conch. 5. t. 182. f. 1817. 1818.

β) Chemn. Conch. 5. t. 182. f. 1819?

Habitat - - -

Ethiops. 32. T. testa transversim sulcata nigra: anfractibus primis argutis striatis, sequentibus argenteis labio utroque limbo fusco.

v. Born. mus. Caes. Vindob. test. p. 340. vign. f. b.

Chemn. Conch. 5. t. 182. f. 1820. 1821.

Habitat - - - testa mediae magnitudinis, apertura dilatata.

Nicobari- 33. T. testa subfuscata reticulata: anfractibus cingulatis apertura limbo virgente pellucido, columella calloso citreo, fauce aurata.

Chemn. Conch. 5. t. 182. f. 1822. 1823.

β) Chemn. Conch. 5. t. 182. f. 1824. 1825.

γ) v. Born. mus. Caes. Vind. test. t. 13. f. 16. 17. Heik paradoxa.

Habitat ad insulas Nicobaricas, testa mediae magnitudinis,

Cidaris. 34. T. testa levata: anfractibus ex compresso teretis sensu primo tereti amplissimo, apertura compressa viridi argentea, columella prominula.

α) Chemn. Conch. 5. t. 184. f. 1840. 1841. Cidaris turcica.

β) Chemn. Conch. 5. t. 184. f. 1842. 1843. Cidaris viridis Valent. Abh. t. 4. f. 35.

γ) Chemn. Conch. 5. t. 184. f. 1844. 1845. Cidaris aurantia.

δ) Chemn. Conch. 5. t. 184. f. 1846. Cidaris fasciata Argenv. Conch. t. 6. f. 8.

ε) Chemn. Conch. 5. t. 184. f. 1847. Cidaris spadicea Argenv. Conch. t. 6. f. 8.

ζ) Seb. mus. 3. t. 74. f. 13. 14. Cidaris marmorata.

η) Seb. mus. 3. t. 74. f. 15. Cidaris polyzonias.

ς) Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 82. Cidaris flavicans rubro lineata.

ι) Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 82. Cidaris ex caruleo rubella variegata.

^{a)} Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 83. *Cidaris virescens* spadiceo lineata.

^{b)} Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 83. *Cidaris subfuscata*, basi marginata.

^{c)} Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 83. *Cidaris dilutius* & obscurius fuscata radiata.

^{d)} Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 83. *Cidaris lutea obscurius* radiata.

Habitat rario in India & Sina, infinitæ fere varietatis.

35. T. testa laevi nigerrima : anfractibus margine excavatis distantibus.

Chemn. Conch. 5. t. 185. f. 1848.

B) Chemn. Conch. 5. t. 185. f. 1849.
Habitat in Oceano australi.

36. T. testa laevi subimperforata subrotunda : anfractibus convexis contiguis, columella incrassata. *v. Born. mus. Caes. Vind. test. p. 355. 356. t. 12. f. 23. 24.*
Habitat - - - testa purpurea & virescente fauce argentea.

37. T. testa ovata crassa ; spira mucronata ; anfractibus levigatis planiusculis, primis duobus maximis.

Adans. Seneg. 1. p. 163. t. 12. f. 1. Marnat.

Habitat in Senegal, testa 6-7 lineas longa ; plumbea, interdum rubella, seriatim albo-punctata, intus coffeæ more tincta.

38. T. testa ovata solida glabra : anfractibus senis striatis, apertura marginata ovali.

Scopol. delic. insubr. 1. p. 67. t. 25. f. B. Bulinus hæmatotomus.

Habitat - - - testa triunciali alba : anfractibus ventricosis contiguis, primo supra rufescente, apertura intus fuscescente.

106. T. testa ovata convexo-transversim sulcata & rugulosa striata, anfractibus ciugulo nodoso, fauce argentea. *Chemin. Conch. 10. p. 295. 6. vign. 24. f. A. H. Martyn Conch. 2. f. 71.*
Habitat ad novam Seelandiam.

107. T. testa ovato-convexa longitudinaliter undulatim strigosa : spira obtusa, fauce argentea. *Chemin. Conch. 10. p. 295. t. 196. f. 1640. 1641.*

VERMES TESTACEA. Turbo.

Martyn Conch. I. f. 29.

Habitat ad novam Seelandiam & Hollandiam.

nivens. 108. T. testa spirali nivea diaphana transversim striata : ^{an}
fractibus saepe distortis. Chemn. Conch. 10. p. 298. ^{1587.} 1588.

Kaemn. Cab. Rudolst. t. 8. f. 4. 5.

Habitat ad insulas nicobaricas.

helicoi- 109. T. testa cornea subdiaphana tricarinata leviuscula :
des. anfractibus prioribus distantibus, apertura triangulata :
Chemn. Conch. 10. p. 298. t. 165. f. 1589. ^{1590.}
Habitat in mari indico, nonne potius ad helices speciem?

*** Solidi, umbilico perforato.

pica. 39. T. testa conico-rotundata laevi : denticulo umbilicali
Mus. Lud. Ulr. 655. n. 346.
Argenv. Conch. t. 8. f. G. Pica.
Adans. Seneg. I. t. 12. f. 7. Livon.
Lift. Conch. t. 640. f. 30.
Petiv. gazoph. t. 70. f. 9.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 29. 30.
Gualt. test. t. 68. f. B.
Klein oftr. t. 2. f. 52.
Knorr Vergn. I. t. 10. f. 1. & 2. t. 21. f. 31.
Bytem. app. t. 12. f. 51.
Regenf. Conch. I. t. 6. f. 66. & t. II. f. 57. ^{176.}
Chemn. Conch. 4. t. 151. f. 1420. 1421. & f. 1750. ^{1751.}

Schroet. Journ. 5. f. 15.

β) Chemn. Conch. 5. t. 185. f. 1850?

γ) Chemn. Conch. 5. t. 185. f. 1851?

δ) Chemn. Conch. 5. t. 178. f. 1769. 1770?
v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 13. f. 1. ^{2.} pollicis
alta, $3\frac{1}{2}$ lata nigro-radiata, columella tenui alba. ²
fractibus 6 convexis, umbilico canali duplice obtuso.

sanguineus. 40. T. testa subumbilicata conico-convexa striata laevi : ^{an}
fractibus subsulcatis.
Chemn. Conch. 5. t. 177. f. 1756. 1757.
Habitat in Africæ littore, testa convexa, sanguinosa, ^{fusca}
magnitudine : umbilico nunc perforato, nunc clauso.

- Argyrof-*
tumus.
41. T. testa subovata exarata lineis dorsalibus elatioribus transverse striatis. *Mus. Lud. Ulr.* 656. n. 347.*
Argenv. Conch. t. 6. f. F. Os argenteum.
Rumpf mus. t. 19. f. 2.
Gualt. test. t. 64. f. D.
Seb. mus. 3. t. 74. f. 6.
Knorr Vergn. 3. t. 15. f. 5.
Regens. Conch. I. t. 11. f. 50.
Chemin. Conch. 5. t. 177. f. 1758-1761. & f. 1763-1765.
 β) *Valent. Abh.* t. 9. f. 79-81.
 γ) *Seb. mus.* 3. t. 74. f. 20-22.
Habitat potissimum in India, cochlo affinis, testa albida;
fusco radiata, apice interdum rubra: spiræ anfractibus
6 teretibus; primo reliquis multo majore, apertura
argentea.
- margari-*
taceus.
42. T. testa subovata: lineis dorsalibus elatioribus lævibus.
Mus. Lud. Ulr. 656. n. 348.*
Rumpf mus. t. 19. f. 3. 4.
Argenv. Conch. t. 6. f. A ?
Seb. mus. 3. t. 74. f. 4.
Regens. Conch. I. t. 10. f. 43.
Chemin. Conch. 5. t. 177. f. 1762.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 29. I. t. 3. f. 18.
Habitat rario in mari indico, testa ventricosa fusco, viridi
& flavescente varia, spiræ anfractibus 5-6.
- Verifica-*
tor.
43. T. testa glaberrima subtilissime transversim striata viridi alboque varia: anfractibus planiusculis contiguis; primo maximo rotundato.
Lift. Conch. t. 576. f. 29.
Chemin. Conch. 5. t. 176. f. 1740 1741.
 β) *Chemin. Conch.* 5. t. 176. f. 1747. a. b.
 γ) *Chemin. Conch.* 5. t. 176. f. 1747. c. d.
Habitat in Oceano austriali; spiræ anfractibus 4, labro subfiso crenato, apertura matris perlarum in star nitente.
- Delphi-*
nus.
44. T. testa umbilico hispido: anfractibus spinis ramosis.
Mus. Lud. Ulr. 657. n. 349.*
Argenv. Conch. t. 6. f. H. *Delphinus.*
Rumpf mus. t. 20. f. H. *Cochlea laciniata.*
Valeni. Abh. t. 5. f. 41.
Petiv. amb. t. 3. f. I.
Gréw. mus. t. 11. f. 5. 6.
Lift. Conch. t. 608. f. 45.
Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 31.

X y y y y y y y y 3

Gualt. test. t. 68. f. C. D.

Seb. mus. 3. t. 59. f. 12-27.

Knorr Vergn. t. 22. f. 4. 5. & 4. t. 7. f. 2. 3. & 8. f. 1^t

Regenf. Conch. 1. t. 8. f. 14.

Chemn. Conch. 5. t. 175. f. 1727-1735.

Chemn. Conch. 5. t. 174. f. 1725-1726.

Chemn. Conch. 5. t. 175. f. 1736.

*Habitat rario in India, testa fusca, nigricante aut rubella
albo varia, infinita, si magnitudinem, anfractuum sa-
perficiem, spinarum formam & ambitum species, varie-
tis, umbilico spinis squamisque horrido, anfractibus
transversim striatis ut plurimum bisariam spinosis exi-
mis complanatis.*

*nodulo- 45. T. testa deppressa nodosa granulatim transversim striata:
fus. anfractus primi carina dorsali inaequaliter tuberculata:
Chemn. Conch. 5. t. 174. f. 1723. 1724.
Habitat rarus in India, testa ex rubello alba, granulis nigris.*

*distortus. 46. T. testa subinconata undique spinis levibus. Mus.
Lud. Ulr. 657. n. 350.*
Chemn. Conch. 5. t. 175. f. 1737-1739.
Schroet. Eint. in Conch. 2. p. 32. 1. t. 3. f. 19.
Habitat in India, testa rosea basi alba multifariam nodulo-
sa, nodulis sanguineis, apertura & umbilico levissimis;
spirae anfractibus 6 prominulis, distantibus, sulco dif-
tindis: carina media nodulosa.*

*stellaris. 47. T. testa virescente basi convexa: anfractibus radiato-fo-
nis; primi spinis duodecim maximis.
Chemn. Conch. 5. t. 164. f. 1553.
Habitat in Oceano australi, testa $\frac{5}{4}$ pollicis alta, $\frac{3}{4}$ lat.*

*aculeatus. 48. T. testa basi convexa: anfractibus spinis laciniatis coro-
natis; primo novem maximis, extimis complanatis.
Chemn. Conch. 5. t. 164. f. 1554. 1555.
Chemn. Conch. 5. t. 164. f. 1556. 1557.
Habitat rarus ad insulas Nicobaricas, spinis thalassinis.*

*stellatus. 49. T. testa flavicante subpyramidali basi complanata: an-
fractibus margine inferiori spinulosis.
Knorr Vergn. 4. t. 4. f. 5.
Chemn. Conch. 5. t. 164. f. 1558. 1559.
Habitat - - -*

- Mespilos.* 50. T. spiræ anfractibus convexis fascia fusco alboque tessellata distinctis, apertura argentea, columella alba.
Chenn. Conch. 5. t. 176. f. 1742. 1743.
Habitat in Oceano australi; colore mespilos referens.
- Granula-*
tus. 51. T. testa annulis granulato-nodosis cincta sordide viridi apice rubella: apertura intus argentea, columellæ labio aurantio maculato.
Chenn. Conch. 5. t. 176. f. 1744. 1745.
β) Chenn. Conch. 5. t. 176. f. 1746
γ) List. Conch. t. 575. f. 23.
Habitat in mari indico & australi.
- Ladus.* 52. T. testa supra impressa subtus concava: spira annulata; anfractu primo maximo, umbilico cochleato.
Chenn. Conch. 5. t. 176. f. 1748. 1749.
Habitat in mari australi, testa heic alba, ibi viridi, maculis obscuris violaceis viridibus & rubris utplurimum tessellatis.
- atratus.* 53. T. testa nigricante: cingulis granorum moniliformibus alternatim binis nigris & cinereis, columella unidentata.
Chenn. Conch. 5. t. 177. f. 1754. f. 1755.
Habitat ad insulas Nicobaricas, testa avellanæ magnitudine.
- Dentatus.* 54. T. testa depressa orbiculata alba fusco varia: columellæ margine inferiori denticulato.
Chenn. Conch. 5. t. 178. f. 1767. 1768.
Habitat. - - -
- Diadema.* 55. T. testa sordide viridi fusco varia filis confertis quasi cincta: anfractibus quatuor; primo maximo.
Chenn. Conch. 5. p. 145. vign. 43. f. A. B.
Habitat ad novam Seelandiam, testa magna.
- Cinereus.* 56. T. testa lœvi subrotunda cinerea albo nigroque varia: anfractibus substriatis ventricosis ad futuram complanatis.
v. Born. mus. Caes. Vind. test. p. 356. 357. t. 12. f. 25. 26.
Habitat - - -
- Catinatus.* 57. T. testa tenui diaphana alba rotundo-pyramidalis: anfractibus carinatis, umbilico spirali.
v. Born. mus. Caes. Vind. test. p. 361. 362. t. 13. f. 3. 4.
Habitat - - - spiræ anfractibus 6.

- afer. 58. T. testa tenui lævi : anfractibus complanatis.
Adans. Seneg. I. p. 171. t. 12. f. 3. Daki.
 β) *Adans. Seneg. I. p. 172. t. 12. f. 4. Rifet.*
*Habitat in Senegalicia, testa vix 2 lineas longa fusca, fulva
 aut grisea.*
- planor- 59. T. testa depressa lævi fusca opaca. *O. Fabr. Fn. groenl.*
 bis. *p. 394. n. 393.*
*Habitat frequens in fabulo littorum Groenlandiae limosa
 sub lapidibus marinis testæ diametro 1 - 1 $\frac{1}{2}$ lineæ,
 anfractibus 4.*
- marginel- 102. T. testa hyalina lævi subcarinata, anfractibus sex 10-
 lus. tundatis, labro fimbriato reflexo. *Chemn. Conch. 9.
 t. 123. f. 1063.*
Habitat - - -
- helicoi- 103. T. testa alba supra lineis angulatis fuscis varia, anfracti-
 des. bus rotundatis : umbilico profundo ampio infundibuli-
 formi. *Chemn. Conch. 9. t. 123. f. 1067. 1068.*
Habitat - - -
- foliaceus. 104. T. testa pyramidali rugis lamellatis inæquali alba
 roseo varia : umbilico ampio. *Chemn. Conch. 9. t. 123.
 f. 1069. 1070.*
Habitat - - -
- Anguis. 110. T. testa transversim striata viridi nigro virgata intus
 margaritacea. *Martyn univ. Conchol. 2. t. 70.*
Habitat ad Velestiam australem.
- Porphy- 111. T. testa granulata atro, viridi flavo alboque varia, sub-
 rites. umbilicata intus margaritacea. *Martyn Conch. 2. t. 72.*
Habitat ad novam Caledam.
- smarag- 112. T. testa glaberrima striata viridi. *Martyn univ. Con-*
 dus. *chol. 2. t. 73. 74.*
Habitat ad novam Seelandiam.
- **** Cancellati.
- crenellus. 60. T. testa umbilico patente planiuscula, anfractibus te-
 retibus : striis crenatis.
*Habitat - - - testa solida, rufa, magnitudine seminis
 lupini, supra plano-convexa, subitus concava : striis
 longitudinalibus.*

thermalis. 61. T. testa umbilicata oblongiuscula obtusa : anfractibus teretibus levibus.

Habitat prope thermas pisanas in aquis dulcibus, recta alba, seniine brassicæ paulo majore, anfractibus quaternis, umbilico minore.

62. T. testa conica anfractibus distantibus. *Mus. Lud. Utr.* 658. n. 351.*

Argenv. Conch. t. II. f. V. Scalaris.

Rumpf mus. t. 49. f. A. Scalare, Wendeltrap.

Pet. amb. t. 2. f. 9.

Valent. Abb. t. 12. f. 101.

Gualt. test. t. 10. f. ZZ.

Knorr Vergn. 4. t. 20. f. 2. 3. & 5. t. 23. f. I. & t. 24. f. 6.

Martin. Conch. 4. t. 152. & 153. f. 1426. 1427. 1430-1433.

Spengl. selt. Conch. t. I. f. B.

Murray testaceol. t. I. f. 7.

B) *Pall. spic. zool. 10. t. 3. f. 5. 6. Turbo principalis.*

Martin. berl. Saniml. 7. I. t. I. f. I. 2.

Conch. 4. t. 152. f. 1428. 1429.

Habitat pretiosus ad Barbariae littora, ♂) rarer in arena littoris Coromandel, testa ad 2-2½ pollices longa, alba, aut rubella costis albis, umbilicata ♂) imperforata, columella nulla, anfractibus rotundatis 8, in ♂) 10, costis tenuibus, carinatis, subobliquis, longitudinalibus, continuis. Vix varietas clathri.

Ciathrus. 63. T. testa turrita ex umbilicata : anfractibus contiguis levibus. *Fn. suec. 2170. Mus. Lud. Utr. 658. n. 352.**

Rumpf mus. t. 29. f. W. Buccinum scalare.

Rondel. test. 89. f. 5

List. Conch. t. 588. f. 51.

Bonann. recr. & nius. Kircher. 3. f. III.

Gualt. test. t. 58. f. H.

Klein. ostr. t. 3. f. 66.

Planc. Conch. t. 5. f. 7. 8.

Ginann. adr. 2. t. 6. f. 54.

Bytem. app. t. 12. f. 54.

Knorr Vergn. I. t. II. f. 5. 4. t. 71. f. 5. & t. 20. f. 46. & 6. t. 39. f. 3.

Martin. Conch. 4. t. 153. f. 1434-1438.

B) *List. Conch. t. 588. f. 50.*

Habitat frequens in mari mediterraneo atlantico, indico, testa vix 2 pollices longa, ut plurimum alba, aliquando

punctata aut lineata, interdum subfuscata obscurius fuscata, spiræ anfractibus angustioribus & minus convexis costis 12-16, ut plurimum convexis a scalari discernenda. Ex hac purpura violacea veterum, nec punicea delata. Plancus.

ambigu- 64. T. testa turrita umbilicata : anfractibus contiguis laevibus.
Habitat in mari mediterraneo, clathro simillimus, umbilico, anfractibus pallidis lineis 2-3 ferrugineis pectinis, costis duplo pluribus distinctus.

crenatus. 65. T. testa subcancellata turrita : anfractibus contiguis supra crenatis. Mus. Lud. Ulr. 659. n. 353. *
Habitat rarus -- clathro affinis, testa alba, $\frac{1}{4}$ finis pollicis longa : spiræ anfractibus 8, costis rotundatis hinc inde obsoletis.

laevis. 66. T. testa turrita : striis longitudinalibus elevatis confectis, Ginann. adr. t. 6. f. 55.
Habitat in mari mediterraneo, clathro similis, at minor, testa grani hordei magnitudine, nivea, striis non membris branaceis.

striatulus. 67. T. testa subcancellata turrita : anfractibus contiguis cingulisque varicosis interceptis.
Habitat in mari mediterraneo ; testa alba, magnitudine seminis hordei : anfractibus cinctis striis membranaceis parvis, paucimque rugis convexis callosis, apertura obovata subitus subangulata.

Uva. 68. T. testa ovata obtusa : anfractibus contiguis ; striis longitudinalibus imbricatis. Mus. Lud. Ulr. 659. n. 354.
Pet. gaz. t. 27. f. 2. Olivaris striata fasciata.
Lift. Conch. t. 588. f. 47-49.
Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 140.
Gualt. test. t. 58. f. D.
Seb. mus. 3. t. 55. f. 21.
Knorr Vergn. 6. t. 25. f. 4.
v. Born mus. Caes. Vindob. test. p. 340. vign. f. 2.
Martin. Conch. 4. t. 153. f. 1439. a. b.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. f. 7.
β) Spengl. n. Schr. daen. Ges. 1. t. 2. f. 7.
Chemin. Conch. 9. t. 113. f. 974.
γ) Lift. Conch. t. 40. f. 38.
Chemin. Conch. 9. t. 112. f. 965.

Habitat in mari, Americam australem alluente, testa ad I $\frac{1}{2}$ pollicem longa, alba, cinerea aut spadicea, umbilicata, anfractibus circiter 12, primo triplo majore secundo: fulcis intermediis striis & qualibus, apertura unidentata.

Cornueus. 69. T. testa umbilicata rotundata acutiuscula : anfractibus teretiusculis decussato-striatis, apertura reflexa. *Mus. Lud. Ulr.* 660. n. 355.

Habitat - - - testa pellucida fusca aut cornea: apertura intus alba, umbilico pervio.

Indexus. 70. T. testa umbilicata convexo-prominula : anfractibus teretibus substriatis, apertura reflexa.

Habitat in Europa australi.

71. T. testa oblonga obtusa rugoso-striata, apertura limbo dilatato plano crenato.

Müll. hist. verm. 2. p. 178. n. 364. Nerita (Licinia) testa ovata incarnata striata, apertura in puncto adnata.

Petiv. gaz. t. 118. f. 11.

Lift. Conch. t. 26. f. 24.

Klein ostr. t. 3. f. 71. a. b.

Sloan. jam. 2. t. 240. f. 12. 13.

Chemn. Conch. 9. t. 123. f. 1060. a-e.

Martin. berl. Mag. 3. t. 5. f. 54.

Habitat in Jamaica & insulis vicinis, testa 8 circiter lineas longa, dura, pellucida, umbilicata, anfractibus 5.

Junulatus. 72. T. testa cylindrica alba reticulata : apertura remota.

Müll. hist. verm. 2. p. 180. n. 366. Nerita lunulata.

Habitat - - - testa dura, pellucida, 7 lineas longa, anfractibus 5, lineis lunularum rufescentium transversis 4-5 notatis.

73. T. testa oblonga umbilicata fusca punctis convexis striata : labro albo dilatato.

Müll. hist. verm. 2. p. 180. n. 367. Nerita Labeo.

Brown jam. p. 401. t. 40. f. 5.

Lift. Conch. t. 25. f. 23.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 43?

Chemn. Conch. 9. t. 123. f. 1061. 1062.

Habitat in Jamaica, testa 15 lineas longa, pellucida, punctis splendidis, fauce fusca glabra, anfractibus 5 protuberantibus, umbilico pervio.

- elegans.* 74. T. testa ovata cinerea spiraliter convexa striata : ^{spes}
tura adnata.
Müll. hist. verm. 2. p. 177. n. 363. Nerita elegans.
Column. purp. c. 9. p. 27.
List. Conch. t. 27. f. 25.
anim. angl. t. 2. f. 5.
exerc. anat. p. 2. t. I.
Gualt. test. t. 4. f. A. B.
Argenv. Conch. t. 28. f. II. 12.
zoomorph. t. 9. f. 9.
Martin. berl. Mag. 2. p. 604. t. I. f. 4. 6.
Schroet. Flusconch. t. 9. f. 15. a. b.
Geogr. test. I.
*Habitat in Angliæ, Galliæ, Italiæ fluviis ? testa dardim
imperforata, 6 lineas longa, anfractibus 5 convexis
operculo corneo, cochleato, striis subtilissimis radiarum
tibus exarato.*

- dubius.* 75. T. testa oblonga umbilicata : anfractibus æqualibus de-
cussato striatis, apertura dilatata.
v. Born mus. Caes. Vind. test t. 13. f. 5. 6. Turbo Lincianus.
Habitat - - -

- limbatus.* 105. T. testa subovata rugosa perforata alba. *Chemin. Conch.*
9. t. 123. f. 1075. a. b.
Habitat in Coromandel.

***** Turriti proprie diđi.

- imbrica-* 76. T. spiræ anfractibus deorsum imbricatis. *Mus. Lud. VII.*
tus. 660. n. 356.*
Gualt. test. t. 58. f. E.
Seb. mus. 3. t. 56. f. 26. 31. 33. 34.
Knorr Vergn. 2. t. 27. f. I. & 6. t. 25. f. 2.
Martin. Conch. 4. t. 152. f. 1422.
*Habitat in insulis Americae mediæ obversis, testa fuligineo
variegata, rarius cinerea, ad 4 pollices longa, an-
fractibus 12-18 intus albis complanatis transverse
striatis : striis subtilissime granulatis.*

- replica-* 77. T. testa laevi : anfractibus sursum imbricatis. *Mus. Lud.*
tus. Utr. 661. n. 357.*
Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 24.
Argenv. Conch. t. II. f. E.
Knorr Vergn. 6. t. 25. f. 3?

β) *Martin. Conch. 4. t. 151. f. 1412.*

Lift. Conch. t. 590. f. 55.

Habitat Tranquebariae, testa 3 pollices longa, & longiori, cornea, β) fusca, tenuissime transversim striata: spiræ anfractibus circiter 10, apertura ovali.

78. T. spiræ anfractibus carina unica majore acuta. *Mus. Lud. Ulr. 661. n. 358.**

Lift. Conch. t. 591. f. 59.

Bonann. recr. & mus. Kircher 3. f. 117?

Gualt. test. t. 58. f. B.

Knorr Vergn. 3. t. 19. f. 5.

β) *Martin. Conch. 4. t. 151. f. 1413.*

Knorr Vergn. 6. t. 19. f. 5.

Habitat ad Tranquebariae littora, testa ad 4 $\frac{1}{4}$ pollices longa cornea, cinerea aut ochroleuca, rarius hyalina, anfractibus 15-17 transversim striatis teretibus.

79. T. spiræ anfractibus carinis duabus acutis. *Mus. Lud. Ulr. 662. n. 359.**

Lift. an. angl. t. 3. f. 7.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 114.

Gualt. test. t. 58. f. C.

Seb. mus. 3. t. 56. f. 7. 8.

Martin. Conch. 4. t. 151. f. 1414.

Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. f. 5.

β) *v. Born mus. Caes. Vind. test. I. p. 368. t. 13. f. 8.*

Turbo torcularis.

Habitat ad littora Coromandel, acutangulo affinis, testa ad 6 pollices longa, carnea, cornea intusque fusca, cæruleescens, aut violacea, interdum fasciata; anfractibus ad 16 transversim striatis.

80. T. spiræ anfractibus carinis duabus obtusis distantibus.

Lift. Conch. t. 591. f. 58.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 113.

Argenv. Conch. t. 11. f. 10.

Martin. Conch. 4. t. 152. f. 1424. 1425.

Knorr Vergn. 6. t. 39. f. 2.

Schroeter Flusconch. t. 8. f. 10.

inn. Bau Conch. t. 3. f. 6.

Turritulus anteriorum militant sub murice, strembo, buccino, trocho, turbine:

*Habitat ad Guineæ littora, testa, vix 2 pollices longæ,
nunc eburnea, nunc alba fusco, rarius cærulecente varia-
rissime alba, intus fusco-fasciata, anfractibus comple-
natis, contiguis, transversim striatis.*

- Terebra. 81. T. Spiræ anfractibus carinis sex acutis. Fn. suec. 217.
*Mus. Lud. Ultr. 662. n. 460.**
Adans. Seneg. I. t. 10. f. 6. Ligar.
Column. aq. t. 53. f. 2.
List. Conch. t. 590. f. 54.
anim. angl. t. 3. f. 8.
Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 23. 115.
Ruinp. mus. t. 30. f. M.
Gault. test. t. 58. f. A.
Argenv. Conch. t. 11. f. D.
zoomorph. t. 4. f. F?
Seb. mus. 3. t. 56. f. 12. 18. 25. 32. 40.
Knorr Vergn. I. t. 8. f. 6.
Martin. Conch. 4. t. 151. f. 1415-1419.
 β) *Adans. Seneg. I. p. 159. t. 10. f. 7. Mesal.*
 γ) *Regenf. Conch. 2. t. 12. f. 57.*
Martyn Conch. I. rubr.
Chenn. Conch. 10. t. 165. f. 1591.
 δ) *Chenn. Conch. 10. t. 165. f. 1592. 1593.*
*Habitat in mari Sinam, Africam occidentalem, Angliam,
Sueciam alluente, adriatico, testa fusca vel subfuscata
creberrime alba 2 ad 6 fere pollices longa, anfractibus
ad 36 subconvexis, discretis, singulis carinis 5-9**
- variega- 82. T. spiræ anfractibus planiusculis; striis septem obsoletis.
tus. *Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 112.*
Seb. mus. 3. t. 56. f. 30. 37. 38.
Knorr Vergn. 6. t. 16. f. 87.
Martin. Conch. 4. t. 152. f. 1423.
*Habitat in mari, Americam australiem & Barbariam oce-
nuente, imbricato affinis, testa 2-3 pollices longa, testa
variegata fusca vel ex fusco lutea, 2-3 pollices longa,
subtilissime transversim striata, anfractibus subconvexis:
strigis nonnullis maculosis.*
- unguli- 83. T. spiræ anfractibus striis decem exoletis. Müll. zool.
nus. *dan. prodr. 2930.*
*Habitat in mari Europæo, & mediterraneo, inter terebrum
& variegatum quasi medius, verme ventricoso proboscide*

*longissima emissili apice globosa & cirris plurimis armata
instrudo, testa 2-4 $\frac{1}{2}$ pollices longa albo varia ex fusco
lutea vel spadicea, anfractibus ad 24 usque.*

84. T. spiræ anfractibus costatis : apertura ovata. Müll.
zool. dan. prodr. 2929.

Habitat in mari Daniam alluente.

85. T. testa imperforata glabra : anfractibus rotundatis
striatis. O. Fabr. Fn. groenl. p. 394. n. 392.

Habitat rarus in profundis maris Groenlandiam alluentis
ad ramulos fertulariarum, testa pellucida, albida,
fragili longitudinaliter sulcata, vix 1 $\frac{1}{3}$ lineam longa,
anfractibus 5 ventricosis lente decrementibus.

86. T. anfractuum sutura marginata prominente.

Gualt. test. t. 58. f. L.

Habitat - - - testa candida, $\frac{1}{4}$ pollicis longa: apertura
subovali.

87. T. testa pellucida : anfractibus contrariis; sutura sub-
crenata, apertura posterius bidentata.

Müll. zool. dan. prodr. 2917. ver. hist. 2. p. 116. n.
315. Helix testa turrita fusca glabra sinistrorsa : aper-
tura canaliculata.

Lift. Conch. t. 41. f. A.
Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 41.

Gualt. test. t. 4. f. D. E.

Stroem. atl. Nidros. 3. p. 436. 437. t. 6.

Schroet. Erdconch. p. 136. A. B. t. 1. f. 4. a. & f. 5.
Einl. in Conch. 2. p. 55. 1. t. 3. f. 22.

β) Chemn. Conch. 9. t. 112. f. 960. n. 1. 2.
Müll. hist. ver. 2. p. 120. n. 317. Helix papillaris.

Ginann. adr. 2. t. 3. f. 23.

γ) Chemn. Conch. 9. t. 112. f. 963. 964.

Chemn. Conch. 9. t. 112. f. 961. 962.

Habitat in Europa, potissimum australi, frequens e. g.
in cavis arborum truncis, testa glaberrima, dimidium
circiter pollicem longa fusca, rarius ex fusco aurantia,
anfractibus 10-11, in commissuris papillis vel denti-
culis albis munitis.

88. T. testa pellucida : anfractibus contrariis non crenatis,
apertura tridentata. Fn. succ. 2172.*

Müll. zool. dan. prod. 2918. hist. vermt. 2. p. 113. h.
316. *Helix testa turrita fusca striata sinistrorsa, apertura canaliculata.*

List. Conch. t. 40. f. 38. & t. 41. f. 39.
anim. angl. p. 124. t. 2. f. 10.

Gualt. test. t. 4. f. C.

Argenv. Conch. t. 28. f. 11. 19. 20.
zoomorph. t. 9. f. 13. 14.

Geoffr. test. 23.

Stroeni. act. Nidros. 3. t. 6. f. 17.

Murray testaceol. t. 1. f. 2.

Schin. verb. act. helvet. 5. t. 3. A. f. 17. 18.

Schroet. Erdconch. t. 1. f. 4. a. b. f. 5.

Chenn. Conch. 9. t. 112. f. 959. a. b.

$\beta)$ Martin. berl. Mag. t. 5. f. 60.

$\gamma)$ List. Conch. t. 20. f. 16?

$\delta)$ Chenn. Conch. 9. t. 112. f. 958. $\alpha.$ $\beta.$

$\epsilon)$ Chenn. Conch. 9. t. 112. f. 957.

$\zeta)$ Chenn. Conch. 9. t. 112. f. 956.

$\tau)$ Chenn. Conch. 9. t. 114. f. 980. $\alpha.$ $\beta.$

Habitat vulgatissimus in Europæ silvis & muscofisi; ^{reflexa} glabra;
circiter pullicis longa, dilute fusca, tenui, rarius rugosula, apertura alba.

Fusulus. 89. T. testa obtusa curvatum sulcata : apertura edentula
anfraetibus undecim.

Müll. hist. vermt. 2. p. 109. n. 309. *Helix Fusulus.*
Habitat — — testa, $7\frac{1}{2}$ lineas longa.

Fusus. 90. T. testa obtusa recte sulcata alba : apertura dentata
anfraetibus novem.

Müll. hist. vermt. 2. p. 108. n. 308. *Helix Fusos.*
Banann. recr. 3. f. 140.

Habitat — — testa fusiformi, apertura lunata, ^{labro} reflexo.

Fulcatus. 91. T. testa obtusa oblique sulcata alba : apertura subquadrata, labro reflexo.

Müll. hist. vermt. 2. p. 108. n. 387. *Helix fulcata.*
Chenn. Conch. 9. t. 135. f. 1231. 1232.

Habitat — — testa subpellucida, alba, immaculata, ^{labro} subventrica, 12 lineas longa, anfraetibus 8, apertura perpendiculari.

quadridens. 92. T. testa sinistrorsa flavicante : apertura quadridentata.
Müll. hist. vermt. 2. p. 107. n. 306. *Helix quadridentata.* List.

Lift. Conch. t. 40. f. 38.

Geoffr. test. 24.

Habitat in Italia, testa glabra 5 lineas longa, anfractibus 9, apertura arcuata, labro subreflexo dentibusque albis.

93. T. testa albida : apertura tridentata.

Müll. hist. verm. 2. p. 106. n. 305. Helix tridens.

Gualt. test. t. 4. f. F.

Chemin. Conch. 9. t. 135. f. 1236.

Habitat in Italia, testa glabra, minutissime striata, 5 lineas longa, anfractibus 7, apertura arcuata, labro subreflexo.

94. T. testa ovata obtusa pellucida : anfractibus senis secundis, apertura edentula. Fn. suec. 2173. * It. oel. 99.

Müll. zool. dan. prodr. 2915. hist. verni. 2. p. 105. n. 304.

Helix testa cylindracea obtusa : apertura edentula orbiculata, labro albo.

Lift. anim. angl. t. 2. f. 6.

Argeny. zoomorph. t. 9. f. 11.

Stroem. act. Nidros. 3. t. 1. f. 7.

Geoffr. test. 20.

Martin. berl. Mag. 3. t. 5. f. 63.

Schroeter Erdconch. t. 1. f. 7.

Chemn. Conch. 9. t. 123. f. 1076. n. 1. 2.

Lift. anim. angl. t. 2. f. 8?

Argeny. Conch. t. 28. f. 17.

Martin. berl. Magaz. 3. t. 5. f. 55.

Schroet. Erdconch. t. 1. f. 6.

Habitat frequens in Europæ muscis, testa lineam longa, tenera, glabra, dilute fusca, anfractibus 5-6, apertura limbo albo, in β dentibus 8 munita.

95. T. testa fragili : anfractibus quinis distinctis transversim striatis albulo-fasciatis. Scopol. delic. insubr. 1. p. 68. t. 25. f. C.

Habitat - - - testa rufescente, digitus auricularis longitudo imperforata, anfractibus rotundatis: singulis fasciis albida; primo duplice, apertura subovata, operculum griseo.

96. T. testa alba levissima; aperturæ labio portecto planiusculo concavo obtuso.

Argeny. Conch. t. 32. f. 19?

Habitat in mari mediterraneo, testa subulata lactea: anfractibus 7-8, apertura dilatata auriscalpium referente, marginata. Logie,

politus. 97. T. testa imperforata glaberrima : apertura ovata.
*Habitat in mari mediterraneo, testa nivea, non pellucida,
 nitidissima, grani horae magnitudine, anfractibus
 nea excavata tenui interstinctis.*

nautileus. 98. T. testa planiuscula : anfractibus annulatis dorso crī-
 tatis.

*Syst. nat. X. 1. p. 709. n. 234. Nautilus Crista.
 Müll. zool. dan. prodr. 2286. hist. verm. 2. p. 165. n. 35.
 Planorbis (imbricatus) testa alba umbilicata : carina
 dentata.*

Roef. ins. 3. t. 97. f. 6. 7.

Hofer act. helv. 4. p. 212. t. 9. f. 21. 22.

Geoffr. test. 8.

Martin. berl. Mag. 4. p. 269.

Chém. Conch. 9. 1. 123. f. 1077. A. a.

*Habitat in Galliae, Helvetiae, Germaniae, Daniæ, ceraso
 phyllo, aliisque plantis aquarum stagnantium, testa
 diametri dimidiæ liceæ, pellucida, frigilissima, alba,
 pallida vel cinerea supra plana, sicutus convexa umbi-
 licata, anfractibus $2\frac{1}{2}$, apertura longa; nonne potius ad
 tertiani tribum referendus?*

obsoletus. 99. T. spiræ anfractibus carinis dibus ob usis approximat-
 iis. v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 13. f. 7.
Habitat - - - exoleto affinis.

quinque- 100. T. testa subumbilicata albida : apertura quinquedentata
dentatus. v. Born mus. Caes. Vind. test. t. p. 378. t. 13. f. 9.
*Habitat - - - bidenti affinis, testa superfluisida : anfractu-
 tibus 12.*

pyrami- 101. T. testa cornea pellucida ventricosa pyramidalis : aper-
 talis. tura supra subcompressa.
Schroet. Erdconch. t. 1. f. 8.

*Habitat rarius in Germania, testa à pollicis longa, ad
 solem & aerem primo cinerascente, post albicans &
 opaca.*

328. HELIX. *Animal Limax.*

Testa univalvis, spiralis, subdiaphana, fragilis.

*Apertura coarctata, intus lunata
s. subrotunda: segmento circuli
demto.*

* *Ancipites, testa longitudinaliter utrinque angulata.*

Sparabae- 1. *H. testa ovata subancipiti: apertura dentata.* *Mus. Lud.*
*Ulr. 663. n. 361. **

*Müll. hist. verm. 2. p. 88. n. 286. Helix (Pythia) testa sub-
umbilicata ovata utrinque subcarinata, apertura dentata.*
Rumpf mus. 91. t. 27. f. I. Cochlea imbrium.

List. Conch. t. 577. f. 31. 32.

Pet. gaz. t. 4. f. 10.

amboin. t. 12. f. 8.

Bonann. recr. 3. f. 385.

mus. Kircher. 3. f. 370.

Gualt. test. t. 4. f. S.

Argenv. Conch. t. 9. f. T.

Seb. mus. 3. t. 60. infra in angulo.

Klein. ostr. t. 1. f. 23. 24.

Knorr Vergn. 6. t. 19. f. 2. 3.

Born mus. Cæs. Vind. test. 1. p. 364. vign. f. 2.

Martin. berl. Mag. 3. t. 6. f. 67.

Favann. Conch. 1. 65. t. D¹. D . D⁴.

Chémn. Conch. 9. t. 136. f. 1249-1253.

*Habitat in Asiae montibus, insulis amicis, olim cum pluvia
cœlitus delabi credita, testa ad 1½ pollicem longa fusco
alboque varia, anfractibus contiguis: primo convexo,
apertura angusta, compressa subflexuosa, labio utroque
tridentato, exteriori acuto & inæquali.*

** *Carinata, anfractuum margine acuto.*

*Lapcida. 2. H. testa umbilicata utrinque convexa: apertura transver-
sali marginata ovata. Fn. suec. 2174. * Mus. Lud. Ulr.
n. 362. * It. wgoth. 27.*

*Müll. zool. dan. prodr. 2899. hist. verm. 2. p. 40. n. 240.
Helix testa umbilicata carinata depressa maculata,
apertura transversa alba.*

Lift. Conch. t. 69. f. 68.

anim. angl. t. 2. f. 14.

exerc. anat. p. 182. t. 5. f. 4.

Petiv. gazoph. t. 92. f. 11.

Geoffr. test. 10.

Schlötterb. ad. helv. 3. t. 3. f. 15.

Martin. berl. Magaz. 2. t. 3. f. 36.

Schroet. Erdconch. p. 191. n. 64. 65. t. 2. f. 23.

Chemn. Conch. 9. t. 126. f. 1107.

Habitat in Europæ rupibus terrestribus & arborum truncis
ut laura lignum, sic calcem rodere prohibita, vegetabilis
libus vicians, testa diametri semipollucaris, oculis ar-
matis eleganter striata, fusco cornea, maculis ferrugineis
neis, aut fusca albo varia, rarius hyalina anfractibus
5, unibilico pervio.

marginalia- 3. H. testa subumbilicata subdepressa oblique striata alba.
fasciis rufis, apertura transversali. *Müll. hist. verma.* 2.
ta. p. 41. n. 241.

Habitat - - - indiscretæ affinis, testa diametri 9 linearum,
supra convexa, subitus planiuscula, anfractibus 4 glabris
primo trifasciato, reliquis bifasciatis, apertura subtriangulari.

cicatrico- 4. H. testa umbilicata subdepressa rugulosa flavicante:
concentricis rufis, anfractibus contrariis. *Müll. hist.*
fa. *verm.* 2. p. 42. n. 242.

Argenv. Conch. app. t. I. f. C.

Petiv. gaz. t. 76. f. 6?

Kaemmerer Cab. Rudolst. t. 11. f. 6.

Chemn. Conch. 9. t. 109. f. 123. vign. 19. l. A.

Favann. Conch. t. 63. f. K.

Habitat rara - - - testa tenera, pellucida, supra con-
vexa, subitus gibba, anfractibus 5, extimo rufa fasciata,
umbilico pervio, apertura subquadrata, intus alba.

Ægophthalmos- 5. H. testa umbilica subdepressa viridescente immaculata: an-
fractibus septem. *Müll. hist. verm.* 2. p. 39. n. 239.

Runpf. mus. I. t. 27. f. P.

Petiv. gazoph. t. 21. f. 6.

Argenv. Conch. t. 6. f. E.

Brown jam. p. 450. t. 40. f. A. B.

Habitat in India, Barbaria & australi America, testa diamet-
ri interdum pollucaris, cornea ex luteo virescente, expar-
tita, albida subtilissime transversim striata, anfractibus

6-7, in juniori subcarinatis, umbilico pervio, apertura lunata acuta, fauce alba.

6. *H. testa subcarinata umbilicata convexa: apertura marginata.* *Mus. Lud. Ulr.* 664, n. 363. *

Rumpf mus. t. 27. f. O?

Argenv. Conch. t. 8. f. F.

Klein ostr. t. 1. f. 10?

8) *Martyn. univ. Conch. I. t. 28.*

Habitat in Aficæ arboribus, testa albida, glabra, centro fusca, anfractibus subdepressis ex fusco luteis, apertura alba infra flavæ, umbilico pervio.

7. *H. testa umbilicata planiuscula subtus gibba: apertura semicordata.* *Fn. suec.* 2175. * *It oel.* 65.

Müll. hist. verm. 2. p. 26. n. 228. Helix explanata.

List. Conch. t. 64. f. 62. t. 80. f. 81. & t. 140. f. 46. 47.

Gualt. test. t. 3. f. Z.

Chemn. Conch. 9. t. 126. f. 1105. 1106.

Habitat in Europæ rupibus, testa glabra, alba, immaculata, subtilissime transversim striata, diametri $5\frac{1}{2}$ linearum, anfractibus 5.

8. *H. testa perforata planiuscula subcarinata alba fusco punctata subtus gibba: fasciis linearibus.* *Müll. hist. verm. 2. p. 25. n. 227.*

Habitat - - testa alba, diametri $4\frac{1}{2}$ linearum: fasciis 2 expundis fascis; anfractibus 3.

9. *H. testa perforata planiuscula alba subtus gibba: apertura quadrangulari.* *Müll. hist. verm. 2. p. 25. n. 226.*

List. Conch. t. 86. f. 86?

Habitat - - - Albellaæ similis, testa inimaculata diametri 3 linearum anfractibus 3; an distincta species?

10. *H. testa subcarinata umbilicata convexa striata subtus gibbosiore: apertura subrotundo lunata.*

Müll. hist. verm. 2. p. 33. n. 235? Helix polita.

Habitat Algiriæ &? in ripis torrentum Lombardiaæ, testa minuta, grisea vel candidissima glaberrima, oculo armato argute transversim striata, anfractibus 4-5. E. Brander.

11. *H. testa subangulata umbilicata convexa: anfractibus fenis, umbilico pervio.*

Favann. Concl. t. 63. f. L.

Chemin. Conch. 9. t. 125. f. 1093. 1094.

β) Born mus. Caes. Vind. test. t. 14. f. 3. 4?

Habitat in Mauritania, striatulae affinis, at spiræ anfractibus 6, umbilico patentissimo, anfractuum angulo obsoletō distincta.

Leucas. 12. H. testa subcarinata umbilicata convexa lœvi subtus gibbosa : umbilico minutissimo, apertura subrotundulata.

Habitat in Africa, testa albida, supra fascia, subtus lineis purpurascens. E. Brander.

lævipes. 13. H. testa perforata subdepressa subcarinata sinistri pallida : fascia rufa albæ adnata. *Müll. hist. ver. 2. p. 22. n. 222.*

Chemin. Conch. 9. t. 108. f. 915. 916.

Habitat - - exili aliquantum affinis, testa pellucida, diametri $\frac{3}{4}$ pollicis tenera, subtus magis convexa alba, anfractibus 5 subtilissime transversim striatis, aperitur, margine acuto.

vermicula- 253. H. testa subglobosa depressa scabra imperforata albola. punctata : fasciis quatuor fuscescentibus, labro reflexo candido. *Müll. hist. ver. 2. p. 20. n. 219.*

Petiv. gaz. t. 52. f. II.

Favann. Conch. 1. 64. f. K², K³.

Chemin. Conch. 9. t. 129. f. 1148. a. b. c.

Habitat in Italia & Lusitania,

exilis. 14. H. testa perforata depressa subcarinata pallida : rufa albæ adnata, anfractibus striatis. *Müll. hist. ver. 2. p. 22. n. 222. I-*

Chemin. Conch. 9. t. 129. f. 1149.

Habitat Tranquebariae, testa diametri 10 linearum, pellicula, tenera subtus convexa alba, anfractibus 5, aperitur, margine acuto.

candida. 15. H. testa umbilicata utrinque convessa ; apertura non marginata. *Kraemmer. Cab. Rudolst. p. 172. n. 4⁵.*

Martin. n. Marnigf. 4. p. 423. t. 3. f. 22. 23.

Habitat - - lapidariae affinis, at testa teneriore, linea

neas alta, 10 lata, umbilico angustiore.

spadicea. 16. H. testa perforata subdepressa umbilicata spadicea, anfractibus quinque. *Kraemmer. Cab. Rudolst. p. 172. t. II. f. 2.*

Habitat - - incarnatae affinis, testa 7 lineas alta 11 lata, spadicea, umbilico labiique margine aliunde

17. H. testa perforata subglobosa subcarinata cornea : anfractibus tenuis, labro incarnato. Müll. hist. verm. 2. p. 63. n. 259.
Schroet. Eraconch. p. 174. n. 52-54. t. 2. f. 18.
Chemn. Conch. 9. t. 133. f. 1206.
*Habitat rara in Daniae, Germaniae nemoribus, testa im-
maculata, diametri 6 linearum, carina pallida, um-
bilico angustissimo.*
18. H. testa perforata subglobosa subcarinata utrinque con-
vexa tomentosa. Müll. hist. verm. 2. p. 62. n. 258.
*Habitat in Daniae hortis, hispidae affinis, testa diametri 3
linearum, cornea, transparente, carina pallida.*
19. H. testa perforata globosa subcarinata striata alba : fascia
fusca. Müll. hist. verm. 2. p. 68. n. 263.
List. Conch. t. 85. f. 85.
*Habitat in Gallia Lugdunensi, testa alba, minutissime
striata, diametri 3½ linearum, apice fusco, labro acuto,
ang. rad. b. 5.*
20. H. testa subcarinata umbilicata plana supra concava :
apertura oblique ovata utrinque acuta. Fn. suec. 2176.
Müll. zool. dan. prodr. 2879. hist. verm. 2. p. 157. n. 344.
*Planorbis (carinatus) testa pallida pellucida supra um-
bilicata, carina marginali media.*
List. anim. angl. t. 2. f. 27.
Gualt. test. t. 4. f. EE.
Swammerd. bibl. nat. t. 10. f. 5.
Klein offr. t. 1. f. 8.
Martin. berl. Magaz. t. 8. f. 18.
v. Born mus. Caeſ. Vindob. iſt. t. 14. f. 5. 6.
Schroet. Flusconch. t. 5. f. 13-15.
 2) *List. Conch. t. 138. f. 42.*
Pet. gaz. t. 10. f. II. & t. 100. f. 216.
Chemn. Conch. 9. t. 126. f. 1102. n. 1. 2...
*Habitat in Europæ & Barbariae aquis stagnantibus & flu-
viis, testa diametri 1 linea ad $\frac{1}{2}$ pollicis, pellucida cor-
nea, rarius opaca, tenuissime striata, anfractibus 4-5 s
primo reliquis multo majori.*
21. H. testa deorsum carinata umbilicata convexa subtus
plana : apertura semicordata. Fn. suec. 2177.*
Müll. zool. dan. prodr. 2881 hist. verm. 2. p. 160. n. 346.
*Planorbis (umbilicatus) testa fusca opaca utrinque sub-
umbilicata, carina marginali infera.*

Geoffr. test. 6.

Chenn. Conch. 9. t. 127. f. 1121-1123.

*Schroet. Flusconch. t. 5. f. 22-25. & t. II. minor. C. f. 4
Einl. in Conch. 2. p. 129. t. 4. f. 1.*

B) Martin. Conch. 4. t. 8. f. 22?

Schroet. Flusconch. t. 5. f. 27?

*Habitat frequens in Europæ & Barbariæ aquis stagnantiis
bus & rivulis, incola nigro: tentaculis rufis, testa dia-
metri 1-6½ linearum, fusca interdum pallida, subpellu-
cida, subtilissime transversim striata, anfractibus 5-6.*

ingens. 22. *H. testa subcarinata imperforata convexa: apertura re-
supinata; labio posteriorius quadruplicato.*

*Müll. hist. verm. 2. p. 17. n. 216. Helix testa imperforata
subcarinata, apertura resupinata utrinque dentata.*

Lift. Conch. t. 99. f. 100.

Bonnan. recr. 3. f. 330. 331.

mus. Kircher. 3. f. 331. 332.

Argenv. Conch. t. 28. f. 13. 14.

Mariin. berl. Magaz. 2. t. 4. f. 42. a. b.

Favann. Conch. t. 63. f. F¹⁰.

Chenn. Conch. 9. t. 109. f. 919. 920.

v. Bern nuf. Caes. Vindob. test. t. 14. f. II. 12.

B) Lift. Conch. t. 83. f. 87.

γ) Lift. Conch. t. 84. f. 84.

δ) Lift. Conch. t. 87. f. 88.

*Habitat rara in India? testa diametri interdum 1½ polli-
cis, ex fusco lutea, vel cinerea aureo maculata, vel
alba maculis subsfuscis, anfractibus 6, apertura oblon-
go-ovali, plicis vel dentibus 4, 5, 6, 8.*

finuata. 23. *H. testa imperforata subcarinata brunnea: carina can-
dida: apertura transversa dentata posterius triplicata.*

Müll. hist. verm. 2. p. 18. n. 217.

Lift. Conch. t. 97. f. 98. & t. 98. f. 99.

Klein ostr. p. II. n. 31. d. I.

Argenv. Conch. t. 63. f. F. 8?

Chenn. Conch. 9. t. 126. f. 1110-1112.

B) Lift. Conch. t. 96. f. 97.

Argenv. Conch. t. 63. f. F. 4.

γ) Lift. Conch. t. 93. f. 93. 94.

Klein ostr. t. I. f. 22.

*Habitat in America, testa scabriuscula, diametri 9 linearum
rum utrinque planiuscula: anfractibus 5 teretibus,
labro reflexo.*

24. H. testa imperforata alba supra planiuscula subtus gibba : apertura transversa bidentata. Müll. hist. verm. 2. p. 13. n. 212.
Chenin. Conch. 9. t. 126. f. 1108. 1109.
Habitat - - - facie placentæ, at testa decuplo minore, diametri 13 linearum, albo, neutiquam striata, anfractibus valde depresso.
25. H. testa imperforata supra planiuscula subtus gibba : anfractibus cicatricosis ; extimo divaricato. Müll. hist. verm. 2. p. 12. n. 211.
Habitat rarissimæ - - - Carocollæ facie, at testa diametri 31 linearum, subtilius striata, fulva, carina subalbescente, fauce lutescente, labro aurantio glabro valde reflexo ; anfractibus 4 latis planiusculis.
26. H. testa imperforata utrinque convexa. Mus. Lud. Ulr. 664. n. 364.*
Müll. hist. verm. 2. p. 77. n. 273. Helix testa imperforata trochiformi carinata oblique striata, labro transversali albo.
Chenin. Conch. 9. t. 125. f. 1090-1092.
Favann. Conch. t. 63. f. 12.
 $\alpha)$ *List. Conch. t. 1055. f. 5.*
 $\beta)$ *List. Conch. t. 63. f. 61.*
Argeny. Coneh. t. 8. f. D.
Seb. mus. 3. t. 40. f. 16. 17.
Knorr Vergn. 4. t. 5. f. 2. 3.
v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 14. f. 9. 10.
Habitat terrestris paulo rario in India, testa utrinque striata, diametri 18 linearum in α) brunnea, interdum subtus alba, vel supra pallide lutescente subtus alba, carina interdum alba, nunc inferne nunc superne fascia cincta, anfractibus 6 subconvexis, labio albo, aperiura triangulari; in β) testa tota nigricante, praeter fluorem pallidam, labrumque album; anfractibus 5.
27. H. testa imperforata alba trochiformi fasciis sulvis : apertura transversali bidentata. Müll. hist. verm. 2. p. 81. n. 278.
List. Conch. t. 90. f. 90.
Habitat - - - inter Lucernari & Lychnum media, ab utraque tanien fascia in superiore anfractus parte duplici, ab illa etiam vertice, non anfractibus depresso, diffindi.
28. H. testa subglobosa umbilicata subcarinata lutescente fascia albida : apertura transversa bidentata pone lineata. Müll. hist. verm. 2. p. 74. n. 269.

Lift. Conch. t. 88. f. 89.

Habitat — — testa diametri circiter pollicaris ^{utrinque} convexa, anfractibus 5 contiguis, apertura lunata, labro vix reflexo, labio reflexo crasso.

Cornu 29. *H. testa subcarinata imperforata convexa : apertura patu militare.* lo-marginata. *Mus. Lud. Ulr.* 665. n. 365.

Gualt. test. t. 3. f. I.

Knorr Vergn. 6. t. 32. f. 2.

Chemn. Conch. 9. t. 129. f. 1142. 1143? *Habitat terrestris in India, testa glabra, sauis magna, sub epidermide fusca alba, apertura fulva : limbo fusco, anfractibus obtusis.*

Pellis fer- 254. *H. testa subcarinata fasciis flammeis rubris albisque pentis. picta, subtus punctis quadrifariam cincta, apertura firmata.* *Chemn. Conch.* 9. p. 79. t. 125. f. 1095. 1096.

Lift. Conch. t. 66. f. 64.

Bonann. mus. Kircher. 3. n. 349?

Petiv. gazoph. t. 156. f. I.

Favann. Conch. t. 63. f. G³.

Habitat in America calidiore.

Vortex. 30. *H. testa supra concava : apertura ovali plana.* *Fn. scutis 2172.**

Müll. zool. dan. prodr. 2880. *hist. verm.* 2. p. 158. n. 345. *Planorbis testa flavo-fusca subcarinata supra concava subtus plana.*

Petiv. gazoph. t. 92. f. 6.

Lift. Conch. t. 138. f. 43.

anim. angl. t. 2. f. 28.

Gualt. test. t. 4. f. GG.

Klein ostr. t. I. f. 9.

Martin. berl. Mag. 4. p. 257. t. 8. f. 19.

Schroeter Flusconch. t. 5. f. 16. 17.

Chemn. Conch. 9. t. 127. f. 1127. α. β.

Habitat in Europæ aquis stagnantibus flaviisque, plantis aquaticis crebro adhaerens, incola rufo, tentaculis albis, vitæ, etiam in sicco, tenacissimo, testa pellucida diametri 1½-4 linearum, minutissime transversim striata, dum vacua, flava, anfractibus 5-7 supra convexiusculis, aperituræ margine tenui acuto.

Scabra. 31. *H. testa subcarinata imperforata ovata acuminata striata.*

Habitat - - - *testa fasciis fuscis discedis varia*, in anfractu inferiore linea elevata.

32. *H. testa utrinque convexa cornea* : *fasciis subferrugineis*.
Habitat in Sueciæ nemoribus.

33. *H. testa imperforata depressa decussatim striata* : *apertura utrinque acuta.**
Gualt. test. t. 68. f. E.

v. Born mus. Caes. Vindob. t. 13. f. 12. 13.

Chemin. Conch. 5. p. 237. vign. 44. f. A. B. C.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 136. t. 4. f. 2. 3.

Chemin. Conch. 9. t. 126. f. 1100. 1101.

Habitat terrestris in India, rarissima, testa Jordide cinerea, infra convexa, apertura triangulari canaliculata : limbo albo.

34. *H. testa trochiformi subumbilicata acuminata* : *striis convexis carinaque triplici spiralibus* : *apertura dilatata*.
Müll. hist. verm. 2. p. 84. n. 282.

Chemin. Conch. 9. t. 126. f. 1103. 1104.

Habitat - - - *testa diametri 11 linearum, pallida, strigis transversis striisque spiralibus obsolete luteis, anfractibus 5, apertura fere circulari, labro albo* : *margine acuto.*

158. *H. testa subfuscata decessa* : *anfractu primo tereti, apertura coarctata subtriangulari tridentata marginata.*

Lift. Conch. t. 93. f. 93. 94.

Klein oft. t. I. f. 22.

Habitat in Virginia, Thuringia, Alsacia, testa subimperforata.

159. *H. testa decessa umbilicata* : *anfractibus contiguis ; primo maximo, apertura oblongo-ovata ; limbo intus fulvescente.*

Seb. mus. 3. t. 40. f. 3-5

Martin. Naturf. 2. t. 79. f. 1.

Habitat - - - *testa magna solida incarnata, cana, aut alternatini subfuscata, & lutea, fasciis utplurimum 6 aut pluribus fuscis, rarius cæruleoscentibus picta, anfractibus 6, extimus mucronatis, apertura conpressa, operculo extrinsecus rubro, nodoso nitido occlusa.*

161. *H. testa umbilicata utrinque convexa albo spadiceo-que varia* : *apertura alata submarginata.*

VERMES TESTACEA. *Helix.*

v. *Born. mus. Caes. Vind. test. t. 14. f. 1. 2. Helix lapicida*
Habitat - - - lapicidae accedens.

marginella. 162. *H. testa umbilicata oblique striata supra convexa subtilis*
depressiuscula : anfractu primo carinato, apertura unicolor
gulari transversa marginata.

v. *Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 14. f. 7. 8.*
Chenn. Conch. 9. t. 125. f. 1097.
Habitat - - - testa 5 lineas ultra pollicem lata, 8
neas alta, alba : fascia fusca.

sinuosa. 163. *H. testa subcarinata imperforata utrinque convexa ex-*
cavato-punctata : anfractibus subconvexis contiguis
apertura transversa septem dentata.

v. *Born. mus. Caes. Vind. test. t. 14. f. 13. 14. Helix sinuata*
Habitat - - - spirae anfractibus 6.

maculosa. 164. *H. testa umbilicata subcarinata oblique striata depressius-*
cula subtilis convexa : apertura lunata ; labio marginato. v.
Born. mus. Caes. Vind. test. t. 14. f. 15. 16.
Habitat - - - testa alba fulvo maculata.

punctata. 165. *H. testa subumbilicata subcarinata depressiuscula rotun-*
data : anfractibus teretibus, apertura transversa oblonga,
labro marginato tridentato, columella incrassata emar-
ginata. v. *Born. mus. Caes. Vind. test. t. 14. f. 17. 18.*
Habitat - - - testa fusca : fascia dorsi angusta transversa
radiisque futuram versus punctatis levatis, apertura
bella.

vitrea. 166. *H. testa ovata subumbilicata semipellucida glabra : an-*
fractibus quinque, primo gibbo, reliquis carinatis,
apertura oblongo-ovata. v. *Born. mus. Caes. Vind.*
test. t. 15. f. 15. 16.
Habitat - - - testa ultra 2 pollices alta ex lutescente
fusca : fasciis longitudinalibus undulatis sulphureis.

annulata. 167. *H. testa umbilicata depressiuscula alba : anfractibus qua-*
tuor : primo gibbo bicarinato. *Schroet. Flusconch. t. 5.*
f. 30.
Habitat - - - testa diametri 2 linearum, apertura ovata.

rhenana. 168. *H. testa umbilicata alba supra depressa : anfractibus*
carinatis conspersim striatis ; ultimo fusco. *Schroet.*
Flus. t. 5. f. 31. a. b.
Habitat in Rheno.

245. H. testa subdepressa umbilicata alba supra longitudinale
liter maculata : subtus fasciis quinque atris. *Chemn. Conch.*
Conch. 9. p. 152. t. 133. f. 1207.

Gualt. test. t. 3. f. Q.

Habitat in insula S. Crucis.

246. H. testa umbilicata rugosa cana oblique striata : aper-
tura lunata , labro incarnato intus reflexo. *Chem. Conch.*
9. p. 152. b. 133. f. 1208,
List. Conch. t. 55. f. 51.

Habitat in Jamaica.

252. H. testa imperforata lævi crocea, anfractuum margine
basique fusca, apertura cærulea. *Mart. univ. Conch.*
2. t. 67. med.
Habitat in Tahiti.

254. H. testa rotundata fusca : anfractibus carinatis , aper-
tura sinuosa. *Martyn univ. Conchol. 2. t. 69.*
Habitat in nova Seelandia.

*** Rotundatæ anfractibus & umbilicatæ.

35. H. testa supra umbilicata plana nigricante : anfractibus
quatuor teretibus. *Fn. suec. 2179.* Mus. Lud. Ulr.*
*665. n. 366.**

Müll. zool. dan. prodr. 2878. hist. verm. 2. p. 154. n. 343.
*Pianorbis (Purpura) testa opaca supra umbilicata immu-
culata.*

List. Conch. t. 137. f. 41.

exerc. anat. 2. p. 58. t. 3. f. 1-4.

anim. angl. p. 143. t. 2. f. 26.

Petiv. gazoph. t. 92. f. 5.

Bonann. recr. 3. f. 316.

muf. Kircher. 3. f. 312.

Lesser testaceoth. p. 148. f. g.

Swammerd. bibl. nat. t. 10. f. 3. 4.

Gualt. test. t. 4. f. DD.

Ginann. op. post. 2. p. 50. t. 2. f. 12.

Argenv. Conch. t. 27. f. 2. n. 3. & f. 8.

zoomorph. t. 8. f. 7.

Seb. muf. 3. t. 39. f. 17.

Knorr Vergn. 5. t. 22. f. 6.

Genfr. test. I.

Geve Conch. p. 27. 29. t. 3. f. 18. 19.

Chemn. Conch. 9. t. 127. f. 1113-1120.

Martin. Berl. Mag. 4. t. 8. f. 17.

Schroet. Flusconch. t. 5. f. 19-21. & t. II. min. C. f.

β) Schroet. Eint. in Conch. 2. p. 268. n. 319?
Habitat in Europæ & terra Coromandel aquis dulcis
incola iimidiissimo nigro, tentaculis sordide cinereis, testa
pulla, fusca, rufa, alba, sublutea, vel cœrulea, cœctu
diametri a linearis ad pollicarem fere glabra,
subtilissime transversim striata, anfractibus 4-5 rarijus
contrariis.

Spirorbis. 36. H. testa utrinque concava plana albida : anfractibus
quinque teretibus. Fn. suec. 2180.*

Müll. zool. dan. prodr. 2882. hist. verm. 2. p. 161. n.
347. Planorbis testa slavecente utrinque concava aqua
li : anfractibus teretibus.

Geoffr. test. 2.

Martin. berl. Mag. 4. p. 258. t. 8. f. 20.

Habitat in Galliæ, Germaniæ, Scandinaviæ aquis flagratis
tibus, testa pellucida vix striata, diametri $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ linearium,
rum, anfractibus 4-5, apertura sublabiata.

Polygyra. 233. H. testa planiuscula orbiculari, apertura ovali, labio
fimbriato. Chemn. Conch. 9. t. 127. f. 1124. 1125.
v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 14. f. 19. 20.
Habitat - - -

contorta. 37. H. testa subumbilicata plana utrinque æquali : apertu
ra linearis arcuata. Fn. suec. 2181.*

Müll. zool. dan. prodr. 2883. hist. verm. 2. p. 162. n.
348. Planorbis testa fusca supra plana subtus umbilica
ta, apertura arcuata.

Periv. gazoph. t. 92. f. 8.

Geoffr. test. 3.

Martin. berl. Mag. 4. p. 260. 261. t. 8. f. 21.

Schroet. Flusconch. t. 5, f. 29.

Chemn. Conch. 9. t. 127. f. 1126.

Habitat in Europæ stagnis, supra plantas, incolla griseo:
tentaculorum margine albo, testa opaca, diametri 1-2
linearum, fusca, brunea vel fusca, centro pellucida,
anfractibus 3-7 arctissime nexione.

nitida. 38. H. testa polita slavecente : supra convexa umbilicata
subtus plana perforata.

Müll. zool. dan. prodr. 2884. hist. verm. 2. p. 163.
n. 349. Planorbis nitidus.

Martin. berl. Magaz. 4. p. 262. t. 8. f. 22.

Schroet. Flusconch. t. 5. f. 27.

Habitat in fossis aquarum Daniæ, incola nigro, tentaculorum apice albo, juniori toto albo, testa politissima, diametri $\frac{1}{2}$ -3 linearum, diaphana, interiorum fusca, anfractibus 3-5, extimo interioribus simul sumitis duplo laiori, apertura cordata.

39. H. testa alba utrinque umbilicata : apertura dilatata. Müll. zool. dan. prodr. 2885. hist. ver. 2. p. 164. n. 350. Planorbis albus.

Petiv. gaz. t. 92. f. 7.

Martin. berl. Mag. 4. p. 253. t. 8. f. 23.

Schroet. Flusconch. t. 5. f. 12.

Habitat in annis Fridrichsdalensis Daniæ plantis aquaticis, incola griseo; tentaculis albis oculisque nigris, testa pellicula, diametri 1-2 linearum, supra planiuscula subtus convexa, anfractibus 4 terebribus subtilissime decussatim striatis, extimo reliquis omnibus majore, apertura larga, obliqua.

40. H. testa pellucida supra umbilicata punctis striata.

Müll. zool. dan. prodr. 2887. hist. ver. 2. p. 166. n. 352. Planorbis similis.

Martin. berl. Mag. 4. p. 265. t. 11. f. 64. B.

Habitat in fossis Berolinensibus & Daniæ Fridrichsdalensis, juniori cornea simillimus.

41. H. testa umbilicata planiuscula : apertura ovali. Mus. Lud. Ulr. 666. n. 367.*

Müll. hist. ver. 2. p. 152. n. 342. Planorbis (contrarius) testa sinistrorsa supra umbilicata: fasciis diversicoloribus.

Lift. Conch. t. 136. f. 40. Cochlea marina compressa.

Seb. mus. 3. t. 39. f. 14. 15.

Klein ostr. t. 1. f. 7.

Knorr Vergn. I. t. 2. f. 4. 5. & 2. t. 13. f. 4.

Geve Conch. p. 23. 24. t. 3. f. 9. 11.

Schroet. Flusconch. t. 9. f. 13.

Chemn. Conch. 9. t. 112. f. 952. 953.

Habitat in Sina, testa diametri 12-16 linearum, utplurimum alba, fasciis 3, 4, 5, 7, rubris nunc æqualibus nunc inæqualibus picta, dura, minutissime transversim striata, anfractibus 4 convexis, labio dilatato.

42. H. testa umbilicata convexa hispida diaphana : anfractibus quinis, apertura subrotundo-lunata. Fn. suec. 2182.*

Müll. zool. dan. prodr. 2909. hist. verm. 2. p. 71. n. 268
Helix testa subglobosa umbilicata hispidosa.
 List. an. angl. p. 125. t. 2. f. 12.
 Pet. gazoph. t. 93. f. 13.
 Ginann. op. post. 2. p. 59. t. 3. n. 21.
 Geoffr. test. II.
 Schlotterb. act. helv. 5. t. 3. f. 13.
 Martin. berl. Mag. 2. p. 607. t. 3. f. 34.
 Schroet. Erdconch. p. 186. t. 2. f. 21. a. b.
 Chemn. Conch. 9. t. 122. f. 1057. 1558.
 Habitat in Europæ campis, hortis, incola nigro,
 pellucida, setis deciduis obsita, cornea, fusca, fulva,
 flavata aut cinerascente, anfractibus 5-6.

- ampulla- 43: H. testa subumbilicata subglobosa glabra: anfractibus
 testa,
 supra ventricosioribus, umbilico subobtecto, apertura
 ovato-oblonga. Mus. Lud. Ulr. 666. n. 368.*
 Müll. hist. verm. 2. p. 172. n. 359. Nerita testa perforata
 ventricosa supra depreßa: apice obtuso, apertura larga
 List. Conch. t. 130. f. 30.
 Rumpf Conch. t. 27. f. Q.
 Pet. gaz. t. 12. f. 14.
 Gualt. test. t. I. f. R.
 Geve Conch. t. 27. f. 289. a. b. & f. 291.
 Seb. mus. 3. t. 38. f. 1-7. 58. 59.
 Knorr Vergn. 5. t. 5. f. 2.
 Fayau. Conch. t. 61. f. D⁸.
 Martin. berl. Mag. 3. t. 6. f. 68.
 Schroet. Flasconch. t. 6. f. 2. & t. 9. f. 14.
 Einl. in Verft. 4. t. 9. f. I.
 Chemn. Conch. 9. t. 128. f. 1133-1135.
 β) Müll. hist. verm. 2. p. 174. n. 360. Nerita (*Urceus*) testa
 subumbilicata ventricosa rugosa fusca, apertura effusa
 alba.
 List. Conch. t. 125. f. 25.
 Chemn. Conch. 9. t. 128. f. 1136.
 γ) Müll. hist. verm. 2. p. 175. n. 361. Nerita (effusa) testa
 umbilicata ventricosa fasciata supra depreßa, apice
 acuto, apertura effusa.
 List. Conch. t. 128. f. 28.
 Seb. mus. 3. t. 40. f. 3-5.
 Geve Conch. t. 3. f. 20.
 Chemn. Conch. 9. t. 129. f. 1144. 1145.
 δ) Argenv. Conch. t. 17. f. B.

Habitat in Asiae australis insularumque obversarum paludosis, testa nitida, diametri 8-19 linearum, β) 5 pollicum, incola eduli.

Nerita piscinalis. 44. *H. testa globosa perforata rufo-fusca.*

Müll. zool. dan. prodr. 2949. hist. verm. 2. p. 172. n. 358.
Nerita piscinalis.

Habitat frequens in horti Fridrichsdalensis Daniæ piscina; testa duriuscula, opaca, subtilissime transversim striata, fauce albida, anfractibus 4.

Pusilla. 45. *H. testa globosa virescente perforata: apertura circinata.*

Müll. hist. verm. 2. p. 171. n. 357. Nerita pusilla.

Martin. berl. Mag. 4. p. 268. t. 8. f. 26.

Habitat in lacu rupinenſi Marchiæ, piscinali affinis at testa multo minore, diametri 1 linea, columellæ labio albido.

Sphaerica. 46. *H. testa globosa cornea: vertice obtuso.*

Müll. zool. dan. prodr. 2948. hist. verm. 2. p. 170. n. 356.

Nerita sphaerica.

Habitat minus frequens in Daniæ paludosis, tentaculatae affinis, testa alba vel cinerea immaculata glabra, $\frac{2}{3}$ 2 linearum: anfractibus 4 convexis; infimo ventricoso.

Pomatia. 47. *H. testa subumbilicata subovata obtusa decolore: apertura subrotundo-lunata.*

Fn. suec. 1283.

Müll. zool. dan. prodr. 2901. hist. verm. 2. p. 43. n. 243.
Helix testa imperforata globosa rufescente, fasciis obsoletis.

Gesn. aq. p. 244. 255. Pomatia.

Aldrov. exang. 339. Cochlea terrestris gypso obserata.

Argenv. Conch. t. 28. f. 1. Pomatia.

zoomorph. t. 9. f. 4.

anim. angl. t. 2. f. 1.

exerc. anat. I. t. I. f. I-6.

Bonann. recr. p. 221. f. I. 2.

Gualt. test. t. I. f. A.

Swammerd. bibl. nat. t. 4.

Leeuwenh. contin. arc. nat. p. 25-32.

ad. angl. 1697.

Geve Conch. t. 29. f. 330-342.

Schlotterb. ad. Helv. 5. p. 276.

Martin. berl. Mag. 2. p. 530. t. I. f. I. & t. 2. f. 13.

Aaa aaa aaa aa

Schroet. Erdconch. p. 145. n. 14. 15. t. 1. f. 10.

Chemin. Conch. 9. t. 128 f. 1138. a-c.

Schaeff. Verf. mit Schnech. t. 3. f. 1-4. t. 5. f. 1-3.
6. f. 3. 4. & t. 7. f. 1. 4.

β) Gualt. test. t. 2. f. B.

γ) Müll. hist. verm. 2. p. 45. n. 244. *Helix (pomaria) testa imperforata globosa unistrorsa rufescente, fasciis obsoletis*

Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. f. 11.

Born mus. Caes. Vindob. test. t. 14. f. 21. 22.

δ) List. Conch. t. 45. f. 43.

ε) List. Conch. t. 47. f. 45.

ζ) List. Conch. t. 49. f. 47.

η) List. Conch. t. 51. f. 49.

θ) List. Conch. t. 52. f. 50.

ι) List. Conch. t. 1055. f. 2.

κ) Gualt. test. t. 1. f. D?

λ) Martin. berl. Mag. 2. t. 1. f. 7. 8.

μ) Knorr Vergn. 1. t. 21. f. 3?

ν) Chemin. Conch. 9. t. 108. f. 908-910.

ξ) Chemin. Conch. 9. t. 108. f. 911. 912.

Habitat terrestris in omni Europa, incola hinc inde educta
testam hemisphericali versus operculo calcareo claudente,^{vitreum}
tenacissimo, oviparo, testa diametri 9 $\frac{1}{2}$ -16, in vix 18
linearum, sordida, rugosa, apice glabra.

glauca. 48. H. testa umbilicata subrotunda acuminata : labro marginato, apertura ovali. Mus. Lud. Ulr. 668. n. 369.

Seb. mus. 3. t. 38. f. 8?

Knorr Vergn. 5. t. 5. f. 3.

Habitat - - - testa dilute fusca : fasciis 4 transversis obscurioribus, apertura flavicante.

citrina. 49. H. testa subumbilicata convexa obtusa flavescens : fascia fusca. Mus. Lud. Ulr. 667. n. 370.*

Müll. hist. verm. 2. p. 63. n. 260. *Helix testa perforata (imperforata) subglobosa laevi nitida : fascia diversicolore.*

List. Conch. t. 54. f. 50. & t. 60. f. 57.

Gualt. test. t. 3. f. D. E.

Argenv. Conch. t. 28. f. 10.

Seb. mus. 3. t. 39. f. 1. 2.

Knorr Vergn. 5. t. 22. f. 7.

Geve Conch. t. 26. f. 277-279. 281-283. 285.

Martin. berl. Mag. 2. p. 615. t. 4. f. 38.

v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 13. f. 14. 15. & t. 15. f. 1-10.

Favann. Conch. t. 6. f. F¹.

Murray testaceol. t. 1. f. 22.

Chemin. Conch. 9. t. 131. f. 1167-1175.

Habitat terrestris in Jamaica & Sina, testa nitida diametri 12-18 linearum, nunc sulphurea, fascia 1-2 lâcteis, vel fascia lineare purpurea lâctea superne adnata vel innata, nunc lutea, fascia basique albis, linea inferne sanguinea, nunc fulva, fascia basique albis, vel fascia sanguinea albæ innata, nunc ex rufa fusca: fascia alba vel fascia sanguinea albæ adnata, nunc ex atro fusca, fascia basique albis, nunc pallide purpurea, fascia sulphurea, nunc pallide fusca, fascia basique albis, nunc albæ, fascia 1 aut 2 sanguineis, nunc ex luteo vidente nigro punctata fascia lineaque rufis, basi alba, anfractibus 5, adultæ umbilico clauso.

50. H. testa perforata subglobosa punctis pertusa: fascia sanguinea, anfractu majore superne introrsum deflexo. Müll. hist. verm. 2. p. 67. n. 261.

Chemin. Conch. 9. t. 131. f. 1176.

Habitat - - - testa diametri 18 linearum, alba; superne lutescente.

Castanea. 51. H. testa perforata subglobosa obscure castanea: fascia rufa albæ adnata, anfractibus striatis. Müll. hist. verm. 2. p. 67. n. 262.

Chemin. Conch. 9. t. 131. f. 1177. 1178.

Habitat - - - testa pellucida, dura, crassa: anfractibus 7, apertura lunata sine labio.

Globulus. 52. H. testa globosa subumbilicata alba: labro reflexo. Müll. hist. verm. 2. p. 68. n. 264.

List. Conch. t. 44. f. 41.

Gualt. test. t. 2. f. C.

Chemin. Conch. 9. t. 130. f. 1159. 1160.

List. Conch. t. 46. f. 44.

Habitat - - - lucanæ affinis, ac testæ umbilico non distincto & vertice non depresso diversa, testa immaculata, glabra, crassiuscula, diametri 12 linearum; sepe transversim subcostata, anfractibus 5.

lactea. 237. H. testa imperforata depressa grisea lacteo-punctata: apertura fusco sanguinea, labro concolore dentato. Müll. hist. verm. 2. p. 19. n. 218.

Lift. Conch. p. 95. n. 96.

Chemin. Conch. 9. t. 130. f. 1161.

Habitat in Jamaica & Lusitania.

- incisa. 238. H. testa depressa umbilicata alba margine incisa. Chemin.
 Conch. 9. p. 129. t. 130. f. 1166.
 Favann. Conch. t. 64. f. S.
 Habitat - - -
- arbusto- 53. H. testa umbilicata convexa acuminata : apertura sub-
 rum. orbiculari bimarginata ; anterius elongata. Fn. succ.
 2184.* Mus. Lud. Ulr. 668. n. 371.*
 Müll. zool. dan. prodr. 2904. hist. verm. 2. p. 55. n.
 248. Helix testa imperforata globosa fusca, lineolis
 luteis, labro albo.
 Lift. Conch. t. 56. f. 53.
 an. angl. p. 119. t. 2. f. 4.
 Seb. mus. 3. t. 38. f. 68.
 Geve Conch. t. 30. f. 345-356.
 Martin. berl. Mag. 2. t. 3. f. 23.
 Schloßterb. að. helv. 5. t. 3. f. 12?
 Brit. zool. 4. t. 85. f. 130.
 Da Costa brit. Conch. t. 17. f. 6.
 Chemin. Conch. 9. t. 133. f. 1202.
 B) Schranck Naturf. 18. p. 72.
 Habitat in Europæ potissimum sepibus & arbustis, tressis
 diametri $9\frac{1}{2}$ linearum, fusca lineis minutissimis flavo-
 centibus, fasciaque pulla picta, juniore pellucida, an-
 fractibus $5\frac{1}{2}$, incola interdum lacertæ præda.
- fulva. 54. H. testa subimperforata globosa pellucida fulva labro
 albo. Müll. zool. dan. prodr. 2905. hist. verm. 2. p.
 56. n. 249.
 Habitat rariissima in palis humidulis & inter solia putri-
 da fragina agri Friedrichsdalensis Daniæ, incola hyalino:
 tentaculis nigris, testa glabra, diametri $\frac{1}{2}$ -3 linearum,
 subtilissime transversim striata, apertura arcuata,
 angusta, anfractibus 7.
- Epistyli- 55. H. testa subimperforata subglobosa striata candida :
 um. aufractibus septem. Müll. hist. verm. 2. p. 57. n. 250.
 Lift. Conch. t. 62. f. 60.
 Habitat - - - testa diametri 12 linearum, hyalinæ,
 subtus planiuscula lævi, apertura lunata, labro reflexo
 polito.
- cincta 56. H. testa subimperforata subglobosa alba : fasciis lat.
 broque rufis. Müll. hist. verm. 2. p. 58. n. 251.

Habitat - - - *ligatae affinis*, at *testa majore diametri 18 linearum*, *striis subtilissimis cum fasciis parallelis, anfractibus 5 distincta.*

57. H. testa subimperforata subglobosa alba : fasciis rufis ; labro albo. Müll. hist. verm. 2. p. 58. n. 252.

Gualt. test. t. 1. f. E.

Chemn. Conch. 9. t. 128. f. 1137.

Habitat in Italia, *testa diametri 14 linearum*, *fasciis 5, intus pellucentibus, anfractibus 4, apertura subovata.*

58. H. testa subimperforata subglobosa lutea : fasciis quatuor rufis maculis aibis interruptis, labro candido. Müll. hist. verm. 2. p. 59. n. 253.

Lift. Conch. t. 49. f. 47.

Argenv. Conch. t. 28. f. XI.

Pet. gaz. t. 65. f. 4.

Knorr Vergn. t. 24. f. 3.

Geve Conch. t. 30. f. 344.

Martin. berl. Mag. 2. t. 2. f. 17,

Brit. zool. 4. t. 84. f. 129.

Costa brit. Conchyl. t. 4. f. I.

Favann. Conch. t. 63. f. D². D³. D⁴.

Chemn. Conch. 9. t. 130. f. 1156-1158.

Habitat in Italia, *testa diametri 12-18 linearum, punctis minimis impressis subrugosa, rarius alba, anfractibus 4, apertura elongata.*

59. H. testa subimperforata subglobosa pallida immaculata : apertura ampla. Müll. hist. verm. 2. p. 60. n. 254.

Habitat - - - *pomatiae facie, at spira minus prominente, apertura repanda, anfractibus 4 distincta, testa diametri 16 linearum.*

60. H. testa perforata globosa candida : fasciis subinterruptis rubris, labro roseo. Müll. hist. verm. 2. p. 60. n. 255.

Pet. gaz. t. 52. f. 12.

Gualt. test. t. 2. f. E.

Schroet. Erdconch. p. 188. n. 63. t. 2. f. 22. a.

Chemn. Conch. 9. t. 132. f. 1186. 1187.

Habitat in Barbaria, Italia, & Thuringia, testa diametri 5-7½ linearum, fasciis 5-6.

- strigata. 61. H. testa perforata vertice depresso alba : fasciis lineisque pluribus rufis, labro utrinque albo. *Müll. hist. verma* 2. p. 61. n. 256.
Lift. Conch. t. 58. f. 55?
Habitat in Italia, facie h. ericetorum, testa polita, striis subarcuatis exarata, diametri 10 linearum, anfractu infimo convexo.
- nemoren-sis. 62. H. testa perforata globosa nitida alba : fasciis fuscis. *Müll. hist. verma* 2. p. 62. n. 257.
Chemin. Conch. 9. t. 129. f. 1146. 1147.
Habitat in India? nemorali affinis, at testa triplo maiore, diametri 15 linearum, crassiore, duriore, nitida, polita, paulisper in sulphureum vergente.
- zonaria. 63. H. testa umbilicata convexa depressiuscula : apertura oblongiuscula marginata.
Müll. hist. verma 2. p. 35. n. 237. *Helix testa umbilicata* depressa : apertura transversali; labro candido reflexo.
Gualt. test. t. 3. f. LL.
Seb. mus. 3. t. 40. f. 52. 53. 55.
Knorr Vergn. 5. t. 21. f. 3. 4.
da Costa brit. Conch. t. 4. f. 7.
Chemin. Conch. 9. t. 132. f. 1188. 1189.
Habitat in Barbaria & Europa, magis australi, testa diametri 11-13 linearum, nunc alba, fasciis 1, 2, 3, 4, 5 vel 6 rufis, maculis præterea interdum laetis varia, nunc cinerea fasciis 3 rufis, nunc supra pallide incarnata subius alba, fasciis albis rufisque alternis, nunc utrinque pallide incarnata, fasciis albis rufisque alternis, nunc lutea, aut fascia rufa, aut maculis obsolete albidis lineisque obscuris insignita.
- striata. 64. H. testa umbilicata subdepressa striata alba. *Müll. hist. verma* 2. p. 38. n. 238.
Schroet. Erdconch. p. 183. n. 60. t. 2. f. 20.
Habitat in Thuringia, testa diametri 6 linearum, subitus convexa, anfractibus sere 6 rotundatis, apertura lunata.
- ericetorum. 65. H. testa umbilicata depresso lutescente : fascia una vel pluribus fuscis. *Müll. hist. verma* 2. p. 33. n. 236.
Chemin. Conch. 9. t. 132. f. 1193-1195.
 α) *Gualt. test. t. 3. f. O.*
Geoffr. test. 13.
 β) *Lift. an. angl. t. 2. f. 13.*

Martin. berolin. Mag. 2. p. 613. t. 4. f. 46.

γ) *Gualt. test. t. 2. f. M.*

δ) *Gualt. test. t. 2. f. L.*

ε) *Gualt. test. t. 3. f. P.*

Habitat in Italia, testa diametri δ) 4½, γ) 5, β) 7, α)

*II linearum, fascia una, 3-4, rarius alba δ) fasciis-
que 9, vel 8.*

- nitens. 66. *H. testa umbilicata subdepressa fulvo cornea pellucida
substriata : apertura larga. Müll. zool. dan. prodr.
2893. hist. verm. 2. p. 32. n. 234.*

Petiv. gazoph. t. 93. f. 14.

Swammerd. bibl. nat. t. 8. f. 3.

Argerv. Conch. t. 28. f. 4.

Geoffr. test. 7.

Stroem. act. nidros. 3. p. 435. t. 6. f. 16.

Schroet. Erdconch. p. 201. n. 71.

Chemn. Conch. 9. t. 127. f. 1130. 1131.

*Habitat in Galliae, Germaniae, Daniae, Norwegiae mus-
cosis humidis, incola pallide cæruleo, testa nitida, dia-
metri 1-4 linearum : anfractibus 4-5, apertura lunata :
margin'e acuto.*

- costata. 67. *H. testa subdepressa umbilicata cinerea : anfractibus costatis,
apertura circulari ; labio albo reflexo. Müll. zool.
dan. prodr. 2897. hist. verm. 2. p. 31. n. 233.*

*Habitat rarissima in Dania, prope Friedrichsdal in loco
elevato, testa convexiuscula opaca, diametri 1 lineæ,
anfractibus 4 transversim plicatis.*

- pulchella. 68. *H. testa umbilicata subdepressa alba glabra : apertura
circinata, labro tereti reflexo. Müll. zool. dan. prodr.
2896. hist. verm. 2. p. 30. n. 232.*

Geoffr. test. 6.

*Habitat in Galliae & Daniae humidis muscosis frequens,
incola laetev, testa subpellucida, diametri 1 lineæ, striis
vix armato oculo conspicuis, anfractus vix 4.*

- intunda- 69. *H. testa umbilicata subdepressa : lineis transversis eleva-
ta, maculisque ferrugineis. Müll. zool. dan. prodr.
2895. hist. verm. 2. p. 29. n. 231.*

Argerv. zoomorph. t. 9. f. 10.

Geoffr. test. 9.

Schroet. Erdeqntk. p. 199. n. 69. t. 2. f. 25.

Aaa aaa aaa aa 4

Habitat in Gallia, Germania, Scandinavia, in Dantis palis putridis, truncis, muscis, vulgaris, incola albo, supra obscure punctato: capite cum tentaculis oculisque nigro, testa, alba, diametri $2\frac{1}{2}$ linearum, subtus convexa, maculis quadratis, interdum nullis, anfractibus 4-6, apertura arcuata: labio nullo.

stellaria. 70. *H. testa umbilicata depressa lutescente nitida subtus lactea: apertura larga.* Müll. zool. dan. prodr. 289⁴. hist. ver. 2. p. 28. n. 230.

Schroet. Erdconch. p. 200. n. 70. t. 2. f. 26.

Chemin. Conch. 9. t. 127. f. 1129. n. 1. 2.

Habitat in Thuringia, & copiosa in Hafniæ cellis vinariorum, incola albo, pellucido: oculo nigro, nervo optico caruleo, testa glaberrima, pellucida, diametri $3\frac{1}{2}$ linearum, subtus convexa, anfractibus 5, apertura lunata.

obvoluta. 71. *H. testa umbilicata utrinque depressa: anfractibus obvolutis.* Müll. hist. ver. 2. p. 27. n. 229.

a) *Gualt. test. t. 2. f. S.*

Schlotterb. act. helv. 5. p. 280. t. 3. f. 16.

Martin. berl. Mag. 2. t. 3. f. 37.

Schroet. Erdconch. p. 196. n. 67. t. 2. f. 24. a.

Favann. Conch. t. 63. f. F².

Chemin. Conch. 9. t. 127. f. 1128. a-c.

β) *Geoffr. test. 12.*

Schroet. Erdconch. p. 194. n. 66. t. 2. f. 24.

Habitat in Thuringia & Italia, testa diametri 4-5 linearum, labro reflexo, in α) albida, glabra, subtus convexa, subtilissime striata, anfractibus 6-7, apertura triangulari; in β) fusca, hispida, anfractibus 5-6, apertura lunari.

strigofusa. 72. *H. testa perforata subdepressa striata alba fascia rufa.* Müll. hist. ver. 2. p. 24. n. 225.

Habitat in Gallia, testa pellucida, diametri 5 linearum, subtus convexa leviuscula, anfractibus sferæ 6, labio crassifuscō albo.

radiata. 73. *H. testa perforata subdepressa striata, subtus convexa radiata.* Müll. hist. ver. 2. p. 23. n. 224.

List. Conch. t. 70. f. 69.

Petiv. gaz. t. 104. f. 1.

Gualt. test. t. 2. f. 3.

Gronov. zooph. 3. p. 331. n. 1541.

Habitat in Gallia meridionali, & Virginia, testa crassa, albo rufoque varia, intus tota alba, apertura lunata, sine labio.

74. H. testa perforata depressa candida nitida diaphana. Müll. zool. dan. prodr. 2893. hist. verm. 2. p. 23. n. 223.
Habitat rara in Daniæ musicis, testa diametri 1 linea, subitus convexa, ab incola ex fuso lutea, anfractibus 4-5.

75. H. testa umbilicata convexa: apertura marginata suborbiculata supra elongata. Mus. Lud. Ulr. 668. n. 372.*
 Müll. hist. verm. 2. p. 69. n. 265. *Helix testa globosa utrinque umbilicata luteo rufa, apertura lunata, labro reflexo albo.*

Rumpf mus. t. 27. f. R. Lapillus.

Pet. gazoph. t. I. f. 6. Planorbis indica.

Klein ostr. t. I. f. II.

Seb. mus. t. 40. f. II.

Geve Belust. t. 3. f. 15.

Born Caes. mus. Vind. ind. test. t. 15. f. II. 12.

Chemn. Conch. 9. t. 125. f. 1098. 1099.

Habitat in India, testa figura ponui, diametri 16 linearum, glabra, nitida supra depressa, subtilissime transversim striata, fauce subpurpurea, labio albo.

76. H. testa globosa umbilicata slavecente albida: anfractibus contrariis, extimo divaricato. Müll. hist. verm. 2. p. 70. n. 266.
Habitat --- testa dura, parum pellucida, diametri 19 linearum, anfractibus 5 rotundatis, insimo ventricoso, aperturæ margine acuto.

77. H. testa globosa umbilicata: apertura elabiata. Müll. zool. dan. prodr. 2908. hist. verm. 2. p. 71. n. 267.
 Schroet. Erdconch. p. 178. n. 55-59. t. 2. f. 19.
 Chemn. Conch. 9. t. 133. f. 1203.

Habitat in Thuringiæ, Daniæ fruicetis, sepibus, limace incola albo, pallido, maculato, nigricante, cinerascente vel atro: tentaculis semper nigris, testa ad nemoralem accedens, at fragiliori, diametri $7\frac{1}{2}$ linearum magis pellucente, anfractibus sex, nunc pallide lutea, punctis sparsis aureis, vel punctis maculisque nigricantibus varia, nunc sulphurea maculis punctisque nigris, aut maculis rarioribus nigris fasciaque purpurea varia, nunc lutescente punctis nigris consertis fasciaque purpurea,

*nunc fusca punctis maculisque nigris, nunc saturata
rubra, punctis maculisque nigris cum vel sine fasciis
purpurea.*

- Lucena. 78. H. testa subglobosa umbilicata subtus gibba : reflexo candido. *Müll. hist. ver. p. 75. n. 270.*
Argenv. Conch. t. 28. f. 7?
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 253. t. 4. f. 9.
Chemin. Conch. 9. t. 130. f. 1155.
*Habitat — — nemorali affinis, testa pellucida glabra
nunc tota candida, nunc supra lutea, anfractibus 5,
infinito valde convexo, apertura lunata.*
- vittata. 79. H. testa subglobosa subumbilicata alba : fasciis crebris
brunneis, vertice cæruleo, labro reflexo albido. *Müll.
hist. ver. 2. p. 76. n. 271.*
Chemin. Conch. 9. t. 132. f. 1190-1192.
*Habitat in littore Coromandel, nemorali facie, teffis
diametri 9 linearum, lignum exsiccatum cum remis
concentricis referente, opaca, anfractibus 5, apertura
ex nigro fusca labio acuto.*
- sosacea. 80. H. testa subglobosa subumbilicata incarnata transversim
striata : labro reflexo fusco. *Müll. hist. ver. 2. p. 76.
n. 272.*
*Habitat — — pomatiæ affinis, at testa maiore diametri
tri 19 linearum, ventricosa, anfractibus 5, apertura
lunata, rosea.*
- itala. 81. H. testa umbilicata convexa obtusa : anfractibus quinque
teretibus, umbilico patulo, apertura suborbiculata.
*Habitat terrestris in Europa australi, testa avellanae
magnitudine, albida : fascia fusca.*
- lusitanica. 82. H. testa umbilicato-perforata convexa obtusa : anfractibus quinque
tibus quinque teretibus flavescenti-albidis, umbilico
patulo.
Gault. test. t. 2. f. T.
Murray testaceol. t. 1. f. 1.
Favan. Catal. t. 2. f. 107.
Chemin. Conch. 9. t. 108. f. 913. 914.
B) Chemn. Conch. 10. t. 173. f. 1684. 1685.
*Habitat terrestris in Europa australi, testa magnitudine
poni minoris, unicolo.*
- mammili- 83. H. testa umbilica ovata : anfractibus tribus striatis
laris. apertura ovata apici adnata.

Argenv. Conch. t. 27. n. 6. f. 3.

Habitat in Africæ fluviis; neritæ mammillæ affinis, at testa transverse confertim subtilissime, longitudinaliter remotius striata, apertura magna.

84. *H. testa umbilicata convexa: anfractibus quinque teretibus, umbilico tenui perforato, apertura suborbiculata.*
Habitat in Europa australi, testa coloris cornei.

85. *H. testa umbilicata ovato-oblonga interne coloratiore: apertura subovata. Mus. Lud. Ulr. 669. n. 373.**
Habitat - - - testa ex ovato conica, subtilissime striata, umbilico obliquo, apertura intus alba.

86. *H. testa perforata ovato-ventricosa striata: apice costato labroque roseis, columella candida. Müll. hist. verm. 2. p. 85. n. 283.*

Chenn. Conch. 9. t. 119. f. 1020. 1021.

Habitat rarissima in India, oblongæ affinis, testa crassa, ultra 4 pollices longa, lutea: claviculis roseis, anfractibus sex, apertura ovali.

87. *H. testa perforata ovato-oblonga striata: labro columellaque roseis. Müll. hist. verm. 2. p. 86. n. 284.*

List. Conch. t. 23. f. 21.

Seb. mus. 3. t. 71. f. 17-20.

Walch Naturf. 12. t. I. f. 1-3.

Born mus. Cœf. Wind. test. t. 15. f. 21. 22.

Chenn. Conch. 9. t. 119. f. 1022. 1023.

Habitat - - - testa crassiuscula pellucida, pallida vel ex albo lutescente 3 pollices & 5 lineas longa, anfractibus 6, apertura ovali, fauce albida.

88. *H. testa perforata oblonga alba: fasciis longitudinalibus rufis, columella reflexa recta. Müll. hist. verm. 2. p. 87. n. 285.*

Adans. Seneg. I. p. 14. t. I. f. I.

Martin. berl. Mag. 3. p. 119. t. 5. f. 49.

Chenn. Conch. 9. t. 119. f. 1024. 1025.

Habitat in Guinea, testa tenera, pellucida, glabra, undulatin fasciata, 18-28 lineas longa, anfractibus 8-9 æqualiter decrescentibus, labro candido nitido, fauce cœrulecente.

89. *H. testa trochiformi alba: fasciis rufis, apertura transversa ampla, labro subreflexo, Müll. hist. verm. 2. p. 80. n. 277.*

Chemn. Conch. 9. t. 112. f. 1046-1048.

Habitat - - - testa pellucida glabra, 15 lineas longissimas fasciis 3-5, anfractibus 5 similiter fasciatis numero 5-6 riabili; an hujus tribus? an eadem cum pileata?

aculeata. 90. *H. testa trochiformi umbilicata utrinque convexa* ^{fusca} *costis aculeatis, labro albido.* *Müll. zool. dan. prud.* 2911. *hist. verm.* 2. p. 81. n. 279. *Naturf.* 19. p. 167. t. 2. f. I. II. III.

Chemn. Conch. 9. t. 133. f. 1209.

Habitat rara in Daniae ramusculis saginis aridis, insulae hyalino: capite cum tentaculis nigricante, testa subpunctata lucida, diametri $\frac{3}{4}$ lineae, anfractibus 4 rotundatis: costis albidis in singulis 28-30, apertura subcircinata: labro subreflexo membranaceo.

Volvulus. 91. *H. testa trochiformi umbilicata acuminata variegata: apertura circinata, labro reflexo.* *Müll. hist. verm.* 2. p. 82. n. 280.

Lift. Conch. t. 50. f. 48.

Petiv. gazoph. t. 77. f. 6.

Seb. mus. 3. t. 40. f. 18. 19.

Chemn. Conch. 9. t. 123. f. 1064-1066.

Habitat - - - testa glabra substriata nitida, anfractibus $5\frac{1}{2}$ maxime convexis protuberantibus, diametri $11\frac{1}{2}$ - 22 linearum, luteo rufoque varia subtus alba, ^{lineis} interdum concentricis obsoletis, aliquando rufo ^{luteo} que varia: fascia lata saturiori.

Involva- 92. *H. testa trochiformi umbilicata acuminata alba: lutea: spiralis convexus, apertura circinata, labro reflexo.* *Müll. hist. verm.* 2. p. 84. n. 281.

Lift. Conch. t. 75. f. 75.

Seb. mus. 3. t. 40. f. 56-58. 61. 63. 64.

v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 14. f. 23. 24. *Habitat* - - - volvulo affinis, at testa minus nitida:

diametri 13. linearum striis subtilissimis longitudinalibus exarata, labro minus reflexo crassaque, fascia interdum maculisque rufis varia.

neritina. 93 *H. testa glabra duriuscula umbilicata spadicea albo fasciata: anfractibus infra planis, apertura ovato-oblonga.* *Kaemmerer Conch. Rudolst.* p. 185. n. 2. t. II. f. 7. *Habitat* - - - testa parum ultra pollicem longa, ^{angustata} *pullaceae affini.*

169. H. testa umbilicata rotundata tenui : apertura semi-lunari.

Lift. an. angl. t. 2. f. 12.

Schlotterb. act. Helv. 5. t. 3. A. f. 13.

Martin. berl. Mag. 2. t. 3. f. 34.

Habitat in Helvetiae, Germaniae, Angliae, silvis, tur-turum esca gratissima, nemorali affinis, ut mucrone testae magis obtuso, testa grisea, achatina, rubella aut alba : limbo albo vel fuscō.

170. H. testa umbilicata depresso-fuscula flava : apertura com-pressa, anfractu primo ex terete planiusculo.

Gualt. test. t. 3. f. G.

Habitat in Florentiae olivetis.

171. H. testa umbilicata subglobosa lævi supra depresso : apertura lunari.

v. *Born mus. Caes. Vind. test. t. 15. f. 11. 12. Helix unguilina.*

Habitat - - - testa spadicea, pollicem alta, & no-vem lineas ultra pollicem lata.

172. H. testa subumbilicata lævi albida fusco-fasciata : an-fractibus convexis, apertura lunata.

v. *Born mus. Caes. Vind. test. t. 16. f. 1. 2.*

Habitat - - - testa 10 lineas alta, & 2 lineas ul-tra pollicem lata.

173. H. testa subumbilicata conica alba spadiceo fasciata : apertura semilunari.

v. *Born mus. Caes. Vindob. test. t. 16. f. 11. 12. Helix Pileus.*

Habitat - - - testa apice obtuso.

174. H. testa rotundata subumbilicata tenui : apertura semi-lunari. *Schroet. Erdconch. t. 1. f. 11.*

β) *Schroet. Flusconch. t. 6. f. 14?*

Habitat in Thuringia, testa subfuscā, alba, margaritacea aut cerea sēpius fasciata.

175. H. testa umbilicata : spira obtuse mucronata ; anfractu primo maximo, reliquis sensim decrescentibus, apertura semilunari marginata. *Schroet. Erdconch. t. 2. f. 19.*

Habitat - - - testa alba, incarnata, aut achatina: anfractibus 6.

176. H. testa rotundata umbilicata tenui nitida alba, apertura seminulari. *Schroet. Erdconch. t. 2. f. 20.*

Habitat - - - terrestri officinis, at testa minore
viore, magis rotundata.

- media. 177. H. testa utrinque plana umbilicata: anfractibus primo tereti, apertura suborbiculari.
Schroet. Erdconch. t. 2. f. 22. 22. a.
Einl. in Conch. 2. p. 241. t. 4. f. 8.
Habitat in Germania, testa varice magnitudinis, interdum fusco fasciata.

- tenella. 178. H. testa umbilicata tenerima plana nitida supra co²
vexa: apertura semilunari compressa.
Schroet. Erdconch. t. 2. f. 26.
*Habitat - - - terrestris, anfractibus 5 contingit,
testa alba, testacea, cornea, vel margaritacea.*

- trepuscu- 179. H. testa umbilicata depressa alba: anfractibus sex ter-
laris. tibus; tertio quartoque fuscis, extimo apice rubello,
apertura seminulari lævi.
Martin. n. Mannigf. 4. p. 422. t. 3. f. 20. 21.
Habitat ad Guineæ littora, testa solida: spira subpyramidalis.

- hyalina. 180. H. testa umbilicata pellucida supra plana dilute fulce-
subtus hemisphærice alba: anfractibus contrariis.
Martin. n. Mannigf. 4. p. 423. t. 3. f. 22. 23.
 $\beta)$ Martin. n. Mannigf. 4. p. 424. t. 3. f. 24.
Chemn. Conch. 9. t. 109. f. 921. 922.
*Habitat terrestris in Guineæ littore, nonne potius secundum
dæ tribui accensenda?*

- Avellana. 181. H. testa subumbilicata obtuse subtrigona aspera plicata
intus argentea: apertura lævi auriculaia, anfractibus primo circulo elevato.
Spengler Besch. berl. Naturf. I. p. 395. t. 9. f. 4.
Chemn. Conch. 5. t. 188. f. 1919. 1920.
*Habitat in Oceano australi, testa avellanæ magnitudine
& colore, labio tamen albo; nonne potius ad nerites
referenda?*

- rufescens. 182. H. testa inflata subumbilicata fragili: anfractibus quinque;
primo maximo subcomprelio, reliquis convexis, apertura semilunari.

Schroet. Flusconch. t. 5. f. 35.
*Habitat Hamburgi in flaviis, testa diametri 6 linearum
rufescente: fascia spadicea.*

- pervia. 183. H. testa umbilicata obtuse subpyramidalis: anfractibus quatuor convexis, primo circulo elevato reliquis convexis cinctis, apertura semilunari.

Schroet. Flusconch. t. 6. f. 10.

Habitat in - - - fluviis, testa minuta.

184. *H. testa umbilicata oblonga : anfractibus teretibus laevis, apertura orbiculari.*

Schroet. Flusconch. t. 6. f. 12.

Habitat in - - - fluviis, perviae affinis.

185. *H. testa umbilicata pellucida : anfractibus tribus canaliculo discretis, apertura orbiculari non marginata.*

Schroet. Flusconch. t. 6. f. 11.

Habitat rara Argentorati & Lutetiis aquatica, incola praeter 2 tentacula cristam erigente, testa latissima, minus alta, obscura.

186. *H. testa umbilicata depressa supra subconcava : anfractu primo villoso plano, apertura triangulari marginata.*

Gualt. test. t. 2. f. 5.

Schlotterb. act. Helv. 5. t. 3. A. f. 16.

Martin. berl. Mag. 2. t. 3. f. 37.

Schroet. Erdconch. t. 2. f. 24. & 24. a.

Habitat in Gallia, Helvetia, Thuringia, testa diametri semipollucaris fusca, anfractibus 6, aperturæ margine intus rufescente vel albo.

187. *H. testa tenui fragili alba umbilicata alba dilutius fasciata : anfractu primo tereti inflato, apertura suborbiculari non marginata.*

Schroet. Flusconch. t. 5. f. 28.

Habitat Hamburgi in aquis, testa diametri fere $\frac{1}{4}$ pollicis, fasciis 8, anfractibus 6.

188. *H. testa umbilicata pellucida cornea transversim striata convexa : anfractibus sex sensim decrescentibus, apertura semilunari.*

Schroet. Flusconch. t. 5. f. 32.

Habitat - - - testa diametri 4-5 linearum.

226. *H. testa cartilagineo-cornea lutescente subpellucide gibba : spira simplici striis circularibus exarata.*

Pall. nov. act. Petrop. 2. p. 243. t. 7. f. 31-33.

Habitat in insulis Kurilibus, spira intus calcarea crux obducta.

227. *H. testa depresso umbilicata labro vendidissimo.*

Chenn. Conch. 9. p. 104. t. 127. f. 1132. 1133.

β) *Chenn. Conch. 9. p. 85. t. 109. f. 317. 318.*

Habitat in Senegalia, ramis foliisque arborum adhaerens.

elegans. 229. *H. testa pyramidali alba umbilicata : anfractibus acutis planiusculis marginatis.* *Chemn. Conch.* 9. t. 122. f. 1045. a-c.

Lift. Conch. t. 61. f. 58.

Pettiv. gaz. t. 22. f. 10.

Favann. Conch. t. 64. f. O.

Habitat terrestris in Barbaria & australi Europa.

Cookia- 230. *H. testa pyramidali lævi alba obtusa : basi imperforata convexa.* *Chemn. Conch.* 9. t. 122. f. 1049. 1050.

Habitat in insulis maris australis.

bidentata. 231. *H. testa pyramidali subcarinata fasciata subtilissime striata, labro bidentato reflexo.* *Chemn. Conch.* 9. t. 122. f. 1052. a. β.

Habitat in horto botanico Argentoratensi.

Turbo. 232. *H. testa pyramidali subimperforata luteo rufoque varia-*
ta. *Chemn. Conch.* 9. t. 122. f. 1059.

Habitat in Coromandel.

trifascia- 247. *H. testa conico-ovata alba : anfractu primo fasciis tribus fuscentibus, apertura similiari : labro dilatato albo.*
Chemn. Conch. 9. p. 155. t. 134. f. 1215.

Lift. Conch. t. 33. f. 31.

Habitat terrestris in Tranquebaria.

Bontia. 248. *H. testa conica ventricosa perforata pellucida apice nigra : anfractu primo fasciis tribus flavescentibus, apertura ovata.* *Chemn. Conch.* 9. p. 156. t. 134. f. 1216. 1217.

Favann. Conch. t. 56. f. L?

Habitat in Bengala, testa fragilissima.

trochoi- 249. *H. testa trochiformi perforata nitida, longitudinaliter des. striata : anfractibus contrariis ; primo carinato, apertura angulata, columella brunnea.* *Chemn. Conch.* 10. p. 369. t. 173. f. 1686. 1687.

Habitat - - -

**** Rotundatae imperforatae.

perversa. 94. *H. testa subumbilicata ovato-oblonga contraria sulphurea.* *Mus. Lud. Ulr.* 699. n. 374.

Müll. hist. verm. 2. p. 90. n. 288. *Helix testa conica sulphurea sinistrorsa : labro albo reflexo.*

Argenv. Conch. 1. t. 9. f. G. Unique.

Grew. mus. t. 10. f. 9.

Petiv.

Petiv. gaz. t. 76. f. 5.

List. Conch. t. 9. f. 4. t. 34. f. 33. & t. 35. f. 34.

Bonann. recr. 3. f. 116?

muf. Kircher. 3. f. 116? 401.

Gualt. test. t. 5. f. O. P.

Seb. mus. 3. t. 40. f. 37.

Knorr delic. t. B. II. f. 6.

Knorr Vergn. I. t. 16. f. 5. 4. t. 5. f. 1. & t. 28. f. 4!
5. & 5. t. 23. f. 4. 5.

Martin. berl. Mag. 3. t. 5. f. 50.

neue Mannigf. 4. p. 406. t. 1. f. 6-9. & t. 2. f. 10-13.

Schroet. Flusconch. t. 10. min. A. f. 2. 3.

Einl. in Conch. 2. p. 153. t. 4. f. 4.

Chemin. Conch. 9. t. 110. f. 928. 929.

8) Chemin. Conch. 9. t. 110. f. 930. 931. 934-935.

2) Chemn. Conch. 9. t. 110. f. 932. 933.

3) Chemn. Conch. 9. t. 110. f. 936. 937.

4) Chemn. Conch. 9. t. 112. f. 950. 951.

C) Kaemmerer Cab. Rudolst. p. 125. t. 10. f. 3.

Habitat terrestris in India, testa 18-24 lineas longa;
nunc tota sulphurea, nunc maculis diversicoloris &
ambitus, nunc macula viridi fascia que rufa, nunc striga
obliqua saturate fusca varia, aliquando candida, ma-
cula rubra aut pluribus diversi coloris notata, anfrac-
tibus 6-8, labro crasso.

95. H. testa conica flava : labro reflexo albo. Müll hist.
verm. 2. p. 89. n. 287.

Petiv. gazoph. t. 44. f. 7.

List. Conch. t. 10. f. 5?

Martin. berl. Mag. t. 5. f. 49?

Chemin. Conch. 9. t. 134. f. 1210-1212.

Habitat - - spiræ anfractibus non contrariis a per-
versa distincta, an distincta species? testa glabra, an-
fractibus 6-7, apertura ovata, nunc citrina unicolore,
fauce albissima, nunc sulphurea, striga obliqua saturate
fusca, fauce pariter nivea, nunc alba varie maculosa,
fauce cærulescente, 18½-22 lineas longa.

96. H. testa conica subacuminata albida : strigis & facia
rufis, labro reflexo. Müll. hist. verm. 2. p. 93. n. 289.
Habitat - - inversæ similis, at anfractibus non con-
trariis 7, strigis paucioribus, testa 2 pollices & 5 li-
neas longa.

- inversa. 97. *H. testa conico-acuminata contraria albida : strigis fascia rufis, labro reflexo.* Müll. hist. verm. 2, p. 97 n. 290.
Gualt. Conch. t. 5. f. O.
Petiv. gaz. t. 76. f. 5.
Geve Conch. t. 10.
Lift. Conch. t. 36. f. 35?
Chern. Conch. 9. t. 110. f. 925. 926.
Habitat ad insulas S. Mauritii & Bourboniam, pollices & 4 lineas longa, anfractibus 8 oblique striatis, apertura ovata labioque albis.
- interrup- 98. *H. testa conico-acuminata alba : strigis fulvis, labro reflexo.* Müll. hist. verm. 2, p. 94 n. 291.
ta.
Chern. Conch. 9. t. 134. f. 1213. 1214.
Habitat - - - dextræ similis, at testa longiore, 22 lineas longa, angustiore, anfractibus 7, lineis transversis 15 supra fulvis, subtus rufis, medio obsoletis un-
- contraria. 99. *H. testa conico-acuminata contraria alba : strigis fulvis, dulatis fuscis interruptis, labro reflexo.* Müll. hist. verm. 2, p. 95 n. 292.
Swammerd. bibl. nat. t. 7. f. II.
Chern. Conch. 9. t. 111. f. 938. 939.
Habitat rarissima - - - testa nitida, 15 lineas longe apice summo nigra, apertura ovata strigis pellucentibus varia.
- læva. 100. *H. testa subcylindrica glabra contraria fasciata subreflexo, columella flava.* Müll. hist. verm. 2, p. 97 n. 293.
Lift. Conch. t. 33. f. 31.
Gualt. test. t. 4. f. M?
Knorr Vergn. 6. t. 29. f. 3.
Favann. Conch. t. 65. I. A³.
Chern. Conch. 9. t. 111. f. 940-949.
Habitat rarissima - - - testa candida 12-16 lineas longa, fasciis 2-6 ex ruso fuscis, aperturæ quoque longitudinaliter exarata : spira contraria hemisphærica.
- arenaria. 228. *H. testa albida nitente striis tenerimis longitudinaliter exarata : spira contraria hemisphærica.*
Spengl. nov. act. soc. dan. I. t. 1. f. 6.
Chern. Conch. 9. t. 113. f. 972. 973.
Habitat in arena littoris Ariminensis, minima.
- jamaicensis. 234. *H. testa globo- Brunnea albo fasciata, labro fimbriatus, candido, vortice obtuso.* Chern. Conch. 9. t. 129. 1140. 1141.

Lift. Conch. t. 42. 43. f. 43.
Knorr Vergn. I. t. 21. f. 3.
Favann. Conch. t. 63. f. M.
Habitat in Jamaica.

239. *H. testa subglobosa depressa basi concava : apertura lunata.* *Chemn. Conch.* 9. p. 136. t. 137. f. 1179. 1180.
Habitat in insula Rhodo.

101. *H. testa oblonga polita candida : apertura edentula, labro dilatato.* *Müll. hist. verm.* 2. p. 96. n. 294.
Gualt. test. t. 4. f. R?
Chemn. Conch. 9. t. 135. f. 1234?
Habitat in India, testa diaphana II lineas longa, anfractibus 8, apertura ovata, labri margine sublacerio.

102. *H. testa oblonga rugulosa rosea : apertura edentula, labro dilatato candido.* *Müll. hist. verm.* 2. p. 97. n. 295.
Chemn. Conch. 9. t. 121. f. 1042.
Habitat - - - testa nitida, 20 lineas longa : fauce alba; apertura ovato-oblonga, labro adnato ex roseo flavescente, anfractibus vix 6.

103. *H. testa subimperforata subrotunda obtusa diaphana fragilissima : apertura posterius dilatata ; labro emarginato.* *Mus. Lüd. Ulr.* 670. n. 375.*
Ad. angl. 301. p. 2051. *Cochlea colore speciosior.*

Brown jam. 399. t. 39. f. 1. *Cochlea purpurea tenuis, ore ampliore.*

Sloan. jam. t. 1. f. 4. & t. 572. f. 23.

Column. aq. 23. t. 22.

purp. t. 13. f. 2.

Lift. Conch. t. 572. f. 24.

Rumpf. mus. t. 20. f. 2.

Gualt. test. t. 64. f. O.

Argenv. Conch. t. 6. f. S.

Knorr Vergn. 2. t. 30. f. 2. 3.

Chemn. Conch. 5. t. 166. f. 1577. 1578.

Schroet. inn. Bau Coneh. t. 3. f. 1.

Habitat in pelago, mari atlantico, mediterraneo, aliisque Europæ, Africæ, Americæ, incola vivo sanie violacea vel purpurea manum vel levissime contrectantem insiciente, noctu lucente, testa violacea, ad pollicem usque lata & alta, apertura subtriangulari.

gigantea. 104. H. testa imperforata subrotunda solida : spira deprellata
Scopol. del. insubr. p. 66. t. 25. f. A.
Habitat -- testa maxima, lœvi, alba, intus ^{fuscescens} contiguis ne
cente, spira flavescente, anfractibus 6 striatis; primitus intus badio, labio marginato.

vivipara. 105. H. testa imperforata subovata obtusa cornea : cingulata
fuscatis, apertura suborbiculari. Fn. suec. 2185.
Müll. hist. verm. 2. p. 182. n. 370. Nerita testa ovata
ventricosa virescente : fasciis tribus lividis obcurvis.
Lift. Conch. t. 126. f. 26. & tab. anat. 6.
animi. angl. t. 2. f. 18.
exerc. anat. 2. t. 2. f. 5. 12.

Pet. gaz. t. 99. f. 16.
Swammerd. bibl. nat. p. 73-78. t. 9. f. 5-13.

Gualt. test. t. 5. f. A.

Ginann. op. post. 2. p. 49. t. 2. f. 8.

Argenv. zoolmorph. t. 8. f. 2.

Frisch ins. 13. t. I.

Seb. mis. 3. t. 38. f. 12. & t. 39. f. 33. 34.

Knorr Vergn. 5. t. 17. f. 4.

Martin. berl. Mag. 4. p. 234-242. t. 7. f. 4-9.
Schroet. Flusconch. t. 8. f. 1. 2. & t. 11. min. 6. f. 6

β) Lift. Conch. t. 1055. f. 6?

Brit. zool. t. 84. f. 132.

da Costa brit. Conch. t. 5. f. 2.

Favann. Conchyl. t. 61. f. D⁹.

Chemn. Conch. 9. t. 132. f. 1182-1183.

Habitat in Europæ (neque tamen in Daniæ) aquis dampnibus, potissimum stagnantibus, vivipara, testa ad digitum pollicem longa, tenera, pellucida, glabra, subtilissime longitudinaliter striata, in juniori setis crystallinis orificiis ut plurimum fasciata, fauce albida vel cœruleofuscata, anfractibus 5-6. valde convexis.

fasciata. 106. H. testa ovato-ventricosa alba : fasciis tribus rubris splendidis.

Müll. hist. verm. 2. p. 182. n. 369. Nerita fasciata.

Gualt. test. t. 5. f. M.

Ginann. op. post. 2. p. 49. t. 1. f. 6.

Habitat in Thuringia & Italia, testa pellucida, anfractu glabri 9½-15 lineas longa : fasciis in primo anfractu altero 2, spira acuta, anfractibus 5, fauce ex 3, cœruleofuscata.

- 107. H. testa subovato-acuminata luteo-albescente : labto-nigro.*
Mull. hist. verm. 2. p. 184. n. 371. Nerita dissimilis.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 253. t. 4. f. 10.
*Habitat Tranquebariax inter viviparam & tentaculatam
quasi media, testa pellucida, glabra, anfractibus 6,
operculo pellucido, nitido, ex luteo fusco.*
- 108. H. testa imperforata subrotunda lævi diaphana fasciata,
apertura subrotundo-lunata. Fn. suec. 2 186. It. oel. 127.*
Müll. zool. dan. prodr. 2902. hist. verm. 2. p. 46. n. 246.
Helix testa imperforata globosa, labro fusco.
List. Conch. t. 57. f. 54.
anim. angl. t. 2. f. 3.
exercit. anat. t. 5. f. 1-3.
Swamnieri. bibl. nat. t. 8. f. 6.
Argenv. Conch. t. 28. f. 8.
zoomorph. t. 9. f. 5.
Lesser testaceoth. p. 88. n. 1.
Geve Conch. t. 32. f. 391-411.
Groffr. test. 3.
Schaeffer Vers. m. Schneck. t. 2. f. 4-6. t. 4. f. 4. & t. 6. f. 1. 2.
Favann. Conch. t. 63. f. H.
Chemn. Conch. 9. t. 132. f. 1196-1198.
- $\alpha)$ Petiv. gazoph. t. 92. f. 10.
 $\beta)$ Gualt. test. t. 2. f. A.
 $\gamma)$ Gualt. test. t. 1. f. P.
 $\delta)$ Petiv. gazoph. t. 92. f. 9.
 $\epsilon)$ Petiv. gazoph. t. 91. f. 11.
 $\zeta)$ Petiv. gazoph. t. 91. f. 12.
 $\eta)$ List. anim. angl. p. 117. n. 1. 2.
 Pet. gazoph. t. 91. f. 9.
Geve Conch. t. 32. f. 399.
 $\vartheta)$ Gualt. test. t. 2. f. D.
List. anini. angl. p. 117. n. 3. 4.
 Petiv. gazoph. t. 91. f. 10.
Seb. mus. 3. t. 38. f. 18.
Geve Conch. t. 32. f. 403.
Schroet. Erdconch. t. 1. f. 13. & t. 2. f. 28.
- $\iota)$ Geve Conch. t. 32. f. 402.
 $\kappa)$ Geve Conch. t. 32. f. 401. & 411.
 $\lambda)$ Schroet. Erdconch. t. 1. f. 14. & t. 2. f. 29.
Geve Conch. t. 32. f. 410.
Schlotterb. act. Helv. 5. t. 3. f. 6.
Martin. berl. Mag. 2. t. 3. f. 25.

- μ) List. an. angl. p. 117. n. 5. 6.
Seb. mus. 3. t. 39. f. 19.
 ν) Geve Conch. t. 32. f. 397.
Mart. berl. Mag. 2. t. 3. f. 26.
Schroet. Erdconch. t. 1. f. 15. & t. 2. f. 30.
 ξ) Geve Conch. t. 32. f. 409.
 ο) Geve Conch. t. 32. f. 396.
 π) Schlotterb. acē. *Helv. 5. t. 3. f. 2. 3.*
Martin. berl. Mag. 2. t. 3. f. 27-29.
 ρ) List. an. angl. p. 117. n. 9.
Geve Conch. t. 32. f. 408.
*Schlotterb. acē. *Helv. 5. t. 3. f. 9.**
Martin. berl. Mag. 2. t. 3. f. 30.
Schroet. Erdconch. t. 1. f. 16.
 σ) List. anim. angl. p. 117. n. 7.
Gualt. test. t. 2. f. F.
Seb. mus. 3. t. 39. f. 12.
*Schlotterb. acē. *Helv. 5. t. 3. f. 10.**
Martin. berl. Mag. 2. t. 3. f. 31. 32.
Schroet. Erdconch. t. 1. f. 17.
 τ) Argeny. Conch. t. 28. f. 8.
 υ) List. Conch. t. 55. f. 51.
Klein ostr. t. 1. f. 28.
 φ) List. Conch. t. 58. f. 55.
 χ) List. Conch. t. 71. f. AA?
 ψ) List. Conch. t. 574. f. 20.
Klein ostr. t. 1. f. 4.
 α) List. Conch. t. 574. f. 27.
Klein ostr. t. 1. f. 5.
 αα) List. Conch. t. 1655. f. 3.
 ββ) Gualt. test. t. 1. f. N.
 γγ) Seb. mus. 3. t. 40. f. 35.
 δδ) Schroet. Erdconch. t. 1. f. 12.
 εε) Schroet. Erdconch. t. 2. f. 18.
 ζζ) Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 4. f. 12.
 ηη) Chemn. Conch. 9. t. 109. f. 924.

Habitat vulgatissima in Europæ arboribus, varietate, ^{fere} incolæ sive testæ colorem & picturam species, innumera, incola hinc inde eduli albo, cinereo, nigro vel luteo, testa diametri 9-11 linearum, rufa vel lutea, rarius badius, incarnata, vel albida, rarissime unicolor, crebrius fascia vel fasciis 2, 3, 4, 5 magis minusve latis, aquatinibus aut inæqualibus, pallidis, fuscis, lutescentibus, incarnatis, sanguineis, rarius albis, arfractibus 5.

109. H. testa imperforata globosa : labro albo. Müll. zool. dan. prodr. 2903. hist. verm. 2. p. 52. n. 247.
Chemn. Conch. 9. t. 133. f. 1199-1201.
Geve Conch. t. 30. f. 357-367 & t. 31. f. 368-390.
a) Mus. Lud. Ulr. 670. n. 376.* *Helix major magis grisea*,
labris albis.
It. wgoth. p. 84. *Cochlea testa pellucida*.
Geve Conch. t. 31. f. 381. 382.
b) List. anim. angl. p. 117. n. 1.
Geve Conch. t. 31. f. 368. 370.
Schroet. Erdconch. t. 2. f. 27.
c) Geve Conch. t. 30. f. 367. & t. 31. f. 380.
d) Geve Conch. t. 31. f. 388.
e) Geve Conch. t. 33. f. 366.
f) Geve Conch. t. 31. f. 387.
g) Geve Conch. t. 31. f. 374.
h) Gualt. test. t. 1. f. M?

*Habitat in Europæ hortis, nemorali tamen rarer, an
vere distincta ab hac species? testa minore diametri
7½-8 linearum discrepat, testa nunc tota albida, nunc
tota flava, nunc lutea, vel maculis linearibus obscuris,
vel maculis punctisque nigris, vel fascia fasciisve 2,
3, 4, 5 fuscis, ut plurimum inæqualibus picta.*

110. H. testa imperforata subrotunda lævi fasciata : aper-
tura oblonga fusca.

- Müll. hist. verm. 2. p. 46. n. 245? *Helix testa imperforata rotundata alba, fasciis strigisque rufis, labro fusco*.
List. Conch. t. 1058. f. 1.
Gualt. test. t. 1. f. C.
Habitat in Europa, potissimum australi, nemorali affinis;
at testa majore alba.

111. H. testa imperforata subovata obtusa grisea : fasciis
duabus pallidis, apertura oblongiuscula.

Gualt. test. t. 1. f. B?

Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 4. f. 7.

Knorr Vergn. 4. t. 27. f. 3.

Chemin. Conch. 9. t. 130. f. 1156-1158.

*Habitat terrestris in Europa, præsertim australi, teste
in Suecia triplo minori, pomatiæ affinis.*

- 112 H. testa imperforata subrotunda fusca : fascia longi-
tudinali alba, apertura purpurea. Mus. Lud. Ulr.
671. n. 377.*

Müll. hist. verm. 2. p. 78. n. 274. Helix testa imperforata trochiformi castanea : fascia alba, apertura ovali, labro reflexo sanguineo.

Bonann. mus. Kirch. 3. f. 364.

Seb. mus. 3. t. 40. f. 6. 7.

Geve Conch. t. 28. f. 328. 329.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 160. t. 4. f. 5. 6.

Chemin. Conch. 9. t. 130. f. 1050-1054.

Habitat terrestris in insula Zeylon, testa ad $1\frac{1}{2}$ pollicem lata, & perinde fere alta, intus alba, obtusa, anfractibus 5 teretibus, primo reliquis duplo majore, extimis rubellis.

pulla. 113. H. testa imperforata subovata fusca fasciata : apertura obliqua marginata albicante.

Lift. Conch. t. 42. 43.

Knorr Vergn. 1. t. 21. f. 3.

Habitat - . - pomatiæ affinis, at testa majoræ 2 pollices lata, $1\frac{1}{2}$ alta obtusa, anfractibus 4.

venusta. 114. H. testa imperforata subovata sulphurea : fascia alba rubro-marginata, labro reflexo marginato.

Kaemmer. Conch. Rudolst. p. 176 t. 11. f. 4. 5. 8¹

Habitat - - - pullæ affinis, testa 10 lineas lata, $\frac{8}{3}$ alta, tenui, levi, intus albida, anfractibus 4.

picta. 189. H. testa imperforata subglobosa glabra : anfractibus quatuor teretibus; primo ventricoso, reliquis depresso, apertura lunari.

v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 15. f. 17. 18. ind. 1. p. 397.

Chemin. Conch. 9. t. 130. f. 1162-1165.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 5.

Knorr Vergn. 1. t. 10. f. 2.

Habitat in Italia, testa nunc dilute cinerea, columella lineaque transversa ad suturam fuscis, nunc rosea, columella lineaque ad suturam transversa fuscis, nunc sulphurea ; columella fusca, lineisque ad anfractuum marginem rubris.

variega- 190. H. testa imperforata subovata subepidermide fuscescente ta. fasciata apertura intus alba.

Knorr Vergn. 4. t. 27. f. 3.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 230. t. 4. f. 7.

Habitat in Italia, in horto medico Argentinensi quoque reperta, testa nunc fusca albo radiata fasciisque stropicatis albo maculatis picta, nunc ex rufescente exalbida

fasciis 4 fuscis albo undulatis, aliisque 2 ad anfractum secundum angustioribus albo maculatis.

191. *H. testa imperforata solida ovata lœvi : anfractibus sex teretibus contiguis, columella incrassata.*

*v. Born mus. Caes. Vindob. t. 13. f. 18. 19. ind. 1. p. 408.
Habitat - - - testa 3 lineas ultra pollicem longa
rosea lineis interruptis tenuissimis rubris albisque p.cta.*

192. *H. testa imperforata subglobosa longitudinaliter subtilissime striata; anfractibus tribus; primo ventricoso, apertura lunari, columella spirali*

Chern. Conch. 9. t. p. 133 f. 1204. 1205.

*v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 15 f. 19 20. ind. 1. p. 399.
Habitat - - - testa fusca.*

193. *H. testa imperforata subrotunda transversim striata : anfractibus teretibus; primo ventricoso, apertura ovata.*

*v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 16. f. 9. 10. ind.
1. p. 398. 399.*

*Habitat - - - testa pomatiæ magnitudine, nivea,
lineis transversis parallelis fuscis fasciisque intermediis
croceis roseisque, columella rosea.*

194. *H. testa imperforata ovata : anfractibus sex planiusculis contiguis, apertura i. quali quinquedentata.*

Adans. Seneg. I. t. I. Pictin.

Habitat in Senegal, testa 3 lineas longa, dilute fulva, aut exalbida; spiræ anfractu primo reliquis multo majore.

255. *H. testa imperforata ovata glauca transversim striata : cingulis atris, apertura sinuosa. Martyn univ. Conch.*

2. t. 67. fig. exter.

Habitat in Tahiti.

256. *H. testa ovata imperforata lœvi rubra : apertura lutea.*

Martyn univ. Conch. 2. t. 68. f. ext.

Habitat in nova Seelandia.

* * * * * *Turritæ.*

115. *H. testa imperforata turrita : spira mutilato-truncata, apertura obovata. Mus. Lud. Ulr. 671. n. 378.**

*Müll. hist. verm. 2. p. 114. n. 314. Helix testa turrita
alba, vertice truncato, apertura edentula.*

Lift. Conch. t. 17. f. 12. & t. 18. f. 13.

- Petiv. gazoph.* t. 66. f. 1.
Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 56.
Gualt. test. t. 4. f. O. P. Q.
Ginann. op. post. 2. p. 39. t. 3. n. 22.
Knorr Vergn. 6. t. 32. f. 3.
Martin. berl. Samml. 7. t. 1. f. 6. 7.
Murray testaceol. t. 1. f. 3.
Argenv. Conch. t. 27. f. 5.
Fayann. Conch. t. 65. f. B⁸.
Chemn. Conch. 9. t. 136. f. 1254. 1255.
 β) v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 16. f. 13? *Helix calcarea*
Chemn. Conch. 9. t. 135. f. 1226.
Lift. Conch. t. 14. f. 9.
Gualt. test. t. 6. f. 1.
Schroet. Flusconch. t. 10. min. A. f. 1.
 γ) *Fayann. Conch.* t. 65. f. B¹⁰.
Chemn. Conch. 9. t. 136. f. 1256. 1254.
 δ) *Chemn. Conch.* 9. t. 136. f. 1258.
Habitat in Europa, Africa, Asiaque australi, testa exal-
bida, oblonga, nitente, substriata, 6-15½ lineas longa,
anfractibus 4-6, in juniori 5-7 teretibus, primo al-
tero fere duplo majore.

scalaris. 116. *H. testa conico turrita imperforata : anfractibus remo-*
tis, aperta, ovata. Müll. hist. verm. 2. p. 113. n. 31.
Chemn. Conch. 9. t. 128. f. 1130. n. 1-3.
Habitat - - - pomatiæ parumper affinis, at testa
oblique striata, pallide rufescente : fasciis 2 albidis ;
spira obtusa : anfractibus 5. ventricosis.

circinata. 117. *H. testa hyalina transversim costata perforata subtur-*
rata : anfractibus distantibus, apertura circulari.
Kaemmer. Conch. Rudolst. p. 182. t. 8. f. 4. 5.
Habitat - - - structura ad turbinem scalarem quodammodo accedens, testa 6 lineas alta, 7½ latu, latus acutis ; an hujus tribus ?

subcylindrica. 118. *H. testa imperforata turrita subcylindrica obtusa : an-*
fractibus quatuor, apertura ovali.
Chemn. Conch. 9. t. 135. f. 1235.
Habitat in Europæ borealis aquis dulcibus, testa cornuta,
pallida, magnitudine grani secalini, apice obtusissima,
rotundata, aperturæ margine interiori reflexa.

119. H. testa subperforata subturrita : anfractibus quinque, apertura ovata.

Bast. op. subs. p. 77. t. 7. f. 4. Turbo stagnalis.

Habitat in aquis dulcibus, testa cornea, pallida, ovato-oblonga, acutiuscula; magnitudine vix grani secalini, umbilico minimo, apertura marginata.

120. H. testa subperforata turrita : anfractibus octo, apertura subrotunda.

Müll. hist. verm. 2. p. 150. n. 340. Buccinum (Acicula) testa turrita glabra alba, axi inflexo acuto.

Gualt. test. t. 6. f. BB.

Geoffr. test. t. 21.

Schroet. Flusconch. t. 8. f. 6. a. b.

Schroet. Erdconch. p. 142.

β) Chemn. Conch. t. 136. f. 1264.

Habitat rara in Sueciæ, Thuringiæ, Galliæ, Americæ australis subpaludosis & arena riparia, testa glabra, fragilissima cornea vix 4 lineas longa, anfractibus interdum 6, planis, linea tenerrima disjunctis: primo altero duplo majore, umbilico inconspicuo.

121. H. testa turrita convexa striata alba : strigis raris fulvis, columella sinuata inflexa.

Müll. hist. verm. 2. p. 149. n. 339. Buccinum striatum.

Chemn. Conch. 9. t. 120. f. 1028-1030.

Habitat - - - testa tenera pellucida, 3-7 lineas ultra 2 pollices longa, longitudinaliter strigosis, anfractibus 7-8 margine incumbentiibus, apertura ovato-oblonga.

122. H. testa turrita alba apice fulva : anfractibus maculatis contrariis, apertura oblonga.

Müll. hist. verm. 2. p. 151. n. 341. Buccinum Columna.

Lift. Conch. t. 38, f. 37. & t. 39.

Bonann. mus. Kirch. 3. f. 400.

Favann. Conch. t. 61. f. H². H³.

Chemn. Conch. 9. t. 112. f. 954. 955.

Habitat - - - testa pellucida aluminis colore & nitore conspicua, 27½ lineas longa maculis fulvis quasi radiata, anfractibus 7-8 singulariter tortis, utrinque gibbis, longitudinaliter & spiraliter striatis, 4to, 5 & 6to fulvis, margine superno albo, apertura maculis pellucensibus varia non labiata: interiori margine fulvo.

- pella. 123. *H. testa imperforata ovata acuminata transverse striata fusca : fasciis flavis.* Müll. zool. dan. prodr. 2916.
Habitat in Islandia, testa ex fusco ferruginea, decumbente, ovato-oblonga, magnitudine semini lithospermi, fasciis in primo anfractu duplice, in reliquis simplici, apertura semiovata. Zoega.
- plicaria. 195. *H. testa subulata semipellucida longitudinaliter plicata: anfractibus teretibus, apertura ovata.* v. Born Caef.
Vindob. test. t. 16. f. 14.
Habitat - - - anfractibus 10.
- undulata. 196. *H. testa subulata lœvi subtilissime transversim striata: anfractibus teretibus, apertura ovata.*
v. Born mus. Caef. Vindob. t. 16. f. 15. *Helix maculata undulata : anfractibus circiter 12, columella glabra.*
- fuscata. 197. *H. testa subulata lœvi subtilissime transversum striata: anfractibus planiusculis, apertura ovata.* v. Born mus.
Caef. Vindob. test. t. 16. f. 17.
Chemn. Conch. 9. t. 135. f. 1229.
Habitat - - - testa exterius ex flavicante fusca, fauce cinerea, anfractibus circiter 10, columella lœvi.
- Priapus. 198. *H. testa imperforata turrita glabra: columella inflexa, anfractibus depresso-ovalis.* Gronov. zooph. 3. t. 19. f. 10. II.
Habitat rarissima - - - testa tenui, pellucida, badius : fasciis 4 punctatis, anfractu primo reliquis triplo majori, apertura ovata.
- Folliculus. 199. *H. testa turrita pellucida, glabra: columella subuplicata, labro tenui.* Gronov. zooph. 3. t. 19. f. 15. 16.
Habitat ad Barbariae littora, testa grani avenae magnitudine, unicolo, alba, anfractibus teretibus, omnibus æqualibus 5-6, apertura ovata.
- Sepium. 200. *H. testa turrita lactea longitudinaliter striata, anfractibus septem contiguis, apertura ovata.*
Martin. berl. Mag. 3. t. 5. f. 53.
Schroet. Erdconch. t. 1. f. 1.
Habitat in Thuringiæ sepibus montanis, testa vix ultra $\frac{1}{2}$ pollicem longa, lineis griseis longitudinalibus interdum picta.

- plendidu-* 201. *H. testa tenella nitida pellucida dilute fusca : apertura oblonga.*
Mitra, *Habitat in Gallia & Thuringia, testa vix $\frac{1}{4}$ pollicis longa, anfractibus 6.*
202. *H. testa turrita : anfractibus costatis distantibus ; primo tereti, reliquis planiusculis, apertura ovali.*
Schroet. Fusconch. t. 9. f. 12.
Habitat - - - testa exalbida, tenui, ultra pollicem longa, anfractibus 8-9.
210. *H. testa turrita atra minutissime striata : anfractibus convexiusculis, apertura oblongo-ovali.*
Gault. test. t. 6. f. GG.
Schroet. Fusconch. t. 10. min. A. f. 5.
Habitat - - - testa 2 pollices longa, anfractibus 7.
- cuspidata.* 240. *H. testa turrita cornea transversim subtilissime striata longitudinaliter plicata : apertura ovali, labro acuto.*
Chemn. Conch. 9. t. 135. f. 1228.
List. Conch. t. 118. f. 13.
Gault. test. t. 6. f. H.
Habitat in Indiæ flaviis.
- crenata.* 241. *H. testa turrita alba transversim substriata, penes suturam cingulo crenulato cincta.* *Chemn. Conch. 9. t. 135. f. 1230.*
Habitat in Indiæ flaviis.
- Carinula.* 242. *H. testa turrita subumbilicata alba : anfractu primo subcarinato ; fascia nigricante.* *Chemn. Conch. 9. p. 190. t. 136. f. 1263. n. 1-4.*
Habitat - - -
- crocea.* 243. *H. testa cylindrica glabra ex aurantio flavesciente apice-obtusa.* *Chemn. Conch. 9. t. 135. f. 1233.*
Habitat rario - - -
- lanschau-* 244. *H. testa subturrita glaberrima brunnea obscuris maculata : fauce albicante.* *Chemn. Conch. 9. p. 174. t. 135. f. 1243. a. b.*
Habitat in Coromandel aquis dulcibus.
- obtusata.* 250. *H. testa alba dense striata subcylindrica : anfractibus convexiusculis, labro marginato.* *Kaemn. Cab. Rudolf. p. 151. n. 9. t. II. f. 3.*
Habitat - - - testa 3 fere pollices longa.

purpurea. 257. H. testa ovato - oblonga purpurascente ^{tegumento} *purpureo* ^{tegumento}
sellata intus iridescente. *Martyn univ. Conchol.* 2. 68. f. med.

Habitat in nova Seelandia.

***** Ovatæ imperforatæ.

Pupa. 124. H. testa subimperforata ovato-oblonga rudi: anfractibus
 senis, apertura lunato-oblonga.
Habitat in Mauritania. E. Bauder.

barbara. 125. H. testa imperforata oblonga rudi: anfractibus ^{oblongis}
 apertura subrotundo-lunata.
*Habitat Algiriae, testa ad pupam accedens, dimidio tamen
 minori, vel hordei semine paulo majori: apertura insima
 subitus saepe fascia grisea cincta.* Brander.

Amarula. 126. H. testa imperforata oblonga: anfractibus spinoso-de-
 tatis. *Mus. Lud. Ulr.* 672. n. 379.*

Müll. hist. verbi. 2. p. 137. n. 330. Buccinum testa subo-

vata nigra: anfractibus sursum muricatis.

Rumpf mus. t. 33. f. FF. Voluta fluviatilis.

Lst. Conch. t. 133. f. 33. & t. 1055. f. 8.

Gualt. test. t. 6. f. B.

Argent. Conch. t. 27. n. 6. f. f.

Petiv. gal. t. 4. f. 3.

Klein est. p. 36. n. 13.

Seb. mus. 3. t. 53. f. 24. 25.

Martin. berl. Mag. 4. t. 9. f. 38. & t. 11. f. 64. C.

v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 16. f. 21.

Schroet. Flusconch. t. 9. f. 8. 11.

- inn. Bau Conch. t. 1. f. 4.

Chemin. Conch. 9. t. 134. f. 1218. 1219.

B) *Chemin. Conch. 9. t. 134. f. 1220. 1221.*

*Habitat in Indiæ flaviis, testa nigra immaculata striis spinis
 raliis subconvexis exarata, 9-19 lineas longa, an-
 fractibus 5-6, singulis in superiori parte spinis 10 acutis
 armatis, apertura ampla hante alba, labio exteriori
 acuto, interiori crasso.*

nævia. 251. H. testa transversim sulcata alba nigricante striata: spira-
 acuminata; anfractibus planiusculis, primo majore teret.

Kaemim. Cab. Rudolff. p. 146. n. 10. t. 8. f. 3.

Habitat in Oceano australi, testa parum ultra pollicem longa;

aspera. 127. H. testa acuminata cinerea transversim striata: anfrag-

tibus muricato deutatis strigisque sanguineis.

Müll. hist. verm. 2. p. 136. n. 329. *Buccinum scabrum.*
Chemn. Conch. 9. t. 136. f. 1259. 1260.

Habitat in paludosis littoris Coromandel, testa ovata
pellucida $5\frac{1}{2}$ - $8\frac{1}{2}$ lineas longa, interdum squalida ex ci-
nereo fusca: striis convexis spiralibus, strigis undulatis
longitudinalibus per anfractas tuberculatis, anfractibus
7-8, singulis 12 spinis armatis, apertura-ovata, labio
exteriori acuto, interiori fusco nitido, fauce pallida
strigis sanguinibus punctatis pelluentibus pida.

- fagnalis.* 128. H. testa imperforata ovato-subulata subangulata: aper-
tura ovata. Fn. suec. 2188.*
- Müll. zool. dan. prodr. 2935. hist. verm. 2. p. 132. n. 327.
Buccinum testa oblonga subulata ventricosa, apertura
ovato-repanda.
- Lift. Conch. t. 123. f. 21.
anim. angl. t. 2. f. 21.
exerc. anat. t. 2. f. 3. 4.
- Petiv. mus. 82. n. 85.
- Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 55.
- Gualt. test. t. 5. f. I. L.
- Ginann. op. post. 2. t. I. f. A. B. C.
- Argenv. Conch. t. 27. n. 6. f. I. 2.
zoomorph. t. 8. f. 5. b.
- Klein ostr. t. 3. f. 69.
- Geoffr. test. I.
- Schlotterb. act. htlv. 5. t. 3. f. 25. 26.
- Lesser testaceoth. p. 88. n. II.
- Frisch. ins. 8. t. 7.
- Seba mus. 3. t. 39. f. 52. 53.
- Swammerd. bibl. nat. p. 9. f. 4.
- Hanov. Seltenh. I. t. I. f. 5.
- Martin. berl. Mag. 4. t. 9. f. 33. a. b.
- v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 16. f. 16.
- Schroet. Flusconch. t. 7. f. 1-4. & t. II. min. C. f. I.
- Brit. zool. 4. t. 86. f. 136.
- da Costa Brit. Conch. t. 5. f. II.
- Favann. Conch. t. 61. f. 16.
- Chemn. Conch. 9. t. 135. f. 1237-1240.
- B) Bonann. mus. Kirch. 3. f. 392?
- Habitat in Europæ stagnis, testa ad $2\frac{1}{2}$ pollices longa, tenui-
fragili, exalbida, flavicante aut cinerea, rarius cornea,
alba aut nigra, nunc glaberrima, nunc tenuiter secun-
dum longitudinem aut transversim striata, anfractibus

6-7, primo turgido reliquis simul sunitis æquali, apertura ampla, labro repando non marginato.

- fragilis.* 129. *H. testa imperforata ovato - subulata tereti pellucida*, apertura ovato-oblonga. *Fn. suec. 2187.**
Lift. Conch. t. 8. f. 3?
Seb. mus. 3. t. 39. f. 41-46.
Martin. berl. Mag. 4. t. 9. f. 35.
Schroet. Flusconch. t. 7. f. 8.
 β) *Argenv. Conch. t. 27. n. 6. f. 4.*
Habitat in Europæ aquis stagnantibus, stagnali similiter utrum vere distincta, an ætate modo minore diversa
testa tamen duplo minore, 11 lineis ut plurimum breviore, nunc alba, nunc aurea & interdum albo-sufficiens
spira acutæ, anfractibus 5-7 lineola discretis, primum
subventricoso, labio non marginato.
- glabra.* 130. *H. testa cylindrica acuminata cornea : apertura ovata*
Müll. zool. dan. prodr. 2936. hist. verm. 2. p. 133.
 328. *Buccinum glabrum.*
Schroet. Flusconch. t. 7. f. 15.
Habitat rara in Daniæ pratis humidis, ubi aquæ stagnantes
lubricæ affinis ; at testa longiore, $4\frac{1}{2}$ lineas longa petillata
cida, anfractibus fere 8 teretibus, sat parum decreta
tibus, primo cingulo reniformi nigro transparente ornato : Incola niger, tentaculis albidis.
- palustris.* 131. *H. testa oblonga acuminata fusca : apertura ovata*
Müll. zool. dan. prodr. 1934. hist. verm. 1. p. 131.
 329. *Buccinum palustre.*
Lift. an. angl. t. 2. f. 22.
Gualt. test. t. 5. f. E.
Geoffr. test. 2.
Ginann. op. post. 2. t. 1. f. 2.
Martin. berl. Magaz. 4. t. 9. f. 37.
Schroet. Flusconch. t. 7. f. 9. 10.
 β) *Schroet. Flusconch. t. 7. f. 7.*
 γ) *Schroet. Flusconch. t. 7. f. 11.*
Habitat frequens in Europæ paludosis, stagnali affinis, incola cinereo albido-punctato, testa minus fragili,
nec apice subulata, nec basi venericosa, striis subtiliter confertis transversis & spiralibus exarata, a primis
turam saturate sanguinea, interdum dupliciti, labio recesso
flexo albo, anfractibus 5-6.

- truncatula, 132. *H. testa ovato-oblonga; anfractibus detruncatis, apertura ovata.*
Müll. hist. verm. 2. p. 130. n. 325. Buccinum truncatum.
Schroet. Flusconch. t. 7. f. 13.
Habitat in Thuringia, testa $1\frac{1}{3}$ -5 lineas longa, atra, subpellucida, anfractibus 5 sursum truncatis, labio incumbente squalido.
- Peregrina. 133. *H. testa cornea subconica: mucrone acuto, apertura ovata.*
Mull. zool. dan. prodr. 2933. hist. verm. 2. p. 130. n. 324. Buccinum peregrinum.
Gualt. test. t. 5. f. e. e.
Chenin. Conch. 9. t. 135. f. 1244. n. 1. 2.
Habitat in Thuringiae, Dania aquis stagnantibus, tempore brumali in tiliarum truncis & ramis, inter Auriculam & palustrem media, teste forma non ventricosa, anfractibus subabruptis & magis elongatis, ab illa, teste forma subconica ab hac discernenda, testa 2-8 lineas longa, nunc albida pellucida, nunc atra opaca.
- Vinosa. 134. *H. testa ventricosa diaphana: mucrone obtuso, apertura ampla.*
Müll. zool. dan. prodr. 2932. hist. verm. p. 129. n. 323. Buccinum glutinosum.
Habitat rarius in Dania, nymphae praesertim luteae foliis insidens, limace incola albo cinereo-purpureo, pallio gelatinoso totam testam obvolvente. teste tenerrima fragilissima flava, $1\frac{1}{2}$ -4 lineas longa, anfractibus 2-3, apertura repanda rotundata.
135. *H. testa imperforata ovata obtusa flava; apertura ovata.*
*Fn. suec. 2189.**
Müll. zool. dan. prodr. 2912. hist. verm. 2. p. 97. n. 296. Helix (succinea) testa oblonga fulva diaphana, anfractibus tribus, apertura ovata.
Tulp. obs. 210. t. 201.
Lift. Conch. t. 123. f. 23.
anim. angl. t. 2. f. 24.
Gualt. test. t. 5. f. H.
Ginann. op. post. 2. t. 1. f. 3. 4.
Sivamined. bibl. nat. t. 8. f. 4.
Klein ostr. t. 3. f. 70.
Argenv. Conch. t. 27. f. ult. n. 6. & t. 28. f. 3.
Geoffr. test. 22.

Schlotterb. ad. helv. 5. t. 3. f. 22.
Martin. berl. Mag. 3. t. 5. f. 66. b. & 4. t. II. f. 60⁶⁰
Schroet. Erdconch. t. I. f. 2. 3.
Chemin. Conch. 9. t. 135. f. 1248.
Habitat frequens in Europæ plantis ripariis, rarius aliis,
incola nigerrimo, torpido prominente, Augusti mense
medio coeunte, tentaculis 4 instrudo, testa pellucidissima
1-8 lineas longa, tenerrima, levissima, membranacea,
fragilissima, striis intus & extrinsecus confertis exarata,
anfractibus 3 quasi contortis, apertura non labiata.

acuta. 136. *H. testa conico-acuminata alba : fascia rubra, apertura edentula.*

Müll. hist. vermi. 2. p. 100. n. 297.

Lift. Conch. t. 19. f. 14.

Gualt. test. t. 4. f. N.

Chemin. Conch. 9. t. 134. f. 1224. n. I. 2.
Habita in Italia, testa 4 lineas longa, fasciis raro 2 in^{miss}
jori anfractu piæ, anfractibus 7, apertura ovata.

Papilla. 137. *H. testa conica perforata : striis rugosis, apertura transversali ; labro reflexo.* *Müll. hist. vermi.* 2. p. 100. n. 298.

Chemin. Conch. 9. t. 122. f. 1053. 1054.

Habitat - - - testa diametri $10\frac{1}{2}$ linearum, rugis albis
& ex rufa fuscis varia, anfractibus convexis fere 6,
apertura ovata, labro albo crasso.

minuta. 138. *H. testa subcylindrica : apertura ovali edentula.* *Mull.*
hist. vermi. 2. p. 101. n. 299.

Habita in Thuringia, turbini muscorum parumper affinis,
at testa breviore, vix ultra $\frac{2}{3}$ linea longa, triplo an-
gustiore & acuminata distincta, anfractibus 5.

detrita. 139. *H. testa conica alba : lineis transversis rufis, apertura*
ovata. *Müll. hist. vermi.* 2. p. 101. n. 300.

Gualt. test. t. 5. f. N.

Lesser testaceoth. p. 224.

Martin. berl. Mag. 3. t. 5. f. 53?

Schroet. Erdconch. t. I. f. 1?

Flasconch. t. 19. min. A. f. 4.

Seb. mus. 3. t. 39. f. 37.

Chemin. Conch. 9. t. 134. f. 1225. a - d.

Habitat in Italia & Saxonia, testa polita, obsolete trigonata,
8½ lineas longa, anfractibus 6, labro ad columellam
aliquantum reflexo.

VÉRMES TESTACEA. *Helix*.

366

Venitico- 140. *H. testa conica pallida striata : apertura edentula.* Müll.
hist. verm. 2. p. 102. n. 301.

*Habitat rara in Thuringia, testa 2 lineas longa, helici trochò
 affini, at veniticosiore, anfractibus 7, extimis 4 latitu-
 dine quam minime diversis.*

obscura. 141. *H. testa conica fusca : apertura edentula ; labro albo.*
Müll. hist. verm. 2. p. 103. n. 302. zool. dan. prodr. 2913:
Lift. an. angl. t. 2. f. 8.

Argenv. Conch. t. 18. f. 15:
Geoffr. test. 15.

*Habitat in Europa, in fagi truncis, incola albo, supra obs-
 curo : oculis solis nigris, testa acuminata, oculo armato:
 tenuissime striata, anfractibus 6, apertura ovali : mar-
 gine acuto, labro candido nitido.*

lubrica. 142. *H. testa conica fulva nitida pellucida acuta : apertura
 edentula ; labro rubente.* Müll. zool. dan. prodr. 2914:
hist. verm. 2. p. 104. n. 303.

Lift. an. angl. t. 2. f. 7.
Geoffr. test. 17.

Martin. berl. Mag. 3. t. 5. f. 59. a. b.
Schroet. Erdconch. t. 1. f. 9.

*Habitat in Europæ muscis ac trubibus palisque putrescen-
 tibus, humidis, incola nigro, subitus albo, aquam fer-
 renti, testa glaberrima, nitidissima ; rarius candida, 2
 lineas longa, anfractibus 5-6, apertura ovata.*

limosa. 143. *H. testa imperforata oblongiuscula pellucida acuta :*
apertura ovata. Fn. suec. 2190:

Brit. zool. t. 86. f. 137.

Chemn. Conch. 9. t. 135. f. 1246. 1247.
Habitat in Europæ paludibus.

contorta- plicata. 144. *H. testa turbinata cinerea subimperforata : vertice trun-
 cato.*

Müll. zool. dan. prodr. 2951. hist. verm. 2. p. 187. n. 374:
Nerita contorta.

Argenv. Conch. t. 8. f. 5.

*Habitat rarissima in Galliae ? Daniae fossis limosis, testa py-
 ramidalis, squalida, opaca, 2½ lineas longa, anfrac-
 tibus vix 5, apertura circinata.*

angularis. 145. *H. testa imperforata virescente : anfractibus spirali-
 ter angulatis, fauce alba.*

Müll. hist. verm. 2. p. 187. n. 373. Nerita angularis;

Lift. Conch. t. 127. f. 27.

Gronov. zoophyl. 3. p. 331. n. 1547?

Chemin. Conch. 8. t. 137. f. 1222. 1223.

Habitat in flumine Sineni, emporium Canton alluente,
testa conica; subtilissime transversim stria:ta, 12 lineas
longa, anfractibus 5 fere perpendicularibus, apertura
rotundata.

gentacula-146. *H. testa imperforata ovata obtusa impura*: apertura
subovata. Fn. suec. 2191.*

Müll. zool. dan. prodr. 2950. hist. verm. 2. p. 185. n. 372.
Nerita (jaculator) testa oblonga cornea, vertice acuto,

Lift. Conch. t. 132. f. 32.

anim. angl. t. 2. f. 19.

Gualt. test. t. 5. f. B.

Geoffr. test. 3.

Schlotterb. act. helv. 5. t. 3. f. 19. 20.

Martin. berl. Mag. 4. t. 7. f. 12-14.

Schroet. Flusconch. t. 7. f. 19-22. b.

Brit. zool. 4. t. 86. f. 140.

da Costa brit. Conchol. t. 5. f. 12.

Chemin. Conch. 9. t. 135. f. 1245.

Habitat vulgaris in Europae aquis stagnantibus & rivis;
incola nigro aureo-punctato, globulos ejaculante, testa
3-4½ lineas longa, cornea, diaphana acuta glabra,
sæpius limo obducta fusca aut brunnea; anfractibus 4, si-
tarius 6, teretibus convexis, operculo ovato, cornu
pellucido, albo.

Auricula-147. *H. testa imperforata ovata obtusa, spira acuta brevi-*
ria. *fima, apertura ampliata.* Fn. suec. 2192.

Müll. zool. dan. prodr. 2931. hist. verm. 2. p. 126. n. 322.

Buccinum (Auricula) testa ampullacea cornea, mucro-

ne acuto breve, apertura amplissima.

Lift. Conch. t. 123. f. 22.

anim. angl. t. 2. f. 23.

exerc. ahat. t. 2. f. 3. 4.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 54.

Ginann. op. post. 2. t. 1. f. 3.

Gualt. test. t. 5. f. F. G.

Argenv. Conch. t. 27. f. 7. & t. 28. f. 22.
zoomorph. t. 8. f. 6.

Geoffr. test. 3.

Schlotterb. act. Helvet. 5. t. 3. f. 27. 28.

Hofmann act. Mogunt. 2. p. 1-15.

Murray testaceol. t. I. f. 4.

Martin. berl. Mag. 3. t. 5. f. 66. f. aa. & 4. t. II. f. 59.
A. B. coll.

v. Born mus. Caes. vindob. test. t. 16. f. 20.

Schroet. Flusconch. t. 6. f. 3-6. & t. II. min. C. f. 2.
Brit. zool. 4. t. 86. f. 133.

da Costa brit. Conch. t. 5. f. 17.

Chenn. Conch. 9. t. 135. f. 1241. 1242.

β) Schroet. Flusconch. t. 6. f. 7. & t. II. min. c. f. 3.

γ) Schroet. Flusconch. t. 7. f. 12?

Habitat vulgaris in Europæ aquis stagnantibus & rivis, testa tenui, fragili, pellucida a 2 ad 15 lineas longa, alba, interdum nitente, exalbida, cornea, cerea, cinerea aut subfuscata, rarius costata, anfractibus 3-5, primo ventricoso turgido reliquis omnibus triplo majore, incola albo cinereo-punctato : oculis nigris.

lavigata. 148. H. testa imperforata obovata obtusissima pellucida lævissima.

Habitat - - - testa cornea longitudinaliter obsolete striata, pisti magnitudine, apertura magna sublunata posterius elongata, labio interiore albo.

baltihica. 149. H. testa imperforata ovata acuminata : rugis elevatis, apertura ovata ampliata. Fn. suec. 2193.* It. goth. 261.

Habitat ad maris balthici littora, incola nigro : tentaculis 2, testa pellucida : anfractibus 4.

150. H. testa imperforata convexa longitudinaliter striata : rima umbilicali, apertura subrotunda. Mus. Lud. Ulr. 672. n. 380.*

Habitat - - - testa livida, striis pluribus quam 40 exarata.

Perspicua. 151. H. testa imperforata convexo ovata : labro nullo, apertura ad apicem usque hiante. Mus. Lud. Ulr. 673. n. 381.*

Habitat in mari mediterraneo, inter bullas & helices intermedia, testa ladea, ad apicem usque perspicua, fragilissima.

heliototoidea. 152. H. testa imperforata depresso-planiuscula striis undatis : apertura ovali dilatata usque in apicem. Mus. Lud. Ulr. 673. n. 382.* Müll. zool. dan. prodr. 2900. O. Fabr. Fn. groenl. p. 390. n. 387.

Adans. Seneg. I. t. 2. f. 2. Sigaret.

Müll. zool. dan. 3. p. 32. t. 101. f. 1-4. Bulla velutina:
Ccc ccc ccc cc 3

Rumpf mus. t. 40. f. R.

Petiv. gazoph. t. 12. f. 4.

Gualt. test. t. 69. f. F.

Bonann. nius. Kirch. 3. f. 404.

Argenv. Conch. t. 3. f. C.

Klein ostr. t. 7. f. 114.

Knorr Vergn. 4. t. 17. f. 5? & 6. t. 39. f. 5?

Martin. Conch. 1. t. 16. f. 151-154.

β) Chemn. Conch. 10. t. 165. f. 1598. 1599.

Habitat in Oceano septentrionali, mari mediterraneo, atlantico, indico, nonne potius ad haliotides referenda, incola parvo albo; tentaculis 2 brevibus, operculo nullo, testa plana, elliptica, tenui, pellucida, alba, aut rubella, fascia alba, aut aurantia fasciis 2 dilutioribus, extrinsecus subcancellata, anfractibus 4 lateralibus, labro acutissimo,

muralis. 153. H. testa imperforata subdepressa striata albida: maculis fuscis, labro albo. Müll. hist. verm. 2. p. 14. n. 213.

Adans. Seneg. 1. t. 1. f. 2. Pouchet.

List. Conch. t. 74. f. 74.

Gualt. test. t. 3. f. F.

Klein ostr. t. 1. f. 18.

Habitat in Italia & Africa, testa diametri 7 linearum interdum fusco punctata, frequentius supra albida striis obsquis confertis profundis strigisque fuscis insignita, subtexta alba, glabra, minus striata, anfractibus 4, apertura fusca, labro acuto subreflexo.

Cartusia. 154. H. testa imperforata, subdepressa alba: anfractibus sexna.

Müll. hist. verm. 2. p. 15. n. 214.

Schroet. Erdconch. t. 2. f. 27?

Graffr. test. 4.

Habitat in Thuringia? & Gallia, testa pellucida, diametri 6 linearum, utrinque convexa, labio candido crassifuscato, ore tenuiore.

Vertigo. 155. H. testa cylindrica glabra obscure fulva: anfractibus teretibus contrariis, apertura subquadrata sexdentata.

Müll. zool. dan. prodr. 2919. hist. verm. 2. p. 124. n. 320. Vertigo pusilla.

Habitat rara in Daniæ truncis putridis, incola pellucido, supra cerulescente subtus albo, tentaculis modo 2 linearibus, apice oculatis, testa lineam longa, anfractibus 4-5, aperturae margine summo arcuato cum dentibus albo, ad anfractum oppositum transverso.

- Carychi-* 156. *H. testa hyalina subconica glabra : apertura ovata den-*
um. *tibus intus sesquitribus munita.*
Müll. zool. dan. prodr. 2920. hist. vermi. 2. p. 125. n.
321. Carychium minium.
Habitat in Daniæ afferibus humidis fagi que foliis putre-
scentibus, incola flavo : tentaculis modo 2 truncatis
quasi bulbigera ad basin posterius oculatis, testa $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$
lineam longa : anfractibus 5 teretibus.
- ambigua.* 157. *H. testa subimperforata convexa : sulcis remotis com-*
pressis, apertura semiorbiculari.
Adans. Seneg. I. t. 13. f. 1? Fossus.
Habitat in mari mediterraneo, testa parva, alba,
neritam referente, ut tamen labium interius non re-
flexum sit, umbilico in junioribus aperto, in adultis
clauso, spira laterali obtusa, sulcis 6 elevatis cincta.
- Corvus.* 203. *H. testa imperforata ovata nigra : apertura ovata.*
Martin. berl. Mag. 4. s. 9. f. 36.
Schroet. Flusconch. t. 7. f. 3. 4.
Habitat in Thuringiaæ aquis stagnantibus, stagnali pro-
xime affinis, at testa duplo minore minus acuminata,
anfractu primo minus convexo, labroque minus proni-
nulo distincta.
- Pyrum.* 204. *H. testa subcylindrica decussatim striata hyalina spa-*
diceo varia apice fusca : anfractibus contrariis : tribus
maximis medio impressis.
Martin. n. Mannigfalt. 4. p. 421. t. 2. f. 15. 16.
Habitat in Guinea, spiræ anfractibus septem.
- marmo-* 205. *H. testa albo-cinereo cæruleoque varia obtusa : an-*
fractibus teretibus ; primo reliquis duplo longiori me-
dio inflato longitudinaliter striato, apertura ovata.
Schroet. Flusconch. t. 6. f. 9.
Habitat Argentorati in flaviis testa $\frac{3}{4}$ pollicis longa,
anfractibus 5.
- achatina.* 206. *H. testa spadicea pellucida tenera : apertura ovata.*
Schroet. Flusconch. t. 6. f. 15. a. b.
Habitat — — marmoratae affinis, at testa minori, an-
fractibus modo 4 angustioribus.
- lugubris.* 207. *H. testa ovato-acuminata pellucida transversim striata*
sub epidermide nigra ochroleuca spadiceo undulata :
anfractu primo reliquis duplo majore, apertura ob-
longo-ovata.

Schroet. Flusconch. t. 6. f. 13.

Habitat — — testa vix 9 lineas longa, anfractibus 7

minima. 208. *H. testa ovato-conica subimperforata* : apertura orbiculari : anfractu primo reliquis duobus in centro ejus positis majore.

Schroet. Flusconch. t. 7. f. 18.

Habitat — — testa obtusa, vix $1\frac{1}{2}$ lineæ longa.

inflata, 209. *H. testa alba solida opaca* : anfractu primo reliquis omnibus duplo majore, apertura ampla marginata.

Schroet. Flusconch. t. 7. f. 5.

Habitat in Thuringiæ fluvio Unstrut.

albicans. 210. *H. testa alba opaca acuminata* : apertura ovali.

Schroet. Flusconch. t. 7. f. 6.

Habitat Hamburgi, aquatica, inflata magis elongata.

repanda, 211. *H. testa ovato-acuminata subimperforata* : anfractu primo ventricoso omnibus reliquis majore, apertura semi-circulares.

Schroet. Flusconch. t. 7. f. 16.

Habitat in Thuringiæ aquis stagnantibus, 6-7 lineas longa.

Difficillimi helicum generis, sive definitiorem specierum & varietatum omni numero absolutam species, sive limites, quibus a proximis generibus distat, multa adhuc occurunt apud autores, utrum species, an variates, utrum huic, an aliis tribui inferenda; ita e. g. apud Lüterum Conch. t. 8. f. 1. 2. t. 11. f. 6. t. 13. f. 8. t. 22. f. 20. t. 24. f. 22. t. 28. f. 26. t. 33. f. 32. t. 44. f. 42. t. 59. f. 56. t. 61. f. 59. t. 65. f. 62. t. 66. f. 64. t. 67. f. 65. 66. t. 68. f. 67. t. 72. f. 70. t. 73. f. 71. 72. t. 74. f. 73. t. 76. f. 76. t. 77. f. 77. t. 78. f. 78. 79. t. 79. f. 80. 80. a. t. 81. f. 82. t. 82. f. 83. t. 84. f. 84. t. 85. f. 85. t. 109. f. 88. t. 91. f. 91. t. 92. f. 92. t. 94. f. 95. t. 95. f. 96. t. 108. f. 1. t. 2. f. 2. a. b. t. 110. f. 3. 4. t. 111. f. 5. t. 112. f. 6. t. 113. f. 7. t. 114. f. 8. 9. t. 115. f. 10. t. 116. f. 11. t. 117. f. 12. t. 119. f. 14. t. 129. f. 29. t. 131. f. 31. t. 135. f. 35. t. 109. f. 44. 45. t. 6. f. 46. 47. t. 576. f. 30. t. 581. f. 35. t. 582. f. 35. a. t. 1055. f. 4. t. 18. 1058. f. 2. 4. 7. 8. t. 1059. f. 4. 5. Klein ostrac. t. 1. f. 12. 16. 17. 18. 22. Bonanni recr. & mus. Kircher. 3. f. 44. 148. 333. 378. recr. 3. f. 35. 371. mus. Kircher. 3. f. 351. 364. 378. 392. 393. 395. Gualtieri 168. 1. f. F. G. H. I. L. M. O. t. 2. f. AA. BB. CC. G. H. I. N. O. Q. R. t. 3. f. A. B. C. H. L. M. N. O. R. FF. & t. 6. f. E. F. G. H. Argenville Conch. t. 8. f. E. t. 27. n. 2. f. 1. 2. 4. 5. n. 6. f. 4. 5. t. 28. f. 2. 3. 6-9. 21. & zoomorph. 1-3. 6-8. t. 10. f. C. Sebantus. 3. t. 38. f. 25. 67. t. 29. f. 9-11. 31. 32. 35. 36. 39. 49. 50. 58. t. 40. f. 8-10. 22. 22-23. 26. 29. 30. 31. 33. 35. 40. 43. 48. 59-61. 62. 64. 67. & t. 43. f. 3. Knorr Vergn. 4. t. 13. f. 4. & 5. t. 26. f. 5-7. Martini berl. Magaz. 2. t. 1. f. 5. t. 2. f. 11. 12. 17. 35. t. 3. f. 35. t. 4. f. 41. 42-45. 47. 48. & 4. t. 7. f. 8-11. 15. 16. t. 8. f. 24-26. 32. t. 8. f. 51. t. 10. f. 46. 51. 53. a. b. Adanson Seneg. 1. t. G. III. Schroet. Flusconch. t. 5. f. 33.

212. H. testa ovato-acuminata solida exalbida opaca : apertura ovato-oblonga , anfractu primo reliquis majore.
Schroet. Flusconch. t. 7. f. 17.
Habitat --- aquatica , anfractibus 5.
213. H. testa obtusa : anfractibus quatuor medio inflatis distantibus , apertura orbiculari marginata.
Schroet. Flusconch. t. 8. f. 7. a. b.
Habitat --- testa 2 lineas longa.
214. H. testa cærulecente ovato-acuminata : anfractibus subventricosis , apertura oblongo rotundata.
Schroet. Flusconch. t. 8. f. 8. a. b.
Habitat frequens Francofurti ad Mœnum , prope pontem Sachsenhusanum , testa 2 lineas longa , anfractibus 4.
215. H. testa inflata : anfractibus quatuor hæribus ; duabus inferioribus distantibus , apertura orbiculari non marginata.
Schroet. Flusconch. t. 8. f. 9. a. b.
Habitat in valle Alsatiæ Steinthal , testa 2 lineas longa.
216. H. testa imperforata oblonga alba longitudinaliter rubro undulata : spiræ anfractu primo altero triplo majore , apertura ovata.
Gualt. test. t. 5. f. N.
Schroet. Flusconch. t. 10. min. A. f. 4.
Habitat --- testa 1 $\frac{1}{4}$ pollicis longa , anfractibus 6. 7.
217. H. testa imperforata oblonga tenui fusca : anfractu primo altero triplo majore aperturaque ovatis.
Gualt. test. t. 5. f. NN.
Schroet. Flusconch. t. 10. min. A. f. 7.
Habitat --- anfractibus 4.
218. H. testa subimperforata oblonga minutissime striata albo : anfractu primo altero duplo majore , apertura ovali marginata.
Gualt. test. t. 5. f. SS.
Schroet. Flusconch. t. 10. min. A. f. 6.
Habitat --- testa $\frac{1}{4}$ pallicis longa , anfractibus 5.
220. H. testa lævi fusca : apertura triangulari marginata.
Gualt. test. t. 5. f. C.
Schroet. Flusconch. t. 10. min. A. f. 9.
Habitat --- testa minuta.

- tumida. 221. H. testa ventricosa acuminata cinerea : anfractu prima reliquos omnes superante , apertura ovali ampla alterio latere marginata.
Gualt. test. t. 5. f. Q.
Schroet. Flusconch. t. 10. min. B. f. 2.
Habitat - - testa $\frac{1}{4}$ pollicis longa , fascia ad columellam alba.
- Acicula. 222. H. testa oblonga acuminata longitudinaliter costata transversum striata : apertura ovali.
Schroet. Flusconch. t. 8. f. 14.
Habitat in Coromandel , testa $\frac{3}{4}$ pollicis longa sub epidermide nigra inter costas spadiceo virgata , anfractibus 10 æquabiliter decrescentibus.
- peregrina. 223. H. testa ovata imperforata : anfractibus teretibus distantibus æquabiliter decrescentibus : apertura ovali.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 254. t. 4. f. 11.
Habitat in insulis Americae obversis , testa dimidium pollicem longa hyalina , interdum teftacea opaca , anfractibus 8-9.
- danubialis. 224. H. testa oblonga imperforata : anfractibus ventricosis distantibus , apertura orbiculari.
Marsigl. danub. 4. p. 91. t. 31. f. 1.
Schroet. Flusconch. t. 10. min. B. f. 5.
Habitat in Danubio , testa $2\frac{1}{2}$ pollices longa.
- turbinata. 225. H. testa oblonga imperforata lævi acuminata : anfractibus inflatis ; primo multo majore , reliquis æqualiter decrescentibus , apertura subovali marginata.
Marsigl. danub. 4. p. 89. t. 31. f. 2.
Schroet. Flusconch. t. 10. min. B. f. 1.
Habitat in Danubio , testa $3\frac{1}{4}$ pollicis longa , minus ventricosa , quam in danubiali.
- curvata. 226. H. testa oblonga curvata subimperforata : apertura ovali marginata.
Marsigl. danub. 4. p. 89. t. 31. f. 4.
Schroet. Flusconch. t. 10. min. B. f. 3.
Habitat in Danubio , testa diametri $2\frac{1}{3}$ pollicis , an ab origine curvata ?
- exilis. 252. H. testa tenui alba spadiceo fasciata lævi : obtusa ; anfractibus planiusculis. *Kaenm. Cab. Rur. dolit. p. 124. n. 7. t. 12. f. 3.*

- β) Kaemn. Cab. Rudolst. p. 124. t. 12. f. 2.
 γ) Kaemm. Cab. Rudolst. p. 125. t. 10. f. 2.
 Habitat --- testa 6-8 lineas, γ) pollicem longa.

329. NERITA. *Animal Limax.*

Testa univalvis, spiralis, gibba;
subtus planiuscula.

Apertura semiorbicularis vel se-
milunaris : labio columellæ
transverso, truncato planius-
cule.

* *Umbilicatae.*

- Laurena. I. N. testa lævi : spira subcromonata, umbilico gibbo bifido. Mus. Lud. Ulr. 674. n. 383. *
- α) List. Conch. t. 560. f. 4.
 Bonnan. recr. 3. f. 372.
 Bonnan. mus. Kircher. 3. f. 365.
 Gualt. test. t. 67. f. V.
 Argenv. Conch. t. 7. f. A.
 Seb. mus. 3. t. 38. f. 27. 51. 52. & t. 40. f. 65. 66.
 Knorr Vergn. 3. t. 15. f. 4. & t. 20. f. 4.
 Chemn. Conch. 5. t. 186. f. 1860. 1861.
 β) List. Conch. t. 564. f. II.
 Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 228.
 Gualt. test. t. 67. f. S.
 Argenv. Conch. t. 7. f. C.
 Seb. mus. 3. t. 38. f. 60. 61.
 Murray testaceol. t. 1. f. 23.
 Adans. Seneg. 1. t. 13. f. 3. Fanel.
 Chemn. Conch. 5. t. 186. f. 1862. 1863.
 γ) List. Conch. t. 559. f. I.
 v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 17. f. 1. 2.
 δ) Chemn. Conch. 5. t. 186. f. 1864. 1865.
 δ) List. Conch. t. 560. f. 3.
 Seb. mus. 3. t. 38. f. 29. 64. 65.
 Knorr Vergn. 1. t. 10. f. 5.
 ε) Chemn. Conch. 5. t. 186. f. 1868-1871.
 ζ) Gualt. test. t. 67. f. Q.
 η) Chemn. Conch. 5. t. 187. f. 1876. 1877.
 θ) Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 224.

- Gualt. test. t. 67. f. R.
 Chemn. Conch. 5. t. 187. f. 1878-1880.
 n) List. Conch. t. 568. f. 19.
 Adans. Seneg. I. t. 13. f. 2. Naticae?
 Chemn. Conch. t. 187. f. 1895. a. b.
 s) Chemn. Conch. 5. t. 188. f. 1921.
 t) List. Conch. t. 563. f. 10.
 u) List. Conch. t. 566. f. 16.
 v) List. Conch. t. 572. f. 25.
 μ) Bonnann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 165.
 ν) Bonnann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 227.
 ζ) Gualt. test. t. 67. f. E.
 ο) Gualt. test. t. 67. f. I.
 π) Gualt. test. t. 67. f. X.
 σ) Seb. mus. 3. t. 38. f. 28.
 τ) Seb. mus. 3. t. 38. f. 53.
 ρ) Seb. mus. 3. t. 40. f. 62?
 υ) Seb. mus. 3. t. 41. f. 14-15.
 φ) Knorr Vergn. 2. t. 10. f. 5?
 χ) List. Conch. t. 561. f. 7.
 Rumpf mus. t. 22. f. G.
 Gualt. test. t. 67. f. O.
 Seb. mus. 3. t. 38. f. 26.
 Chemn. Conch. 5. t. 187. 1885. 1886.
 ψ) Rumpf mus. t. 22. f. C.
 Seb. mus. 3. t. 38. f. 62. 63.
 Chemn. Conch. 5. t. 187. f. 1887. 1891.
 ω) List. Conch. t. 560. f. 5.
 Gualt. test. t. 67. f. N.
 Argenv. Conch. t. 7. f. 4.
 Seb. mus. 3. t. 38. f. 70.
 Knorr Vergn. I. t. 10. f. 3.
 Chemn. Conch. 5. t. 187. f. 1892. 1893.
 ωω) Seb. mus. 3. t. 38. f. 57.
 Habitat innumera coloris, picturæ, ipsius magnitudinis
 varietate in mari Indiano, Africam undecunctorum
 Americam, alluente, testa nivea, flavicante, certe
 lescente, punctis, maculis, lineis, aliquando punctis
 nebulis, fasciis diversi coloris picta, fauce spir-
 pius violacea.
 cancellata. 2. N. testa decussatim striata impresso punctata: spir-
 subclavata, umbilico gibbo bifido. Hermann Naturf.
 16. p. 55, t. 2. f. 8. 9.
 Chemn. Conch. 5. t. 188. f. 1911-1914.

β) *Chern. Conch.* 10. t. 165. f. 1596. 1597?

Habitat ad insulas Americæ mediæ obversas, testa alba, maculis obsoletis, interdum radiis fulvis fasciaque picta.

3. *N. testa lævi: spira obtusiuscula, umbilico semiclavato, labio gibbo bicolore.* *Fn. suec.* 2197.* *Mus. Lud. Ulr.* 674. n. 384.*

List. Conch. t. 562. f. 9?

Bonnann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 225.

Gualt. test. t. 67. f. A. B.

Argenv. Conch. t. 7. f. V.

Seb. mus. 3. t. 39. f. 16.

Regenf. Conch. I. t. 3. f. 34.

Knorr Vergn. 2. t. II. f. 1. & 6. t. 13. f. 7.

Chern. Conch. 5. t. 186. f. 1856-1859.

β) *Bonann. recr. & mus. Kirch.* 3. f. 226?

γ) *Gualt. test.* t. 67. f. P?

δ) *Seb. mus.* 3. t. 38. f. 31?

ε) *Schroet. Einl. in Verst.* 4. t. 9. f. 5.

ζ) *v. Born mus. Caes. Vind. test.* t. 13. f. 20. 21?

Habitat frequens Tranquebariae, & in Barbaria, testa ad 2 pollices longa, inflata nunc cinerea cæruleescente obumbrata: fascia supra cæruleescente aut fusca, subtus alba: umbilico fusco alboque vario, nunc supra rufescente: fascia ex Inteo fusca, subtus alba, umbilico & fauce spadiceis spiræ apice cæruleo aut spadiceo.

4. *N. testa subglobosa: perforato æquali.*

List. Conch. t. 565. f. 12.

Rumpf mus. t. 22. f. A.

Gualt. test. t. 67. f. I.

Seb. mus. 3. t. 38. f. 30.

Knorr delic. t. B. II. f. 9.

Vergn. I. t. 7. f. 2. & 2. t. 8. f. 5.

Chern. Conch. 5. t. 186. f. 1866. 1867.

Habitat paulo rarer in Oceano Indico, testa vitellina hinc inde obumbrata maculisque albis in series digestis, superne fascia obscuriori picta, intus & in annulo umbilici alba.

5. *N. testa convexa: umbilico subcordato; lobo explanato.* * *Mus. Lud. Ulr.* 675. n. 385.*

Rumpf mus. t. 22. f. B. *Vitellus compressus.*

Seb. mus. 3. t. 41. f. 9-11.

Knorr Vergn. 4. t. 7. f. 4. 5.

Chern. Conch. 5. t. 139. f. 1924. 1925.

β) Argenv. Conch. t. 7. f. T?

Habitat rarissima ad Caput Bonæ Spei, ad Barbariæ littoribus insulas nicobaricas & moluccas, testa laevi lata, fuliginea magna, hepatica vel lutea, subtus alba plana.

Mammilla. 6. N. testa ovata glabra: umbilico obtecto, apertura ovata. Mus. Lud. Ulr. 675. n. 386.*

Column. aq. t. 52. f. ult. Cochlea nivea.

Rumpf mus. t. 22. f. F. Valvata 7: Albuta.

Argenv. Conch. t. 7. f. X. Uber tenui.

List. Conch. t. 566. f. 14. & t. 571. f. 22.

Seb. mus. 3. t. 38. f. 9. 10. 32. & t. 41. f. 22.

Knorr Vergn. I. t. 6. f. 6. 7. & 4. t. 8. f. 4. & 6.^p

40. f. 2. 3.

Meuschen Naturf. 13. p. 85. t. 5. f. 5.

Chemn. Conch. 5. t. 189. f. 1923-1933.

β) Chemn. Conch. 5. t. 189. f. 1922. 1923.

γ) Gualt. test. t. 67. f. T.

δ) Seb. Mus. 3. t. 41. f. 12. 13.

Habitat in mari, Indianam, & medium australiæque Americae alluente, testa ad $2\frac{1}{4}$ pollices longa nivea ante ochroleuca rarius fusca, glaberrima, solida, anfractibus 4-5 extimis maxime approximatis.

leucozo-
nias. 7. N. testa subglobosa solida badia albo fasciata: spiralis depresso-ovalis. Kaemmer. Conch. Rudolst. p. 187. " 12. f. 5. 6.

Habitat --- vitello affinis, at lobo teste evidenter distincta, testa ultra pollicem alta, at paulo latiori, anfractibus 4-5.

spadicea. 8. N. testa subglobosa solida spadicea subtus alba, apice cærulecente, faucis fasciis lateritiis, dorsi alba. Chemn. Conch. 5. t. 187. f. 1872. 1873.

β) Chemn. Conch. 5. t. 188. f. 1896. a. b. 1897.

Habitat ad littora insulae S. Mauritii, teste solida satis magna.

rufa. 9. N. testa tenui rufa: umbilico obscuriori: limbo, dorso baseosque spiræ fascia albis, faucis fascia rufescente, columellæ vitta fusca.

Rumpf mus. t. 22. f. D.

v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 17. f. 3. 4.

Chemn. Conch. 5. t. 187. f. 1874. 1875.

Habitat ad insulam S. Mauritii, spadiceæ affinis.

fulminea. 10. N. testa subglobosa lineis angulatis spadiceis picta i lobo explanato.

Adans. Seneg. I. t. 13. f. 4. Gocher.

List. Conch. t. 367. f. 17.

Gault. test. t. 67. f. M.

Seb. mus. 3. t. 38. f. 33.

Knorr Vergn. I. t. 10. f. 4.

Chemn. Conch. 5. t. 187. f. 1881-1884.

β) *List. Conch. t. 567. f. 18?*

γ) *Gault. test. t. 67. f. H?*

Habitat ad Africæ littora, rara, testa alba aut flavi-
cante.

II. *N. testa lævi nivea maculis punctisque subtilissimis*
rufis varia; umbilico gibbo bifido.

Chemn. Conch. 5. t. 187. f. 1894.

Habitat in mari mediterraneo & americano, an vere dis-
tincta a canrena species?

III. 12. *N. testa subglobosa nitida lævissima: spiræ basi sub-*
rugosa, columella nivea.

Chemn. Conch. 5. t. 188. f. 1898-1899.

β) *Chemn. Conch. 5. t. 188. f. 1904.*

Habitat rara in maribus orientalibus, testa utrinque cer-
vina: fascia media angusta alba; in β) tota testa nivea.

IV. 13. *N. testa subglobosa alba sanguineo maculata & punctata*
apice obtuso intusque cærulecente: umbilico spirali.

Chemn. Conch. 5. t. 188. f. 1900. 1901.

Habitat - - -

V. 14. *N. testa rugosa intus glaberrima dilute testacea: um-*
bilici ambitu albo.

Chemn. Conch. 5. t. 188. f. 1902. 1903.

Habitat ad insulas Americæ mediæ obversas; testæ ru-
gis oblongis consertis.

VI. 15. *N. testa subglobosa lævi prasina intus subfuscata apice*
livida, ad angulum anfractuum subrugosa.

Chemn. Conch. 5. t. 188. f. 1905-1910.

Habitat ad Africæ, præsertim Marochii, Antillarum
quoque littora, testa interdum fasciis plumbosis varia,
juniore tenui & pellucida.

VII. 16. *N. testa subglobosa oblique plicata: spira mucronata,*
umbilico bifido.

v. *Born. mus. Caes. Vind. test. t. 17. f. 5. 6.*

Habitat - - - spiræ unfractibus 4.

- arachnoidea- 17. N. testa alba lineis rufescentibus reticulata apice ^{nit} gricante : anfractibus convexis , umbilico subobtegula. *Chenn. Conch.* s. t. 188. f. 1915. 1916.
Habitat --- an vere distincta species ?
- vittata. 18. N. testa subglobosa fusca : vitta duplii alba medio reticulata utrinque denticulata. *Chenn. Conch.* s. t. 188. f. 1917. 1918.
Habitat ad Marochii littora.
- melanosto- 19. N. testa tenui pellucida lœvi oblonga : anfractu ^{primo} umbilico ventricoso plano maximo reliquis compressiss , lico semiclauso. *List. Conch.* t. 142. f. 35. & t. 566. f. 15.
Gualt. test. t. 67. f. D.
Seb. mus. 3. t. 41. f. 20. 21?
v. Borni mus. *Caes. Vindob.* *test.* t. 15. f. 13. ¹⁴
Chenn. Conch. s. t. 189. f. 1926. 1927.
Schroet. inn. Bau Schneck. t. 5. f. 3.
 $\beta)$ *List. Conch.* t. 565. f. 13.
Knorr Vergn. 4. t. 6. f. 3. 4.
Regenf. Conch. I. t. 5. f. 54.
Chenn. Conch. s. t. 189. f. 1934. 1935.
 $\gamma)$ *Chenn. Conch.* s. t. 189. f. 1936. 1937.
 $\delta)$ *Chenn. Conch.* s. t. 189. f. 1938.
 $\epsilon)$ *List. Conch.* t. 559. f. 2.
Chenn. Conch. s. t. 190. f. 1940. 1941.
 $\zeta)$ *Rumpf mus.* t. 22. f. E.
Habitat in mari indico, β , γ , ϵ rara', magis adhuc δ , testa ad 2 pollices longa , alba , aurantia vel fusca , crebro fasciis vittisve interdum interruptis , subfuscis , spadiceis vel albis , in δ) canis venis lineisque angulis , fuscis pictis , ut plurimum 2 exornata umbilici , ambitu columellaque nigris , aut obscuris , hæc in β) mare.

Hæc neritarum tribui videntur inserendæ utrum vere distinctæ species , en potius varietate depictæ a Listero Conch. t. 561. f. 8. t. 569. f. 10. t. 570. f. 21. t. 572. f. 23. & t. 573. f. 28. a Bonnani recreat. & mus. Kircher. 3. f. 7. 4. 164. 168. 169. 198. 203. & 334. recreat. 3. f. 387. mus. Kircher. 2. f. 24. & 388. a Rumpf. mus. t. 22. f. 1. a Valentyn. Abb. t. 8. f. 72. a Gualtieri. test. t. 64. f. N. t. 66. f. A. & t. 67 f. F. G. ab Argenville Conch. t. 6. f. M. t. 7. f. D. T. Y. Z. t. 3. & t. 29. f. 3. & zoomorph. t. 3. f. B. & t. 10. f. E. Seba mus. 3. t. 38. f. 54. 55. 66. & 69. t. 39. f. 21-24. et 30. et t. 41. f. 1. 7. 8. 16. et 17. et Knorr Vergn. 2. t. 13. f. 5.

Papilla. 20. N. testa pellucida tenui oblonga decussatim striata for-
didè lutea : apertura subovalis, columella alba, um-
bilico semiclauso.

Chemin. Conch. 5. t. 189. f. 1939.

Habitat frequens ad Tranquebariae littora, anfractibus 4.

clathrata. 21. N. testa depressa ovata transversim undulata longitudi-
naler costata : costis planis obliquis semilunaribus,
spira papillari.

Schroet Einl. in Conch. 2. p. 332. t. 4. f. 15.

Habitat - - - fossile in Campania Gallica.

Valvata. 22. N. testa planiuscula : apertura circinata.

Müll. zool. dan. prodr. 2891. Valvata cristata.

*Habitat in Oceano septentrionali, an hujus generis &
tribus? incola tentaculis 2 setaceis, oculum ad angu-
lum posteriorem gerentibus gaudet.*

Lindica. 23. N. testa globoso-subacuta crassiore : anfractibus qua-
tuor per sulcos profundissimos discretis. *Müll. zool.
dan. prodr. 2955.*

Habitat in Oceano septentrionali, an hujus tribus?

24. N. testa globosa crassiore : spiræ submucronata; an-
fractibus tribus. *Müll. zool. dan. prodr. 2956.*

Habitat in Oceano septentrionali; an hujus tribus?

25. N. testa sub epidermide ex flavicante, virescente &
cærulescente varia lineis angulatis viridibus picta: spiræ
anfractibus novem sulco distinctis.

v. Zorn *Naturf. 7. p. 160. t. 2. f. B. 1. & B. 2.*

*Habitat in nova Seelandia, nonne potius ad trochos
releganda? testa mediae magnitudinis; ochroleuca;
spice aurantia, apertura subargentea.*

** Imperforatae:

† labiis edentulis.

Corona. 26. N. testæ anfractibus spinis cōrōnatis. *Mus. Lud. Ulri:
976. n. 387.**

*Müll. hist. verm. 2. p. 197: n. 383. Nerita testa dilatata
convexa striata fusca: aculeis longis nigris.*

Rumpf nius. t. 22. f. O. Valvata spinosa.

Petiv. amb. t. 3. f. 4.

Argenv. Conch. t. 7. f. 2:

Martin. berl. Mag. 4. t. 8. f. 30.
Walch. Naturf. 4. p. 52. t. I. f. I. 2.

Favann. Conch. t. 61 f. D⁷.

Chemn. Conch. 9. t. 124. f. 1083. 1084.

Habitat in Indiæ, insulae S. Mauritii, Americæ australis)
insularumque obversarum fluviis, testa minuta, inter-
dum tota nigra spinis longioribus vel brevioribus ar-
mata extrinsecus tenuiter striata: spiræ anfractu pri-
mo magno, reliquis convexis.

Radula. 27. N. testa fulcata tuberculis æqualibus. *Mus. Lud. Ulr.*
*676. n. 388.**

Rumpf mus. t. 22. f. M.

Gualt. test. t. 64. f. I?

Seb. mus. 3. t. 41. f. 18. 19.

v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 17. f. 7. 8.

Chemin. Conch. 5. t. 190. f. 1946. 1947.

Habitat rario in India insulisque obversis, testa tenui-
pellucida juglandis magnitudine, nunc alba nunc cinc-
rea, costata: costis tuberculatis, sulcis striatis, spiræ
prominente acuta.

cornea. 28. N. testa obsolete striata. *Mus. Lud. Ulr.* 677. n. 389.*

Argenv. Conch. t. 7. f. M?

Habitat in mari indico & rubro? testa fragili, nunc fusca,
nunc alba, nunc subviolacea fasciis longitudinalibus
albis vel testaceis picta, nunc violacea albo-punctata,
interdum fascia longitudinali alba exornata.

fluvialis. 29. N. testa rugosa. *Fn. suec* 2194.*

Müll. zool. dan. prodr. 2952. *hist. verm.* 2. p. 194. n. 481.
Nerita testa dilatata convexa albis maculis reticulata,
List. Conch. t. 141. f. 38.

anim. angl. t. 2. f. 20.

Pet. mus. 67. n. 718.

Gualt. test. t. 4. f. LL.

Argenv. Conch. t. 27. f. 3.
zoomorph. t. 8. f. 3.

Martin. berl. Mag. 4. t. 8. f. 27. 28.

Schroet. Flußconch. t. 5. f. 5-10. t. 9. f. 4. 5. 2. 3.
& t. 11. min. C. f. 8.

Geoffr. test. 5.

Geve Conch. t. 24. f. 258-265.

g) Lister. Conch. t. 607. f. 43.

γ) Chemn. Conch. 9. t. 124. f. 1086. 1087. a-l.

δ) Chemn. Conch. 9. t. 124. f. 1080. 1081.

Habitat in Europæ & Barbaria flaviis & rivis, potissimum ad cataractas, & lacuum ostia, recta & circiter lineare longa, ut plurimum maculis squamosis varia, ovata, anfractibus 3, minoribus 2 lateralibus, columellæ alba.

litoralis. N. testa laevi : vertice carioso. Fn. suec. 2195.* It. ocl. - 261. Müll. zool. dan. prodr. 2953. O. Fabr. Fn. groent. p. 402. n. 404.

Lift. Conch. t. 607. f. 39. 40.

animi; angl. t. 3. f. 11. 12.

Petiv. mus. 67. n. 717.

Klein ostr. t. I. f. 25. 26.

Habitat innumera varie atque in Europæ maribus, an d'versa a fluvialili, aut turbine nerito. de species? vertice fortuito carioso.

lacustris. 31. N. testa laeviuscula cornea : apice exquisito. Fn. suec. 2196.

Gualt. test. t. 4. f. MM.

Habitat in Europæ aquis stagnantibus fontibusque calidis, littorali similis, at testa cornea aut nigricante, interdum albo-punctata.

Magdale- 32. N. testa late sulcata nigra intus alba : labio flavicante, operculo laevi bidentato.

Adans. Seneg. 1. p. 190. t. 13. f. 5. Kiset.

Huic alteri tribui adscribendæ videntur cochleæ a Lister Conch. t. 606. f. 34. t. 607. f. 44. a Bonanni recr. & mus. Kirch. 3. f. 197. 200. 205. 206. 217. 219. recr. 3. f. 388. 389. 391. 392. 399. 401. a Rumpf. mus. t. 27. f. 2 a Gualtieri test. t. 66. f. E. M. N. & T. ab Argenville Conch. t. 7. f. 7. E. N. S & t. 29. f. 4. nr. 4. 1. a Klein ostr. t. 7. f. 115. a Seba mus. 3. t. 40. f. 32. & 46. t. 41. f. 28-30. t. 59. f. 11. 12. 17. & 21. 24. a Knorr Vergn. I. min. 13. f. 5. a Marigli Danub. 4. t. 31. f. 6. & a Schroeter Enchonch. 1. X. Kircher. 3. f. 4. depictæ, primæ ejus familie cochleæ a Bonanni recr. mus. 607. f. 41. 42. & t. 1056. f. 6. 7. a Kleina. ostrac. t. 2. f. 33. 34. a Gualtieri t. H. t. 66. f. AA & a Knorr Vergn. 6. t. 17. f. 8. alteri utrum familiae t. stæ a Listero. Conch. t. 595. f. 2. t. 596. f. 4. 6. & 8. t. 597. f. 9. & 10. t. 598. f. 12-14. t. 601. f. 18. & 19. t. 603. f. 22. t. 23. t. 604. f. 28-30. t. 605. f. 31-33. & t. 606. f. 38. a Kl. in. str. t. 2. f. 33. a Bonanni recr. & mus. Kircher 3. f. 216. a Gu. literi test. t. 66. f. B. O. Q. R. S. ab Argenville Conch. t. 7 f. B. H. L. & t. 26. f. 4. n. 4. 2. & zoomorph. t. 3. f. C. a Seba mus. 3. t. 59. f. 193. Regenfus Conch. I. t. 3. f. 26. & t. 10. f. 39. depictæ.

VÉRMES TESTACEA. Nerita.

Habitat rario circa insulas Magdalene, testa 6 lineas longa, spiræ anfractibus 3, operculi dentibus recurvis approximatis.

marginata. 33. N. testa tenui decussatim striata tuberculata nigra ochroleuco-maculata subglobosa : apertura extrinsecus marginata.

Schroet Einl. in Conch. 2. p. 371. t. 4. f. 16.

Habitat - - - testa intus glaberrima, apertura margine externo cancellato, columella plana, rugosæ, tuberculata.

dubia. 34. N. testa tenui pellucida ovata nitida obscurius flava nigro varia : labio exteriori acuto, interiori glaberrimo. Chemn. Conch. 5. t. 193. f. 2019. 2020.
Habitat rarissima - - - verüce prominente.

†† labiis dentaliis.

pulligera. 35. N. testa laevi rudi : spirula excavato-oculata, labio interiori laevi crenulato.

Müll. hist. verm. 2. p. 195. n. 382. Nerita (rubella) testa dilatata convexa nigrante, labio interiore crenulato.

Rumpf mus. t. 22. f. H. Valvata fluviatilis sive rubella
Petiv. gaz. t. 11. f. 4.

Lift. Conch. t. 143. f. 37.

Gualt. test. t. 4. f. HH.

Seb. mus. 3. t. 41. f. 23-26.

Knorr Vergn. 6. t. 3. f. 3.

Martin. berl. Mag. 4. t. 8. f. 31.

v. Born. mus. Caes. Vind. test. t. 17. f. 9. 10.

Favann. Conch. t. 61. f. D¹⁸.

Chern. Conch. 9. t. 124. f. 1078. 1079.

Habitat in Indiæ fluviis, incola indiæ eduli, pullos ovales, convexos, exterius ochroleucos, intus albos, ad 235 in testæ dorso gerente, testa 14-16 lineas longæ, dura, subtilissime transversim striata, pellucida, nigra, vel fuscescente, anfractibus 2, altero maximo in dentem acutum terminato, fauce glabra nisi id fundo late carnea vel albida, juxta marginem fascia lata fulva cincta, labio interiori adscendente nitido.

undulata. 36. N. testa tenui laevi undulata : vertice obtuso, labio exteriori substriato edentulo, interiori subdenticulato.

Chemn. Conch. 5. t. 191. f. 1970. 1971.

Habitat raro in India.

- aterrima.* 37. N. testa crassa opaca globosa nigerrima lineis picta ; intus alba : labio exteriore glabro , interiori tuberculato rugoso.
Chemin. Conch. 5. t. 192. f. 1985. 1986.
Habitat — — testa minutissime striata.
- Larva.* 38. N. testa laevi subglobosa alba fasciis ex fusco luteis varia : vertice obtuso , labio subdenticulato.
Rumpf mus. t. 22. f. 6.
Chemin. Conch. 5. t. 193. f. 2017.
Habitat rarissima ad Amboinam , testa mediae magnitudinis.
- Pupa..* 39. N. testa laevi subrotunda lactea : anfractuum striis transversis nigris parallelis.
Habitat — — inter virginem & littoralem media , hujus magnitudine , labio plano laevissime dentato.
- bident.* 40. N. testa laevi : labio interiori bidentato. *Mus. Lud.*
Ulr. 677. n. 309.*
 ♂) *Chemin. Conch.* 10. t. 165. f. 1594. 1595.
Habitat — — testa nigra aut rubella , obsolete striata ; unicolor , pist magnitudine ; ♂) lutea albido nebulosa : fasciis tribus nigris.
- viridis.* 41. N. testa laevi viridi : labio interiori medio crenulato. *Brown jam.* 399. *Nerita minima viridis.*
Schroet. Flusconch. t. 5. f. 11. a. b.
Chenin. Conch. 9. t. 124. f. 1089. a. β.
Habitat ad Minorcam & Jamaicam , fluvialili affinis , at testa magis oblonga & ovali , plus quam duplo minori , cingulis interdum moniliformibus albis , aut lineis longitudinalibus undulatis fuscis picta , apertura ovata ampla , labio interiori pallidiori , vertice vix conspicuo laterali.
- virginea.* 42. N. testa laevi ovata : labio interiori denticulato. *Mus.*
Lud: Ulr. 678. n. 391.*
List. Conch. t. 606. f. 35-37.
Pet. gaz. t. 11. f. 3.
Bonann. recr. & *mus.* *Kircher.* 3. f. 204.
Bonann. recr. 3. f. 176-181?
mus. *Kircher.* 3. f. 176-178. 180-182?
Argenv. Conch. t. 7. f. P.
Klein ostr. t. 2. f. 32.
Seb. mus. 3. t. 41. utrinque ad n. 1. 6. 5.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 292. t. 4. f. 141.
 ♂) *List. Conch.* t. 604. f. 24?

γ) List. Conch. t. 604. f. 25?

δ) List. Conch. t. 604. f. 26?

ε) List. Conch. t. 604. f. 27?

Habitat in Indiae & australis Americæ flaviis, testa a pisi magnitudine ad pollicem usque longa alba, cinerascente aut flavicante, punctis, maculis, lineis angulatis vel unsulatis fasciisve nigris, fascis, cœruleo-escenibus, viorlaceis aut rubellis varia, vertice obtusissimo elongato, apertura ovata, labio interiori nonnunquam lœvi.

polita.

43. N. testa lœvi : vertice oblitterato, labio utroque dentato. Mus. Lud. Utr. 678. n. 392.*

List. Conch. t. 600. f. 17. & t. 602. f. 20.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 221?

Rumpf mus. t. 22. f. I. K. Nerita alpina.

Gualt. test. t. 66. f. D. F. G. H?

Argenv. Conch. t. 7. f. K.

Klein ostr. t. I. f. 29.

Seb. mus. 3. t. 38. f. 56. & t. 59. f. 1-3.

Regenf Conch. 1. t. 4. f. 43.

Knorr Vergn. 3. t. I. f. 4.

v. Born mus. Ctes. Vindob. test. t. 17. f. 11-16.

Chemn. Conch. 5. t. 193. f. 2001-2014.

β) List. Conch. t. 603. f. 21?

γ) Gualt. test. t. 66. f. E?

δ) Gualt. test. t. 66. f. I?

ε) Gualt. test. t. 66. f. L?

ζ) Gualt. test. t. 66. f. M?

η) Seb. mus. 3. t. 41. f. 27.

δ) Seb. mus. 3. t. 59. f. 13.

ι) Seb. mus. 3. t. 59. f. 14.

κ) Seb. mus. 3. t. 59. f. 15.

λ) Seb. mus. 3. t. 59. f. 17.

Habitat in India, in Oceano quoque australi, testa ovata solida, intus et exterius nitida, maculis, plumis, nebulosis, fasciis cinereis, his quoque roseis aut albis picta, vel ex albo nigroque varia, labio utroque eburneo, fauce utplurimum slava.

Peloron- 44. N. testa striata : labiis dentatis : interiore planiusculo ta.

rugoto. Mus. Lud. Utr. 679. n. 393.*

List. Conch. t. 595. f. I.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 214.

Gualt. test. t. 66. f. Z.

Argenv. Conch. t. 7. f. G. O.

Knorr Vergn. 5. t. 3. f. 2.

Mausch. Naturf. 13. p. 84. t. 5. f. 4. & 4. h.

Chemn. Conch. 5. t. 192. f. 1977-1984.

Schroet. Journ. 5. p. 462. f. 16.

Habitat ad insulas Americæ mediae & australi obversas ; grossæ affinis , at testæ colore rubro , sulcis minus profundis , labio exteriore non crenato , interiore non convexo facile distinguenda , testa rotundata alba , flavidante vel sanguinea , maculis radiisve rubris , spadiceis , cœruleofuscis vel nigris varia intus alba : apertura repanda , columella impressa : macula fauceque croceis.

Albicilla. 45. N. testa striata : labiis subdentatis ; interiore tuberculato. *Mus. Lud. Ulr.* 679. n. 394.*

Lift. Conch. t. 600. f. 16.

Rumpf mus. t. 22. f. 8.

Argenv. Conch. t. 7. f. F.

Seb. mus. 3. t. 41. supra f. 23. & t. 59. f. 16.

Knorr Vergn. 6. t. 13. f. 4.

Chemn. Conch. 5. t. 193. f. 2000. a-h.

Habitat ad Caput Bonæ Spei , & in mari indici , testa solida , oblonga , alba , rubella vel sordide lutea , maculis nebulosive interdum fasciis nigris , flavidantibus aut rubellis varia , vertice laterali plano , apertura amplissima : fauce arguta.

Hiftrio. 46. N. testa sulcata transverseque striata : labio interiore dentato. *Mus. Lud. Ulr.* 680. n. 395.*

Lift. Conch. t. 598. f. 11.

Knorr Vergn. 6. t. 13. f. 2.

Chemn. Conch. 5. t. 190. f. 1948. 1949. & t. 191. f. 1960. 1961.

Habitat - - - testa costis 30 inæquali , nunc pallide tinerea , fasciis 3 longitudinalibus fascis nunc rubicunda aut flavidante : fasciis transversis flexuosis albis , vertice obtusissimo , labio exteriori glaberrimo.

plicata. 47. N. testa sulcata : labiis dentatis : exteriore utrinque dentibus acutis conicis *Mus. Lud. Ulr.* 680. n. 396.*

Lift. Conch. t. 595. f. 3.

Bonann. recr. 3. f. 386.

mus. Kircher. 3. f. 371.

Gualt. test. t. 66. f. V.

Klein ostr. t. 5. f. 100.

Seb. mus. 3. t. 59. f. 18.

v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 17. f. 17. 15.

Schroët inn. Bau. Schneck. t. I. f. 5.

8) *Mantiss. alt. p. 551.* *Nerita lactaria.*

Habitat in India, testa rotundata solida ladea interdum maculata, vertice ut plurimum flavo, costis transversis 17-20, apertura angusta, labio exteriore intus dentibus 5-6, interiore convexo rugoso tuberculato, dentibus praeter aliquot minores 3 longis, validis.

grossa. 48. *N. testa sulcata : labiis dentatis, interiore convexo rugoso.* *Mus. Lud. Ulr. 681. n. 397.**

Rumpf mus. t. 22. f. N.

Scb. nius. 3. t. 41. ad f. 15.

Chemin. Conch. 5. t. 191. f. 1968. 1969.

Schroet. Journ. 5. p. 465. f. 17.

Habitat rara ad insulas Moluccas, testa rotundata alba venis nigris cinereisque varia, vertice prominulo, anfractu primo costis 13-14, labio exteriore exteriorius crenulato, intus dentato, interiore albo macula flava dentibus 3-4.

Chamæleon. 49. *N. testa sulcata sulcis viginti : labiis dentatis ; interiore rugoso tuberculato.* *Mus. Lud. Ulr. 681. n. 398.**

Rumpf mus. t. 22. f. L. *Nerita 3 undulata.*

Gualt. test. t. 66. f. X.

Argenv. Conch. t. 7. f. Q.

Knorr Vergn. 5. t. 15 f. 4.

Chemin. Conch. 5. t. 192. f. 1988-1991.

Habitat in mari indico, testa mediae magnitudinis, radibus undulatis nigris albisque alternis varia, aut flavicante nigro alboque undulata, subglobosa, lineis subtilissimis costas inaequales decussantibus, vertice depresso lateraliter.

undata. 50. *N. testa sulcata sulcis triginta : labiis dentatis ; interiore rugoso tuberculato.* *Mus. Lud. Ulr. 682. n. 399.**

List. Conch. t. 596. f. 7.

Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 215.

Gualt. test. t. 66. f. P.

Chemin. Conch. 5. t. 190, f. 1950. 1951.

Habitat in mari indico, Chamæleoni affinis, at testa solidæ exalbidæ cinereæ aut rufescens nigro cinereove maculatae fasciis hinc inde interruptis latioribus, vertice magis acuminato prominulo, costis complanatis, circiter 30 cum sulcis intermediis lœvibus, columella alba.

51. *N. testa fulcata*: labiis dentatis; interiori tuberculato;
Mus. Lud. Ulr. 682. n. 400.*
Lift. Conch. t. 596. f. 5? & t. 599. f. 15.
Pet. gaz. t. 100. f. 6.
Bonann. recr. & mus. *Kircher.* 3. f. 220?
Gault. test. t. 66. f. CC.
Argenv. Conch. t. 7. f. I?
Seb. mus. 3. t. 59. f. 4. 6-10.
Knorr Vergn. 3. t. 1. f. 5.
Chemn. Conch. 5. t. 191. f. 1972. 1973.
Habitat rario in India, *testa dilatata, solida, magnæ alba, maculis nigris, interdum cærulecentibus varia, costis latis complanatis 15-19 apertura ampla, columella plana.*

52. *N. testa solida crassa glaberrima radiis undulatis atris & flavicantibus picta*: labio exteriore edentulo, interiore subconcavo quadridentato.
Chemn. Conch. 5. t. 190. f. 1942. 1943.

Habitat - - - testa inter congeneres maxima, intus & ad aperturam nivea, labio interiori lævi latissimo.

53. *N. testa alba lineis angulatis nigris varia*: costis sulcisque sedecim crenatis: labio exteriore exterius crenato intus dentato, interiore superne rugoso inferne tuberculato; palato dentato.
Rumpf mus. t. 22. f. 3.

Chemn. Conch. 5. t. 190. f. 1944. 1945.
Habitat rarissima - - -

54. *N. testa aterrima glabra supra tenuissime striata*: labio utroque albo, exteriore intus subtiliter sulcato subdentato, interiore concavo rugoso tuberculato.
Chemn. Conch. 5. t. 190. f. 1954. 1955.

Habitat in mari atlantico, americano, australi.

55. *N. testa sulcis albis costisque albo maculatis sedecim, vertice prominulo, labio exteriore utrinque glabro, interiore subconcavo flavicante dentato.*
Chemn. Conch. 5. t. 191. f. 1956. 1957.

Habitat ad insulam Ascensionis, testa satis magna, vertice ut plurimum detrito, rarius nigro, operculo tenui pellucido.

- lineata. 56. N. testa intus labioque utroque albis, anfractibus tere
tibus striis nigris parallelis cinctis : interstitiis striatum
violaceis, labio exteriore intus striato.
Chenn. Conch. 5. t. 191. 1958. 1959.
Habitat rara in freto malaccensi.
- vericolor. 57. N. testa maculis quadratis nigricantibus, cæruleoscen-
tibus, rubris albisque & fasciis rubro alboque macu-
latis, varia : labio interiore intus striato utrinque
dentato.
Argenv. Conch. t. 7. f. & Ec.
Chenn. Conch. 5. t. 191. f. 1962. 1963.
*Habitat ad insulas Antillas, anfractibus teretibus, veri-
prominulo, labio interiore superne rugoso, inferne qua-
dridentato, dentibus mediis majoribus.*
- Pica. 58. N. testa alba exterius nigro radiata striis transversalibus
rotundatis lævibus inæquali ; labio interiore rugoso
quadridentato.
Rumpf mus. t. 22. f. 4.
Chenn. Conch. 5. t. 191. 1964. 1965.
*Habitat in mari indico, vertice parum prominulo, labio
exteriori extrinsecus crenato, intus striato.*
- costata. 59. N. testa intus flavicante subglobosa striis crassioribus
cincta : interstitiis niveis, labio utroque dentato,
exteriore exterius crenato, interiore subconvexo ru-
goso tuberculato.
v. Born mus. Cœf. Vindob. test. t. 17. f. 19. 20.
Chenn. Conch. 5. t. 191. f. 1965. 1967.
*Habitat rara ad insulas Indiæ nicobaricas, testa pulla
aut picea : vertice obtusissimo ut plurimum detrito flavic-
ante, aut albo, labiis albis.*
- quadrico- 60. N. testa subviolacea apice flavicante intus alba striis
lor. elevatis nigris : labio utroque dentato, exteriore intus
fulcato ; interiore rugoso.
Chenn. Conch. 5. t. 191. f. 1974. 1975.
*Habitat in mari rubro, testa nonnunquam intus cum
utroque labio flavicante.*
- malaccen- 61. N. testa sulcata intus flavicante : vertice prominulo,
sis. labio exteriori inermi exterius crenulato, interiore
flavicante lævi.
Chenn. Conch. 5. t. 192. f. 1976.
Habitat in freto malaccensi.

62. N. testa subglobosa nigra intus alba sulcata striataque : vertice obtuso , labio utroque rugoso denticulato.
Chemn. Conch. 5. t. 192. f. 1987.
Habitat frequens ad insulas Antillas.
63. N. testa subglobosa confertim transverse striata alba : radiis undulatis purpurascientibus , labio utroque dentato.
Chemn. Conch. 5. t. 192. f. 1992. 1993.
 $\beta)$ *Chemn. Conch.* 5. t. 192. f. 1994.
 $\gamma)$ *Chemn. Conch.* 5. t. 192. f. 1995.
Habitat ad insulas Americæ mediae obversas , vertice prominulo , labio exteriori intus sulcato , interiori superne rugoso , testa in β) rubro obumbrata : radius in atrum vergentibus , in γ) fasciata , fasciis part. m lividis , par. im rubro - punctatis.
64. N. testa subglobosa confertim transverse striata nigerima : radiis ochroleucis : labio utroque subdenticulato ; interiore medio tuberculato.
Chemn. Conch. 5. t. 192. f. 1996. 1997.
Habitat ad insulas Americæ obversas , vertice vix prominulo , labio exteriore intus sulcato ; margine crenato albo nigroque vario , ad laius denticulato , altero subconcavo , medio tuberculato , inferne subdentato.
65. N. testa obtusa transversim striata : striis maculis subquadratis albis nigrisque , labio utroque denticulato.
Adans. Seneg. 1. p. 190. t. 13. f. 2. Tadin ?
Chemn. Conch. 5. t. 192. f. 1998. 1999.
Habitat ad insulas inter Africam & medium Americam intersitas , testa mediae magnitudinis , labio exteriori intus vix striato denibus 1-2 , interiore concava glabra inferne denticulata.
66. N. testa nigricante : fasciis duabus canis , vertice albo.
Rumpf niuf. t. 22. f. 7.
Chemn. Conch. 5. t. 193. f. 1015.
Habitat in India , an distincta hujus tribus species ?
67. N. testa subglobosa alba characteribus inscripta : labio interiori crenulato dentato.
Chemn. Conch. 5. t. 193. f. 2016.
 $\beta)$ *Chemn. Conch.* 5. t. 193. f. 2018.
Habitat rara in India , β) testa fasciata , fasciis ex lineis parallelis conflatis.

- violacea.* 68. N. testa ovata violacea albo punctata solida lævi : labio interiori inferne denticulato.
Meuschen Naturf. 13. p. 81 t. 5. f. 2. 2. c. d. e. f.
Martin. Conch. I. t. 13. f. 133. 134.
β) *Meusch. Naturf.* 13. p. 84. t. 5. f. 3. 3. g.
Habitat rara - - - testa rarius rubra vel exalbida,
β) *alba maculis spadiceis nigro variis, subitus obscurior*
re, nonnunquam ex atro cinerea aut alba.
- Senegalen-* 69. N. testa ovata obtusa solida nigerrima intus alba fulcis.
sis. ta : labio utroque dentato.
Adans. Seneg. I. p. 188. t. 13. f. 1. *Dunar.*
Habitat in Senegal, testa pollicem lata, dimidio breviori,
anfractibus tribus, primo turgido fulcis 25-30 exar-
rato, 2 reliquis minimis.
- promen-* 70. N. testa atra ovato acuminata : fulcis triginta.
torii. *Adans. Seneg.* I. p. 191. t. 13. f. 3. *Lagar.*
Habitat rario ad littus Africæ inter promontoria Manuel
& viride, testa duplo latiori, quam longa, interdum
albo varia, vertice anfractibus 3 conflato, labio sinistri
tro rugoso.
- tricolor.* 71. N. testa rubro nigro albidoque varia : anfractu primo
striis quindecim elevatis, labio utroque dentato.
Adans. Seneg. I. p. 191. 192. t. 13. f. 4. *Selot.*
Habitat ad Africæ littus occidentale, testa 9 lineas longa
labio dextro dentibus 10, sinistro glabro magnis 3 emul-
ginatis subbifidis exasperata.
- perversa.* 72. N. testa cingulata : spira contraria, apertura octodentata.
Walch Naturf. 6. p. 165.
Schmidel Verst. v. Verst. Forts. p. 41. t. 23. f. 1-3.
Chemin. Conch. 9. t. 114. f. 975. 976.
Habitat - - - haec tenus modo fossilis.
- turrita.* 71. N. testa alternatim albo nigroque fasciata intus alba:
vertice valde elata, labro acuto. *Chemin. Conch.* 9.
t. 124. f. 1085.
Habitat in insularum antillarum aquis dulcibus, anfrac-
tibus quatuor.
- aculeata.* 72. N. testa nigrescente transversim striata : striis spinosis,
labio planiusculo lævi subdentato. *Chemin. Conch.* 10.
p. 305. t. 169. f. 1642.
Habitat in Indiae fluviis, pulligeræ affinis.

HALIOTIS. Animal Limax.

Testa auriformis, patens: spira occultata laterali; disco longitudinaliter poris pertusum.

1. *H. testa subrotunda utrinque nitida.* Mus. Lud. Ulr. 683.

n. 401.*

Lift. Conch. t. 613. f. 5.

Gualt. test. t. 69. f. B.

Valent. Abh. t. 12. f. 102.

Knorr Vergn. 5. t. 20. f. 3?

Martin. Conch. I. t. 14. f. 136. & t. 15. f. 141.

Habitat in mari indico & ad Caput Bonæ Spei, testa ad 7 & 9 pollices longa crassa intus eximie margaritacea, exteriorius dorso longitudinaliter undulatim rugosa, sordide viridi, ut plurimum sordibus marinis obducta, poris 8-10.

2. *H. testa subovata: dorso transversim rugoso tuberculato.*

Fn. suec. 2. 2198. Müll. zool. dan. prodr. 2876.

Fn. suec. I. 1326. Haliotis striata rugosa.

Rondel. pisc. 5. Auris marina.

Gesn. aq. 807. 808. Patella major f. fera.

Adans. Seneg. I. t. 2. f. 1. Ormier.

Bellon. aq. 395.

Aldrov. exang. 551. f. 1. 2.

Lift. Conch. t. 611. f. 2.

dn. angl. t. 3. f. 16.

Bonann. recr. & mus. Kircher. I. f. 10. 11.

Rumpf mus. t. 40. f. H.

Gualt. test. t. 69. f. I.

Ginanni. adr. 2. t. 3. f. 27.

Argenv. Conch. t. 3. f. A. F.

zoomorph. I. I. f. C.

Bytem. app. t. II. f. 42.

Regenf. Conch. I. t. 8. f. 20.

Martin. Conch. I. p. 174. vign. 6. & t. 15. 16. f. 145-149.

Regenf. Conch. I. t. 10. f. 42.

Argenv. zoontorph. t. I. f. D.

Argenv. Conch. t. 3. f. D.

Habitat frequens in Oceano europeo, mari adriatico, atlantico, indico, testa 4-5 pollices longa, dorso rugis un-

*dulatis, poris circiter 28, quorum 4 aut plures aperi-
tū tuberculis inæqualibus, interdum obsoletis.*

- striata.** 3. *H. testa ovata ferruginea transversim rugosa longitudinaliter striata.* *Mus. Lud. Ulr. 684. n. 403.**
Knorr Vergn. I. t. 17. f. 2. 3.
Martin. Conch. I. t. 14. f. 138.
Gault. test. t. 69. f. E.
Schroer. Einl. in Conch. 2. p. 387. t. 4. f. 17.
*Habitat in Asia, & Barbatia tuberculata affinis, at telli-
ut plurimum minore rugis non tuberculatis & magis rugo-
laribus exarata, albo maculata ferruginea, rubra, viri-
ridi, aut rubro viridi que varia, poris circiter 38, ele-
vatis, quorum 4-5 aperti.*
- varia.** 4. *H. testa ovata : striis longitudinalibus ; majoribus tube-
culatis.* *Mus. Lud. Ulr. 684. n. 404.**
List. Conch. t. 612. f. 4?
Rumpf mus. t. 40. f. G.
Gault. test. t. 69. f. L. M.
Klein ostr. t. 7. f. 113?
Martin. Conch. t. 15. f. 144.
*Habitat rara in India, testa alba vel flavescente fusco vel
sordide viridi-nebulosa, striis elevatis arcuatis paralle-
lis spiram versus majoribus inæquali, poris 20-30, &
5 apertis, margine inæquali.*
- marmo-
rata.** 5. *H. testa ovali : striis longitudinalibus ; transversis obsole-
tis.* *Mus. Lud. Ulr. 685. n. 405.**
List. Conch. t. 614. f. 6.
Gault. test. t. 69. f. A. C.
Argenv. Conch. t. 3. f. B.
Knorr Vergn. 2. t. 17. f. 4. 5.
Martin. Conch. I. t. 14. f. 139.
*Habitat in mari africano & indico, testa ut plurimum ²³
interdum 4 pollices longa infra poros circiter 30, quo-
rum 4-5 aperii, excavata, fusco alboque, vel fusco
albo viridi que, vel fusco albo viridi rubroque varia,
striis longitudinalibus semilunaribus subcilibus.*
- abinium.** 6. *H. testa læviuscula oblonga : margine subfalcato, dorso
nervis elevatis.* *Mus. Lud. Ulr. 685. n. 406.**
List. Conch. t. 610. f. 1.

Rumpf *nus.* t. 40. f. E. F.
Gault. *test.* t. 69. f. D.
Argenv. *Conch.* t. 3. f. E.
Regenf. *Conch.* t. 1. t. 9. f. 29.
Knorr Vergn. 3. t. 15. f. I.
Mariin. *Conch.* t. 16. f. 150.

Habitat rara in India, testa vix ultra 3 pollices longa; striis longitudinalibus subtilissimis notata exterius viridi fusco alboque varia, intus ex viridi margaritacea striata, poris circiter 30 elevatis, quorum 5-7 aperti, striis omnibus spirae propinquis granulatis, saepius rubro-punctatis.

7. *H. testa ovata rubra* : ventre angulo elevato. *Mus.*
Lud. Ulr. 686. n. 407.*
Knorr Vergn. t. 1. t. 20. f. 5.
Murray testac. t. 1. f. 25?
Martin. *Conch.* t. 14. f. 137? 140.
Habitat in mari africano & indicō, testa interdum flavicante, decussatim striata, poris 30 approximatis, 5-6 apertis, plicis transversis rarioribus, planioribus, striis obliquis crebrioribus magis elevatis.
8. *H. testa ovata virescente fusco maculata* : striis transversis elevatis duplicitibus.
List. *Conch.* t. 612. f. 3?
Martin. *Conch.* t. 15. f. 142.
 β) *Martin.* *Conch.* t. 15. f. 143.
Habitat rara in mari africano, testa intus argentea, exterius sub spira macula dilute purpurea, ex qua radit quidam arcuati ejusdem coloris per dorsum decurrent, margine dextro acuto sinuoso, poris aperiis 6.
9. *H. testa cano cærulecente rubroque varia ovata* convexa cancellata; spira prominente inflata.
Spengl. *Naturf.* 9. p. 150. t. 5. f. 1. a. b.
Abh. n. danz. *Ges.* 1. p. 264. n. 27.
Chemin. *Conch.* 10. t. 166. f. 1603. 1604.
Habitat ad novam Seelandiam, testa $3\frac{1}{4}$ pollicem longa, $2\frac{1}{2}$ lata, intus ex flavo rubroque margaritacea poris apertis 7-9 approximatis, orbicularibus, plicis transversis elevatis.
10. *H. testa ovata subconvexa solida* decussatim striata.
Schroet. *Eint.* in *Conch.* 2. p. 388. t. 4. f. 18.
Habitat rara ad Guineæ littora, testa $2\frac{1}{4}$ - $2\frac{1}{2}$ pollicis longa, $1\frac{1}{2}$ -2 lata obscure viridi alba maculata ad 1/2 spadicea;

interdum viridi rubro alboque varia, intus ex rubore viridique margaritacea striis longitudinalibus arcuatim & qualibus, transversis binis ternisve parallelis marginis acuto recto, poris complanatis, 6 apertis.

imperforata. II. *H. testa ovata imperforata costata: costis aculeatis, spira exserta.*

*Meuschen Naturf. 18. p. 19. t. 2. f. 18. 18. e.
Helblins Abh. bohem Privatg. 4. p. 124. t. 2. f. 3⁴*

35? Stomatia Phymotis.

Chemin. Conch. 10. t. 166. f. 1600. 1601.

Habitat rarissima in India, testa ultra pollicem longa, & ultra dimidium lata, cinerea, costarum spinis mediis validioribus, margine satis tenui acuto.

perversa. 12. *H. testa ovata imperforata: margine superne obliquior, interius tuberculato, spira perversa.*

Martin. n. Männigf. 4. p. 404. t. 1. f. 3.

Gault. test. t. 69. f. M?

Habitat - - - fossilis, testa $\frac{3}{4}$ pollicis longa, $\frac{1}{2}$ latus, ininore ad latus acuta; an vere hujus generis & ordinis?

plicata. 13. *H. testa dorso transversim plicata, matgne lato crasso longitudinaliter subtilissime striata.*

*Schroet. Einl. in Verstein 4. p. 278. t. 3. f. 9.
Hábitat - - - hacdenus modo fossilis reperta prope Hildesiam, testa violenter compressa, $\frac{1}{4}$ pollicis longa, $\frac{1}{2}$ lata, spiræ anfractibus 3-4.*

glabra. 14. *H. testa ovata laeviuscula solida viridi alboquè varia: spira humili.* *Chemin. Conch. 10. p. 311. t. 166. f. 1602.*

Habitat - - - testa 5 lineas ultra 2 pollices longa, 9 ultra pollicem lata, labio interiori latissimo, foraminibus per viis 6, striis nonnullis transversis prope spiram, aliisque longitudinalibus ponte percros:

pulcherri- 15. *H. testa subrotunda roseo alboque varia: striis granulatis, spira exserta.* *Chemin. Conch. 10. p. 313. t. 166. f. 1605. 1606.*

Martyn univ. Conch. 2. t. 62.

Habitat rarissima ad insulas Oceani australis; testa ultra 7 lineas longa, intus argentea, margine interiori latissimo, labio exteriori crenato, poris 30, quorun 6 per vii.

Virginea. 16. *H. testa ovata decussatim undulato-striata, obscure viridi maculis fasciisque albidis varia, intus coloribus iridis splendente.* *Chemin. Conch. 10. p. 314. t. 166. f. 1607. 1608.*

Habitat

Habitat ad novam Seelandiam, testa pollicem lata, & 6 lineas longiore, poris perviis 6.

17. *H. testa suborbiculari depressa rugosa albo spadiceo & flavicante varia : medio poris pertuso, spira aperta.*
Chemn. Conch. 10. p. 315. t. 166. f. 1609.

Habitat - - - circulo triplici elevato, similiique tuberculis obpresso pone rugas, labio interiore lato.

18. *H. testa ovali rugosa rubro alboque varia maculata intus margaritacea : spira deppressa.* *Chemn. Conch. 10. p. 315. t. 167. f. 1610. 1611.*

Martyn Conchol 2. f. 63. Frechled Ear.

Habitat rarissima ad novam Hollandiam, testa 4½-6 pollices longa, 3½ lata, plicis undulatis striisque longitudinalibus rugas transversas decussantibus, vittis quasi arcuatis albis varia, poris perviis 3-7, labii interni margine latissimo.

19. *H. testa ventricosa ex fusco fluvida rugis transversis plurimisque tuberosis longitudinalibus scabra, intus iridis coloribus coruscante.* *Chemn. Conch. 10. p. 317. t. 167. f. 1612. 1613.*

Favann. Conchyl. 1. p. 585. t. 79. f. D. Oreille de mer de la nouvelle Zelande.

Martyn Conchol. 2. t. 61. Iris Ear.

Habitat ad novam Seelandiam, pretiosa, testa 4½ pollices longa, 3 lata, intus coloribus pulcherrimis variantibus rutilante, poris perviis 6.

31. PATELLA. Animal Limax.

Testa univalvis subconica absque spira.

* *Labiatae s. labio interno instrudæ, testa integra.*

1. *P. testa orbiculata exterius perfoliata : labio fornicali perpendiculari.* *Mus. Lud. Ulr. 687. n. 408.**

Argenv. Conch. 1. 2. f. K. Cabochon.

Lift. Conch. 1. 546. f. 38.

Rumpf Mus. 1. 40. f. P. Q.

Gualt. test. 1. 9. f. 7.

Knorr Vergn. 6. t. 22. f. 1. & t. 35. f. 4. xl

Murray testaceol. 1. f. 5.

eee eee eee

Spengl. Naturf. 9. t. 3. f. 1. 2.

Mariin. Conch. 1. t. 13. f. 117-120. 125. 126.

β) Chemn. Conch. 10. p. 337. t. 168. f. 1630. 1631. *Patella Teotum sinense.*

Argeny. Conch. t. 2. f. 5.

da Costa Conchof. t. 6. f. 9.

Knorr Vergn. 6. t. 35. f. 4.

Favenn. Conch. 1. t. 4. f. B¹.

Habitat in mari indico & Americanam medium alluente, testa diametri rarius pollicem superantis conica obtusata, quasi truncata, hyalina, plicis, rugis, striis hue diluc decurrentibus potissimum versus marginem inferiorem inaequali, labio libero paulisper obliquo altera parte aperito in centro verticis positio, altera $\frac{1}{4}$ pollicis longior canalem referente.

neritoidea. 2. P. testa ovata apice subspirali: labio laterali. *Mus. Lud.*
Ulr. 688. n. 409.*

Lift. Conch. t. 545. f. 36?

Walch Naturf. 10. p. 75. t. 1. f. 172?

Meuschen Naturf. 13. p. 79. t. 5. f. 171a? ib?

Schroet. n. Litterat. 2. p. 301.

Habitat. - - aliis testaceis adhaerens incola rubro, testa verasi magnitudine, ut plurimum minorē, exalbida, glabra, adultiori, rugis nonnullis transversis inaequali, vertice valvulaque interna subrepanda lateralibus.

chinensis. 3. P. testa subconica lœvi: labio sublateralis. *Mus. Lud.*
Ulr. 688. n. 410.*

Argeny. Conch. t. 2. f. F. *Mitella chinensis.*

Lift. Conch. t. 549. f. 39.

Bonann. recr. & mus. Kirch. 1. f. 12.

Gualt. test. t. 9. f. X.

v. Born mus. Caes. Vindob. test. p. 414. *vign.* f. a. b.

Martin. Conch. 1. t. 13. f. 121-124.

β) Knorr Vergn. 6. t. 22. f. I.

Habitat in mari mediterraneo, atlantico, indico, rarius testa tenuissima, pellucida, glabra, latiori quam alijs, vertice acuto subflexuoso, labio concavo depresso, testa ut plurimum alba: maculis, rarius radiis fuscis, interdum spadicea, hinc inde quasi cinere conspersa.

Porcellana. 4. P. testa ovali apice recurva: labio posteriori plano. *Mus. Lud.* *Ulr.* 689. n. 411.*

Adans. Seneg. 1. t. 2. f. 8. *Sulin.*

Lift. Conch. t. 545. f. 34.

Rumpf. mus. t. 40. f. O.

Martin. Conch. t. 13. f. 27. 28.

Chenn. Conch. 9. t. 124. f. 1082.

Habitat rara in India & ad insulam Goream, testa convexa intus alba, exterius rubra maculis squamosis albis & lineis transversis undulatis cæruleis varia, nonne potius ad neritas amandanda?

fornicata. 5. P. testa ovali posterius oblique recurva : labio posteriori concavo.

Lift. Conch. t. 545. f. 33. 35.

Argenv. Conch. t. 2. f. N.

Mus. Gottwald. t. 40. f. 275. a. b.

Knorr Vergn. 6. t. 21. f. 3.

Walch. Naturf. 10. p. 78. t. 1. f. 3. 4.

Martin. Conch. I. t. 13. f. 129. 130.

β) Käemmer. Cab. Rudolst. p. 25. t. 2. f. 9.

γ) Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 504. t. 6. f. 10.

δ) Lift. Conch. t. 545. f. 37.

Klein ostr. t. 8. f. 8.

ε) Kuorr Vergn. 6. t. 11. f. 5?

Habitat ad Barbados, Iliam & alibi in mari mediterraneo, testa ut plurimum alba margine spadicea, interdum exalbida: radius dorsalibus maculisque lateralibus ex luteo fusca, rarus unicolor rubella aut spadicea, margine acuto, labio prominente, anterius semilunari.

aculeata. 6. P. testa ovali fusca striis aculeatis exasperata : vertice recurvo. Chenn. Conch. 10. p. 334. t. 168. f. 1624. 1625.

Da Costa Conchol. t. 6. f. I.

Elem. of. Conch. t. 2. f. 2.

Favann. Conch. I. t. 4. f. 3.

Walch. Naturf. 10. t. 1. f. 5.

β) Favann. Conch. I. t. 4. f. 2?

Habitat paulo rarer ad insulas Americæ mediorum obversas, fornicate usque, testa ut plurimum parva spadicea, aut alba, striis per longitudinem decurrentibus, labio albo cavitatem internam in partes æquales dispescente.

7. P. testa conica longitudinaliter plicata : labio interno lateral. Chenn. Conch. 10. p. 335. t. 168. f. 1626. 1627.

Da Costa Conchol. t. 6. f. 2.

Knorr Vergn. 3. t. 29. f. 1. 2?

Favann. Conch. I. p. 551. t. 4. f. A. I.

Meusch. Naturf. 18. t. 2. f. 16. 17.

B) Argent. Conch. t. 2. f. L.

Martin. Conch. I. t. 13. f. 135.

*Habitat ad Tranquebar & insulas Falkland, testa nitida
que alba, tenui, ad basin latiori quam alta, plicis obliquis.*

*Auricula. 8. P. testa subrotunda radiatim sulcata & striata apice
recurva : cavitate interna auriculari. Chemn. Conch.
10. p. 336. t. 168. f. 1628. 1629.*

Pet. gaz. I. t. 21. f. 11.

Da costa Conchol. t. 6. f. 10.

Favann. Conch. I. p. 559. t. 4. f. C. 2.

*Habitat ad insulas Borneo, S. Crucis & Thomæ, testa
nivea, nunc circa verticem violacea, nunc nigro rufa
diata, nunc intus fusca, margine modo alba, vel
tice fusco, limbo flavicante.*

*inæqua- 9. P. testa ovata tenui hyalina obsoleta transversum ru-
lis. gosa : margine inæquali : labio inæqualiter repando
hyalino.*

Schroet. n. Litterat. 3. p. 6. t. I. f. I. 2.

*Habitat ad Siam, buccino spirato innidularis, testa striata
transversum ultra dimidium pollicem longa, vertice obsoleta.*

*goreensis. 10. P. testa ovali plana tenui alba nitida, exterius lamellosa
Adans. Seneg. I. t. 2. f. 10. Jenac.*

Martin. Conch. I. t. 13. f. 131. 132.

*Habitat rara ad rupes maritimas insulæ Goreæ, testa
diametri 5-6 linearum.*

*contorta. II. P. testa albo-granulata subtilissime perpendicularlyiter
oblique costata : labio tenuissimo dimidiato obliquo.*

Walch. Naturf. 9. p. 199. t. 3. f. 3. 4.

Meusch. Naturf. 18. p. 16. t. 2. f. 14.

Martin. neuest. Mannigf. I. p. 405. t. I. f. 3. 4.

*β) Martin. neuest. Mannigf. I. p. 406. t. I. f. 3. 6.
Habitat rarissima - - - testa ex albo coriacea, intus
nitide dilute fusca.*

*depressa. 12. P. testa alba subtilissime striata pone verticem cer-
num dilatatum depressa.*

Meusch. Naturf. 18. p. 14. t. 2. f. II & II. c.

Habitat - - - -

*plicata. 13. P. testa conica ochroleuca intus ferrugineo radiata
plicis longitudinalibus transversim striatis.*

Meusch. Naturf. 18. p. 15. t. f. 12. 12. a.

Habitat - - - vertice medio, margine tenui, acutip-

14. P. testa alba conica striata undulatim sulcata : vertice sublaterali.

Meusch. Naturf. 18. p. 16. t. 2. f. 13.

Habitat - - - plicatae affinis.

15. P. testa subtortuosa pellucida ferrugineo maculata tenuiter plicata supra transversim sulcata , labio undulatim repando.

Meusch. Naturf. 18. p. 14. t. 2. f. 15. & 15. b.

Habitat - - - testa dimidio pollice paulo longiore.

16. P. testa conica echinata intus glaterrima.

Martin. neuest. Mannigf. I. p. 407. t. 1. f. 7. 8.

Habitat - - - fossilis haec tenus modo prope Crignon reperita, testa calcarea albida, tota exterius aculeis horrida.

** *Dentatae basi f. margine angulatae.*

17. P. testa ovali planiuscula laevi : labio posterius plano;

*Mus. Lud. Ulr. 689. n. 412.**

Gualt. test. t. 69. f. H. Crepidula Michelii.

Adans. Seneg. I. t. 2. f. 9? Garnot.

Habitat in mari mediterraneo, potissimum ad Barbariam, fornicatae affinis, testa hyalina subdepressa, labio semilunari.

18. P. radiis elevatis inæqualibus : extrinsecus crassioribus obtusis.

Rumpf. mus. t. 40. f. C.

Knorr Vergr. 6. t. 30. f. 2-4. 7. 8.

Argenv. Conch. t. 2. f. O.

Martin. Conch. I. t. 10. f. 81.

Habitat in mari indicis scopulis, testa fusca inter radios transversim striata: radiis ipsis albis, margine repando, vertice lato, oculos quasi binos albos referente.

19. P. testa angulata : costis septenis carinatis obtusis. *Mus. Lud. Ulr. 690. n. 413.**

Argenv. Conch. t. 2. f. M. Asteroepas.

List. Coneh. t. 532. f. 10.

Rumpf mus. t. 40. f. B.

Petiv. amb. t. 3. f. 3.

Klein offr. t. 8. f. 4.

Murray testac. t. I. f. 6.

Martin. Conch. I. t. 9. f. 70. 75? 76. 77.

Habitat ad insulas Javam & Barbados, testa intus alba, ceterum nunc unicolo, nunc radiata, nunc maculata, nunc

fasciata, solida, nunc magis, nunc minus depresso, vertice obtuso sublaterali, radiis ut plurimum marginem superantibus, inter majores septem ut plurimum & minoribus.

barbara. 20. P. testa dentata : costis novemdecim elevatis fornicate muricatis. *Mus. Lud. Ulr. 690. n. 414.**

Knorr Vergn. 5. t. 13. f. 5.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 405. t. 5. f. 1.

Habitat ad insulas Falkland, testa alba, extrinsecus interdum fascia lata radiisque fascis picta, convexa, inter costas 19 majores minoribus intersuis.

granula. 21. P. testa dentata : striis elevatis angulatis imbricatis. *Mus. Lud. Ulr. 691. n. 415.**

Lift. Conch. t. 536. f. 15.

Bonann. mus. Kircher. I. f. 22.

Gualt. test. t. 8. f. D.

Argenv. Conch. t. 2. f. H.

Regenf. Conch. I. t. 2. f. 24.

Martin. Conch. I. t. 8. f. 61.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 19-24. n. 42-50. 53.

Habitat ad littora Europæ australis, & ad promontorium Bonæ Spei, testa ad 2 usque pollices longa ut plurimum laetèa vertice fusco, interdum fusca radiis albis vertice dilutius fusco ochroleuco marginato, rarius cœruleo-fuscata fasciis 2 albis & vertice fusco, testa ceterum oblonga, convexa, antrorsum latiori, inter binas strias laeves tribus granulatis interstitiis : granulis cinereis, fuscis aut nigris.

granatina. 22. P. testa angulata : striis numerosis muricatis. *Mus. Lud. Ulr. 691. n. 416.**

Lift. Conch. t. 533. f. 12. & t. 534. f. 13.

Bonann. mus. Kircher. I. f. 27. 28. 30.

Gualt. test. t. q. f. F.

Argenv. Conch. t. 2. f. G.

Knorr delic. t. B. V. f. 8.

Vergn. I. t. 30. f. 2.

Regenf. Conch. I. t. 9. f. 31.

Martin. Conch. I. t. 9. f. 71-74.

Schraet. n. Litterat. 3. p. 26-40. n. 54-78.

Habitat ad Jamaicæ & australis Europæ littora, testa tenui extrinsecus alba, fuscescente, cornea, lutescente maculis, lineis, squamis obscurius vel dilutius fuscis, rarius spadiceis, nunc confertis, nunc rarioribus, nunc sparsis, nunc

ordinatis picta, vertice fusco, intus eburnea margine fusco luteoque maculato vertice fulvo, ferrugineo vel fusco sanguineo marginato, aut variegata, 1 $\frac{1}{4}$ -3 pollices longa, antrorsum latiore, striis tenuissimis transversis undulatis costis inaequalibus ad 60 usque.

Vulgarata. 23. P. testa subangulata: angulis quatuordecim obsoletis, margine dilatato acuto. Fn. suec. 2199.*

List. anim. angl. t. 5. f. 40.

Bonann. recr. & mus. Kircher. I. f. 4.

Knorr Vergn. 6. t. 27. f. 8.

Gualt. test. t. 8. f. Q.

Ginann. adr. 2. t. 2. f. 17.

Mariin. Conch. I. t. 5. f. 38..

β) Schroet. n. Litterat. 3. p. 62. n. 117.

γ) Knorr Vergn. 6. t. 27. f. 8.

Habitat in Oceani indici & europaei maris quoque mediterranei scopulis, testa cinerea aut nivea: fasciis 4 ferrugineis picta, fundo plumbeo vel sanguineo-maculato, ultra 2 polices alta, diametri 4 interdum pollices superantiis, costis numero & altitudine inaequalibus.

Cærulea. 24. P. testa erosa-subangulata: striis numerosis inaequalibus, subitus cærulea.

v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 18. f. 2?

Habitat in mari mediterraneo, testa oyata, convexa; exterius nigricante.

Tuberculata. 25. P. testa subdentata conica tuberculata posterius retusa. Mus. Lud. Ulr. 692. n. 417.*

Habitat - - - testa flavescente: tuberculis albis seriatim.

Lepas. 26. P. testa subrotunda pectinata: radiis imbricatis tuberculatis transversim striatis, vertice incurvato.

Argenv. Conch. t. 2. f. D.

da Costa Coachol. p. 12. t. 2. f. 7. & t. 5. f. 9.

Favann. Conchyl. I. p. 543. t. 4. f. H².

Chemn. Conch. 10. p. 322. vign. 25. f. A. B.

β) Bronze Limpet. Martyn univ. Conch. I. t. 17.

Habitat rarissima ad Chili littora, β) ad insulas Falkland, testa solida, exterius ex flavicante subspadicea, ad 2 polices 2 lineas longa, & 3 polices 8 lineas lata, marginis altera parte levigata, altera tumida, inaequilater dentata.

- tricostata. 27. P. testa ovali tricostata alba ad latera striata : marginis interno planiusculo sublacero.
Chemin. Conch. 10. p. 333. t. 168. f. 1622. 1623.
 β) v. *Born mus. Caes. Vindob. test.* t. 18. f. 6?
 γ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. p. 495. n. 130?
Habitat rara in mari indico, tricarinatae affinis, testa solidata : vertice mucronato, recurvo.
- mytilina. 28. P. testa carinata anterius rotundata undulatim striata fusca intus margaritacea : margine posteriori crenato.
Favart d'Harbign. dictionn. 2. p. 238. 239.
Martin. neuest. Mannigf. I. p. 417. t. 2. f. 13. 14.
Helbling Abh. boehni. Privatges. 4. p. 104 t. 1. f. 5. 6.
Habitat ad Americæ australis littora, testa 2 lineas ultra pollicem longa.
- depressa. 29. P. testa dentata ovali compresso-conica costata alba inter costas fusca intus sulcis albis.
Helbling Abh. der. boehni. Privatges. 4. p. 108. t. 1. f. 9. 10.
Habitat - - - testa 9 lineas longa, 6 lata, costis circa 40 inæqualibus.
- stellata. 30. P. testa angulata ovata depressa : radiis decem elevatis; intermediis costis brevioribus.
Helbling Abh. boehm. Privatg. 4. p. 109. t. 1. f. 11.
Habitat rarer - - - saccharinæ affinis, testa tenui, 8 lineas longa, 6 lata, fusca costis albis, intus nivea, fundo fusco.
- islandica. 31. P. testa solida ovata gibba inæqualiter costata intus glabra radiis alternis cinereis & corneis picta margine crenata.
Kaemmer. Cabin. Rudolst. p. 15. t. 3. f. 6.
Habitat ad Islandæ littora, testa 4 lineas ultra pollicem longa, vertice fere medio intus cœruleo atbo marginato, costis imbricatis.
- cypria. 32. P. testa ovali subpellucida costata : costis hinc inde tuberculatis exterrsum foliaceis.
Bonann. recr. & mus. Kirch. I. f. 5.
Gault. test. t. 9. f. H.
Martin. Conch. I. t. 9. f. 79.
 β) *Argenv. Conch.* t. 2. f. B.
Martin. Conch. I. t. 10. f. 86.
Habitat ad Cypri littora, barbaræ proxime affinis, testa 1½-2½ pollicis longa, alba, margine interno cinereo

aliquando fascia lata alba, vertice annulo fusco cincto,
costis 16-20 & ultra.

33. P. testa ovata subgibba alba costata : costis confertis
 inæqualibus tuberculato rugosis.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 12. n. 27.

β) Schroet. n. Litter. 3. p. 12. n. 28.

γ) Schroet. n. Litter. 3. p. 13. n. 29.

Habitat --- testa $1\frac{1}{2}$ pollices longa, costis elevatis
 carinatis 20-40, fascia interdum interna fundo pro-
 pinqua cana, aut lutescente ferrum equinum referente,
 sulcis inter costas intermedialis in γ) fuscis.

34. P. testa ovata obscura : costis confertis albis lævibus
 inæqualibus.

Lift. Conch. t. 539. f. 22.

Knorr Vergn. 6. t. 28. f. 9.

Martin. Conch. I. t. 7. f. 56. 57.

β) Schroet. n. Litterat. 3. p. 13. n. 30.

γ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 15. n. 32.

δ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 15. n. 33.

ε) Schroet. n. Litterat. 3. p. 15. n. 34.

ζ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 16. n. 35.

η) Schroet. n. Litterat. 3. p. 17. n. 37.

Habitat --- testa minuta, $\frac{1}{2}$ -1 pollicem longa, nigra,
 fusca, subfusca, rarius spadicea, interdum albo varia,
 vertice ut plurimum fuso.

35. P. testa subrugosa alba striis fuscis flexuosis extrorsum
 ramosis varia, fundo maculis duabus fuscis.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 16. n. 36. t. I. f. 3.

Habitat --- testa pollicem longa.

36. P. testa convexa : costis tuberculatis præter minores
 majoribus octo.

v. Born. mus. Caes. Vind. test. t. 18. f. 62. Patella tricari-
 nata.

β) Lift. Conch. t. 532. f. 11.

Klein ostr. t. 8. f. 5.

Martin. Conch. I. t. 10. f. 82. 83.

δ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 18. n. 40.

γ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 19. n. 41. t. I. f. 4.

Habitat ad insulas Americæ mediae obversas, testa $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$
 pollicis longa, nunc utrinque tota alba, nunc extrin-
 secus cinerea, intus colore ardenscere macula spatulata
 cana albo-marginata, nunc subspadicea, vertice costis-

*que, intusque præter marginem fuscescerentem alba, nunc
subfuscata, intus, costis & vertice alba, hoc tamen fascia
fusca cincta, nunc ex livido alba, intus costisque alba
costis in β) II, in γ) I6, in δ) I2.*

- cubra. 37. P. testa dentata sub epidermide cinerea rubra : annulis
elevatis rotundatis ; minoribus imbricatis, iugis alba.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 489. n. 112.
Habitat - - - granulari affinis, testa ovali $1\frac{1}{2}$ pollicem
fere longa, vertice spadiceo, fascia lata alba cincta,
margini intus fascia fundoque spadiceis.
- hepatica. 38. P. testa ovata gibba tenti dentata hepatica : annulis
elevatis obtuse spinosis.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 489. t. 5. f. 15.
Habitat rara - - - testa $1\frac{1}{2}$ pollicem longa, vertice epulso
que ambitu albo, fundo & margine interno subfuscis.
- badia. 39. P. testa subconvexa fusca intus badia : radiis duodecim
majoribus utrinque costa cinctis totidemque minoribus.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 484. t. 5. f. 9.
 β) Schroet. n. Litterat. 3. p. 41. n. 80.
 γ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 41. n. 81.
 δ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 42. n. 82.
 ε) Schroet. n. Litterat. 3. p. 43. n. 83.
 ζ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 43. n. 84.
 η) Schroet. n. Litterat. 3. p. 44. n. 85.
 θ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 44. n. 86.
 ι) Schroet. n. Litterat. 3. p. 45. n. 87.
 κ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 45. n. 88.
 λ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 46. n. 89.
 μ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 47. n. 90.
 ν) Schroet. n. Litterat. 3. p. 47. n. 91.
 ξ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 48. n. 92.
 ο) Schroet. n. Litterat. 3. p. 49. n. 93.
 π) Schroet. n. Litterat. 3. p. 49. n. 94.

Habitat - - - testa $2\frac{1}{4}$ pollicis longa nunc magis nuda
minus plana, mediae crassitie rarius pellucida, siccus
punctis viridibus conspersa nunc per totam superficiem ex-
ternam, nunc per radios, nunc per marginem externum
disparsis, rarius in series digestis, rarius punctis circinatis
varia, crebrius cinereo varia aut undulata, interdum in
luteum aut hepaticum colorem vergente, vel nigro macu-
lata, margini & vertice ut plurimum, radiis saepe varisis

aut colore alieno tinctis, vertice nonnunquam quinquefariam cæruleo punctato, fundi macula spatulata hepatica vel virescente: fascia simplici aut duplice utraque diversi ut plurimum dilutioris coloris cincta, interna superficie interdum in fuscum, luteum, hepaticum, canum colorem vergente.

- fuscescens.* 49. P. testa planiuscula fucescente: striis elevatis decem, vertice diversicolor, fundi macula spatulata dilutius hepatica glauco & aureo marginata, margine interno fusco.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 50. n. 95.

β) Schroet. n. Litterat. 3. p. 51. n. 96.

γ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 51. n. 97.

δ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 52. n. 98.

ε) Schroet. n. Litterat. 3. p. 53. n. 99.

ζ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 53. n. 100.

Habitat - - testa $2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$ pollices longa, nunc magis nunc minus convexa, saepe perpendiculatius striata, ut plurimum nigro-varia vel undulata, vel dilutius lineato-fasciata vertice nigro cano-marginata, vel hepatico lineis angulatis fuscescientibus nigrisque vario, albo-marginata, vel cinereo glaucoque vario exalbido marginata; nunc virescente exalbido marginata, radiis, praeter intersitos minores, rarius in altero latere deficientes, 10-11 nunc acutioribus, nunc magis obtusis, nunc magis complanatis, interdum aureis, margine externo nonnunquam exalbido, superficie interna maculis interdum aureis fugacibus picta, fundi macula rarius virescente exalbido marginata.

- maculosa.* 41. P. testa complanata anterius angusta & rotundata flavicante fusco-maculata: vertice albo, radiis planis rotundatis æqualibus.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 54. n. 101.

β) Schroet. n. Litterat. 3. p. 54. n. 102.

Habitat - - testa $\frac{3}{4}$ -1 pollicem longa, ovali, intus alba fusco maculata, radiis 10-11, fundi macula spatulata dilutius & obscurius fusca, varia.

- rotundata.* 42. P. testa subovali complanata fusca varia: costis rotundatis, planis, vertice fundoque diversicoloribus.

β) Schroet. n. Litterat. 3. p. 55. n. 103.

γ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 55. n. 104.

Habitat - - testa $1\frac{3}{4}$ - $2\frac{1}{4}$ pollicis longa, dilutius fusca luceo radiata; β) maculata, vertice ex fuscidente cinereo:

*limbo albo, in β) hepatico limbo lacheo, margine ū
β) cinereo fusco-lineato fundo obscure hepatico, ū
albicante, corona calcarea alteraque candidiore cincta, in
β) fundo cinereo fuscescente vario corona ex albida cincta.*

Pecten. 43. P. testa ovata obscure marginata albo radiata : striis distantibus extorsum pectinatis, vertice griseo, fundi macula subspatulata corona alba cincta.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 56. n. 105.

β) Schroet. n. Litterat. 3. p. 56. n. 106.

γ?) Martyn univ. Conch. I. t. 16.

Habitat ad litoria occidentale Americæ borealis
testa $1\frac{1}{4}$ - $1\frac{3}{4}$ pollicis longa, cinerea hinc inde fuscescente varia, β) alba fusco-radiata, margine fusco, in
β) nigro interiori cano fusco radiata, fundo dilutius & obscurius fusco, in β) cano.

corrugata. 44. P. testa ovata rugosa spadicea : verticis corona alba, intus cinerea albo radiata, fundo dilute fulvo albo marginato.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 57. n. 107.

Habitat - - - testa $\frac{1}{2}$ pollicem longa.

alboradia- 45. P. testa ovali utrinque fusca albo-radiata : striis elevatis pectinatis, fundo flavicante, vertice albo.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 57. n. 108

Habitat - - - testa $\frac{3}{4}$ sere pollicis longa.

plivacea. 46. P. testa ovata olivacea intus fusca albo varia : striis elevatis inæqualibus margine bifariam obtuse spinolit, vertice luteo, fundo argenteo, centro fusco.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 490. t. 6. f. 1.

Habitat - - - testa $\frac{1}{2}$ pollicem circiter longa, fundo corona albo cincta.

cerea. 47. P. testa ovata utrinque cerea perpendiculariter striatis : costis tredecim complanatis, fundo albo.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 59. f. 110.

β) Schroet. n. Litterat. 3. p. 59. f. 111.

Habitat - - - testa $\frac{1}{2}$ pollicem longa, in β) luteolis vertice argenteo duplice punctorum nigrorum ferme cincta, margine punctis fuscis seriatim notata, fundo argenteo in β) albo.

impressa. 48. P. testa ovata : striis elevatis dimidiatis transversim striatis fulcescentibus obscurius alboque maculatis, verticis ambitu impresso albo.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 60. n. 112.

Habitat - - - testa $\frac{1}{2}$ pollicis longa, vertice maculata 3 fuscous fundo exalbido, margine interno fuscouscente.

Melanoceras. 49. P. testa ovata solida citrina fusco undulata: striis elevatis confertis rugosis, fundo albo.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 60. n. 113..

Habitat - - - testa pollicem longa.

Scutellata. 50. P. testa ovata denticulata cinerea cingulis tribus nigra varia intus lactea; striis elevatis inaequalibus extorsum nodulosis margine spinosis.

Schroet. n. Litterat. p. 61. n. 114. f. 5.

$\beta)$ Schroet. n. Litterat. p. 61. n. 115.

Habitat - - - testa pollicem longa, in β) cinerea albo varia vertice acuto rufescente, in β) exalbido, margine interno cinereo fuscouscente vario, fundo luteo.

Magellanaica. 51. P. testa ovata alba inter costas complanatas longitudo inaequales fuscouscente: verticis cingulo fusco.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 494. n. 127.

Habitat - - - testa $\frac{1}{2}$ pollicem longa, vertice obtuso.

52. P. testa tenui ovata alba margine nodulosa, intus margaritacea: striis elevatis spadiceis, vertice acuminato fundoque fuscis.

Gualt. test. t. 9. f. E.

Martin. Conch. I. t. 5. f. 40. a. b.

Habitat in freto Magellanico, testa $\frac{1}{2}$ pollicem longa; ultra pollicem alta, epidermide fusca, flava, aut alba fuscus radiata vestita.

Ochroleuca. 53. P. testa ochroleuca fasciis tribus slavis picta: striis elevatis acutis inaequalibus, vertice albo, fundo argenteo.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 64. n. 120.

Habitat - - - testa pollicem alta, $\frac{1}{4}$ pollicis longa.

denticulata. 54. P. testa alba denticulata: striis elevatis acutis inaequalibus, vertice dupli punctorum cinereorum serie fasciaque ex atro cinerea cincto.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 64. n. 121.

Habitat - - - testa pollicem longa, $\frac{1}{4}$ sere lata & alta.

Nodulosa. 55. P. testa flava fusco radiata: striis elevatis nodulosis inaequalibus, vertice fundoque albis.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 65. n. 122.

β) Schroet. n. Litterat. 3. p. 65. n. 123.

Habitat - - - testa ad $1\frac{1}{2}$ pollicem longa.

cinerea. 56. P. testa dentata *cinerea* inter strias elevatas inæquales fusca rugosa; vertice acuminato lacteo.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 66. n. 124.

β) Schroet. n. Litterat. 3. p. 66. n. 125.

Habitat - - - testa ultra pollicem longa, vertice & fundo in β) argenteis, margine in β) citrino fusco cresente radiato.

exalbida. 57. P. testa exalbida intus ochrolœuca inter strias elevatas rotundatas inæquales rugosa : vertice obtuso albo; fascia lata interrupta alteraque marginali fusca.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 67. n. 126.

Habitat - - - testa $1\frac{1}{4}$ pollicis longa.

cancellata. 58. P. testa *cinerea* fusco varia decussatim striata : callus bifarium tuberculato, vertice slavicante, fundi macula spatulata alba.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 67. n. 127.

β) Martin. Conch. I. t. 5. f. 37.

Habitat in Jamaica, testa $1\frac{1}{2}$ pollicem longa, exterius punctis sparsis, intus radiis fuscis varia, fundi margine ex cinereo argenteo, β) testa cana obscurius pavidata, striis nonnullis flavis, intus sordide flava: fundo albo.

laevi. 59. P. testa rotundata laevi slavicante : margine fascia lata alteraque angusta citrina fusco-maculata: margine dilatato acuto subrugoso.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 68. n. 129.

Habitat - - - testa ultra $1\frac{1}{2}$ pollicem longa, intus annulis 2 obscurioribus notata, vertice cœruleo: cinereo alboque varia, fundo glauco.

argentea. 60. P. testa laevi crassa subargentea: radiis undecim fuscis, margine argentato, vertice luteolo, fundo eburneo dupli annulo albo cincta.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 69. n. 130.

Habitat rara - - - testa 2 fere pollices longa.

cuprea. 61. P. testa alba: costis validis rotundatis fuscis: intus margaritacea, vertice fundoque cupreis.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 488. t. 5. f. 14.

β) Schroet. n. Litterat. 3. p. 70. n. 132.

Habitat - - - testa 2 pollices longa; inter costas maiores nigro liribatas minoribus hinc inde intersiliis.

62. P. testa utrinque dilute hepatica: costis carinatis majoribus minoribusque alternis, vertice plano albo.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 71. n. 133.

Habitat - - - testa $1\frac{1}{4}$ pollicis longa.

63. P. testa fusca superne glabra: infra striis elevatis confertis albis, vertice obtuso albo; nimbo fundoque fulvis.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 71. n. 134.

Habitat - - - testa $1\frac{1}{2}$ pollicem longa: striis vix $\frac{1}{3}$ altitudinis asequentibus.

64. P. testa flavicante fusco-varia: costis complanatis inæqualibus, vertice obtuso, fundo albo rufescente vario.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 72. n. 135.

Habitat - - - testa pollicem longa.

65. P. testa denticulata compressa utrinque rotundata flava perpendiculariter striata; costis carinatis, fundo albo cinereoque varia.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 72. n. 136.

Habitat rara - - - testa $1\frac{1}{4}$ pollicis longa.

66. P. testa rotundata glaberrima alba.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 73. n. 137.

Habitat - - - testa lenticis magnitudine.

67. P. testa ovata tota flava undulatim sulcata intus perpendiculariter striata: margine hinc inde repando.

Davil. Catal. t. 2. f. A.

Martin. Conch. I. t. 6. f. 44.

Habitat in Sina, testa 4 lineas ultra 3 pollices longa.

68. P. testa alba subrotunda punctis multicoloribus confusa ad basin radiata annulisque duobus fuscis cincta: margine subrepando.

Bonann. recr. & mus. Kirch. I. f. 7.

Martin. Conch. I. t. 7. f. 55.

Habitat - - -

69. P. testa ovata annulatim striata nigra: striis elevatis inæqualibus, margine crenato, vertice fundoque albis.

Martin. Conch. I. t. 8. f. 60.

Habitat - - -

- ulyssipo- 70. P. testa ovata dentata flavescente: striis elevatis complanatis, vertice acuminato curvante.
Martin. Conch. I. t. 8. f. 62.
Habitat prope Ulyssiponem.
- Umbella. 71. P. testa oblonga rubra: striis elevatis inaequalibus albidis margine crenato.
Adans. Seneg. I. t. 2. f. 1. Libot.
Lift. Conch. I. 538. f. 21.
Knorr Vergn. I. t. 19. f. 2. 3. & 5. t. 19. f. 3.
Martin. Conch. I. t. 8. f. 63.
Schroet. Journ. 6. p. 453.
n. Litterat. 3. p. 109. n. 212-215.
Habitat ad Africæ littora, varietate innumera, testa saepe speciebus rarius straminea, interdum maculata aut nebulosa.
- crenata. 72. P. testa tenui pellucida striata nigricante olivaceo radiata intus glauca vel cinerea: vertice acuminato, margine crenato, fundo lacteo.
Lift. Conch. I. 537. f. 16.
Bonann. mus. Kircher. I. f. 25.
Gault. test. t. 9. f. G.
Martin. Conch. I. t. 8. f. 64-65.
Habitat ad Africæ, Malagæ; Ulyssiponis littora.
- ferrugi- 73. P. testa ferruginea lineis pullis angulatis undulatiæ cingulisque albis picta intus lactea; striis elevatis nodosis, margine plicato.
Martin. Conch. I. t. 8. f. 66.
Habitat - - - testa saepe magna, nunc magis ovali, nunc potius pyramidali, costis alternatim elevatis & depresso, vertice acuminato ut plurimum albo lineis undulatis pullis cincto, fundo ex colore lacteo in pullum vergente.
- melano- 74. P. testa ovali ochroleuca: striis elevatis nigris, intus grammæ argentea maculata, vertice acuminato albo, fundi macula straminea.
Martin. Conch. I. t. 8. f. 67.
Habitat - - - vertice lœvi, margine crenato.

*Huic tribui inferendæ videntur testæ a Listero Conch. I. 535. f. 14. & t. 540. f. 24.
 a Bonanui mus. Kircher. I. f. 24. & 26. a Gaultieri test. t. 8. f. G. H. L.
 O. et R. et t. 9. f. D. et L. a Knorr Vergn. 3. t. 29. f. 3. et 4. et 6. 12. P.
 27. f. 8. et t. 30. f. 2-4. et 7. delineatae.*

75. P. testa ovali tenui intus argentea fuscescente-radiata ; striis teneris undulatis badio granulatis, margine repando.

Martin. Conch. I. t. 8. f. 68.

Habitat in fratre magellanico, vertice acuminato.

76. P. testa ovali alba tenuissime striata, maculis punctisque rubris varia ; margine octangulari.

Lift. Conch. I. t. 538. f. 21. b.

Martin. Conch. I. t. 8. f. 69.

β) *Martin. Conch. I. t. 10. f. 88. 89.*

Habitat — — testa in β) aurantia striis punctisque elevatis albis, fundo luteo : annulo centrali auraneo ; marginali albo.

77. P. testa ovali laevi nitida pellucida ex olivaceo cærulecente fulvo punctata striata ; costis septem flavicantibus, margine septangulari.

Martin. Conch. I. t. 9. f. 78.

Habitat — — testa intus margaritacea, verticis acuminati fundique macula aurantia.

78. P. testa oblonga planiuscula badia albo striata intus lactea : striis elevatis undecim inæquâlibus, vertice rotundato albo.

Bonann. nus. Kirch. I. f. 32.

Lesser testaceoth. f. 86.

Martin. Conch. I. t. 9. f. 80.

β) *Lift. Conch. I. t. 532. f. 11.*

Klein ostrac. t. 8. f. 5.

Martin. Conch. I. t. 10. f. 82. 83.

Habitat ad insulas Americæ mediæ oppositas, testa interdum fusca albo varia, in β) alba vel spadicea, striis nonnunquam albis & fuscis alternis.

79. P. testa ovata dentata fusca viridi punctata : striis elevatis cavis undecim latioribus totidemque angustioribus inæquali ; vertice albo.

Martin. Conch. I. t. 10. f. 74.

Habitat — — fundi litura centrali flava vel fusca.

80. P. testa tenui inæqualiter striata alba intus margaritacea : verticis litura aurantia annulo flavescente cinctâ, margine crenato.

Gualt. test. t. 8. f. L.

Mart. Conch. I. t. 10. f. 85. A. B.

β) *Kaemmer. Conch. Rudolf. p. 16. n. II.*
Habitat ad Islandiam, testa fulvo vel aurantio nebulosa,
margine radiis translucentibus picta.

tenuis. 81. P. testa ovali tenui ochroleuca lineis spadiceis angustatis varia: striis elevatis obtusis cavis inæqualibus.
Martin. Conch. I. t. 10. f. 87.
Habitat -- inter tenuissimas & maxime complanatas
hujus generis, striis 10-12.

Mitrula. 82. P. testa solida subconica transversim plicata: margine repando.
Lift. Conch. t. 344. f. 31.
Klein ostr. t. 8. f. 11. 12.
Martin. Conch. I. t. 12. f. 11. 12.
Habitat ad insulam Barbados, utrum hujus generis
ordinis, an ad ostreas releganda, testa angusta alba,
varius fusca, nunc magis nunc minus oblonga.

plicaria. 83. P. testa ovata dentata: striis elevatis obtusis undulatis transversim rugosis.
v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 18. f. 1.
<β) *Knorr Vergn. 3. t. 30. f. 1.*
Habitat ad freti magellanici littora, rario, vertice ob-
tufo, marginis dentibus 30-34.

pentago- na. 84. P. testa albida obtuse pentagona: margine dilatato crenato, vertice obtuso, fundo rubello.
v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 18. f. 4. 5.
Habitat --

zenea. 85. P. testa ovata tenera pellucida sub epidermide albida argentea pullo-radiata elevata-siriata: vertice fundoque cùpreis.
Martin. neuest. Mannigf. I. p. 408. t. 1. f. 9.
Habitat in freto mageланico, testa $\frac{1}{2}$ pollicem circuit
longa, vertice nitidissimo.

concha- cea. 86. P. testa tenui oblongo-ovata tenuissime undulata ex cinereo flavescente: radiis elevatis obscurioribus, vertice recurvo.
Martin. neuest. Mannigf. I. p. 417. t. 2. f. 13. 14.

Habitat in mari Americanum australem alluente, testa, excepto cardine, conchæ v. g. mytilo eduli simillima, intus glabra margaritacea, vertice fuscō, margine repando.

VERMES TESTACEA. Patella.

3709

87. P. testa ovata argentea : striis elevatis complanatis , vertice obtuso cupreo , fundi litura ovali badia , marginē repando.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 489. n. 114.

Habitat --- testa ultra pollicem longa , intus nitente.

88. P. testa suborbiculata striata alba : fascia fulcescente fuscō punctata , intus cana : striis inæqualibus , margine transversim rugoso.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 130. n. 254.

Habitat --- vertice obtuso subcentrali , fundi macula spiculata cretacea.

*** Mucronatæ , vertice acuminato recurvo.

89. P. testa integra conico-acuminata striata : vertice ha-
moso revoluto.

Lift. Conch. t. 544. f. 32.

Bonann. mus. Kirch. I. f. 23.

Gualt. test. t. 9. V. VV.

Ginann. adr. 2. t. 3. f. 24.

Lesser testaceoth. f. 85.

Klein ostrac. t. 8. f. 10.

Argenv. Conch. t. 2. f. R.
zoomorph. t. 10. f. 8.

Knorr Vergn. 6. t. 16. f. 3.

Verstein. 2. t. N. f. 3. 4.

Schroet. Einl. in Verst. 4. t. 3. f. 8.

v. Born ind. mus. Caes. Vind. test. p. 414. vign. f. d.

Martin. Conch. I. t. 12. f. 107. 108.

Habitat in mari mediterraneo ; adriatico , Americam me-
diam alluente ; testa ad 2 pollices lata & alta , tenui-
subtilissime longitudinaliter striata , interdum transver-
sim plicata aut margine denticulata ; ut plurimum albida
rubro nebulosa , intus alba laevi : fundo roseo ; non raro
fossili.

90. P. testa integræ oblonga imbricata : vertice posteriore.

Habitat --- testa opaca lactea , apertura ovata.

91. P. testa integræ conica striata subdiaphana : vertice re-
cto laevi.

Lift. Conch. t. 537. f. 17.

Klein ostr. t. 8. f. I.

Martin. Conch. I. t. 7. f. 58. 59.

Habitat in mari mediterraneo & ad Africæ littus occiden-
tale , testa solida mediae magnitudinis nulla , albo

VERMES TESTACEA. Patella.

striata : fasciis interdum transversis flavicantibus ^{au}
albis , vertice albo.

- tricari- 92. P. testa substriata anterius tricarinata.
 nata. *Schroet. n. Literat. 2. p. 170. f. 8. a. b.*
Einl. in Conch. 2. p. 417. t. 5. f. 2.
Habitat rara -- testa subovata , $\frac{1}{2}$ pollicem alta , $\frac{1}{4}$ longa ,
dilute viridi solida , margine subdenticulata intus laevi ,
inferne late viridi , supra lactea , subdiaphana , intus
qualiter striata , ad verticem obtusum posteriorem
cellata.
- pectinata. 93. P. testa integra ovata : striis rugosis subramosis , vertice
 subcentrali reflexo mucronato.
Knorr Vergn. 6. t. 28. f. 9.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 418. t. 5. f. 3.
Habitat in mari mediterraneo , testa ad 2 pollices longa ,
opaca , tenui , cinerea , striis numerosis longitudine inter-
qualibus exarata , intus laevi , spadiceo plumbeo que vario-
ria , fundo plumbeo , vertice spadiceo alboque vario-
- lutea. 94. P. testa integra ovali convexa striata : vertice submargi-
 nali reflexo mucronato. *Mus. Lud. Ulr. 692. n. 418.*
Rumpf mus. t. 40. f. I.
Martin. Conch. I. t. 17. f. 154. 155.
Habitat in Italia , testa magnitudine seminis peponis fulvo-
vertice annulo rufescente cindo.
- Unguis. 95. P. testa integerrima oblonga margine anteriori retusa
 vertice mucronato carinato. *Mus. Lud. Ulr. 693. n.*
*419. **
Rumpf mus. t. 40. f. L.
Pet. gaz. t. 32. f. 9.
da Costa Conch. t. 2. f. 2.
Fayann. Conch. I. t. 4. f. G.
Humphr. Conch. t. 2. f. L.
Chem. Naturf. 22. t. 3. f. A-E. Conch. 10. t. 172. f.
1675-1677.
Habitat ad Amboinam , testa alba ; an pinnæ potius species ?
- cristata. 96. P. testa vertice revoluta , dorso cristato carinato.
Habitat -- testa compressa tenuissima diaphana fulcis
numerosis transversis exarata , dorsi membrana duplia
tenuissima in crenulas excisa , limbo sinuato , aperturæ
angulo dorsali acuto.
- lacustris. 97. P. testa integerrima ovali membranacea ; vertice mu-
- cronato reflexo. *Fn. suec. 2200. **

Müll. zool. dan. prodr. 2861. hist. verm. 2. p. 199. n.
385. *Ancylus testa membranacea*, mucrone verticis
subcentrali, apertura oblonga.

Geoffr. test. I. *Ancylus*.

Argenv. Conch. t. 27. f. I.

zoomorph. t. 8. f. I.

Ginann. op. posth. 2. p. 50. t. 2. f. II.

Martin. berl. Magaz. 4. t. 7. f. 2. 3.

Habitat in Europæ rivi & lacubus, plantis aquaticis adhae-
rens, rarer in mari balthico, incola tertaculis 2 trun-
catis occultis, angulo interiori oculatis instrudo, testa $1\frac{1}{2}$
 $2\frac{1}{3}$ lineas longa, tenerrima, pellucida alba, supra con-
vexa, subtus concava, verticis mucrone minimo.

Fluviatilis. 98. P. testa integerrima ovali subcornea : verticis mucrone
marginali, apertura ovali.

Müll. hist. verm. 2. p. 201. n. 386. *Ancylus. fluviatilis*.

List. Conch. t. 141. f. 39.

an. angl. t. 2. f. 32.

Gualt. test. t. 4. f. AA. & f. BB.

Argenv. Conch. I. t. 27. f. I.

Martin. berl. Mag. 4. t. 7. f. I.

Schroet. Flusconch. t. 5. f. I. 2. 3. & t. X. min. A. f. 10.

Habitat in Europæ fluviis, lacustri affinis, testa tenui, fra-
gili, minuta, $2\frac{1}{2}$ lineas longa, pellucida, præter raras
strias concentricas glabra, mucrone magis obtuso.

99. P. testa integra punctis elevatis striata vertice acuto-
reto. Müll. zool. dan. I. p. 45. t. 12. f. 1-3. rar.
I. p. 25. prodr. 2866.

Habitat rara in sinus Norwegiae Drobacensis saxis
incola albo ovato, oculi vestigiis nullis instrudo
testa alba : striis 60 - 80.

virinea. 100. P. testa integerrima alba : fasciis rubris. Müll. zool. dan.
I. p. 43. t. 12. f. 4. 5. rar. I. p. 26. prodr. 2867.

Habitat ad finum maris norwegici fucos, minuta, testa fas-
ciis 18, striis que subtilissimis concentricis varia, intus fla-
vicante, incola albo: pallio spadiceo latissimo, oculis
nigris.

tessellata. 101. P. testa integerrima albida : tesseris rubris. Müll. zool.
dan. I. p. 45. t. 12. f. 6-7. rar. I. p. 27. prodr. 2868.

Claff. it. isl. t. II. f. II.

Habitat ad Norwegiae fucos & saxa maritima, testa subtilis-
sime striata, subtus sordide flavo, intus (si recens) lac-

VERMES TESTACEA. Patella.

*tea, vertice obtuso, incola albo: oculis nigris pallioque
obscuro albo fimbriato.*

- fulva. 102. P. testa integerrima aurantia: vertice mucronato subverticali. Müll. zool. dan. I. p. 82. t. 24. f. 1-3.
rar. I. p. 49. prodr. 2869.

Habitat rario in Norwegiae sinu Drobacensi, fucis & testaceis affixa, testa solida, laevi, immaculata, striis vix armato oculo conspicuis; incola albo: capite rotundato, anterius plano, utrinque subtus cuspidato, pallio albido;

- subspiralis. 103. P. testa ovata: apice subspirali obtuso. Müll. zool. dan. prodr. 2873.
Habitat in mari Norwegico.

- ambigua. 104. P. testa ovata margine subdentata: mucrone subacuto reflexo. Müll. zool. dan. prodr. 2874.
Habitat in mari Norwegico.

- rubella. 105. P. testa integerrima subconica laeviuscula rubicunda,
Fabr. Fn. groenl. p. 386. n. 383.
Habitat rario in mariis Groenlandiam circumfluentis profundis inter alvarum radices & testaceorum fissuras, incola rubicundo, testa longitudine vix $2\frac{1}{2}$ lineas superante, laeviuscula, striis tamen subtilissimis longitudinalibus consertis extrinsecus exarata, vertice subcentrali antrorsum verso, apertura oblongo-orbiculari.

- Borniana. 106. P. testa ovata integerrima subtilissime longitudinaliter striata alba: venis sanguineis.
Helbling Abh. böök. Privatg. 4. p. 106. t. I. f. 7.
Habitat -- testa 6 circiter lineas longa, intus glabra.

- Calyptra. 107. P. testa integra: costis subimbricatis, vertice hamoso, margine sinuato.

Chemn. Conch. 10. p. 340. n. 169. f. 1643. 1644.

Martyn Conchol. I. f. 18.

Habitat ad Americæ septentrionalis lictus occidentale, et ex spadiceo dilute fusca, intus alba, rubello & cæruleo cente obumbrat.

Patellæ scopulis, saxis, testaceis, fucis aliquique aquaticis tenacissime adhaerent, non nisi vi devellendæ: incola tentaculis duobus, excepta lacustri et forsitan fluvialium, setaceis; et oculis binis instrutius, in angulo tentaculorum exteriori, si utramque modo memoratam speciem exceperis, persistens, in sola cæca, ut videtur, deficiens, ut tamen incola animalæ a reliquarum omnium multum disforepet.

Melanoleuca. 108. P. testa striata alternatim nigra albaque integrerrima.
Martin. Conch. I. t. 7. f. 56. 57.

δ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 74. n. 142.

Habitat --- testa $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ pollicem longa, vertice nunc fuscescente nunc albo, limbo interdum carulescente, fundo albo.

Pectunculus. 109. P. testa oblonga convexa striis elevatis nodulosis exasperata subdenticulata intus nitida: vertice antrosum curvato.
Martin. Conch. I. t. 12. f. 115. 116.

β) Schr: et. n. Litterat. 3. p. 75. n. 144.

? Schroet. n. Litterat. 3. p. 76. n. 145.

δ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 76. n. 146.

ε) Schroet. n. Litterat. 3. p. 76. n. 147.

ζ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 77. n. 148.

η) Schroet. n. Litterat. 3. p. 77. n. 149.

δ) Bornius. Caes. Vind. test. t. 18. f. 7.

Habitat --- testa $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ pollicem longa, striis nonnunquam alterne minoribus nodulis non raro in spinas abeuntibus, colore & pictura quam maxime varias; testa nunc tota nigra, nunc exterius nigra intus alba vel flavicante nigro radiata, nunc cinerea, striis modo aliquando & vertice & radiis interioris superficie flavae nigris, nunc nigra striarum interstitiis, fascia transversa, & vertice flavicantibus, nunc ochroleuca intus exalbida maculis obsoletis fuscescentibus varia, striarum nodulis dilute fuscis, nunc lutea maculis ex atro cinereis varia, nunc albo fuscoque varia intus ex cinereo flavescente, striarum nodulis nigris.

fasciata. 110. P. testa ovata alba: fascia fusca, striis elevatis acutis, margine dilatato crenato intus cinereo.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 77. n. 150.

Habitat --- testa ultra $\frac{3}{4}$ pollicis longa, fundo albo & fuscescente vario.

elegans. 111. P. testa decussatim striata alba rubro radiata denticulata: vertice cano.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 78. n. 151.

Habitat --- testa 2 pollices longa, striis inæqualibus, transversis subtilioribus, fundi macula spatulata eburnea.

iquamosa. 112. P. testa striis elevatis extrosum transversim undulatis aspera fusca, verticem versus argentea, vertice ipso æneo adunco.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 81. n. 155.

β) Knorr Vergn. 6. t. 9. f. 1. 2.

γ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 82. n. 157.

Habitat - - - testa $3\frac{1}{2}$ pollicem longa, intus argentea,
marginē dilute fusco albo maculata extrinsecus cinereo
repando, costis circiter 38, vertice obtuso.

squalida. 113. P. testa integra fusca intus exalbida: fundo fuscescente,
marginē cærulecente fusco radiato, vertice nōdoto,
filiis elevatis obsoletis.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 83. n. 158.

Habitat - - - testa $1\frac{1}{2}$ pollicem longa.

crocea. 114. P. testa lævi subangulata flava fusco radiata; ^{vertice}
obtuso albo, fundi niacula spatulata albida.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 83. n. 159.

Habitat - - - testa pollicem fere longa.

candida. 115. P. testa ovata lævi utriisque candida: cingulo extenso
roseo.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 494. t. 6. f. 6.

Habitat - - - testa $\frac{1}{2}$ pollicem longa, vertice laterali.

trigona. 116. P. testa compressa medio convexa cancellata alba: fal-
cia exterius & marginē intus fuscecente, vertice mar-
ginali obtuso.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 84. f. 6.

Habitat - - - testa solidā $\frac{1}{2}$ pollicem longa.

minima. 117. P. testa rotundata convexa tenui lævi exalbida rufef-
cente maculata: vertice obtusissimo albo marginali.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 85. n. 162.

Habitat ad insulam Feroë, zoophytis adhærens, testa $\frac{1}{4}$
pollicis longa, integerrima.

tranque- 118. P. testa ovata tenui pellucida confertim tenuissime stria-
barica. ta spadicea, squamis albis varia, intus lactea, verti-
cis litura cyanea, fundi fusca.

List. Conch. t. 530. f. 8.

Martin. Conch. I. t. 12. f. 114.

Habitat Tranquebariæ.

perversa. 119. P. testa oblonga cornea tenerima pellucida glaberrima:
ma: basi ferruginea.

Adans. Seneg. I. t. 2. f. 2. Liri.

Martin. Conch. I. t. 12. f. 114. A. B.

*Habitat in Africæ littore, testæ mucrone incolæ posteriora
versus recurvo.*

120. P. testa decussatim sulcata pallide incarnata tenui apertura oblonga.

Meusch. Naturf. 18. p. 13. t. 2. f. 9. & 9. a.

Habitat - - -

121. P. testa tota alba plana : verticis mucrone tortuoso.

Meusch. Naturf. 18. p. 12. t. 2. f. 10. & 10. b.

Habitat - - -

170. P. testa ovali depressa glabra subfuscæ : punctis viridibus in radios obliquos interruptos digestis, vertice aduncro obtuso.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 490. n. 116.

β) *Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 490. n. 117.*

Habitat - - - testa vix pollicem longa hepatica, in β) subfuscæ, punctis quoque nigris interstïtïis, intus sordide cinerea, in β) subolivacea margine acuto, fundo hepatica, in β) fascia cana cincto.

**** Integerrimæ absque vertice mucronato.

122. P. testa conica præter verticem album obtusum medium & marginem striata virescente aut dilute fusca intus alba.

Adans. Seneg. I. t. 2. f. 4. Gadin.

Gault. test. t. 9. f. 10.

Habitat frequens in insula Gorea Africæ.

123. P. testa conica alba præter verticem acutum annulo spadiceo cinctum radiata : radiis fuscis striis nigro granulatis exaratis.

Gault. test. t. 8. f. N. & t. 9. f. A.

Martin. Conch. I. t. 5. f. 35. a. b.

β) *Gault. test. t. 8. f. M.*

Martin. Conch. I. t. 5. f. 36. a. b.

γ) *Gault. test. t. 8. f. P.*

Martin. Conch. I. t. 6. f. 43. a. b.

Habitat frequens ad maris lusitanici scopulos; testa minuta, fundo utrinque flavo maculato, in β) immaculato, cui etiam radii alternatim albi & spadicei.

124. P. testa rotundata convexa grisea decussatim striata : vertice acuminato medio lineis duodecim aurantiis radia tim picta, fundo corneo.

Martin. Conch. I. t. 5. f. 37.
Habitat in Jamaica.

treolata. 125. P. testa pyramidalis ex griseo rubella : striis tenerrimis circularibus longitudinales decusantibus, vertice violaceo.

Argenv. Conch. t. 2. f. A.

Martin. Conch. I. t. 5. f. 41.

Habitat - - - magellanicae affinis, at testa magis depressa : basi latiore, per striarum decussationes in ureos triangulares divisa, striis longitudinalibus 21.

flammea. 126. P. testa ovata subtilissime annulatim striata ex rubello cinerea : radiis undulatis fuscis, vertice acuto centrali medio albo.

Argenv. Conch. t. 2. f. Q.

Martin. Conch. I. t. 5. f. 42.

Habitat - - - fundi litura fusca.

indica. 127. P. testa ex rubello grisea radiatim striata glabra altero latere angustiori : vertice acuto laevi, annulo rubello cincto.

Gualt. test. t. 8. f. E.

Martin. Conch. I. t. 7. f. 49.

Habitat in India, rusticæ affinis, 3½ pollicis longa.

surinamensis. 128. P. testa crassa subovata flavidante atro-radiata : striis longitudinalibus inæqualibus, cingulis nodosis, vertice obtuso, laevi albo.

Martin. Conch. I. t. 7. f. 50.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 127. n. 247-250.

Habitat frequens ad Surinam.

vitellina. 126. P. testa ovata flava : basi inæqualiter striata, vertice obtuso albido.

Martin. Conch. I. t. 7. f. 51.

Knorr Vergn. I. t. 20. f. 2.

Habitat - - -

fanguino-lenta. 130. P. testa ovata convexa albâ solida : striis longitudinalibus elevatis capillaribus & flexuosis interspersis, vertice annulo lato rubro punctato cincto.

Lift. Conch. t. 537. f. 18?

Martin. Conch. I. t. 7. f. 52.

β) Martin. Conch. I. t. 7. f. 53.

Habitat in Africa, vertice laterali, fundo interdum flavidante.

lavigata. 131. P. testa ovata flava intus ex cærulecente alba : striis complanatis alternatim crassioribus & tenuioribus obliquis, vertice albo lœvi nitido.

Martin. Conch. I. t. 7. f. 54.

Habitat - - fundi litura flavo fuscoque varia.

Patula-132. P. testa rotundata alba punctis multicoloribus conspersa basin versus radiata annulisque duobus fuscis cincta.

Bonann. recr. & mus. Kirch. I. f. 7.

Martin. Conch. I. t. 7. f. 55.

Habitat - - vertice lineis nonnullis fuscis cincto.

Pellucida. 133. P. testa integerrima obovata gibba pellucida : radiis quatuor cæruleis. *Stroem. act. Nidr. 4. p. 98. Müll. zool. dan. 3. p. 37. t. 104. f. 1-4. prodr. 2862.*

Lift. Conch. t. 543. f. 27.

an. angl. app. t. 2. f. 10.

Petiv. gaz. t. 75. f. 3.

Borl. Cornu. t. 28. f. 1.

Walch Naturf. 10. p. 82. t. 1. f. 7.

Martin. neuest. Mannigf. I. p. 410. t. 1. f. 12.

v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 18. f. 9.

Brit. zool. 4. t. 90. f. 150.

Knorr Vergn. 6. t. 28. f. 6.

da Costa Conchol. t. 4. f. 4.

brit. Conchol. t. 1. f. 5. 6.

Chemn. Conch. 10. t. 168. f. 1620. 1621.

β) *Helbling Abh. boehm. Privatg. 4. t. 1. f. 8.*

Habitat in mari mediterraneo & septentrionali, lacustri affinis, nonne ad priorem ordinem referenda, testa avel-lanæ utplurimum magnitudine, forma ovi in medio dis-secti, glaberrima, ex olivaceo cornea, radiis 2, 4, 6, 8, 12 punctorum cæruleorum.

Studina-134. P. testa integerrima acuta lœvi glaberrima. *Mus. Lud. Utr. 693. n. 420.* Stroem. act. Nidr. 4. p. 99. Müll. zool. dan. prodr. 2871.*

Argenv. Conch. t. 2. f. P. Clypeus testudinarius.

Lift. Conch. t. 531. f. 9.

Bonann. mus. Kirch. I. f. 31.

Rumpf mus. t. 40. f. A.

Gualt. test. t. 8. f. B.

Knorr Vergn. I. t. 21. f. 1. & 3. t. 30. 5-7 f.

Walch Naturf. 8. p. 161. t. 4. f. 2. 3.

Martin. Conch. I. t. 6. f. 45-48.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 88. n. 169-179.

Habitat in mari indico & norwegico, innumera colorum & picturæ varietate, testa ut plurimum ferruginea radiis maculisque spadiceis & luteis picta, striis subtilibus longitudinalibus circulares tenerimas decussantibus exorata intus argentea, alias testa alba moulis quadrae vel cinereis radios simulantibus picta, intus præter fundum fuscum marginemque fusco maculatum lutea.

testudina- 135. P. testa integerrima ovata striata. Müll. zool. dan. prodri. lis. 2872. O. Fabr. Fn. groenl. p. 385. n. 382.
Cherun. Conch. 10. t. 168. f. 1614. 1615.
Favann. Conch. I. t. I. f. Q. 2.
Kaemmer. Rudoljt. Conch. t. 2. f. 4. 5.
β) Müll. zool. dan. prodri. 2875. Patella testa ovato-conica, apice prope centrum obtuso.

Habitat vulgatissima inter fucos ad Groenlandia littora, an diversa a testudinaria species! testa ad 14 lineas longa, antrorsum angustiori virescente, sub violaceo vel albo maculis quadratis vel undulatis brunneis varia, intus candida, incolæ disco pauci lutee viridi, limbo albido, ceterum verme albo.

compres- 136. P. testa integerrima ovali oblonga striata lœvi : dorsa compressa.

Lift. Conch. t. 541. f. 25.

Bonann. mus. Kirch. I. f. 21.

Knorr Vergn. 6. t. 28. f. 1.

Walch. Naturf. 8. p. 159. t. 4. f. I.

Martin. Conch. I. t. 12. f. 106.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 93-98. n. 180-191.

β) Knorr Vergn. 2. t. 26. f. 4.

γ) Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 492. n. 122.

Habitat in India, testa ad 4 pollices longa, tenui, planiusculis latis, transversis vix conspicuis.

rufica. 137. P. testa integerrima conica : striis quinquaginta obtusis. Mus. Ind. Ulr. 694. n. 421.*

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 428. t. 5. f. 4.

n. Litterat. 3. p. 108. n. 208-211.

Habitat - - - testa magna, non raro ultra $3\frac{1}{2}$ pollices longa, posterius angustiori exalbida, interdum fuscescens, aut spadiceo fasciata, vertice margini posteriori propiore,

138. P. testa integerrima ovata obtusa : striis elevatis. *Mus. Lud. Ulr.* 691. n. 422.*
Habitat — — testa subconica ex nigricante cinerea : striis cinereis filiformibus circiter 39, vertice subcentrali, subobtuso, saepius fascia cincto.
139. P. testa integra striata : vertice submucronato erecto, intus alba : macula atra cordata medio alba.
da Costa Conchol. t. 5. f. 1.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 431. t. 5. f. 5.
n. Litterat. 3. p. 124. n. 242-244.
Kaemmer. Rudolft. p. 13. n. 4. t. 2. f. 3. 7.
Chemn. Conch. 10. p. 324. vign. 25. f. C. D.
Habitat in mari mediterraneo, testa minuta tenui, ovali, saepius cinerea : striis tenerimis, elevatis & fuscis vel nigris subtilissime granulatis, inaequalibus vertice annulo nigricante cincto, margine interno subtilissime crenato fuscō vel nigro maculato, fundi macula interdum spatulata.
140. P. testa integerrima ovali subconvexa fusca cruce alba picta. *Mus. Lud. Ulr.* 695. n. 423.*
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 432. t. 5. f. 6.
Habitat — — testa pollicem longa, $\frac{3}{4}$ lata, retrorsum angustiori tenui laevi, intus laetea, fundo fuscō, vertice discolare.
141. P. testa integra conica compressa venoso-reticulata. *Mus. Lud. Ulr.* 695. n. 424.*
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 433. t. 5. f. 7.
Habitat — — testa tota laetea, posterius multo angustiori, striis elevatis confertis sese decussantibus, vertice subcentrali obtuso.
142. P. testa ovali integra quasi deaurata intus argentea striata : striis subimbricatis, margine plicato-dentato. *Chemn. Conch.* 10. p. 327. t. 168. f. 1616. a. b.
Scutum deauratum.
Martyn Conchol. 2. t. 65 ? *Lepas denticulata.*
N. Danz. Abh. I. p. 253. t. 3. f. II. A. B.
Favann. Conchyl. I. t. 1. f. D. I. & t. 3. f. D. 3.
Habitat in freto magellanico & ad insulas Falkland, testa radiis albis exterius picta, striis satis crassis vertice quasi deaurato.
143. P. testa ovali integra ex atro fusca striata albo radiata intus argentea. *Chemn. Conch.* 10. p. 329. t. 168. f. 1617.

N. Danz. Abb. I. p. 262. n. 56?

Habitat ad insulas amicas & novam Seelandiam, testa decussatim striata, vertice fundoque albis.

radians. 144. P. testa integra ovali pellucida depressa striata cornez maculis nigris radiata.

Chemn. Conch. 10. p. 329. t. 168. f. 1618. Patella radiata novae Zealandiae.

Habitat ad terram ignis & novam Seelandiam, testa intus subargentea, verticis margine flavicante.

Rota. 145. P. testa subrotunda incus subargentea exterius strigis rufescentibus, limbo flavescente. *Chemn. Conch. 10. p. 330. t. 168. f. 1619.*

Habitat in mari indico & americano.

umbella- 146. P. testa integra subrotunda diaphana integra depressa ta. intus radiata flavescente: vertice luteo, margine acutissimo.

Mus. Tessin. p. 116. t. 6. f. 5.

da Costa Conchol. p. 4. t. 1. f. 5. & t. 5. f. 5.

Favann. Conch. I. t. 3. f. H.

Chemn. Conch. 10. p. 341. t. 169. f. 1645. 1646.

Davil. catal. rais. p. 78. n. 1. t. 2. f. A.

Habitat in Oceano indico, testa ad 4 pollices & 3 lineas longa, intus punctis elevatis aspera, rarius margine denticulata.

pustulata. 147. P. testa tenui ovali depressa radiata alba sanguineo-punctata intus laevi. *Helbling. Abb. Privatg. in Boehm. 4. p. 110. t. 1. f. 12.*

Habitat - - - testa 6 lineas longa.

synmetr. 148. P. testa ovato-conica solida fusca per lineas perpendicularares albas in areolas partita intus laevi alba: margine arcuatim exciso. *Helbling. Abb. der Boehm. Privatg. 4. p. 111. t. 1. f. 13. 14.*

Habitat - - - testa 6 lineas longa, lineis diversæ & triclinis quidem magnitudinis, vertice centrali, margini interno punctis albis fuscisque alternis vario.

citrina. 149. P. testa ovata convexa tenerrime decussatim striata alba: fasciis duabus latis flavis, intus exalbida: fundo lacteo vertice subsulco.

Kaemmer. Conch. Rudolst. p. 12. t. 2. f. 6.

Habitat - - - testa solida, 10 lineas ultra pollicem longa.

capensis. 150. P. testa ovali decussatim striata: striis longitudinalibus fuscis albisque alternis, intus submargaritacea: fundo albo,

Argenv. Conch. t. I. f. O.

Kaemmer. Conch. Rudolst. p. 13. t. 2. f. I. 2.

Habitat ad Caput Bonæ Spei, raro testa 7 lineas ultra pollicem longa intus lœvi, striis fuscis 9-11 latioribus intus violaceis, albis intus flavis.

151. P. testa rudi fusca orbiculari : vertice submarginali.

Müll. zool. dan. I. p. 14. t. 5. f. 1-7. prodr. 2870.

Habitat in fundo maris Norwegici, saxis testaceis que emortuis affixa & quasi continua, utrum hujus, an distincte generis, testa minuta, punctis elevatis subtilissimis aspera, interdum cinerea, subitus cœrulea, incola ex massis 2 rubellis, tenacibus, intortis, per totam longitudinem fimbriatis constato, fimbriae ex pilis conseruis, flavis, rigidis quasi crissatis compositis, tendine cœruleo cum reliquo corpore coharentibus, ovarii ramosis aurantiis : ovis globosis.

152. P. testa subtilissime striata punctis diversi coloris varia : fundo obscuro.

Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 6. f. 2. 3.

n. Literat. 3. p. 98. n. 192-197.

Habitat - - - compressæ affinis, testa $\frac{1}{2}$ -I sere pollicem longa, ut plurimum cinerea, interdum floridum persici more tintæ, aut hepatica, albo variegata, punctis crebrius viridibus, quam albis aut casuis, rarius sparsis, quam in radios aut series digestis, fasciis saepè cingulis 2-3 ut plurimum obscurioribus picta, nonnunquam decussatim striata.

153. P. testa glaberrima plumbea : fascia intus alba figura ferri equini.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 494. t. 6. f. 5.

Habitat ad insulam Feroë, zoophytis adhaerens testa paulo ultra $\frac{1}{4}$ pollicis longa, mytilum mentiente, a dorso ad vericem obscuriori : fundo dilutiori.

154. P. testa ovali tenui atra : striis perpendicularibus complanatis albis.

Schroet. n. Literat. 3. p. 103. n. 199-201.

Habitat - - - testa $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ pollicis longa, intus exalbida, rarius spadicea, verice ut plurimum cano, fundi macula subfuscæ.

155. P. testa alba planiuscula : altera parte angusta intus canaliculata callo cœrulecente ferri equini forma notata, altera rotundata.

Knorr Vergn. 2. t. 26. f. 3.

β) Schroet. n. Litterat. 3. p. 105. n. 204.

γ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 106. n. 206.

δ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 107. n. 207.

ε) v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 18. f. 3.

Habitat --- testa I, $1\frac{1}{2}$ -2 pollices longa, ut plurimum
solida, interduni transversim fasciata & striata: striis
interstitiis spadiceis; margine saepius extrinsecus striato-

craticula- 156. P. testa tenui ovali depressa cancellata radiata.

lata. Schroet. n. Litterat. 3. p. 111. n. 216-220.

Habitat --- testa 1- $1\frac{1}{4}$ pollicis longa, saepius cana, intus
alba, radiis nunc spadiceis, nunc ex cinereo rubris,
nunc ex luteo fuscis, nunc sanguineis, nunc alternis
rubris & albis, fasciis interduni & transversis obscuriori-
bus, vertice cano, cinereo, ochroleuco, albo, saepius
rubro guttato fundo ut plurimum candido.

crumen- 157. P. testa ovali convexiuscula rubro varia subdentata:
tata. striis elevatis inaequalibus asperis.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 113. n. 221-225.

Habitat --- testa 1-2 pollices longa rarius cinereo,
quasi alba, maculis guttisve interdum etiam albis, ci-
nereis fuscis intermixtis, rarius in coronae speciem dispe-
tis, fundo & vertice albis, hujus limbo interdum nigra
maculato aut cinereo.

papyra- 158. P. testa depressa tenui hyalina rubro punctata extre-
cea. sum spadiceo radiata: striis confertis tenuioribus &
granulatis crassioribus.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 487. t. 5. f. 12.

Habitat --- vertice obtuso, testa I pollicem longu-

cylindri- 159. P. testa ovali plana confertim longitudinaliter striata:
ca. striis crassitie inaequalibus omnibus granulatis.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 488. t. 5. f. 13.

β) Schroet. Einl. in Conch. p. 487. n. 108.

γ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 118. n. 229.

δ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 118. n. 230.

ε) Schroet. n. Litterat. 3. p. 119. n. 232.

ζ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 120. n. 134?

η) Schroet. n. Litterat. 3. p. 122. n. 237?

Habitat --- testa $\frac{1}{2}$ -1 pollicem longa, diametri saepe aqua-
lis, nunc sanguineo alboque varia intus alba fundo cine-
reo, vertice spadiceo, nunc maculis radiisque rofosis
intus

*intus quoque albo rubroque varia : vertice albo , nunc
alba punctis , maculis radiisque rubellis varia , fundo &
vertice lacteis , hoc corona fusco maculata cincto , nunc
albo confertim rubello punctata , vertice corona quasi
floribunda fusca cincto , nunc lutea spadiceo maculata
vertice fundoque flavicantibus.*

decussata. 160. P. testa subconvexa alba confertim rubro maculata intus
albo rubroque radiata decussatim striata : striis glabris ;
longitudinalibus nonnullis crassioribus albis.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 119. n. 231.

Habitat - - - testa $\frac{1}{4}$ pollicis fere longa , vertice obtuso
albo , fundi macula spatulata albida.

haemato-
nigra. 191. P. testa tenui depresso alba rubro punctata ; intus fusces-
cente maculata striata : vertice cinereo fuscescente vario.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 486. t. 5. f. 11.

Habitat - - - testa ultra $\frac{1}{4}$ pollicis longa , fundi macula
ex testaceo cinerea.

aleroj-
des. 162. P. testa planiuscula cancellata cinerea : stella radiisque
marginem versus spadiceis , vertice laevi cano punctis
fuscis circumscripto.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 121. n. 235.

Habitat - - - testa ultra pollicem longa , tenui : fundo
testaceo.

Walis. 163. P. testa ovali convexiuscula tenui confertim striata
cana : radiis maculisque nigricantibus.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 406. t. 5. f. 10.

Habitat - - - testa ultra $\frac{1}{4}$ pollicis longa : vertice ob-
tuso flavicante fascia punctorum lacteorum cincto , fundo
cinereo fascia lactea cincto.

tubella. 164. P. testa convexiuscula striata rubella : vertice rubro
maculata fundoque albidis.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 122. n. 238. 239.

Habitat - - - testa ultra $\frac{1}{2}$ pollicem longa , nunc crassio-
re , nunc tenuiore.

pedestabi-
lis. 165. P. testa planiuscula subrugosa ex rufescente alba striata
fascia versus verticem spadicea , altera marginis
interni badia.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 124. n. 241

Habitat - - - testa 3 pollices longa, striis circiter 18 majoribus, tenerioribus pluribus interjectis, vertice plano cinereo, fundi litura spatulata alba limbo cinereo, alteroque rubello notata.

conspurcata. 166. P. testa solida planiuscula striata nigra cinereo-punctata intus cærulescente: vertice sordide luteo.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 497. n. 133.
Habitat - - - testa ultra 1½ pollicem longa, altero latere angustiori, striis complanatis, margine interno argenteo, fundi macula ovali hepaticu fascia alba ferri equini forma cincta.

melanosticta. 167. P. testa solida planiuscula striata exalbida, cinereo-punctata nigro punctata, intus cærulescente: vertice subcuminato albido.

Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 6. f. 9.
Habitat - - - conspurcatæ affinis, at testa minore subpelucida, fundis nigris in 5-6 cingula digestis, fundo squalido, fascia cana ferri equini forma cincto.

atra. 168. P. testa nigra striata: vertice dilutiore, fundi litura subfusca, fascia alba articulata ferri equini forma cincta.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 129. n. 251.
Habitat - - - testa 1½ pollicis longa, vertice nunc albo, nunc fuscescente stramineo que vario, margine interno nunc cinereo, nunc cæruleo, fundi litura spatula nunc alba & fuscescente varia, nunc fusca.

specularis. 169. P. testa ovali convexa solida glaberrima hepatica intus & vertice fuscescente, hoc limbo albo fascia que interrupta fuscescente cincto.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 129. n. 252.
Habitat - - - fundi macula fascia cretacea ferri equini forma cincta.

canescens. 170. P. testa ovali nigra intus cærulescente striata: striis majoribus complanatis canis, verticis obtuso, area exalbida.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 131. n. 255.
Habitat - - - testa ultra 2 pollices longa, fundi litura ovali fuscescente, margine subcrenato.

virescens. 171. P. testa oblonga planiuscula utrinque dilatata striata olivacea albo radiata maculataque intus cærulea.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 496. t. 6. f. 8.

Habitat - - testa $1\frac{1}{4}$ pollicis longa, altero latere angustiore, striis longitudinalibus æqualibus, paucioribus transversis, vertice obtuso macula ex hepatico lutea notato, fundi macula spatulata aurantia: limbo albido.

172. P. testa rotundata convexa longitudinaliter striata transversim rugosa suscescente iatus pulla albido & suscescente radiata: fasciis supra duabus lacteis.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 132. n. 257.

Habitat - - testa $1\frac{1}{4}$ pollicis longa, striis inæqualibus, vertice subacuminato exalbido fundi macula albo fuscoque varia.

173. P. testa subovali crenata striata ochroleuca rubro maculata radiataque altero latere latiore: margine revoluta.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 496. t. 6. f. 7.

Habitat - - testa pollicem longa, intus alba, striis inæqualibus, majoribus complanatis, vertice stramineo.

174. P. testa ovata convexa albo nigroque varia striata striis squamosis, vertice subcentrali cano.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 492. t. 6. f. 4.

Habitat - - testa fere pollicem longa, latere angustiore nigro radiata, striis longitudinalibus subtilibus confertis, fundo ex albo hepatico.

175. P. testa ovata subtilissime striata testacea: annulis tribus transversis suscescentibus, intus lutea: fundo albido.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 135. n. 261.

Habitat - - testa ultra $\frac{3}{4}$ pollicis longa, vertice obtuso.

176. P. testa ovata tenui fusca obscurius fasciata dilutius striata, intus subfusca, vertice fundoque albis.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 136. n. 262.

Habitat - - testa fere $\frac{3}{4}$ pollicis longa, striis perpendicularibus tenerrimis.

177. P. testa ovata altero latere angustiore subtilissime striata cærulecente fascia marginem versus alba, alteraque cærulecente, vertice & margine albis.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 136. n. 263.

Habitat - - testa $\frac{3}{4}$ pollicis fere longa perpendiculariter striata intus alba fascia ex luteo fusca alteraque propiore alba fundum luteum cingente.

- obscura. 178. P. testa ovata planiuscula striata fusco & lutescente varia viridi punctata intus fusca : vertice badio.
Schroet. n. *Litterat.* 3. p. 137. n. 264.
Habitat - - - *testa vix $\frac{1}{2}$ pollicem longa.*
- exoleta. 179. P. testa ovali subconvexa inaequaliter striata exalbida: lineis nonnullis dimidiatis nigris, fundi macula ^{lutea} spatulata ochroleuca.
Schroet. *Einl. in Conch.* 2. p. 493. n. 124.
Habitat - - - *testa parum ultra $\frac{1}{4}$ pollicis longa,*
intus nitida alba.
- affinis. 180. P. testa ovali planiuscula solida : radiis quibusdum nigris dimidiatis, fundi macula spatulata alba.
Schroet. n. *Litterat.* 3. p. 138. n. 266.
Habitat - - - *testa $\frac{3}{4}$ pollicis longa.*
- fuscata. 181. P. testa ovata convexa subtilissime striata fusco varia.
Schroet. *Einl. in Conch.* 2. p. 493. n. 126.
 β) *Schroet.* n. *Litterat.* 3. p. 138. n. 267.
 γ) *Schroet.* n. *Litterat.* 3. p. 139 n. 269.
Habitat - - - *testa nonnullas lineas $\frac{1}{2}$ pollicem longas*
maculis, punctis, fasciis atris, spadiceis vel fuscis variis,
- mellea. 182. P. testa rotundata solida glaberrima mellea intus alba : vertice fuscescente, margine fusco maculato intus ^{atque} genteo, fundi litura spatulata hepatica.
Schroet. *Einl. in Conch.* 2. p. 493. n. 125.
Habitat - - - *testa ultra $\frac{1}{4}$ pollicis longa.*
- anceps. 183. P. testa solida glaberrima subacuminata dilutius ^{lutea} dicea, intus ex incarnato alba.
Schroet. n. *Litterat.* 3. p. 139. n. 271.
Habitat - - - *an hujus generis!*
- guineen- sis. 184. P. testa ovata convexa laevissima altero latere latoe spadiceo, altero cum vertice luteo : margine utrinque incarnato.
Schroet. n. *Litterat.* 3. p. 140. n. 272.
Habitat rara in Guinea, testa $\frac{1}{4}$ sere pollicis longa.
- compla- 185. P. testa depresso hemisphaerica obsolete cancellata nata. albo & fuscescente varia.
Schroet. n. *Litterat.* 3. p. 141. n. 274.
Habitat - - - *testa minuta, vertice complanato, fundo*
fuscescente, margine altero latere albo.

- Virgata.* 186. P. testa ovata longitudinaliter striata albida : vertice radiisque fuscis intus margaritacea.
v. Born *muf.* Caes. *Vindob.* *test.* I. p. 443. t. 18. f. 10.
Habitat - - -
- nivea.* 287. P. testa subconica solida glabra transversim concentrica annulata nivea.
Adans. *Seneg.* I. p. 32. t. 2. f. 3. *Soron.*
Habitat in Africa, testa diametri 4 circiter linearum, annulis 7-8, vertice rotundato.
- grisea.* 188. P. testa ovali confertim radiatimque sulcata intus nitida vertice subcentrali.
Adans. *Seneg.* I. t. 2. f. 5.
Habitat in Africa, testa pollicem fere Longa, recente ut plurimum grisea aut ex viridi cinerea, interdum albida aut vinacea fusco fasciata: sulcis fuscis fundo albido.
- Navicula.* 189. P. testa angusta decussatim striata rosea: cingulo calloso in altero latere medio & fundo exalbidis, margine utrinque revoluto.
Meusch. *Naturf.* 18. p. 9. t. 2. f. 6.
β) *Meusch.* *Naturf.* 18. p. 9. t. 2. f. 5.
Habitat - - - testa pollicem circiter longa: margine acutissimo.
- tingulata.* 190. P. testa subovali ferruginea obsolete striata: cingulis duobus elevatis obscure fasciatis, vertice subcentrali.
Meusch. *Naturf.* 18. p. 8. t. 2. f. 7.
Habitat - - - testa margini utrinque revoluta.
- Scapha.* 192. P. testa candidissima undulatim striata angusta: latere latiore callo acuto obsesta, angustiore repanda.
Meusch. *Naturf.* 18. p. 10. t. 2. f. 8.
Habitat - - - testa $\frac{1}{4}$ pallicis longa, vertice versus latus angustius verbo.

Huius tribui adscribendae videntur testae a Listero Conch. t. 537. f. 19. 20. a Kleino oſfr. t. 8. f. 2. a Runipio muf. t. 40. f. 5. b. a Gualtieri test. t. 8. f. A. C. F. t. 9. f. B. D. & L. ab Argenville zoomorph. t. 1. f. 1-3. a Knorio Vergni. 3 t. 9. f. 1. 2. 4. t. 29. f. 3. & t. 30. f. 5. 5. t. 19. f. 2. & 6. t. 28. f. 6. t. 30. f. 5. 6. & t. 33. f. 7. depicitæ, tertiaæ autem tribui testæ a Listero Conch. t. 542. f. 26. & t. 544. f. 29. a Kleioio Oſrac. t. 8. f. 6. 7. & a Bonanni muf. Kircher. t. f. 29. delineatae.

***** Perforatæ vertice.

Fissura. 192. P. testa ovali striato-reticulata : vertice recurvo, anterius fissa.

Müll. zool. dan. I. p. 83. t. 24. f. 7-9. rar. I. p. 51. prodr. 2864. Patella testa sulcato-reticulata, vertice recurvo, margine antice sursum fiso.

Klein ostr. p. 116. Patella reticulata exigua alba, fissura notabili in margine.

Lift. Conch. t. 543. f. 28.

Pet. gaz. t. 75. f. 2.

Ad. Nidros. 4. p. 471.

Brit. zool. t. 90. f. 151.

da Costa brit. zool. p. II. t. I. f. 4.

v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 18. f. 12.

Martin. Conch. I. t. 12. f. 109. 110.

Habitat ad Angliae, Norvegiae, Barbariae littora, saxis, madreporeæ quoque virtusæ adhærens, inter terriam & hanc tribum media, incola albo : oculis magnis nigris pallioque cinereo albo fimbriato, testa conica solida, flavescente, intus alba lœvi.

Fissurel- 193. P. testa sulcata : vertice recurvo, anterius perforata, la.

Fabr. Fn. greenl. p. 384. n. 381. Müll. zool. dan. I. p. 82. t. 24. f. 4-6. rar. I. f. 50. prodr. 2865.

Habitat ad Islandiae littora in fundo maris lapidibus adhærens, fissuræ affinis, at incola flavicante, testa minore non reticulata, cana, intus lœvi, vix ultra $\frac{3}{4}$ lineas longa.

Pustula. 194. P. testa ovali gibbosof-convexa striato-reticulata : marginé crenulato.

Lift. Conch. t. 528. f. 3.

Klein ostr. p. 116. n. 5.

Pet. gaz. t. 3. I. 12.

da Costa Conchol. t. 7. f. 12.

Chemin. Conch. 10, p. 338. t. 168. f. 1632. 1633.

Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 5. f. 8.

β) Martin Besch. berl. Naturf. 2. t. 12. f. 4. 5. Patella Unguis, Schröt. n. Litterat. 3. p. 173. t. I. f. 9.

γ) Meisch. Naturf. 18. t. 2. f. 1.

Habitat in mari mediterraneo, atlantico, īndico, testa alba, prope marginem posteriorem perforata, striis inaequalibus radiatim decurrentibus decussatis.

græca. 195. P. testa ovata convexa : marginé introrsum crenulato.

Adans. Seneg. I. t. 2. f. 7. Gival,

Lift. Conch. t. 527. f. I. 2.

Tournef. it. I. t. 94.

Bonann. recr. & mus. Kircher. I. f. 6.

Gualt. test. t. 9. f. N.

Argenv. Conch. t. 2. f. I.

Klein ostr. t. 8. f. 3.

Knorr Vergn. I. t. 30. f. 3.

Regenf. Conch. I. t. 2. f. 23.

Martin. Conch. I. t. II. f. 98-101. 104.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 143. n. 276-279.

Habitat in mari mediterraneo & atlantico. testa aurorofum
latiore alba, cinerea vel lutea, frequentius macu-
lata, radiata aut variegata, pris elevatis decusatis,
in sectionis angulis tuberculatis.

nimbosa, 196. P. testa ovata striata rugosa fusca : vertice oblongo-
perforato. Mus. Lud. Ulr. 695. n. 425.*

Adans. Seneg. I. t. 2. f. 6. Dafan.

Lift. Conch. t. 528. f. 4.

Calumin. aq. II. 12. f. 3.

Ginann. adr. 2. t. 2. f. 19.

Bonann. recr. & mus. Kircher. I. f. 3.

Gualt. test. t. 9. f. P? Q. R. S. T.

Argenv. Conch. t. 2. f. C.

Martin. Conch. I. t. II. f. 91. 92.

Habitat in mari mediterraneo & atlantico, testa ad 2
pollices longa alba, grisea vel sanguinea, interdum
violaceo radiata & fundum versus viridi nebulosa, striis
subtilibus nunc squamosis, nunc nodulosis.

Rubru-
cula.
Pisa.
barbaden-
4s.

197. P. testa subovata rugosa, alba rubro radiata : vertice
ovato-perforato.

Habitat frequens in mari mediterraneo, nimbosæ affinis,
at testa minore : funda fusco.

198. P. testa ovata solida albo & virescenti nebulosa : radiis
obliquis undulatis alternis violaceis & albis.

Davil. Catal. t. 3. f. C.

Martin. Conch. I. t. II. f. 92.

Habitat in freto magellanico, testa $3\frac{1}{2}$ pollices longa,
annulis 6 duplicitibus circumscripta, verticis foramine
rotundo.

199. P. testa oblonga inæqualiter striata, intus laevi lactea
virescente fasciata, margine crenulato.

Lift. Conch. t. 528. f. 7.

Martin. Conch. I. t. II. f. 93. 96. 97.
Habitat ad insulam Barbados, testa nunc grisea, nunc ex luteo virescente crebro macula: a aut radiata, striis granulatis aut squamosis, verticis foramine circulari annulo spadiceo cincta.

Jamaicæ 200. P. testa albida transversim annulata : striis longitudi-
cenis. libus tuberculis foliaceis extorsum majoribus obsecessis.

List. Conch. t. 528. f. 6.

Martin. Conch. I. t. II. f. 94.
β) Schroet. n. Litterat. 3. p. 146. n. 282.

*Habitat ad insularum Jamaicæ & Barbados littora, ver-
ticis foramine oblongo.*

cassia. 201. P. testa ovata compressa striata subtilissime annulata
nigro radiata : margine dentato intus nigro, fundo
laetio, verticis foramine subcentrali.

Martin. Conch. I. t. II. f. 95.

*Habitat rara ad Caput Boæ Spei, testa cinerea aut
alba nonunquam verticem versus viridi.*

perforata. 202. P. testa convexiuscula transversim rugosa fuscescente
stramineo-radiata maculataque : striis longitudinali-
bus alternatim majoribus squamosis.

Martin. Conch. I. t. II. f. 97.

*Habitat - - - testa $1\frac{1}{2}$ pollicem longa, fuscescente
intus alternotim albo virescente fasciata, vertice dia-
lato intus crenato, fundo rubescente.*

porphy- 203. P. testa oblonga compressa inæqualiter striata alba:
rozonias. cingulis quinque purpureis interruptis, intus ex
albo virescente.

Martin. Conch. I. t. 12. f. 102. 103.

β) Schroet. n. Litterat. 3. p. 155. n. 299.

*Habitat rario in America septentrionali, foramine ver-
ticis minuto orbiculari, intus circulo sanguineo cindo:*

rosea. 204. P. testa tenerrime striata, radiis alternis roseisque
picta, verticis foramine ovali.

List. Conch. t. 529. f. 22.

Martin. Conch. I. t. 12. f. 105.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 166. n. 316. 317. 384.

Habitat - - - testa minuta alba fascia interdum transversa rosea picta intus nonnunquam virescente, nunc oblonga compressa, nunc rotundata convexa: verticis foramine intus annulo rubro circumscripto.

*Scutell-
lum.* 205. P. testa utrinque repanda compressa: verticis foramine sulcis radiato.

Meusch. Naturf. 18. p. II. t. 2. f. 3.

β) Meusch. Naturf. 18. p. II. t. 2. f. 2.

γ) Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 512. t. 6. f. II.

δ) Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 512. n. 167.

ε) Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 511. n. 165.

ζ) Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 511. n. 164.

η) Schroet. n. Litterat 3. p. 172. n. 325.

Ω) Schroet. n. Litterat. 3. p. 173. t. I. f. 8.

Habitat - - - testa 1-1½ pollicem fere longa, interdum cingulis magis minusve elevatis notata, crebrius longitudinaliter striata, aut sulcata, ex flavescente exalbida radiis undulatis angustis violaceis, aut cinerascentibus picta, vel dimidiato alba & carulea, vel: cinereo alboque varia, vel alba sulcis rubris radiata, aut extrorsum radiis roseis picta, vel cinerea, intus ut plurimum alba.

Avellana. 206. P. testa tenera alba tenerime striata: verticis foramine oblongo per ligamentum interjectum bipartito.

Meusch. Naturf. 18. p. 10. t. 2. f. 4.

β) Argent. Conch. t. 2. f. E?

Habitat - - - rarissima, teste margine utrinque subrevoluto.

spinosa. 207. P. testa ovata convexa alba: striis elevatis extrorsum crassioribus quadrispariam tuberculatis; tuberculis exterioribus spinosis.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 513. t. 6. f. 12.

Habitat - - - testa intus exalbida, vertice roseo: apertura oblonga, margine interno crenato.

*denticu-
lata.* 208. P. testa ovata gibba exalbida fusco radiata, intus viridi: striis elevatis subrugosis alternatim majoribus, margine denticulato intus crenato.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 513. n. 169.

Habitat - - - testa pollicem circiter longa, verticis foramine parallelogrammo, fundo albo.

nodulosa. 209. P. testa ovata convexiuscula intus alba : striis elevatis nodulosis transversas teneriores decussantibus, vertice nigro.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 514. n. 170.

(β) Schroet. n. Litterat. 3. p. 160. n. 306.

Habitat - - - testa interdum cinerascente : striis albis, intus nonnunquam cinerascenti-radiata, margine repando.

angusta. 210. P. testa deppressa alba : striis elevatis ; quaternis majoribus, verticis foramine angustissimo, fascia spadicea intus vitidi cincto.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 514. t. 6. f. 13.

Habitat - - - testa $\frac{1}{4}$ circiter pollicis longa.

inæqua- 211. P. testa ovata convexa decussatim striata alba latere latoiore subtriangula : verticis foramine annulo elevato linea rubra circumscripta cincto.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 145. n. 172.

Habitat - - - testa pollicem longa, margine intus fascia virescente.

minuta. 212. P. testa ovali-pyramidata rubella : striis elevatis duodecim fundoque albis, verticis medii foramine ovali, margine denticulato.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 515. n. 173.

Habitat - - - testa dimidiuni pollicem longa.

confusa. 213. P. testa ovata convexa striata flavicante rubro punctata : radiis tribus obliquis, intus levigata.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 515. n. 174.

Habitat - - - testa vix- $\frac{3}{4}$ pollicis longa, vertice subcentrali, foramine linearie, margine integro.

rubef- 214. P. testa ovali striata rubella : fascia media intusque alba : margine integro, verticis foramine linearie.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 515. n. 175.

Habitat - - - testa parum ultra $\frac{3}{4}$ pollicis longa, tenui, margine lateris latioris repando, ceterum integro.

sanguine- 215. P. testa ovali tenera sanguinea intus ex albo virescente.

nea. fascia longitudinalibus subtiliores transversas extrossum rugosas decussantibus.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 516. n. 176.

Ad hanc tribum spedant, an distinctæ species? testæ a Listero Conch. 28. f. 5. & a Knorri Vergn. 4 t. 29. f. 4. depida.

Habitat - - - testa vix $\frac{1}{2}$ pollicem longa, angusta: marginē integro, fundo rubello.

- Ventricosa. 216. P. testa ovali ventricosa striis decussatis rubris exarata, intus alba: verticis depressi foramine orbiculari, marginē integro.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 516. t. 6. f. 14.

Habitat - - - testa fere pollicem longa.

- Triradiata. 217. P. testa ovali planiuscula striata alba: radiis tribus fuscis intus exalbida: verticis foramine linearī, marginē integro.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 517. t. 6. f. 15.

Habitat - - - testa parum ultra $\frac{1}{2}$ pollicem longa, vertice subcentrali.

- Tenuis. 218. P. testa ovali convexiuscula pellucida longitudinaliter striata alba: radiis quinque dimidiato fuscis, intus flavicante.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 517. n. 179.

Habitat - - - testa parum ultra- $\frac{1}{4}$ pollicis longa, verticis foramine anibitu cinereo intus punctato.

- Pelanozonias. 219. P. testa convexa rosea: fascia interrupta nigra striisque elevatis inæqualibus albis, intus alba lævi, marginē denticulato.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 148. n. 286.

Habitat - - - testa $\frac{1}{4}$ pollicis longa, striis majoribus squamosis, vertice acuminato: foramine orbiculari, intus annulo elevato cinerascente cincto.

- Elegans. 220. P. testa convexa rosea: striis elevatis nodulosis alternatim majoribus albis, intus alba lævi, verticis foramine orbiculari ampio.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 149. n. 287.

β) Schroet. n. Litterat. 3. p. 149. n. 288.

γ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 150. n. 289.

Habitat - - - testa $\frac{1}{4}$ pollicis longa, margine subcrenato intus virescente.

- Punicea. 221. P. testa convexa spadicea inæqualiter confertim & decussatim striata, intus lævi fasciis alternis viridibus albisque picta, verticis foramine orbiculari.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 150. n. 290.

β) Schroet. n. Litterat. 3. p. 151. n. 291.

Habitat - - - testa ultra pollicem longa, verticis foramine annulo spadiceo, intus albo elevato cincta, marginē integro.

- rufescens.* 222. P. testa convexa alba rubello obumbrata, hinc inde
rubro striata, striis granularis exarata, intus lævi alba.
Schroet. n. *Litterat.* 3. p. 151. n. 292.
Habitat - - - marginē integro transversim striato, ver-
ticis foramine ovali.
- dimidia-* 223. P. testa convexa supra cāandidissima cancellata, mar-
ta. ginem versus longitudinaliter striata: fascia rosea.
Schroet. n. *Litterat.* 3. p. 152. n. 293.
Habitat - - - testa pollicem longa, intus lævi alba,
marginē subintegro, verticis foramine orbiculari.
- lactea.* 224. P. testa convexa alba, striis inæqualibus acutis glabris
exarata, intus lævi: vertice roseo; foramine amplio
orbiculari.
Schroet. n. *Litterat.* 3. p. 152. n. 294.
Habitat - - - testa ultra pollicem longa.
- pyrami- dalis.* 225. P. testa convexa rosea striatā: costis duodecim lævi-
bus, intus lævi ex virescente alba.
Schroet. n. *Litterat.* 3. p. 153. n. 295.
Habitat - - - testa 1½ pollicis fere longa.
- bicolor.* 226. P. testa angusta altenatim spadiceo alboque radiata:
striis inæqualibus crassis dente lamellatis, intus lævi
alba, margine crenulato.
Schroet. n. *Litterat.* 3. p. 155. n. 296.
Habitat - - - testa 1½ pollicis longa, margine inflexo,
verticis foramine oblongo.
- erythroee- phala.* 227. P. testa convexa alba exterius rubro lineata: striis
elevatis rugosis contrariis: decem majoribus marginē
repando inflexo.
Schroet. n. *Litterat.* 3. p. 154. n. 297.
Habitat - - - testa 1½ pollicis longa, vertice rubello.
- verrucosa.* 228. P. testa supra fusca striata cingulo nodoso terminata,
infra rubro radiata, costis acutis nodulosis inæquali-
magine denticulato repando.
Schroet. n. *Litterat.* 3. p. 156. n. 300.
Habitat - - - testa ¾ pollicis longa convexiscula, intus
lævi ex albo virescente, verticis foramine orbiculato.
- contami- nata.* 229. P. testa convexa costis nodulosis inæqualibus, majoribus
ex luteo fuscis alpera, guttis atris in circulos interruptos
digestis pieta, intus ex virescente alba: vertice cinereo.
Schroet. n. *Litterat.* 3. p. 156. t. I. f. 7.

Habitat - - - *margine testæ repando, intus integro gramineo, verticis foramine intus annulo elevato gramineo, alteroque circulo fusco cincto.*

- atratæ.* 230. P. testa convexiuscula angusta alba rubello lineata, extrosum nigro maculata: striis elevatis convexis inæqualibus: verticis foramine oblongo; ambitu spadiceo.

Schroet. n. Litterat. 3. 158. n. 103.

Habitat - - - *testa $\frac{3}{4}$ fere pollicis longa, margine crenato, verticis foramen intus ambiente, annulo rubello.*

- candicans.* 231. P. testa alba versus marginem repandum spadicea: costis viginti alternatim majoribus, verticis rubelli foramine oblongo.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 158. n. 304.

Habitat - - - *testa ultra $\frac{1}{4}$ pollicis longa.*

- succinctæ.* 232. P. testa ovato-acuminata alba supra lœvi cingulo medio elevato, versus marginem denticulatum ferrugineo punctatum striis elevatis inæqualibus lœvibus.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 160. n. 307.

Habitat - - - *testa $\frac{3}{4}$ pollicis longa, verticis foramine angusto orbiculato.*

- pugilæ.* 233. P. testa planiuscula alba suborbiculata: striis elevatis viginti: alternatim minoribus brevioribus, verticis foramine rotundo utrinque circulo rubello cincto.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 161. n. 308.

Habitat - - - *testa $\frac{1}{2}$ pollicem longa lataque.*

- lavacriæ.* 234. P. testa tenuissima effusa acuminata subtiliter striata flavicanæ: radiis sex fascis margine denticulato, verticis cinerei foramine oblongo.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 165. n. 315.

Habitat - - - *testæ longitudine $\frac{1}{2}$ pollicem non afferente.*

- antiquata.* 235. P. testa convexiuscula, obsolete striata alba: exteriorius radiis sanguineis striatis, verticis foramine oblongo inæquali.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 167. f. 319.

Habitat - - - *testa pullicem longa, margine integro.*

- Caleata.* 236. P. testa solida ovata compressa intus alba; verticis subrecurvi obtusi foramine lineari, margine crenato.

Helbing. Abh. der boehm. Privatg. 4. p. 103. t. I. f. 3. 4.

Habitat - - - *testa 6 lineas longa striata: margine intus ochroleuca.*

personata. 237. P. testa convexa decussatim lineata : radiis atris *Mari-*
tyn univ. Conch. 2. t. 64.
Habitat ad insulas Falkland.

332. DENTALIUM. *Animal. Terebella.*

Testa univalvis, tubulosa;
recta, monothalamia,
utraque extremitate per-
via.

elephantis. 1. D. testa decemangulata subarcuata striata. *Mus. Lud.*
*num. Uir. 699. n. 426.**

Rumpf mus. t. 41. f. I. Denticulus elephantis.

Argenv. Conch. t. 3. f. H. Dentalis.

zoomorph. t. 1. f. H.

Lift. Conch. t. 547. f. I.

Pet. amb. t. 16. f. 33.

Per. t. 13. f. 9.

Bonaa. recr. & mus Kircher. I. f. 8.

Gualt. test. t. 10. f. I.

Ginani. adr. 2. t. I. f. I.

Knorr Vergn. I. t. 29. f. 3.

v. Born mus. Caes. Vind. test. p. 430. vign.

Martin. Conch. I. t. I. f. 5. A.

β) *Argenv. Conch. t. 3. f. I.*

*Habitat in mari indico, siculo aliisque europaeis, testa
 ad 4 fere pollices longa viridi, obscurius externe
 annulata, apice alba, intus laevi.*

aprinum. 2. D. testa decemangulata subarcuata laevi.

Martin. Conch. I. t. 4. B.

*Habitat in mari indico, nonne varietas elephantini? testa
 alba, profundius sulcata, ut plurimum angustiori, in-
 ter angulos, interdum 8-12, aut laevissima, aut sub-
 tilissime striata.*

Dentalis. 3. D. testa viginti striata subarcuata interrupta.

Rumpf mus. t. 41. f. 6.

v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 18. f. 13.

*Habitat rarum in mari mediterraneo, testa aut tota;
 aut apice acuminato rubro.*

Entalis. 4. D. testa tereti subarcuata continua laevi. *Fa. suec. 220¹.*

Muse. Lud. Ulr. 699. n. 427. Müll. zool. dan. prod. 285².*

Argenv. Conch. t. 3. f. K. & t. 29. f. 2. Antalis.

Lift. Conch. t. 547. f. 2. & t. 1056. f. 4.

Bonann. recr. & mus. Kircher. I. f. 9.

Gualt. test. t. 10. f. E.

Ginann. adr. 2. t. I. f. 2.

Knorr Vergn. I. t. 29. f. 4.

Martin. Conch. I. t. I. f. I. 2.

Habitat ad Indiæ, Persiæ, Europæ littora, testa ad $\frac{1}{2}$ pollicem longa, alba, apice interdum rubella aut flavicante, nunc solidiore, nunc tenuiore, nunc angustiore, nunc ampliore, nunc acuminata, nunc obtusa, quasi polita; striis tamen interdum nudo oculo vix conspicuis exarata.

*arieti-
num.* 5. D. testa tereti arcuata continua lœvi. Müll. zool. dan. prodr. 2853.

Habitat ad Scandinaviæ littora, Entali proxime affine, testa tamen magis arcuata octuplo minori.

torneum. 6. D. testa tereti subarcuata interrupta opaca.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 523. t. 6. f. 16.

Habitat rarum in Oceano africano, Entali affine, testa ad $\frac{1}{2}$ pollicis longa, lœvi, cornea, aut ex luteo fusca, apice obtusa, rotundata.

Politum. 7. D. testa tereti subarcuata continua: striis annularibus confertissimis.

Rumpf mus. t. 41. f. 5.

Gualt. test. t. 10. f. F.

Martin. Conch. I. t. I. f. 3. A.

Habitat rarum in mari indicò & siculo, Entali affine, testa $\frac{1}{2}$ pollicem longa, polita, valde acuminata, lœdea, rarius rosea: striis annularibus albis aut viridibus.

eburneum. 8. D. testa tereti subarcuata continua: annulis remotis.

Habitat in India, Entali simillimum, testa candidissima lœvissima, nitida, striis annularibus convexis numerosis.

minutum. 9. D. testa tereti erectiuscula lœvi minuta.

Planc. Conch. t. 2. f. 2.

Habitat in mari mediterraneo, at tam exile, ut nisi armatis oculis discerni non posset, setam potius aut echini aculeum referens.

fasciatum. 10. D. testa subtilissime striata subarcuata grisea obscurius fasciata.

Martin. Conch. I. t. I. f. 3. B.

- Habitat in mari siculo, testa minuta solida, pennae cori
vinæ crassitie, fasciis 4-5 obscure cinereis aut fuscis.*
- nebulosum. 11. D. testa arcuata lævissima alba fulvo maculata nebulosa.
*Habitat in mari siculo, fasciato affine, at testa magis
arcuata, longiore & tenuiore.*
- rectum. 12. D. testa recta duplicato striata annulata.
Gualt. test. t. 10. f. H.
Martin. Conch. I. t. I. f. 4. A.
Schroet. Einl. in Verst. t. 3. f. 5.
*Habitat --- elephanino simile, at testa minus acutus
apertura ampliore magis obtusa, præter longitudine,
rarius: triplicatas, annularibus quoque exarata, ex alba
virescente annulis viridibus varia, aut alba, aut testacea.*
- striatum. 13. D. testa octangulata octostriata acuminata viridi apice
alba.
List. Conch. t. 547. f. I. b.
Martin. Conch. I. t. I. f. 5. B.
*Habitat rarius in mari siculo, elephanino affine, at testa
longiore, angustiore, apertura altera angulata, altera
angustissima orbiculata.*
- fossile. 14. D. testa subtereti obtusiuscula striata: striis subtilibus
æqualibus.
Schroet. Einl. in Verst. 4. t. 3. f. 7.
*Habitat --- hæcenus modo fossile prope Loretto in Italia
repertum, striatulo affine, at testa non angulata, minus
acuminata, amplius aperta.*
- annulatum. 15. D. testa tereti oblique striata.
Guettard mineral. Belustig. 4. t. 5. f. 3.
Habitat --- hæcenus modo fossile repertum.
- arcuatum. 16. D. testa angulata arcuata subulata unicolor.
Gualt. test. t. 10. f. G.
Habitat --- testa virgescente.
- pellucidum. 17. D. testa cornea flexili rectiuscula terete lævi.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 529. t. 6. f. 17.
*Habitat in Oceano septentrionali, testa dilute mellea, atque
gustiflava, tenui, ad 2 $\frac{1}{4}$ pollicis longa, cum acidis non
effervescente.*
- Radula. 18. D. testa subarcuata obtusiuscula decussatim striata:
striis longitudinalibus granulatis.
Schroet.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 530. n. 9.

Habitat - - - haecenus modo fossile in Pedemontio inventum : testa ad pollicem longa.

interrup- 19. D. testa decussatim striata : striis omnibus lævibus ;
tum. longitudinalibus subtilioribus interruptis.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 530. n. 10.

Habitat - - - haecenus modo fossile in Pedemontio inventum.

Vireum. 20. D. testa hyalina glaberrima subarcuata.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 531. n. 11.

Habitat - - - haecenus modo fossile in Pedemontio reperatum , testa solida , $\frac{3}{4}$ pollicis longa , diametri $\frac{2}{3}$ pollicis , apicem versus sensim decrescentis.

Exangu- 21. D. testa sexangulata striata.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 531. n. 12.

Habitat - - - haecenus modo fossile prope Loretto in Italia deprehensum.

333. SERPULA. Animal Terebella.

Testa univalvis , tubulosa , adhaerens , (sœpe isthmis integris passim intercepta.)

tautilo- 1. S. testa planiuscula minuta confliente verrucosa spirali des; isthmis intercepta : septis semilunaribus tenerimis.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 283. t. 3. f. 22. 33.

Habitat in mari norwegico , madreporeæ proliferæ adhaerens , testa ut plurimum seminis milii magnitudine , ut tam interdum diameter $\frac{1}{4}$ pollicis æquet , fusca sive aut alba , figuræ inconstantis , nunc magis oblonga , nunc magis orbiculari , septis parallelis , apertura angustissima

seminu- 2. S. testa regulari ovali libera glabra. O. Fabr. Fn. lum. groenl. p. 376. n. 370.

Gualt. test. t. X. f. S.

Planc. Conch. t. 2. f. 1?

Martin. Conch. i. t. 3. f. 22. a; b.

Habitat in mari adriatico & rubro scilicet in strato conchis

eo prope Cassellas frequens , grani arenæ magnitudine;

Hhh hhh hhh hh

testa alba vel flavicante, anfractibus sibi appressis, apertura angusta, compressa.

planorbis. 3. S. testa orbiculata regulari plana æquali. Fn. suec. 2102.

*Habitat in conchis pelagicis, testa primo intuitu squamu-
lam orbiculatum ante adnatam referente, spirarum ru-
dimento externo nullo, et fracta horizontaliter diser-
dente, intusque ostendente spiram peregrinæ testæ, his
insidebat, insculptam, tanquam circulos concentricos.*

Spirillum. 4: S. testa regulari spirali orbiculata pellucida: anfrac-
tibus teretibus sensimque minorebus. Fn. suec. 2203.
Müll. zool. dan. prodr. 2854. O. Fabr. Fn. groenl. p.
376. n. 371.

Planc. Conch. t. I. f. 8.

Ginann. adr. 2. t. I. f. 7.

Martin. Conch. I. t. 3. f. 20. C. D.

Pallas nov. að. Petrop. 2. p. 236. t. 5. f. 21. (animal)

*Habitat in Oceano, & mari mediterraneo, sertularis
aliisque zoophytis, testaceis quoque insidens, at testa
triplo minori, subtus & anfractuum latere centrum re-
piciente sulcis oculo nudo non usurpandis inæquali.*

Spirorbis. 5. S. testa regulari spirali orbiculata: anfractibus supra
introrsum subcanaliculatis sensimque minoribus. Fn. suec.
2204. It. wgoth. t. 170. Müll. zool. dan. 3. p. 8. t. 86. f.
1-6. prodr. 2855. O. Fabr. Fn. groenl. p. 377. n. 372.

Lift. Conch. t. 553. f. 5.

Petiv. gaz. t. 35. f. 8.

Gualt. test. t. 10. f. O.

Ginann. adr. 2. t. I. f. 8.

Klein tubul. t. I. f. 8.

Baster op. subsec. I. p. 79. t. 9. f. 3.

Planc. Conch. 19. n. 3.

Martin. Conch. I. t. 3. f. 21. A. B. & f. 21. O.

β) Chemn. Conch. 9. t. 116. f. 999.

*Habitat in Oceani, porissimum septentrionalis, & pelagico
fucus, zoophytis, testa varie magnitudinis, apertura
fere circulari: limbo albo.*

triquetra. 6. S. testa repente flexuosa triquetra. Fn. suec. 2205.*
Mus. Lud. Ulr. 693. n. 428.* It. wgoth. 170. Müll. vol.
dan. prodr. 2856. O. Fabr. Fn. groenl. p. 379. n. 374.

Gualt. test. t. 10. f. P.

Ephem. Ac. Nac. Curios. 1727. p. 315. t. 10.

Baster. opusc. subs. I. t. 9. f. 2. A. B. C.

Stroem. ad. Nidros. 4. p. 53. t. 2. f. 14.

ad. Havn. 10. p. 17. t. 6. f. 1-5.

v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 18. f. 14.

Martin. Conch. I. t. 3. f. 25.

Habitat in Oceano, mari etiani caspio, testaceis, fucis, lapidibus, năvibus insidens, testa alba, pellucida, figuræ variabilis, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ pollicis longa, non raro longiore, dorso carinata, interdum denticulata, apertura angusta circulari.

laticata. 7. S. testa filiformi scabra tereti flexuosa.

Guettard. mineral. Belust. 3. t. 6. f. 12. 13.

Habitat in mari mediterraneo, atlantico, indico, pennis aliisque testaceis insidens, testa ex cinerascente alba subrugosa, oculo armato rudi & valde scabra, fili tenuioris instar flexa.

filograna. 8. S. testis capillaribus fasciculatis ramoso glomeratis cancellatisque.

Raj. hijt. I. p. 65. Reticulatum tophaceum.

Bocc. mus. 228. t. 2. f. 13. & t. 7. f. 2. Rete marinum.

Ad. petrop. 7. p. 374. t. 16. f. 3. Tubipora.

Planc. Conch. add. ad p. 18. Tubularia filograna.

Pallas elench. zooph. p. 239. Serpula corallifica.

Seb. nuf. 3. t. 100. f. 8.

Guettard mineral. Belust. 4. t. 6. f. 14.

Schroet. Einl. in Verst. 4. t. 2. f. 12.

Habitat rara in mari mediterraneo, testa ad 4 pollices longa; singulis teretibus utrinque lăvibus.

Granula- ta. 9. S. testa tereti spirali glomerata : latere superiorē sulcis tribus elevatis. Müll. zool. dan. prodr. 2857.

O. Fabr. Fn. groenl. p. 380. n. 375.

Habitat in Oceano septentrionali, gregaria, lapidibus & testaceis adhaerens, testa alba, seminis corianari magnitudine, subumbilicata.

coartatu- plicata. 10. S. testa semitereti rugosa glomerata carinata. Fn. suec. 2205. Mus. Lud. Ulr. 698. n. 429. O. Fabri*

Fn. groenl. p. 381. n. 376.

Bonann. recr. & mus. Kircher. I. f. 20. G.

Argenv. Conch. t. 4. f. B. C. D.

zoomorph. t. I. f. L.

Martin. Conch. I. t. 3. f. 24. A:

Argenv. Conch. t. 4. f. E.

Habitat frequens in mari adriatico & americano, testa alba, cinerea, aut ex luteo fusca intus laevi, calami scriptorii crassitierem interdum asequentem, transversim striata, 3, 4 & plures pollices longa.

glomerata- II. S. testa tereti decussato-rugosa glomerata. Fn. ^{fusco} 2207. Mus. Lud. Ulr. 699. n. 430. * Müll. zool. d. ^{diss.} prodr. 2858. O. Fabr. Fn. groenl. p. 381. n. 377.

Adans. Seneg. I. t. II. f. 2. Lispe.

Bonann. recr. & mus. Kircher. I. f. 20. E.

Gualt. test. t. 10. f. T.

Argenv. Conch. t. 4. f. G.

Martin. Conch. I. t. 3. f. 23.

Habitat in Oceano septentrionali, mari siculo, atlantico, caspico, testa alba, fuscescente, cinerea, fusca vel alba, intus laevi, ad 23 usque libras interdum ponderis aequante.

Iunbrica- II. S. testa tereti flexuosa : apice spirali acuto. ^{Mus.} Lud. Ulr. 699. n. 431.

Adans. Seneg. I. t. II. f. I. Vermet.

Lis. Conch. t. 548. f. I.

Bonann. mus. Kircher. I. f. 20. M.

Rumpf. mus. t. 41. f. I.

Gualt. test. t. 10. f. Q. V.

Ginann. adr. 2. t. 2. f. 14.

Argenv. Conch. t. 4. f. I.

Knorr Vergn. 2. t. 13. f. I. & 4. t. 17. f. 2.

Martin. Conch. I. t. 2. f. 12. B. & t. 3. f. 24. B.

β) Bonann. recr. & mus. Kircher. I. f. 20. A?

Rumpf mus. t. 41. f. 4.

Martin. Conch. I. t. 2. f. 15.

γ) Boeann. recr. & mus. Kirch. I. f. 20. C?

Knorr Vergn. I. t. 29. f. 5?

Martin. Conch. I. t. 2. f. 16?

Habitat rario in mari adriatico, atlantico, indico, plurimum gregaria, testa transversim costata, longius dnatiter rugosa, 3-4, & plures pollices longi; hujus generis certe incola differre videtur.

polytha- I3. S. testa tereti diaphana laevi rectiuscula polythalamia. lamia. Rumpf mus. i. 41. f. D. E. Solen arenarius.

Martin. Conch. I. t. I. f. 6.

Habitat rario in mari mediterraneo & indico, in arena la- tens, testa exterius alba, transversim rugosa & canulata;

*finem latiorem versus sordidula, intus septis transversis
hinc convexis inde concavis non perforatis distincta,
ex pluribus quasi coalitis tubulis conflata.*

arenaria. 14. *S. testa articulata integra distincta subtus planiuscula.
Mus. Lud. Ulr. 700. n. 432.**

Adans. Seneg. I. t. II. f. 5. Musier.

Bonann. recr. & mus. Kircher. I. f. 20. B.

Gualt. test. t. 10. f. L. N.

Argenv. Conch. t. 4. f H.

Martin. Conch. t. 3. f. 19. A. B. C.

β) *Rumipf mus. t. 41. f. L?*

Martin. Conch. I. t. I. f. 10?

*Habitat rara in mari Indiam & occidentalem Africam
alluente, testa alba radiis undulatis dilute fuscis picta,
aut exalbida intus laevi, exterius cancellata: striis
interdum nodulosis, circa centrum spiraliter contorta:
an potius teredinis species?*

inguina. 15. *S. testa teretiuscula subspirali: fissura longitudinali
subarticulata. Mus. Lud. Ulr. 701. n. 433.**

Lift. Conch. t. 548. f. 2.

Bonann. recr. & mus. Kircher I. f. 20. F?

Rumipf mus. t. 41. f. H. & 2.

Gualt. test. t. 10. f. Z.

Guettard. miner. Belust. 4. t. 5. f. 36.

v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 18. f. 15.

Martin. Conch. I. t. 2. f. 13. A. B. C. & f. 14.

β) *Lift. Conch. t. 1056. f. 3?*

Klein tub. t. I. f. 3?

Seb. mus. 3. t. 94?

Martin. Conch. I. t. I. f. 11?

γ) *Born mus. Caes. Vindob. test. t. 18. f. 16. Serpula
muricata.*

*Habitat rario in mari indicō, testa polymorpha, nunc
tereti, nunc angulata, nunc porrecta, nunc magis
minusve flexuosa, nunc glabra, nunc scabra, fissuræ
articulæ interdum obsoletis; an hujus generis?*

*vermicu-
laris.* 16. *S. testa tereti subulata curvata rugosa. Müll. zool. dan.
3. p. 9. t. 86. f. 7-9.*

Eltis coroll. t. 38. f. 2. Turbus vermicularis.

Klein tubul. t. I. f. 1?

*Habitat in Oceano Europaeo; animalis inhabitantis pro-
boscidie interiori cfundo exterioris pro lubitū exferenda,
lichenem pyxidatum referente. Skene.*

- Penis. 17. S. testa tereti recta extremitate radiata : disco ^{poli}
cylindricis. Mus. Lud. Ulr. 702. n. 434.*
Argenv. Conch. t. 3. f. G. *Penicillus marinus.*
List. Conch. t. 548. f. 3.
Bonann. mus. Kirch. I. f. 38.
Rumpf mus. t. 41. f. 7.
Valent. Abh. t. 10. f. 87.
Gualt. test. t. 10. f. M.
Knorr Vergn. 4. t. 28. f. 1. & 6. t. 40. f. 1.
Mus. Leess. p. 3. n. 4. f. 1.
Mus. Gronov. p. 136. n. 1447.
Mazéas act. paris. extrans. 9. p. 299. t. 1-3. & p. 317¹
 t. 1. 2.
Martin. Conch. I. t. 1. f. 7.
Besch. berl. Naturf. 2. t. II. f. 1-5.
Habitat pretiosa in mari indico, testa alba, aut cinea-
rascente rubro obumbrata, læviuscula, sensim attenuata,
fine tenuiori aperta, ad 6 pollices longa, fine
convexo; nonne potius ad teredinem releganda?
- Echinata. 18. S. testa teretiuscula flexuosa rosea multifariam aculeata
fine obtusa.
Gualt. test. t. 10. f. R.
Martin. Conch. I. t. 2. f. 8.
Habitat - - - testa pennæ corvinæ crassitie, aper-
tura marginata.
- Ocrea. 19. S. testa teretiuscula striata fusca.
Rumpf mus. t. 41. f. K.
Martin. Conch. I. t. 1. f. 9.
Habitat in mari indico, coralliis affixa.
- protensa. 20. S. testa nitida læviuscula annulatim plicata ^{finem}
versus parum attenuata.
Rumpf mus. t. 41. f. 3.
Martin. Conch. I. t. 2. f. 12. A.
Habitat in mari indico & Americam alluvante, lacerata,
exalbida aut cœrulescens, calami anserini crassitie aut
tenuiori, tota porrecta, aut partim flexuosa.

*Huic generi adnumerandæ videntur testaceæ a Bonanni recr. & mus. Kircher. t. 4:
 f. 20. D. a Guaijeri t. f. t. 10. f. W. & X. ab Argenville Conch. t. 22. f.
 f. F. a Soba mus. 3. t. 9. f. 2. 4. 6-9 a Knorr Vergn. 5. t. 1. 22. f.
 1. & a Guettard mineral. Belusfig. 4. p. 306. t. 5. f. 37. depidæ.*

- Decussata.* 21. S. testa tereti decussatim striata subrugosa flexuosa sanguinea, intus lævi alba.
List. Conch. t. 547. f. 4.
Martin. Conch. I. t. 2. f. 17.
Habitat - - -
- Proboscidea.* 22. S. testa lævi alba: latiori parte recta transversim plicata.
Martin. Conch. I. t. 2. f. 18. B.
β) Martin. Conch. I. t. 2. f. 18. A.
Habitat - - - testa diametri ad finem latiorem vix $\frac{1}{2}$ pollicem superantis, 4, in β) 2 pollices longa, in hac extrinsecus quasi infumata.
23. S. testa substriata ex luteo fusca in tres anfractus contorta, terete: apice centrali.
Adans. Seneg. I. t. II. f. A. B. Datin.
Martin. Conch. I. t. 3. f. 20. A. B.
Habitat ad insulam Goream.
- Cereolus.* 24. S. testa tereti lævi flavicante multoties contorta;
Davil. catal. rais. I. t. 4. f. E.
Martin. Conch. I. t. 3. f. 20. E.
Habitat ad Americæ littora, testa longa, angusta supradiles, ad latera 5ies contorta.
- Cornu copiae.* 25. S. testa conica turrita flavicante fusco fasciata brusca; medium torta terete: apertura orbiculata.
v. Born. mus. Caes. Vindob. test. vign. p. 163, & t. 13, f. 10. ind. I. p. 371. f. I. 2.
Habitat - - - testa apice obtusa.
- Soreen-fis.* 26. S. testa tereti cancellata flava intus cornea.
Adans. Seneg. I. p. 164. t. II. f. 3. Dofan.
Habitat ad insulæ Goreæ littora, testaceis lignique frustis affixa, testa 8-9 pollices longa: striis elevatis; longitudinalibus confertis.
- intestinalis.* 27. S. testa triquetra tortuosa fragili, tuberculata excavato punctata.
Adans. Seneg. I. p. 166. t. II. f. 6. Jelin.
Habitat rara ad promontorium Africæ Manuel, testa exalbida, 8-9 pollices longa, nira contorta, subumbilicata, intus glaberrima.
- Infundibulum.* 28. S. testa tereti alba transversim striata ter contorta: gyro primo ex quinque quasi infundibulis sese recipientibus conflato.

*Martin. Besch. berl. Naturf. 2. p. 357. t. 12. f. 1.
Habitat in mari indico, topho affixa.*

pyramidalis- 29. *S. testa cinerea supra convexa subtus plana pyramidalis*
multoties contorta: gyris introrsum decrescentibus.
*Spengl. Besch. berl. Naturf. Fr. 2. p. 569. t. 9. A. f. 3-5. catal. rais. t. 5. f. 12-17.
Habitat in mari indico, testaceis variis adhaerens, aliaque
includens, testa fine angustiori aperta, ad pollicem usque
longa, interdum porrecta aut subflexuosa.*

denticula- 30. *S. testa alba terete subulata ad latera dentata recta: costata*
longitudinali media glabra: apice incurvulo glabro.
*Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 569. t. 6. f. 18.
Habitat in lepade tintinnabulo, testa $\frac{3}{4}$ pollicis longa.*

meliten- 31. *S. testa teretiuscula contorta umbilicata decussatim striata:*
costis longitudinalibus nodulosis intus laevi polythalamia.
*Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 570. t. 6. f. 19.
Habitat - - - fossilis in Melita inventa, gyris 2 primis
recta sibi impositis.*

norwegi- 32. *S. testa tereti laevi incurva: basi anfractuosa subobsoleta,
ore oblique truncato.* Müll. zool. dan. prodr. 2859.
*Ad. Nidr. 4. p. 51. t. 2. f. 11-13.
Habitat in mari norwegico.*

porrecta. 33. *S. testa tereti e basi spirali flexuose adscendente laevi
tente.* Müll. zool. dan. prodr. 2860. O. Fabr. Fn. groenl. p. 378. n. 373.
*Habitat cum spirillo, cui proxime affinis, in Oceano
septentrionali, testa tamen candidiore, pellucida, neu-
tiquam rugosa, verme inhabitante brevi, dorso sanguineo,
ad latera pallidiore.*

vitrea. 34. *S. testa tereti regulari spirali orbiculata pellucida splen-
dente rugosa: apertura incrassata.* O. Fabr. Fn. groenl.
p. 382. n. 378.

*Habitat rarer in mariis Groenlandiam alluentis fertulariis,
testaceis, fucis, lapidibus, glomeratæ affinis, testa crassi,
umbilicata, diametri $\frac{1}{3}$ -1 lineæ, interdum rubicunda.*

cancella- 35. *S. testa spirali glomerata trisulcata: sulco inferiore costis
transversis interrupto.* O. Fabr. Fn. groenl. p. 383. n. 379.

Habitat satis frequens cum granulata, cui similis, in mari Groenlandiam alluente, testa alba, cinerascente aut vivente: apertura bidentata.

36. S. testa suborbiculari umbilicato-convexa rugis radiata.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 383. n. 380.

Habitat in mari Groenlandiam alluentis serulariis, rarius testaceis & lapidibus adhaerens, testa magnitudinem capituli acus minoris vix asequente, testa violacea, brunea vel flavicante, albo radiata, subitus plana, gyro solitario, apertura minutissima.

37. S. testa subtriquetra subflexuosa lente attenuata violacea, intus laevi lutea: apertura alba undulatim striata dente conico munita.

Pallas miscell. zool. p. 139. t. 9. f. 2-10.

Seb. mus. I. t. 29. f. I. 2? Urtica marina singularis.

Habitat in mari, Americam medianam inter & Africam intermedio, rupibus corallisque affixa, testa semipedali, digitii minimi crassitie, incola albido.

38. S. testa filiformi glabra, conglomerata, perforata. *Forsk.*
Fn. arab. p. 128. n. 77.

Habitat ad Massiliæ littora, intricatae assinis, at testa glabra ex cinereo albida, ceterum flexuosa.

334. TEREDO. *Animal Terebella: valvis duabus calcareis hemisphæricis anteriorius excisis, & duabus lanceolatis.*

Testa teres flexuosa lignum penetrans.

- I. T. testa tenuissima cylindrica laevi.

Syst. nat. XII. 2. p. 1267. n. I. Teredo.

Vallifn. nat. 2. t. 4.

Rumpf mus. t. 41. f. F. G.

Sellius hist. natur. tered. 1733. Ultraj. 4. t. I.

Teredines intra vegetabilia habitantes, quæ destrunt, vitæ generæ, vidu, & habitatione, navalis certe, ipsa valværum vermi adhaerentium fabrica, proprius ad pholades accidunt, quam ad serpulas.

Planc. Conch. 17. n. 2.

Adans. Seneg. t. 19. f. 1.

β) *Slabber act. Vlissing.* I. p. 387. t. 2.

Habitat intra lignum navium & palorum marinorum, quod misere destruit, fertilissima, calamitas navium ex India in Europam allata, arsenico cum oleo cocto domanda & arcenda, testa mira, interdum parum flexuosa, apice & nunc magis nunc minus obtusa, 4-6, nonnunquam plures pollices longa.

Utriculus. 2. T. testa solida cylindrica undulata.

Kraemner. Conch. Rudolst. p. 7. t. 1.

Habitat intra lignum - - - testa alba subpellucida, valde flexuosa, torulosa, sensim attenuata, & circiter pollices longa: apertura ovali septo medio bipartita.

Clava. 3. T. testa altero fine clavata, altero incurva angustiori obtusa medio perforata.

Walch Naturf. 10. p. 38. t. 1. f. 9. 10.

Spengler Naturf. 13. p. 53. t. 1. f. 1-11. & t. 2. f. 12-14.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 574. t. 6. f. 20.

Habitat in Xylocarpi granati pericarpiis, testa exterius siccabra fuscescente, ad 2 usque pollices longa, vix dimidium ampla intus laxe, nunc magis nunc minus flexuosa.

335. SABELLA. *Animal Nereis, ore ringente, tentaculis duobus crassioribus pone caput.*

Testa tubulosa contexta ex arenulis confertim membranæ vaginali insertis.

Scruposa. 1. S. testa solitaria libera simplici curvata: granis lentiformibus nitidis.

Habitat in India, America australi insulisque obversis, testa subulata, apice tamen obtusa, pennæ cygneæ crassissime & ultra, arenæ granulis æqualibus albis.

Scabra. 2. S. testa solitaria basi fixa simplici curvata: granis radiato scabris.

Act. Petrop. 1766. p. 353. t. 9. f. 1. 2. *Dentalium arcuatum spongiosum, superficie tuberculis contiguis exasperata.*

Habitat in Oceano americano.

- alveolata.* 3. *S. testa composita concamerationibus numerosis poro communicantibus.*
Syst. nat. X. I. p. 790. Tubipora arenosa.
Ellis corall. 90. t. 36. Tubularia arenosa indica.
Habitat gregaria in Oceano britannico, ex arenulis nido communem sruens.
- Chrysodon.* 4. *S. testa subcylindrica testaceo-papyracea.*
Berg. act. Stockh. 1765. p. 228. t. 9. f. 1-3. Testudo Chrysodon.
Klein tub. t. I. f. 4.
Bast. op. subs. t. 9. f. 4.
Martin. Conch. I. t. 4. f. 29. 30.
Habitat in mari europæo, indico, ad Caput Bonæ Spei, testa pennæ anserinæ crassitie ad $\frac{1}{2}$ pedem longa, acuminata, ex macro incolæ compacta, sordide flava, dum humet, flexili, testaceorum ruderibus conspersa.
- belgica.* 5. *S. testa conica.*
Klein tub. t. I. f. 5.
echinod. t. 33. f. A. B.
Martin. Conch. I. t. 4. f. 27.
Habitat ad Belgii littora, testa vix ad 3 pollices usque longa.
- rectangu- la.* 6. *S. testa fusca annulis alternis albis nigrisque varia recta: sine rectangulo gibbosum.*
Gualt. test. t. 10. f. D.
Martin. Conch. I. t. 4. f. 31.
Habitat - - - testa 9 pollices longa, diametri vix $\frac{1}{2}$ pollicis.
- capensis.* 7. *S. testa cylindrico conica utrinque aperta membranacea, aspera transversim interruptim striata.*
Müller Linn. Naturf. 6. t. 19. f. 6. 7.
Habitat ad promontorium Bonæ Spei.
- nigra.* 8. *S. testa cylindrica nigra extrinsecus læviuscula: granis arenæ subtilissimis.*
Schroet. Flusconch. t. 11. min. D. f. I.
Habitat in Thuringiæ rivulo prope Thangelstedt, testa $\frac{1}{2}$ pollicem longa, diametri $\frac{1}{2}$ lineæ.

Sabellæ genus ambiguum, inter Spiones, Amphitritas, Terebellas, Brachiones Serpulas, Teredines quasi medium; quæ præterea in aquis dulcibus repertæ huc referuntur testæ, infectorum potius, potissimum larvarum phryganearum opera confitulæ, quam vermium nativa esse habitacula videntur.

- stagnalis.* 9. *S. testa recta utrinque aperta terete sensim attenuata lœvi : apertura marginata, arenæ granis subtilissimi.*
Schroet. Fusconch. t. II. min. C. f. 13. & t. II. min. D. f. 9.
Habitat in Thuringiæ fluvio Sala prope Kahla, nunc solitaria testa nigra, nunc gregatim ranunculo aquatico adhaerens testa cinerea, hac semper ultra $\frac{1}{4}$ pollicis longa.
- conica.* 10. *S. testa angusta conica lœvi recta cinerea apice nigricante apeito; granis subtilissimis.*
Schroet. Fusconch. t. II. min. C. f. 14.
Habitat prope Jenam, testa vix $\frac{1}{2}$ pollicem longa, apertura non marginata.
- uncinata.* 11. *S. testa lœvi terete sensim attenuata apice aperto aduncum.*
Schroet. Fusconch. t. II. min. D. f. 8.
Habitat solitaria in rivulo Thuringiæ prope Thangelsiedt, testa ad $\frac{3}{4}$ pollicis usque longa ex arena subtilissima strudla, nunc cinerea, nunc nigra, nunc supra cinerea, infra nigra.
- fabulosa.* 12. *S. testa cylindrica apice clausa subclavata pertusa: granis arenæ majoribus.*
Schroet. Fusconch. p. 416. n. 7. t. II. min. D. f. 4.
Habitat in Thuringia & Belgio, testa vix pollicem longa, diametri fere $\frac{1}{4}$ pollicis, nunc recta, nunc medio subinflexa, nunc cinerea, nunc nigra, nunc supra cinerea infra nigra.
- vegetabilis.* 13. *S. testa depressa ex surculis, caulis, corticibus, & tellinis cornicis compacta.*
Schroet. Fusconch. t. II. min. C. f. 9.
Habitat in Thuringiæ aquis, testa pollicem longa.
- ammoniaca.* 14. *S. testa polygono-cylindrica intus lœvi ex cornubus ammonis structa.*
Schroet. Fusconch. t. II. min. C. f. 10.
Habitat in rivis Cellensisibus.
- helicina.* 15. *S. testa intus lœvi tereti ex testis helicis pusillæ structa'*
Schroet. Fusconch. t. II. min. C. f. 11.
Habitat frequens in Thuringiæ aquis stagnantibus prope Thangelsiedt, testa vix pollicem longa, rarius longiore, diametri paulo ultra $\frac{1}{4}$ pollicis.
- dimidiata.* 16. *S. testæ altera parte ex arena fabulosa, altera crassiore clavata ex testaceorum rudimentis compacta.*

Sohroet. Fusconch. t. II. min. D. f. 3.

Habitat frequens in Thuringiae aquis prope Thangelstedt.

17. S. testa ex lapillis majoribus minoribusque conflata apicem versus attenuata.

Schroet. Fusconch. t. II. min. C. f. 12.

Habitat prope Vinarium & Thangelstedt Thuringiae, saxis subequalicis affixa, gregaria, latere, quo affigitur, aperto, tepta ad pollicem usque longa.

18. S. testa e lapillis conflata : fine aperto clavato e lapillis majoribus compacto.

Schroet. Fusconch. t. II. min. D. f. 2.

Habitat solitaria in Thuringia, prope Vinarium.

- corticalis. 19. S. testa ex corticum fragmentis, ad finem ex caulis confata.

Schroet. Fusconch. t. II. min. D. f. 5.

Habitat frequens in rivulo Thuringiae prope Thangelstedt, varietate innumera.

- arundinacea. 20. S. testa subconica utrinque aperta ex fragmentis corticalis arundinis sibi impositis structa.

Schroet. Fusconch. t. II. min. D. f. 6.

Habitat prope Vinarium, testa vix ultra pollicem longa.

- coleata. 21. S. testa teretiuscula ex culmis caulinisque prominulis confata.

Schroet. Fusconch. t. II. min. D. f. 7.

Habitat frequens prope Thangelstedt in Thuringia, testa vix ultra pollicem longa, nunc magis conica, nunc magis cylindrica.

- marpupia- lis. 22. S. testa nigra ; fine aperto cylindrico angustiori, altera parte turgida ovata.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 591. t. 6. f. 21.

Habitat in mari, -- testa ultra 2 pollices longa, ex arena nigra composita, intus lœvi.

- Norwegi- ca. 23. S. testa teretiuscula utrinque aperta fragili membranacea exterius granulis arenæ minutissimis confata.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 591. n. 20.

Habitat in Norwegia, testa ultra 4 pollices longa, penæ corynæ crenulæ.

lumbrica- 24. *S. testa rudi repente fragili utrinque aperta, incole
lis, ore non tentaculato, corpore aculeato articulato.* O.
Fabr. Fn. groent. p. 369.

*Habitat gregaria in mariis Groenlandiam alluentis pro
fundo, lapidibus præsertim in fissuris adhærens, tefts
grisea ex arenulis membranæ convexiusculæ agglutinatis
conflata, intus lubrica nitida; incola verme rufo albo
annulato, subius pallidiore, præter articulos 2 termina-
les inermes, 21 aliis, singulis in dorso diacanthis conf-
tante.*

indica. 25. *S. testa cylindrica ex capillaribus subcylindricis quarti
crystallis coagmentatis conflata.* *Abildg. Schr. berli-
Naturf. 9. p. 144. t. 4.*
Habitat in mari indicō.

IV. ZOOPHYTA.

Animalia composita, animalium more efflorescentia.

336. TUBIPORA. *Animal Nereis?*

Corallium tubis cylindricis ca-
vis erectis parallelis ag-
gregatis.

I. T. tubis fasciculatis combinatis : dissepimentis transversis membranaceis distantibus.

Hort. Cliff. 481. *Tubipora membranis transversis tubos perpendiculares connectens.*

Pallas zooph. 199. *Tubipora purpurea.*

Imper. nat. 821. *Tubularia purpurea.*

Aldrov. mus. 291. *Pseudo-Corallium rubrum.*

F. Bauh. hist. 3 p. 808. f. 2. *Alcyonium fistulosum rubrum.*

Bonann. mus. Kirch. t. 289. f. 14. *Tubularia purpurea.*

Beßl. mus. Lochn. t. 23. *Alcyonium maris rubri*

Welsch hecast. t. 44. *Tubularia coralloides.*

Moris. hist. 3. f. 15. t. 10. f. 22. *Alcyonium fistulosum rubrum.*

Petiv. gaz. t. 67. f. 10. II. *Tubularia purpurea vulgaris.*

Tournef. inst. t. 342. *Tubularia purpurea.*

Valent. ind. litt. t. 8. f. 5. *Tubularia coralloides.*

Büttn. corall. p. 18. t. 1. f. 3. *Tubularia coralloides.*

Mercat. metalloth. arm. 6. c. 9. p. 107. *Alcyonium petrosum.*

Shaw afr. app. p. 48. n. 37. *Madrepora tubis eleganter coagmentatis ruberriina.*

Rumpf amb. 6. c. 236. t. 85. f. 2. *Alcyonium rubrum indicum.*

Seb. mus. 3. t. 110. f. 89.

Argenv. Conch. t. 26. f. A.

Fdiw. av. t. 93.

Martin. Conch. I. p. 21. vign. 2.

Knorr delic. t. A. f. 3.

B) *Pallas zooph. ed. belg.* t. 10. f. 2. *Tubipora flexuosa.*
Habitat in mari americano, indico, rubro, aliis coral-

liis rupibusve affixa, purpurea, ab Indis contra stran-

guriam & vulnera a venenatis animalibus inflicta adhibita.

2. T. tubis parallelis connatis in laminam contortu plicato-

anastomozata.

Amoen. acad. t. p. 103. t. 4. f. 20. *Millepora tubis ovatis longitudinaliter reticulatum concatenatis.*

Bromel lithogr. sp. 2. t. 23-27. *Tubularia gothlandica*
Helv. lithogr. t. 5. f. 1-6. & t. 6. f. 1. *Lapis albidus catenua corallina.*

Büttn. corallogr. t. 1. f. 2. *Corallium catenulatum.*

Volkam. siles. subt. t. 58. f. 7. & t. 20. f. 3.

Habitat - - - *frequens ad littora maris Baltici projecta, constans membrana erecta nullis septulis distincta, varie contortuplicata, conjuncta in madros margine fastigiata pororum serie simplici, catena more digestorum, tubuli enim plurimi paralleli, squarles, si formes lateribus oppositis connexi, conficerunt parietes.*

serpens. 3. *T. tubulis cylindricis erectis brevissimis distantibus axillaribus: basi repente dichotoma divaricata.* *O. Fabr. Fn. groenl.* 428.

Amoen. acad. t. p. 105. t. 4. f. 26. *Millepora dichotoma repens teres: poris axillaribus solitariis eminentibus.*
Mus. Teylin. t. 3. f. 3. *Millepora repens teres, poris solitariis eminentibus.*

Pallas clenchi. zooph. p. 343. n. 152. *Millepora liliacea.*
Ellis corall. p. 74. n. 6. t. 27. f. e E.

Mass. hist. mar. p. 153. t. 134. f. 168.

Planck. Conch. t. 18. f. n N.

Habitat in mari mediterraneo, & Oceano septentrionali, ad littora maris Baltici sepe rejecta, alba, rarius rubens, prostrata, laciniosa, lacinis linearibus supra quasi lamellatis cristis transversis duplice ordine, tubulis erectis quasi pedinatis; an hujus generis?

fascicularis. 4. *T. tubis filiformibus fasciculatis: lateribus paucim anastomosantibus.* *O. Fabr. Fn. groenl.* 429.

Habitat - - - *passim ad Gotlandiae littora obvia, in montibus quoque calcareis fossiliis, pennae pectinatae crassitie, alba minus recta, anastomosibus transversis angustioribus tubos ipsos connecentibus.*

ramosa. 5. *T. interstitiis subrotundis distincta, tubulis ramorum confluentium simplicibus flexuosis aggregatis conglutinatis.* *Koelreuter act. Petrop.* 7. p. 374. t. 16. f. 3.

Lithophyta animalcula materia m corallinam deponere & pro cellulis uti, & materiali animalcula scilicet incumbentia sibi continuo subternendo materiam lapidem elevarum & habitaculum suum augere recte statuit Peyronel.
Habitat

*Habitat in mari albo, acaulis, basi angustiore, rimis unde-
que diffusis, fragilissima, exalbida, intus candida;
testaceis fucove adhaerentibus saepe ornata.*

- Pinnata. 6. *T. dichotoma erecta, tubulis pinnulatum digestis.*
Pallas el. zooph. p. 247. n. 151. Millepora pinnata.
*Mars. hist. mar. p. 152. & 153. t. 34. f. 107. n. 1. 3. 4.
& 2. 3. 5. & f. 168. n. 1-3. Madreporae musciformes;*
*Habitat in mari mediterraneo, cineraceens aut virideceens,
pollicem circiter alta, fragilis, fili grossioris crassius;
quasi bipedinata, ramis aequalibus, patulis.*
- Penicil-
lata. 7. *T. caulescens, cacumine incrassato ex tubulis basin versus
connexis formato. O. Fabr. Fn. groenl. p. 429. n. 430.*
*Habitat in mari Groenlandiam alluente, testaceis affixa, 3
lineas longa, $1\frac{1}{2}$ lata, alba, erecta, fasciculari affinis.*
- Flabellata-
ris. 8. *T. depressa flabelliformis adnata tubulis parallelis connatis
radiata. O. Fabr. Fn. groenl. p. 430. n. 431.*
*Habitat frequens in mari Groenlandiam alluente, ulvae
maximae folio ad paginam inferiorem adnata, cineras-
cens, $1\frac{1}{2}$ lineam lata, subitus levigata, radiatim striata,
circuli segmentum referens.*
- Flabellata.
Strues. 9. *T. tubis discretis tabulato-combinatis: tabulatis plurimis
remotis horizontaliter tubulosis superficie striato-radiatis.
Modeer n. ad. Stockh. 1788. 3. n. 10. t. 7. f. 1.
Habitat - - - haecenus modo inter fossilia reperta.*
10. *T. tubis distantibus divergentibus liberis posterius saepius
flexis: tubulis minoribus simplicibus horizontalibus com-
binatis. Ad. Modeer n. ad. Stockh. 1783 4. n. 1.
Helwing. lithogr. p. 52. t. 5. f. 7.
Buttner corallogr. p. 22. t. 2. f. 9. Corallium fil-
tulosum ac luridum.
Habitat - - - haecenus modo inter fossilia reperta.*

337. MADREPORA. *Animal* Medusa. *Ellis corall.*
t. 32. Donat. mar. t. 6. f. F.
Corallium cavitatibus lamello-
so-stellatis.

* Simplices stella unica.

verruca- 1. M. stella orbiculari planiuscula sessili : disco cylindris foli-
 ria. culofo, limbo radiato. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 430. n.*

432. Forsk. ic. rer. nat. t. 26. dD.

Pallas el. zooph. p. 280. n. 164. Madrepora simplex
sessilis subundulata marginataque, disco poris inæqua-
libus pectinatis radiato.

Soland. & Ellis corall. p. 137. n. 13. Millepora limbo
concavo tenui explanato substriato, disco convexo tu-
bulis confertis radiato.

Ginann. adr. 10. t. 4. f. 10. Fungus marinus.
Habitat in mari rubro, mediterraneo & septentrionali,
algis marinis & zoophytis mollioribus adhaerens, inter
madreporas, tubiporas & milleporas quasi media, pijs
dimidiati magnitudine, alba vel flavicans, disci subis
aggregatis, instar disci florum compositorum, limbo ex-
planato striato, radium horum florum mentiente.

turbinata. 2. M. turbinata lævis, stella hemisphærico concava. *Anæn.*
acad. I. p. 87. t. 4. f. 1-4. 7.

Pallas el. zooph. p. 305. n. 176. β. Madrepora (trochis-
formis) simplex turbinata acaulis striata, stellæ lanellis
integris.

Bromel. lithogr. p. 32. 33. 36. 38. 40. Lang lap. figur.
p. 52. t. 12. Fungites major orbicularis gothlandicus.
Helw. lithogr. t. 5. f. 9-11. 13. 15. 17. Wolff-hoff.
t. 10. f. 3. 4. Columellus turbinatus.

Habitat - - - haærenus modo fossilis inventa, copiofiss-
sime in Gothlandia & Campania gallica.

Porpita. 3. M. acaulis, stella convexa : centro depresso orbiculari,
 subtus plana marginata lævi.

Anæn. acad. I. p. 91. n. 2. t. 4. f. 5. Madrepora
simplex orbiculata plana, stella convexa.

Calceol. mus. p. 218. Lapillus numismalis.

Scheuchz. lithogr. helv. f. 43. 44. Lens lapidea striata
utrinque convexa.

Buttin. corall. p. 24. t. 3. f. 5. Fungi marini capitulum.

Lhwyd lith. p. 151. *Porpita minor numularis.*

Brom. lith. sp. 2. p. 33. f. a-h.

Habitat in mari indico & rubro, frequens inter Europæ petrefacta, semini's lupini magnitudine, an mera fungitæ detriti varietas?

Fungites. 4. *M. acaulis orbiculata*, stella convexa : lamellis simplicibus longitudinalibus, subtus concava. *Forsk.* *Fn. aeg. arab.* p. 134. n. 10. *ic. rer. nat.* t. 42.

Hort. Cliff. 481. *Madrepóra simplex acaulis orbiculata convexa* : lamellis denticulatis.

Pall. el. zooph. p. 281. n. 165. *Madrepóra simplex acaulis* ; stella convexa lameillosa, lamellis iuxequalibus crevatis.

Soland. & Ellis corall. p. 149. n. 2. t. 28. f. 5. 6. *Madrepóra simplex acaulis convexa*, lamellis latere subalperis indivisis : alternis minoribus subincompletis.

Refl. mus. Lochn. t. 26. f. 3.

Clus. exot. l. 6. p. 125. t. 10. f. 1. *Fungus lapideus major.*

Valent. ind. litt. p. 568. t. 9. f. 2. *Fungus lapidofus.*

J. Bruh. hist. 3. p. 801. f. 1. 2. *Fungus lapideus.*

Bonann. mus. Kircher. p. 289. n. 17. *Fungus petrificatus.*

Olear. mus. p. 63. n. 21 t. 34. f. 2. *Fungites quarinus.*

Boerh. ind. hort. lugdb. 1. p. 2. *Fungus coralioide.* piz leatus lamellatus.

Shaw afr. app. p. 47. n. 6. *Fungus coralloides lamellatus maris rubri.*

Rumpf amb. 6. p. 247. 249. t. 88. f. 1. 4. *Fungus saxeus.*

Seb. mus. 3. t. 110. f. 6. b. t. 111. f. 1. 2. & t. 112 f. 28 zo.

Knorr delis. t. A. III. n. 4.

β) *Pall. is elench. zooph.* p. 284. n. 165. β. *Mad. pora echinata.*

Habitat in mari rubro & indico, ut plurimun liberæ, centro concava, subtus scabra; lamellis acutis inaequalibus basi verius per isthmos connexis.

Patella. 5. *M. acaulis*, lamellis latere muricatis sabrichotomis : teriiis indivisis majoribus. *Soland. & Ellis corall.* p. 148. n. 1. t. 28. f. 1-4.

Habitat in mari mediterraneo, $\frac{1}{4}$ pollicis crassa, diametri $\frac{1}{2}$ pollicis, junior plane, adutior convexa, lamellis omnibus margine denticulatis.

Cyathus. 6. *M. clavato-turbinata* basi attenuata : stella obconica ; centro prominulo exeso duplicato. *Soland. & Ellis corall.* p. 150. n. 3. t. 28. f. 7.

Marf. hist. mar. t. 28. f. 128. n. 11.

VERMES ZOOPHYTA. Madreporea:

Planc. conch. ad 2. p. 128. tab. app. 18. f. M.
Habitat frequens in mari mediterraneo, ad Galliae & Italiae
littora, ifidi nobili ut plurimum affixa, alba, durissima,
2 pollices longa, lamellis majoribus circiter 40.

** Compositæ stellis pluribus.

† Concatenatæ, stellis disjunctis : lamellis continuis,

Pileus. 7. *M. acaulis oblonga*, stella convexa conglomerato-lamellosa : lamellis abbreviatis subtus concava.

Pallas el. zooph. p. 285. n. 166. Madrepora concatenata
acaulis gibba, stellis subpinnatis confertis concatenatis,
lamellis inæqualibus.

Tournef. act. paris. 1700. p. 30. Mitra Neptuni.

Rumpf amb. 6. p. 248. t. 88. f. 2. 3. Mitra polonica.

Seb. mus. 3. t. III. f. 3. 5. Pileus Neptuni.

Soland. & Ellis corall. p. 159. t. 45.

β) *Rumpf amb. 6. p. 248. Limax saxeae.*

Seb. mus. 3. t. III. f. 6. & t. 112. f. 31. Talpa marina.
Habitat in Oceano indico, disco composito e stellulis exca-
vatis : radiis palmatis centrum & anibutini respicientibus,
alternis humilioribus depresso-rubris, & altioribus ; mar-
gine bifurcata crenata, centro oblonge sulcata.

cristata. 8. *M. foliaceo-cristata* : stellis serialibus centro impresis,
 ambulacris explanatis planiusculis. *Soland. & Ellis*
corall. p. 158. n. 27. t. 31. f. 3. 4.

Pallas el. zooph. p. 288. n. 167. β.

Habitat in Oceano australi & indico.

Lactuca. 9. *M. sessilis*, stellis magnis confertis frondescentibus : fron-
 dibus laciniosis crispatis. *Pall. el. zooph. p. 289. n.*
168. Soland. & Ellis corall. p. 158. n. 28. t. 44.
Seb. mus. 3. t. 89. f. 10. Concha fangiformis.
Habitat rara in Oceano americano ?

ficoides. 10. *M. foliaceo-cristata*, stellis sparsis : ambulacris laterali-
 bus planiusculis ; marginalibus acute crenatis, lamellis
 foliaceis. *Soland. & Ellis corall. p. 159. n. 29.*
Habitat in Oceano australi.

acerosa. 11. *M. foliaceo-cristata*, stellis sparsis : ambulacris latera-
 lis planis ; terminalibus subcarinatis, lamellis acerosis.
Soland. & Ellis corall. p. 159. n. 30.
Habitat - - -

Lichen. 12. M. foliaceo-cristata, stellis serialibus obconicis rotundatis, ambulacris carinato-foliaceis acutissimis subflexuosis obliquatis. Solander & Ellis corall. p. 160. n. 33.
Habitat in Oceano australi.

Agarici-
tes. 13. M. acaulis sulcata : sulcis carinatis, stellis concatenatis. Pall. el. zooph. p. 287. n. 167. Madrepora concatenata crustacea polymorpha transversim sulcata, stellis per fulcos crebris concatenatis.

Soland. & Ellis corall. p. 159. n. 32. Madrepora foliaceo-cristata concatenata, stellis flexuoso subserialibus obconicis subangulatis, ambulacris acute carinatis rectiusculis hinc coalescentibus.

Seb. mus. 3. t. 110. f. 6. CC.

Argenv. oryct. p. 367. t. 22. f. 7.

Knorr del. 1. p. 25. t. A. X. f. 1.

Habitat in mari insulas Americæ obversas interfluente ; cinerea, diametri ad 5-6 pollices asequentis, lamellis variis divergentibus semiorbiculatis constans, sulcis plurimi repandis exarata, in quorum fundo stellæ.

Elephan-
totus. 14. M. subturbanata, intus lamellis granulosis parallelis stellisque lacero-prominulis sparsis. Pallas el. zooph. p. 290. n. 168. β.

Habitat in Oceano indico, inter M. laetucam & agaricicamen quasi media laminam tenuem sessilem undulato cristam mentiens ; stellis fere in quincunce positis.

crustacea. 15. M. crustacea, superficie plana stellata : radiis crassis dentatis concatenatisque. Pallas el. zooph. p. 291. n. 170.

Habitat in mari americano, rarioris texturæ, obverse concavæ, stellis minus ordinata in quincunces dispositis.

incruf-
tans. 16. M. inæqualis, stellis prominentibus conico truncatis cavis apice distantibus intus lamellatis. Forsk. Fn. ægypt. arab. p. 135. n. 16.

Habitat in mari rubro, stellis diametro baseos pismum, supra lentem æquantibus, un distincta species ?

exefa. 17. M. crustacea, stellis anfractuosis interstitiis conicis. Pallas el. zooph. p. 290. n. 169. Soland. & Ellis corall. p. 101. n. 38. t. 49. f. 3.

Habitat in Oceano indico & australi, mytilo margaritifero superinducta, alba, verrucis conicis vertice lœvigatis, certum lamellis scabris inæqualibus undique porcatis aspera.

Filogra- 114. *M. acaulis simplex*, stella tenuissima repando labyrinthina-
formi : futura acuta, areolis planis perforatis. *Esper Pflanzenh.* 3. p. 139. n. 20. t. 23. f. 1. 2.
Gault. ind. test. t. 97.
Habitat in mari indicō.

natans. 115. *M. simplex acaulis*, stella repando-labyrinthiformi,
pulvillis latissimis, futura obtusa, corallio poroso la-
viori. *Esper Pflanzenh.* 3. p. 140. n. 21. t. 23.
Seb. mus. 3. p. 201. t. 99. f. 9. 10.
Habitat in mari Indianam & Americam alluente.

Antho- 116. *M. simplex caulescens*, caule ovato stella terminali-
phyllum. hemisphaerica concava : fundo lamellis crassioribus ta-
diatis. *Esper Pflanzenh.* 3. p. 143. n. 22. t. 24. f. 15.
Battarra hist. recr. nat. I. p. 176. t. 44. f. 6.
Habitat in mari mediterraneo.

† Conglomeratae, stellis conjunctis.

labyrin- 118. *M. acaulis*, stella repando-labyrinthiformi : futura obtusa.
thica. *Hort. Cliff.* 481. *Madrepora composita* labyrinthiformis
hemisphaerica, lamellis duplicato ordine integris obtusis,
sinibus æqualibus.
Pallas el. zooph. p. 292. n. 171. *Madrepora (mæandri-*
tes) conglomerata sessilis, stellis anfractuosis, lamellis
denticulatis.
Soland. & Ellis corall. p. 160. n. 34. t. 46. f. 3. 4. *Madre-*
pora conglomerata, anfractibus basi dilatatis longis, dis-
sepimentis excelsis æqualibus latis, ambulacris simplicibus.
Boet. gemm. l. 2. c. 146. f. B. Sloane cat. p. 2. *hist. I. p.*
54. n. 7. *Lapidis astroitidis* sive *stellaris tertium genus*.
Best. mus. t. 26. f. 1. 2. *Mutilla corallina alba* porosa,
maris fluctus egregie representans.
Valen. ind. litt. p. 509. n. 2. t. 9. f. 1. *Batu-purudan,*
flutus lapidei.
Poccon. epist. 17. tab. p. 142. *Astroites undulatus major*
& *Fungus maritimus* coralloides undulatus.
Petiv. gaz. t. 68. n. 11. *Corallium cerebri* facie.
Boerk. in l. hort. Lugdb. p. 1. *Shaw afr. app.* p. 47. n.
8. *Fungus coralloides encephaloides*, gyris in medio
fulcatis, lamellis ferratis.
Mercat. metall. arm. 6. t. 16. p. 124. *Lapis corallites*,
Gault. test. t. 10. 29. b. 97. b. *Mæandrites*.
Brown jam. p. 392. *Mycedium*. 1-3.

Olear. mus. Gott. t. 34. f. I. 3.

Seb. mus. 3. t. III. f. 7. 8. & t. 112. f. I. 4-7.

Knorr delic. t. A. IV. n. I.

Habitat in mari Iudiam, & australem Americam alluente, formæ quam maxime variabilis, & diametri aliquot pedes nonnunquam æquantis, in insulis Caribæis calci urendæ adhibita.

Sinuosa. 19. M. anfractibus patulis flexuosis brevibus, dissepimentis inæqualibus exēsis, ambulacris subduplicatis, lamellis denticulatis.

Soland. & Ellis corall. p. 160. n. 35.

Habitat in Oceano, Americam australem alluente.

Mæandri-tes. 20. M. acaulis, stella repando-labyrinthiformi, satura acuta. Pallas el. zooph. p. 297. n. 172. Madrepora (labyrinthica) conglomerata sessilis, stellis anfractuosis, lamellis crassiusculis integris.

Soland. & Ellis corall. p. 161. n. 37. t. 48. f. I. Madrepora conglomerata, dissepimentis simplicibus sub-solutis, lamellis incrassatis æqualibus remotis iatus attenuatis subintegris.

Grahl. test. t. 51. b. Mæandrites costis planis amplioribus, acutis & rarioribus lamellis.

Hill plant. 2. Mycedium convexum, gyris fulcatis.

Seb. mus. 3. t. 109. f. 9. 10. t. 112. f. 2. 3. 4?

Knorr delic. t. A. III. f. 2.

Habitat in mari Americanus australis alluente, & mediterraneo, anfractibus amplioribus & laxioribus, quam in labyrinthiformi, solidior & sere lapidea, stellarum centris ipsis radiatim lamellatis.

Areola. 21. M. acaulis, ambulacris pinnatisidis, pulvillis angustis truncatis.

Pallas el. zooph. p. 295. n. 171. β. Madrepora simplex sub-pedunculata, stella crispato laciniosa lamellis crenulatis.

Soland. & Ellis corall. p. 161. n. 36. t. 47. f. 4. 5. Madrepora (areolata) conglomerata, anfractibus dilatatis, dissepimentis exēsis subinæqualibus, ambulacris duplicatis hinc dilatatis, lamellis denticulato crenulatis.

Clus. ex. l. 6. c. 10. p. 125. Best. mus. Lochn. p. 87. t. 28. Fungus lapideus minor.

Petiv. pterigr. t. 20. f. 16. Corallium album fungoides ovale.

Slovane catal. p. 2. jam. I. p. 56. n. 10. II. t. 18. f. 3. Fungus lapideus undulatus.

Shaw afr. app. p. 47. n. 7. Fungus coralloides rosaceus maris rubri.

*Rumpf amb. 6. p. 244. t. 87. f. 1. Lang. lap. fig. 9.
52. t. 12. f. 4. Ephem. Nat. Curios. Dec. II. A. 3.
obs. 24. p. 78. t. 2. Amaranthus saxeus.*

Valent. ind. 3. t. 52. f. CC. Amaranthus marinus,

Molin. Cabin. p. 220. t. 45. n. 7. Morille.

Argenv. oryct. t. 22. n. 4. Cariophilloides.

Hill plant. p. 3. Mycedium cavatum undulatum.

Knorr delic. t. A. XI. f. 1. 2. Cerebrates.

Kundni. rar. p. 153. t. 9. f. 7.

J. Bauh. hisp. 3. p. 801. f. 3.

Seb. mus. 3. t. 108. f. 3. 5. & t. 112. f. 23-27.

Turgot. mem. instr. t. 22. f. C.

*Habitat in mari, Americam australem & Indiam alluentibus
mæandritæ (subitus tamen levibus), proprius adhuc labyrinthi-
thiformi affinis, calyce, quam utcunque refert, in lac-
nias crispato, exterius porcis crenato-muricatis crebro,
intus cavo lanuelloso, centro inter lamellas demerso pin-
nato.*

abdicta. 22. M. subconglomerata, anfractibus stelliformibus angulatis
obconicis, ambulacris simplicibus : lamellis angustis cre-
nulato-denticulatis. *Soland. & Ellis corall. p. 162. n.
39. t. 50. f. 2.*

Habitat - - - an forsitan mera favosæ varietas?

phrygia. 23. M. anfractibus longissimis angustis, ambulacris perpendicularibus
simplicibus, dissepimentis simplicibus lamello-
sis lobulatis, lamellis remotiusculis. *Soland. & Ellis
corall. p. 162. n. 40. t. 48. f. 2.*

*Habitat in Oceano australi, ambulacris nunc reditis, nunc
flexuosis.*

repanda. 24. M. ambulacris incrassatis, dissepimentis simplicibus sub-
solutis, lamellis numerosis : plurimis intus incrassatis.
Soland. & Ellis corall. p. 162. n. 41.

Habitat - - -

ambigua. 25. M. anfractibus stelliformibus flexuosisque, ambulacris in-
crassatis, dissepimentis simplicibus crassiusculis, lamel-
lis distantibus. *Soland. & Ellis corall. p. 162. n. 42.*

Habitat - - -

dædilea. 26. M. anfractibus profundis brevibus, dissepimentis subexclusis
laceris, lamellis ferrato-dentatis, ambulacris perpendiculari-
laribus. *Soland. & Ellis corall. p. 163. n. 43. t. 46. f. 1.*

Habitat in Oceano indicō.

27. M. cellulosa, ambulacris duplicatis foliaceis, dissepimentis simplicibus, lamellis foliaceis æqualibus. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 163. t. 51.
Seb. mus. 3. t. 109. f. 9. 10.
Habitat --- congeneribus magis lævis, cellulis numerosis cavernosa.
28. M. anfractibus basi angustatis, dissepimentis subexesis æqualibus, ambulacris simplicibus crassiunculis, lamellis alternis abbreviatis. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 163. n. 45.
Habitat in mari, Americam australem alluente, rotunda-
 tp, nodulosa.
29. M. anfractibus basi subrotundatis tortuosis longissimis,
 dissepimentis exesis æqualibus, ambulacris simplicibus
 angustis. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 163. n. 46.
Habitat --- rotundata æqualis.
30. M. anfractibus basi dilatatis lævibus, dissepimentis exesi-
 subæqualibus angustis, ambulacris simplicibus. *Soland.* & *Ellis* p. 164. n. 47.
Habitat ---
31. M. anfractibus rotundatis subperpendicularibus, dissepimentis exesis æqualibus latis, ambulacris duplicatis
 latis. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 164. n. 48.
Habitat ---
32. M. anfractu spirali, stella simplici aut dupli : centro
 punctato, radiis serrulatis. *Spengler nov. act. soc. dan.*
Hafn. I. p. 240. c. ic.
Habitat ad Tranquebariæ littora, inter testacea & zoophyta, quasi media, an hujus generis & familiæ?
- +++ Aggregatae, indivisae, stellis distinctis, am-
 bulacris porositis, tuberculosis.
33. M. stellis angulosis concavis coadunatis. *Amœn. acad.*
 I. p. 96. t. 4. f. XVI.
Pall. el. zooph. p. 319. n. 187. Madrepora (favites)
 corporibus brevibus coadunatis stellis angulosis cavis
 intus lamellosis.
Soland. & *Ellis corall.* p. 167. n. 61. t. 50. f. 1. Madre-
 pora aggregata conglomerata, anfractibus substelliformi-
 bus angulatis patulis, parietibus simplicibus, lamel-
 lis dentatis margine connatis elevatis.

Bocc. mus. I. t. 5. f. 3. Astroites.

Forsk. Fn. ægypt. arab. p. 132. n. 2. 3.

Gualt. test. t. 19. n. 23.

Seb. mus. 3. t. 112. f. 8. 10. 21. c.

Knorr delic. I. t. A. IV. f. 2.

Habitat in Oceano indico, alba, ad latera striata, ^{tremp} verisim diffœcta rete grossum monstrans punctis pertusum, maculasque, alias extimum pollicem latitudine aquantes, alias piso minores radiatas.

cavata. 34. *M. subconglomerata, anfractibus stelliformibus angulatis, parietibus simplicibus angustis, lamellis denticulatis.* Soland. & Ellis corall. p. 167. n. 62.
Habitat - - - an mera favosæ varietas?

bulliens. 35. *M. stellis distantibus teretibus oblongisye inæqualibus margine elevatis, interstitiis radiato-rugulosis ^{concav} viosculis.* Soland. & Ellis corall. p. 167. n. 63.
Habitat - - -

Ananas. 36. *M. stellis angulosis convexis disco concavis.* *Anan-*
acad. I. p. 92. t. 4. f. VIII. 2. IX.
Pallas el. zooph. p. 321. n. 189. Madrepora aggregata, corporibus obverse conicis coadunatis, stellis scabris convexis centro cavis.
Soland. & Ellis corall. p. 168. n. 64. t. 47. f. 6. Madrepora aggregata, stellis subangulatis inæqualibus multi-radiatis: marginibus convexis lamellosis, lamellis decorticulato-crenatis, interstitiis concavis.
Helw. lithogr. t. 5. f. 22. Corallium album superne figura asteriformibus propemodum oblitteratis.

Bocc. mus. t. 9. f. 7.

Brom. lith. spec. 2. n. 20.

Seb. mus. 3. t. 109. f. 11.

Wolf. Hass. t. 10. f. 3. 4.

Volkm. Sil. I. t. 18. f. 5. & t. 19. f. 3. a. b.

Knorr delic. I. t. A. VI. f. 1.

Schroet. Einl. in Verst. 3. t. 7. f. 3? & t. 9. f. 4.

Habitat in mari mediterraneo, & Americam australalem at-
luente, frequens fossilis, gibba, ramulis obovatis ^{stell} gibba radiata: disco demerso striato terminatis, ad laters futuræ ope connexis composita, transverse diffœcta, rete album, maculis sexangularibus annulum album includen-
tibus, inter rete & annulum striatis varium referens.

37. M. stellis subconfertis obconicis rotundis subangulatisque : parietibus crassis porosis , centris planiusculis convexisque. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 168. n. 65.

Habitat - - -

38. M. stellis confertis rotundis subangulatisque : parietibus crassis convexiusculis , lamellis alternis margine subconnatis, centris simplicibus. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 168. n. 66. t. 49. f. 1.

Habitat - - -

39. M. stellis subconfertis impressis : parietibus crassis planiusculis subdistinctis, lamellis tenuissimis, centris subhexesis. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 168. n. 67. t. 47. f. 7.

Habitat - - - lamellis quaternis ad centrum extensis , tribus intermediis prope basin conniventibus.

40. M. stellis subteretibus : marginibus acutis elevatis , interstitiis concavis leviusculis hinc cavernosiusculis. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 169. n. 68. t. 53. f. 7. 8.

Habitat - - -

41. M. subaggregata , stellis cylindraceo papillofis : marginibus incrassatis rotundatis obliquis. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 169. n. 70.

Habitat - - - muricatae aefinis , & forte primordium , papillis tamen contiguis & simplici cardine dispositis.

42. M. stellis cylindraceis margine elevatis , interstitiis latis concavis sulcato - radiatis. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 169. n. 71. t. 47. f. 8.

Pallas el. zooph. p. 321. n. 188. β.

Habitat - - -

43. M. stellis subteretibus multiradiatis margine elevatis ; interstitiis radiato-sulcatis subcoarctatis inæqualibus. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 170. n. 72.

Sloan. jam. I. t. 21. f. 4.

Habitat in mari Americam australem alluente.

44. M. stellis minutis confertis : immixtis majoribus perforatis fundo concavo-cylindrico. *Aman. acad.* 4. p. 258. t. 3. f. 15.

Habitat in mari indicó , mytili margaritiferi testam interdum obducens , crustam niveam , & policuni crassitie , re-

VERMES ZOOPHYTA. Madreporæ.

ferens, stellis plurimis minutis obtusiusculis 12 radiis, paucioribus digitis minimi crassitie, gibbosioribus, cavitate infra has stellas inani.

arenosa. 45. M. stellis contiguis planiusculis subarenaceis.
Habitat in mari Algiriam alluente, alba, stellis majoribus ochraceis, interdum parum elevatis & verrucosis.
 Brandre.

interstincta. 46. M. stellis immersis teretibus distantibus : interstitio punctato. Müll. zool. dan. prodr. 3037.
Soland. & Ellis corall. p. 167. n. 60. t. 56. Madrepora stellis cylindraceis profundis distinctis, interstitiis porosiss., corallio subexplanato duplicato.
Pallas el. zooph. p. 256. n. 158. Millepora cærulea.
Petiv. gaz. t. 10. f. 12. Coralloides philippensis cærulea.
Habitat in mari indico, Americam australi, Norvegianam alluente, extrinsecus cinerascens, intus obsolete cinerea,

spongiosa. 47. M. foliacea subexplanata, ambulacris confragosis supra obtusatis, subtus planis, stellis infundibuliformibus profundis inæqualibus. Soland. & Ellis corall. p. 164. n. 49.
Habitat - - -

foliosa. 48. M. foliacea subexplanata, ambulacris superne confragosis verruculosis infeine planiusculis, stellis æqualibus parvis. Soland. & Ellis corall. p. 164. n. 50. t. 52.
Pallas el. zooph. p. 333. n. 196. Madrepora polymorpha laciniosa, laminis laceris scaberrimis, poris utrinque sparsis minutis.
Rumpf mus. 6. t. 87. f. 2.
Gualt. teſt. t. 42. f. b.
Seb. mus. 3. t. 150. f. 7.
Turgot mem. instr. t. 22. A.
Mus. Besler. t. 27.
Baier mon. rer. petr. t. 2. f. 3. 4.
Habitat in Oceano indico, rarior, rosam explanatum interdum referens.

poculata. 49. M. stellis obconicis : marginibus acutis hinc inde remotis, interstitiis lævibus ; lamellis undique granulatis.
Soland. & Ellis corall. p. 165. n. 51.
Pallas el. zooph. p. 319. n. 186. β.
Ellis corall. t. 32. f. A. 1. A. 3.
Habitat rarissima - - - ex griseo alba,

50. M. cylindris stellarum teretibus distantibus æqualibus
marginē elevatis, interstitiis planiusculis scabriusculis.
Soland. & Ellis corall. p. 165. t. 53. f. 3. 4.

Habitat - - -

51. M. stellis confertissimis immersis disco concavo - cylindrico.

*Pallas el. zooph. p. 322. n. 190. Madrepora (radians)
aggregata folida, stellis confertis convexiusculis, centri
poro radiante, striis scabriusculis.*

*Soland. & Ellis corall. p. 165. n. 53. Madrepora stellis
confertis impressis, interstitiis porosis, lamellis acerosis
scabriusculis.*

Brown jam. p. 392. Astrea aperturis cavernarum minimis, massa inæquali.

Seb. mus. 3. t. 112. f. 12. 14.

Knorr delic. I. t. A. X. f. 4.

Myl. fax. subterr. 2. t. 2. f. 1.

Herm. marlogr. I. II. f. 32.

Kundm. rar. nat. t. 10. f. 9-17.

Argenv. oryctol. t. 23. f. 4. 10. 19.

*Habitat in mari, Americano australē alluente, frequens:
satis inter fossilia massis ingentibus saepe obvia, alba,
solida extrinsecus pallide grisea.*

52. M. solida exterius scabra, stellis sparsis convexis medio
impressis.

Pallas el. zooph. p. 323. n. 191.

*Habitat rario in Oceano Indico, rupibus superinducta, te-
nerrimis punctis scabra, extrinsecus ex griseo cinerascens.*

53. M. stellis confertis obconicis, interstitiis lamellisque
acerosis scabriusculis, corallio subnodoso. *Soland. &
Ellis corall. p. 165. n. 54.*

Seb. mus. 3. t. 112. f. 18.

Habitat in - - -

54. M. stellis confertis annularibus prominulis crenatis.

*Habitat - - - hemisphaerica, stellis parvis, elevatis, fun-
do profundioribus.*

55. M. stellis immersis hypocateriformibus: limbo striato,
interstitiis sutura elevata.

*Pallas el. zooph. p. 320. n. 188. Madrepora (astroites)
aggregata, cylindris coadunatis, stellis cavis lameillo-
s ambitu radiatis.*

Soland. & Ellis corall. p. 169. n. 69. t. 53. f. 1. 2. Ma-
drepore (annularis) stellis teretibus æqualibus marginé
elevatis, interstitiis plano-concavis radiatis.

Seb. mus. 3. t. 112. f. 15. 19. 22.

Bocc. mus. t. IX. 5. f. 4.

Kundm. rar. nat. t. 10. f. 6.

Knorr delic. I. t. A. IV. f. 3.

Volkm. Siles. subt. I. t. 18. f. 1.

Bourg. petrif. t. 4. f. 26. & t. 7. f. 36.

Argenv. oryct. t. 23. f. 9. 16.

Knorr Petref. 2. t. F. V. n. 2. & t. F. VI. f. 3.

*Habitat in mari Americam australem alluente & mediter-
 raneo, futuris rete pentagonum, stellis elevatius, al-
 latera striatuni referentibus, an forte varietas minor ra-
 diata?*

punctata. 56. M. punctis stellaribus confertis conflatis e punctis denisi-
Habitat in Oceano europæo, & mari mediterraneo rosyndar-
ta, alba, friabilis, punctis stellaribus parvis inæqualibus,

carycula- 57. M. cylindris coadunatis, stellis excavatis, centro prominulo.
Spallanz. ad. societ. ital. 2.

Pallas el. zooph. p. 318. n. 186. Madrepora cylindrica
obconicis coadunatis, stellis crateriformibus lamellosis,
centro exeso prominulo.

*Brown. jam. p. 392. n. 2. Astrea aperturis cavernarum
 radiatis, centro spongioso.*

Cavolin. pol. rar. I. t. 3. f. 1-5. & 3. p. 248.
B) Cavolin. pol. mar. I. p. 57. t. 3. f. 6-8. Madrepora denu-
data.

*Habitat in mari mediterraneo, subrotunda fusca, cylindrica
 lateralibus saepe diginatis, exterius transversim rugosiss.,*
incola adinia, non medusa, segnis, magna.

truncata. 58. M. articulis turbinatis proliferis radio pluribus marginé
 coadunatis, stellis truncatis: disco concavo-cylindrico,
Amen. acad. I. p. 93. t. 4. f. X. 3.

Volkm. Siles. subt. I. p. 121. t. 19. f. I. a. b.
*Knorr Petref. 2. 2. t. I**. f. 2. & t. G. I*. f. 2. & 3**
suppl. t. VI. b. f. 3.

*Habitat --- hædenus modo inter fossilia reperta, parum
 rugosa, articulis longitudine & latitudine æqualibus
 summo margine coalescentibus.*

stellaris. 59. M. articulis proliferis centralibus solitariis, stellis mar-
 gine dilatato coadunatis.
Amen. acad. I. p. 94. t. 4. f. XI. 4.

Habitat — — — *haecenus modo fossilis inventa*, *frequens ad Gothlandiæ littora*, *caulibus simplicibus parallelis*, *erectis*, *digiti crassitie*, *palmariibus*, & *longioribus*, *cortice obsolete striato*, *articulis cyathiformibus*, *pollicem longis*.

Organum. 60. *M. coralliis cylindricis lœvibus distantibus combinatis: membranis deflexis.*

Ancen. acad. I. p. 96. t. 4. f. VI. I.

Forsk. Fn. ægypt. ar. p. 134. n. II.

Habitat in mari rubro, *frequentius fossilis*, *potissimum ad littora maris Balthici*, *caulibus parallelis crassitie culmine secalini*, *diaphragmatibus stellarum striis radiatis*, *interdum deficientibus*.

Divergens. 61. *M. subglobosa*, *cylindris divergentibus duplo diametri ultra superficiem exstantibus*. *Forsk. Fn. ægypt. arab. p. 136. n. 19.*

Habitat — — — *haecenus modo inter fossilia obvia*, *nunc mera organi varietas?*

musicalis. 62. *M. corallis cylindricis striatis distantibus combinatis membranis confertissimis transversis.*

Pallas el. zooph. p. 317. n. 185. Madrepura (Organum) aggregata, *cylindris simplicibus angulosis*, *stellis crusta terminali connexis prominulis.*

Soland. & Ellis corall. p. 165. n. 55. Madrepora aggregata, *cylindris stellarum striatis distantibus combinatis membranis transversis.*

Ellis act. angl. 53. p. 432. t. 20. f. 14.

Borlaß. Cornub. p. 241. t. 27. f. 7.

Habitat in Oceano Indico, *ad Hiberniæ littora aliquando rejecta*, *lædea*, *massa sâpe ingenti.*

denticulata. 63. *M. stellis inæqualibus*: *lamellis margine elevatis*; *majoriibus basi processu acutis*, *interstitiis sulco exaratis.*

Soland. & Ellis corall. p. 166. n. 56. t. 49. f. 1.

Habitat — — —

faveolata. 64. *M. stellis subangulatis multiradiatis*: *parietibus hinc inde subduplicatis.* *Soland. & Ellis corall. p. 166. n. 57. t. 53. f. 5. 6.*

Habitat — — —

- Retepora. 65. M. stellis angulatis, lamellis filamentosis, parietibus reticularis denticulatis. Soland. & Ellis corall. p. 166. n. 58. t. 54. f. 3-5.
Habitat - - -
- rotulosa. 66. M. stellis cylindraceis pauciradiatis, lamellis marginem erectis acutis, basi spinula erecta acutis. cincta land. & Ellis corall. p. 166. n. 59. t. 55.
Habitat - - -
- cespitoso. 67. M. coralliis teretibus subramosis striatis approximatis, stellis turbinato concavis, reticulatis.
Pallas el. zooph. p. 315. n. 184. Madrepora (flexuosa) aggregata, cylindris subramosis linearibus striatis apice truncatis stellatisque.
Imper. hist. nat. 818. Porus matronalis.
*Aldrov. mus. metall. p. 292. Pseudocorallium album fun-
gosum.*
Worm. mus. p. 235. Millepora Imperati.
Mercat. metall. p. 134. Juncus lapidens.
Gault. test. t. 61. Acropora cespitosa albida ramosa.
*Habitat in mari mediterraneo, alba, lapidea, maxima
sæpe molis, frequens satis inter fossilia.*
- flexuosa. 68. M. coralliis cylindricis scabris flexuosis approximatis, stellis convexis striatis.
Amoen. acad. 1. p. 96. t. 4. f. XXIII. 5.
Habitat - - - ad maris Baltici littora rejecta, an forsan mera cespitosæ varietas?
- fascicu-
laris. 69. M. coralliis rectis cylindricis glabris divergentibus.
*Pallas el. zooph. p. 313. n. 183. Madrepora (cariophyl-
lites) aggregata, stellis distinctis cylindraceis turbinatis lameololis.*
Imperat. hist. nat. 817. Millepora.
J. Bauh. hist. 3. p. 795. Corallio affinis Madrepora.
Rumpf mus. 6. p. 245. t. 87. f. 3. Cariophyllum saxeum.
Gault. test. t. 106. f. G. Balanorum cylindraceorum glomus.
Shaw afr. app. p. 48. n. 17. Fungus tubulatus & stellatus.
Seb. mus. 3. t. 108. n. 9. Madrepora tubulosa, Acropora aliis.
Bonann. mus. Kircher. t. 5. f. 1.
Boccon. mus. t. 9. n. 5. f. 1.
Knorr delic. t. A. IV. n. 4.
Argenv. oryctol. t. 22. f. 6.
Bourg. petr. t. 4. f. 25. 6. t. 10. f. 47.
Volkm. fil. subt. t. 17. f. 4.

Herm. marlogr. t. 12. f. 10.

Habitat in Oceano indico, alba, lapidea, solida, inæqualis, frequens inter fossilia europæa.

Pectinata. 70. *M. stellis orbiculatis: margine tumido dilatato radiato, interstitiis punctatis.*

Volkm. siles. subt. I. p. 121. t. 19. f. 2.

Knorr Petref. suppl. t. VI. g. f. 2.

Guett. mem. 2. p. 425. & 3. p. 509. t. 51. f. 2. Heliolitha.

Walch Naturf. 5. p. 45. n. 5.

Habitat - - - haecenus modo inter fossilia, in Silesia, episcopatu Basileensis, & prope Vesuntium reperta, stellis planis: lamellis circiter 30 inæqualibus denticulatis.

totularis. 71. *M. polymorpha, stellis solitariis orbiculatis planis æqualiter radiatis: margine lœvi piano vix prominulo.*

Forsk. Fr. aeg. amb. p. 135. n. 15. Madrepora Serailia.

Guett. mem. 2. p. 421. & 3. p. 502. t. 47. f. 7.

Knorr Petref. II. 2. t. F. V. f. 1.

Walch. Naturf. 5. p. 47. n. 6.

Habitat in mari rubro, aliis interdum marinis adnata, alba, solida, nunc subglobosa, nunc explanata, stellarum diametro lineam circiter æquante.

tubularis. 72. *M. tubis cylindricis integerrimis prominulis in stellam inæqualiter radiatam expansis.*

Walch Naturf. 5. p. 48. n. 7.

Habitat. - - - haecenus modo inter fossilia occurringens-tubis crassitate pennæ corvinæ, stellis lamellis 6 crassioribus, interficetis intersingulas 3 minoribus.

*mammil-
laris.* 73. *M. stellis orbiculatis prominulis verruciformibus acuto excavatis.*

Guett. mem. 3. p. 514. t. 54. f. 3.

Walch. Naturf. 5. p. 50.

Schroet. Eint. in Verst. 3. t. 6. f. 3.

Habitat - - - haecenus tantum fossilis prope Tréjëtum ad Mosellam & Vesuntium inventa, sellarum limbo nullo.

Patelloides. 74. *M. glabra, stellis magnis multiradiatis elatiusculis: centro exili.*

Guett. mem. 3. p. 506. t. 48. f. 2-4.

Büttner. corall. subt. p. 24. t. 3. f. 2.

Knorr. Petref. II. 2. t. F. VI. f. 4.

Habitat - - - haecenus modo inter fossilia obvix stellarum radiis crassis, æqualibus, saepe ultra 35.

Kkk kkk kkk kk

globularis. 75. M. stellis magnis rotundatis æqualiter radiatis : centro
amplo pertuso.

Kundm. rar. nat. t. 10. f. 7.

Walch Naturf. 5. p. 51.

Habitat - - -

Filum. 76. M. stellis rotundis magnis subconfertis explanatis : centro
minimo vix excavato.

Scheuchz. lithogr. helv. p. 36. t. n. 49. Astroites majoribus
stellis.

Walch Naturf. 5. p. 54.

Habitat - - - prope Basileam inter fossilia reperta,
stellarum diametro 3-4 linearum.

perforata. 77. M. stellis confertis exilibus excavatis : lamellis per-
foratis.

Walch Naturf. 5. p. 54-58.

Habitat - - - interdum hemisphærica diametro pe-
dali, superficie inæquali, stellarum radiis 12, an for-
san varietas poritæ?

vermicu- 78. M. stellarum radiis inæquilibus undulatis explanatis,
laris. Lang. tap. fig. Helv. p. 60. t. 20.

Bourg. petref. t. 3; f. 19.

Volkm. filef. subt. p. 119. t. 18. f. 4. & ? 5.

Walch Naturf. 5. p. 58.

Habitat - - - haecenüs modo inter fossilia occurrentes,
stellarum diametro 5-6 lineis æquali, radiis principi-
bus 8, nonnullis bifurcatis, centro exili.

arachnoi- 79. M. stellis confertis exilibus explanatis : radiis subun-
des. dulatis brevibus æqualibus.

Plot. nat. hist. Oxf. t. 2. f. 7.

Hill. hist. of. foss. t. 7.

Guett. mem. 2. p. 435. & 3. p. 508. t. 49. f. 2.

Walch Naturf. 5. p. 59.

Scheuchz. lithogr. helv. f. 54.

Volkm. filef. subt. p. 120. t. 18. f. 11.

Schroet. Einl. in Verf. 3. p. 461. t. 9. f. 3.

Habitat - - - haecenüs modo inter fossilia reperta,
hemisphærica, stellarum radiis 12 sese contingentibus,

undulata. 80. M. stellis magnis elevatis : radiis elongatis arcuatis.

Bourg. petrif. 3. f. 23.

Guett. mem. 2. p. 441. 3. 491. t. 40. f. 1.

Walch Naturf. 5. p. 60.

Knorr Petref. II. 2. t. F. VI. f. 1.

Habitat - - - *hacdenus modo inter fossilia reperta, stellarum diametro, 5-6 lineas aequante, radiis ad 24.*

81. M. stellis undique contiguis : marginibus coadunatis membranaceis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p. 131.*

Habitat in mari rubro, *insignes scopulos sola constituens, dura, ad aedes struendas calcemque urendam adhibita, stellis concavis, seminis sinapi magnitudine, margine tenuissimo fragili, lamellis nunc radiatis, nunc marginem modo occupantibus, centro orbiculato, verrucarum serie aspero.*

Monile. 82. M. stellis infundibuliformibus disco vacuis lamellis & parietibus obtectis, lamellis aequalibus radiantibus denticulatis in alteram stellam continuatis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p. 133. n. 6.*

Habitat - - - *hacdenus modo fossilis prope Djiddam Arabiæ reperta, M. Ananas proxime affinis, stellis pist magnitudine, centro semine sinapi minore.*

dædalica. 83. M. stellis subhexagonis : parietibus unitis reticulatis interne & marginedentatis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p. 133. n. 7.*

Habitat in mari rubro, *stellis magnitudine lenticis, niveis, tenuissimis, intus dentatis.*

monos- 84. M. parietibus inter stellas antiquas in linguas lanceolatas
niata. scabras elatis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p. 133. n. 8.*

Habitat in mari rubro, *spongiosa, tenax, nivea, stellarum diametro linguis duplo minori.*

Contigua- 85. M. planiuscula orbiculata, stellis ad ambitum linearibus
tio. versus centrum spectantibus, mediis ovalis divaricatis subcontiguis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p. 134. n. 9.*
Habitat in mari rubro, *diametri interdum pedalis, an distincta hujus familiæ species?*

Rius. 86. M. inaequalis spongiosa-papillosa, stellis superficialibus
planiusculis distantibus. *Forsk. Fn. aeg. arab. p. 135. n. 14.*

Habitat in mari rubro, *stellis subobsoletis, seminis sinapi magnitudine.*

cristata. 87. M. corallis ventricoso-conicis levibus apicem versus
scabris, stellis angulato-rotundatis labyrinthiformibus
lamellis alternatim brevioribus seriatim instructis. *Esper.
Pflanzenth. 3. p. 150. n. 24. t. 26.*

Habitat ad Sinæ littora.

cuspidata. 118. M. coralliis conicis sulcatis; stellis turbinatis: lamellis rectis elongatis acutis. Esper Pflanzenh. 3. p. 145 n. 26. t. 28.

Habitat ad Sinæ littora.

††† *Ramosæ, stellis distinctis, ambulacris tuberculosis porulosæ.*

pores. 87. M. subramosa composita scabra, poris substellatis confertis. Pallas el. zooph. p. 324. n. 192. Madrepora polymorpha subramosa convexa, stellulis minutis impressis punctato-scabris.

Imper. hist. nat. 802. t. 814. Corallium stellatum. J. Bauh. hist. 3. p. 805. Corallium stellatum minus album. C. Bauh. pin. p. 366. Corallium album stellatum majus. Moris. hist. plant. 3. t. 10. n. 12. Porus albus pumilus ramosior creberrime stellatus. Petiv. pterogr. t. 20. f. 15. Corallium porosum typhoides stellatum.

Turnef. inst. p. 573. Madrepora alba stellata major. Gualt. test. t. 20. Madrepora alba brassicam floridam referens.

Soland. & Ellis corall. p. 172. n. 77. t. 47. f. 1. Madrepora ramulosa, ramis clavato-complanatis, stellis contiguis (lamellarum loco) cuspidato-tuberculatis.

Sloan. jcm. p. 53. t. 18. f. 4.

Brown jam. p. 391. n. 3. 4.

Mus. Gottiv. p. 61. t. 47. f. 3.

Boccon. mus. t. 9. f. 1. 4.

Knorr delic. t. A. I. f. 3.

Habitat in Oceano indico, & Americam australem alluente, albissima, extrinsecus saepe grisea vel sordida, ramis patulis subdichotomis vel alternis, obtusissimis, punctatis prominentibus exasperata.

digitata. 88. M. ramis clavato-complanatis, stellis sparsis sexradiatis: margine superiore porrecto fornicate. Soland. & Ellis corall. p. 173. n. 74.

Pallas el. zooph. p. 326. n. 193. Madrepora ramosa scabra, ramis subclavato-compressis, stellis creberrimis prominulis deorsum spectantibus.

Rumpf amb. 6. p. 240. n. 3. Lithodendrum digitatum: Seb. mus. 3. t. 109. f. II.

Habitat in Oceano indico; ad varietatem ramosam poritæ accedens, & media inter hanc & muricatam, alba, extrinsecus ex griseo flavescens.

- damicor- 89. M. ramosissima, ramis attenuatis subdivisis, stellis
nis. passim crebris cæcis ciliatis. Soland. & Ellis corall. p.
170. n. 73.
- Pallas el. zooph. p. 334 n. 197. Madrepora polymorpho
ramosissima, ramis subdivisis attenuatis, poris crebris
cæcis crenatique.
- Imper. nat. hist.* 626. Species corallii.
- Moris. hist. plant.* 3. t. 10. f. 11. Porus s. corallium af-
troites humilius, ramis alias latis & compressis; alias
incertæ figuræ.
- Mercat. metalloth.* 6. c. 16. p. 124. Truncus corallites.
- Shaw afr. app.* p. 48. n. 33. 34. t. n. 33. Madrepora-
-stroites ceratiformis.
- Gualt. test.* t. 104. b. Madrepora candida ramosa, damæ
cornua referens, foraminibus rotundis in superficie in-
signita.
- Rumpf amb.* 6. p. 240. t. 86. f. 3. Lithodendrum littoreum.
- Knorr delic. nat. t.* A. I. f. 4.
- Habitat in Oceano africano & indico, verrucarum defedū
a verrucosa discernenda.*
- verticosa. 90. M. ramosissima, ramis obtusatis; ramulis numerosissimis
simplicioribus verrucæformibus, stellis sparsis crebris
ciliatis. Soland. & Ellis corall. p. 172. n. 78.
- Syst. nat. XII. 2. p. 1279. n. 32.* & *O. Fabr. Fn. groenl.*
p. 31. n. 433. Madrepora (damicornis) ramosa compo-
sita verrucosa poris sparsis confertis immersis margine
solo crenatis.
- Syst. nat. X. p. 791. n. 9.* Millepora damicornis.
- J. Bauh. hist. 3. p. 805.* Corallium candidius verrucosum
punctatum.
- C. Bauh. pin. p. 366.* Corallium album verrucosum
punctatum.
- Tournef. inf. p. 373.* Madrepora verrucosa punctata.
- Weinm. phytanth. 2. p. 426. f. 2.* Coralloides fistulosa.
Habitat in Oceano, africano & indico.
- muricata. 91. M. composita subimbricata, stellis oblique truncatis,
prominentibus adscendentibus.
- Hort. Clifffort. 481.* Millepora ramosissima, punctis subtus
semiovatis prominulis, ramis acutis.
- Mus. Tessin. 118.* Madrepora spinosa.
- Syst. nat. X. p. 792. n. 14.* Millepora muricata.
- Pallas el. zooph. p. 327. n. 294. Madrepora polymorpho-
ramosa, stellis creberrimis cylindraceis prominulis.
- Soland. & Ellis corall. p. 171. n. 76. t. 57.* Madrepora-

ramulosa, ramulis attenuatis, stellis prominentibus cylindraceis oblique truncatis.

Theophr. hist. pl. I. 4. c. 8. *Thymum lapideum.*

Aldrov. mus. met. p. 278. *Soccus concretus ex aquis sil- lantibus.*

Clus. exot. l. 6. c. 7. p. 123. *Planta saxeae abrotanoides,*

Worm mus. p. 233. *Corallium tuberosum punctatum,*

Bell. mus. t. 26. f. 4. *Truncus lapidosus.*

mus. Lochn. t. 23. *Planta saxeae alba.*

J. Bauh. hist. pl. 3. p. 807. *Abrotanoides saxeae planta,*

Moris. hist. pl. 3. p. 656. f. 15. t. 10. n. 3. & 9. *Porus*

albus erectior :amosus, tuberculis crebris surfsum spec- tantibus, & poros albus cupressiformis.

Funk. pilgr. l. 3. c. I. f. 5. p. 135. & l. 4. c. 6. f. 2. p.

448. 449. *Corallium album.*

Petiv. pterigr. t. 18. f. 7. & 18. *Corallium porosum mu-*

ricatum, & Corallium porosum typhoides muriacatum.

Tournef. inst. p. 573. *Madrepora abrotanoides, & Ma-*

dreporella erectior ramosa, tuberculis crebris surfsum

spectantibus.

Shaw. afr. app. p. 48. n. 25-28. *Madrepora abrotanoides.*

Valent. ind. 4. t. 52. f. 1D. *Arbuscula marina coral-*

loides alba.

Rumpf amb. 6. p. 239. t. 86. f. 1. *Lithodendrum calcareum,*

Brown jam. p. 391. n. 5. *Madrepora ramosa major murica-*

ta & stellata, aperturis cavernarum minoribus depressis,

Eph. Nat. Cur. Dec. II. A. III. p. 78. t. 3. f. 1. *Carana,*

Lang. lap. fig. Helv. p. 57. t. 17. n. 1. 2. *Corallium ma-*

rinum squamenum.

Weinm. phytantheq. 2. p. 234. t. 426. f. 9. *Coralloides*

gypsea lapidosa:

Hill plant. p. 8. *Madrepora ramosissima poris minimis,*

Forsk. Fn. æg. arab. p. 137. n. 24. *Millepora muricata.*

Gualt. test. t. ante 20. *Madrepora albida digitata.*

Bonann. mus. Kirch. p. 265. ic. p. 285. n. 8. .

Sloan. cat. p. 2. hist. I. p. 53. n. 4. t. 17. f. 4.

Seb. mus. 3. t. 116. f. 5.

Knorr delic. t. A. II. f. 1. 2.

Valent. mus. I. p. 104. t. 8. f. 8. 13.

Mus. Gottwald. t. 48. f. 2. 3.

α) ramis longis acuminatis, absque ulla ramulis parvis.

Sloan. jam. I. p. 51. t. 18. f. 3. *Corallium album por-*

osum maximum muricatum.

Seb. mus. 3. t. 1-4. f. 1. "

- β) ramis divaricatis : ramulis sparsis brevibus acuminatis divergentibus.
- γ) ramis ramulisque adscendentibus rectis subæqualibus cespitosis.
- δ) ramis inferioribus decumbentibus anastomosantibus : ramulis adscendentibus acutis brevibus.
- Mus. Teylin. p. 118. n. 1. Madrepora corymbosa.*
Brown jam. p. 391. n. 6. Madrepora maxima compressa palmata &c muricata.
Mars. hist. mar. p. 154. t. 34. n. 169. f. 1. 2. & t. 35. n. 170. Madrepora conica, Abrotanoides Trionfatti.
Rumpf amb. 6. p. 240. t. 86. f. 2. Lithodendrum calcareum sessile.
Moris. hist. pl. 3. p. 657. f. 15. t. 10. f. 10. Tournef. inst. p. 373. Porus albidus compressus frondiporæ ad instar cribriformis.
Shaw afr. app. p. 48. n. 30. Madrepora abrotanoides ramosior tuberculis horizontaliter dispositis.
Klein dub. p. 18. t. II. f. 1. Madrepora alba.
Kundm. rar. p. 159. t. 9. f. 10. 11. Saxum abrotanoides Clusii.
Calceol. mus. p. 12.
Mus. Moscard. l. 3. c. 2.
- ε) ramis basi in palmam coalitis ; ramulis divergentibus.
- Sloan. jam. cat. p. 2. hist. 1. p. 58. n. 5. t. 17. f. 3. Corallium porosum album latissimum.*
Davil. catal. system. p. 18. n. 44-46. Cornes de Daim, & Charde Neptune.
Martin. n. Mennigf. 4. p. 10. t. 1. f. 1.
- ζ) ramis ramulisque numerosis divergentibus ; cylindris stellatum turbinatis margine incrassatis rotundatis.
- Seb. mus. 3. t. 108. f. 6.*
Habitat in mari Indian & australi American alluente, ut plurimum alba, γ) rufescens.
- Fastigiata. 92. M. rudis subdichotoma fastigiata, stellis exterius decoratis.*
- Pallas el. zooph. p. 301. n. 175. Madrepora dichotoma fastigiata, stellis terminalibus subturbinatis : lamellis integerimis.*
- Seb. mus. 3. t. 109. f. 1. t. 110. f. 3. & t. 116. f. 4.*
Habitat in mari, American australi altuente, alba, in fruticulos saxe pedales excrescens.
- ramea. 93. M. pinnata undulato striata, stellis terminalibus. En. suec. 2216. Müll. zool. dan. prodr. 3042.*

- Pallas el zooph.* p. 302. n. 176. *Madrepura ramoso-sab-*
pinnata ferruginea, stellis terminalibus cylindraceis.
Tournef. inst. p. 573. t. 340. *Madrepura maxima arborca-*
Worm. mus. p. 233. *Madrepura ramosa Imperati.*
Donat. adriat. p. 53. t. 6. & act. angl. 47. p. 105. t. 4
Madrepura, *Porus matronalis*.
Ginann. adr. I. p. 8. t. II. f. 5. *Madrepura ramosa*.
Lobel hist. p. 651. *Coralloides f. Corallii albi varietas*.
Imperat. hist. nat. p. 651. *Porus matronalis ramosus*.
Besl. mus. t. 25. *Corallium maximum truncatum*.
J. Bauh. hist. pl. 3. p. 807. & *Shaw efr. app.* p. 48. n.
 36. t. 36. *Porus magnus*.
C. Bauh. pin. p. 367. & *Moris. hist. pl.* 3. p. 656. s. 15.
 t. 10. f. 1. *Corallio affinis Porus magnus*.
Petiv. gazoph. t. 75. n. 7. *Corallium slavecens striatum nodosum*.
Rumpf amb. 6. p. 245. t. 87. f. 4. *Anthophyllum saxeum*.
Torrub. hist. nat. hisp. t. 10. f. 13. *Acropora alba*.
Planck. Conch. m. not. t. 18, *Fungites sive Caryophyllum marinus*.
D'Aubent. ic. misc. t. 47. *Porus magnus*.
Bozann. mus. Kirch. t. 285. f. 6.
Knorr del. I. t. A. VII. f. 2.
Habitat in mari atlantico, mediterraneo, norwegico,
ferruginea, saxeae, fruticulis ad summum sesquipedalibus.

- oculata.* 94. M. tubulosa glabra flexuosa oblique substriata, ramis
 alternis, stellis inimis bifariis.
Pallas el. zooph. p. 308. n. 179. *Madrepura ramosissima*
coalescens laevis, ramiulis flexuosis, stellis ad flexuras
 ramorum concavis margine striatis.
Hill plant. p. 6. *Madrepura glabra poris magnis*.
Imper. hist. nat. 315. *Corallium album fistulosum*.
Bester. mus. t. 25. *Corallium album indicum*.
Kalent. mus. I. p. 104. t. 8. *Corallium album pelagicum*.
J. Bauh. hist. pl. 3. p. 805. *Corallium album oculatum*,
officinarum.
Weinm. phytantheroz. 2. p. 233. t. 426. a. *Corallium album*.
Rumpf amb. 6. p. 233. *Accabarium album verrucosum*.
Eph. nat. Cur. Dec. II. A. 3. obs. 42. p. 78. t. 3.
Seb. mus. 3. t. 116. n. 12.
Mus. Gottwald. t. 48. f. 4. & t. 49. f. 1.
Turgot. mem. instr. t. 22. E.
Knorr delic. t. A. I. n. 2.

Blackwell. herb. ed. germ. t. 342.

Habitat in Oceano indicō, intus perforata, alba, corallium album officinarum, inter fossilia europea quoque obvium.

95. M. subdichotoma recta solida, stellis alternis, eminentibus.

Müll. zool. dan. prodr. 3041.

Hort. Cliff. p. 481. Madrepora simplex ramosa, ramis teretibus lăvibus solidiusculis, lamellis integris.

Tournef. inst. p. 573. Madrepora vulgaris.

Gualt. test. p. 24. n. 3. (ante t. I.) Acropora alba formabimibus stellatis amplioribus.

Gesn. lap. fig. p. 132. b. n. 2. Corallium verrucosum.

Imper. hist. nat. p. 809. Corallium album.

Boccon. mus. p. 256. t. 9. n. 5. f. 6. Corallium fistulosum Imperati.

Petiv. gaz. t. 76. n. 8. Corallium album majus radiatum & stellatum.

Mars. hist. mar. p. 139. t. 30. n. 140.

Argenv. oryctol. p. 324. t. 15.

Pontopp. Norw. I. p. 282. t. 14. f. G.

*Stroem. fundm. I. p. 144. ♂.
act. Nidros. 4. p. 49. t. 8. f. 2-4.*

Martin. n. Manni f 3. p. 419. f. 1. 2.

Habitat in mari mediterraneo, americano, norwegico, luccea, digii minimi crassitie, spithamea, diffusa.

96. M. ramosissima rosea; ramis attenuatis, stellis minutis passim congestis efflorescentibus. Pallas el. zooph. p. 312. n. 181.

Habitat in mari insulam S. Dominici alluente, solida, interdum flavescentis, fruticulis semipalmariis, an distinctas a virginēa?

97. M. stellis undique alternis prominentibus: lamellis exsertis acutis. Pallas el. zooph. p. 313. n. 182.

Habitat rara in Oceano indicō, alba, virginēa cōfinis, magis tamen cavernosa.

98. M. ramis subcomplanatis, stellis sparsis sexradiatis margine æqualibus. Soland. & Ellis corall. p. 172. n. 79.

Habitat - - - interstītiis scabris, lineis subreticulatis exaratis.

99. M. ramis coacervatis crassis fastigiatis obtusis, ambulacris reticulato-confragosis. Soland. & Ellis corall. p. 172. n. 80.

Habitat - - -

granosa. 100. M. subramulosa cristata subdigitata, ramis obtusis, ambulacris omnibus acute carinatis undulatis, stellis acerosis irregularibus. Soland. & Ellis corall. p. 173 n. 81.

Habitat - - -

prolifera. 101. M. subdichotoma reticulato-coalescens, stellis latere proliferis terminalibus concavis. Müll. zool. dan. prodri. 3040.

Pallas el. zooph. p. 307. n. 178. Madrepora ramosissima coalescens, stellis turbinatis margine proliferis axillaribus terminalibusve.

Bst. mus. Lochn. t. 25. Corallium immaturum cincteum colore.

Weinm. phytanthon. 2. p. 234. t. 426. f. 1. Corailoides lapidosa porosa.

Seb. mus. 3. t. 116. f. 3.

Mus. Gotwald. t. 47. f. 7.

Edw. av. t. 94.

Pontopp. norw. I. p. 282. n. 3. t. 14. f. A.

Stroem Sundm. I. p. 144. C.

Að. nidros. 4. p. 34. t. 2. f. 1. 2.

Habitat in mari norwegico, alba, solidissima, stellis insundibuliformibus; lamellis circiter octonis.

Seriata. 102. M. tereti-subulata, poris stellaribus longitudinaliter seriatis. Pallas el. zooph. p. 336. n. 198.

Syst. nat. XII. 2. p. 1283. n. 46. Millepora (lineata) caulescens dichotoma teres, poris multiplicatis seriatis.

Soland. & Ellis corall. p. 171. n. 75. t. 31. f. 1. 2. Madrepora ramulosa, ramis attenuatis acuminatis, stellis longitudinaliter seriatis: margine superiore porrecto formicato ciliato.

Pallas el. zooph. p. 41. n. 8. β? Eschara areolata.

Marf. hist. mar. I. 32. f. 152.

Habitat in Oceano orientali, alba, saxeæ, calamis, rarius digitæ crassiæ, diffusa subpedalis.

Cætus. 103. M. ramis compressis divergentibus intricatis dichotomis margine carinatis: lateribus contigue stellatis. Forsk. Fn. æg. arab. p. 134. n. 13.

Habitat - - - haçenus modo sussilis inventa, pedatis ramis eretiusculis transversim seriatis.

corymbosæ. 104. M. corymbi ramis apice crassioribus striato aculeatis, stellis terminalibus solitariis repando-lobatis. Forsk. Fn. æg. arab. p. 137. n. 20.

Habitat - - - ramis digitii crassitie, stellis pollicem amplis.

gemmas- 105. M. stellis prominulis obconicis.

cens. Müll. Linn. syst. 6. p. 107. t. 23. f. 7.

Habitat in Oceano indico, nivea, stellis gemmas referentibus.

Problema- tica. 106. M. stellis obliquis minutis immersis distantibus : margine lato punctato.

Knorr delic. 1. t. A. X. f. 3.

Mus. Gottw. t. 49. f. 5.

Habitat circa insulas Antillas, saxeae, scabra, thalassina, brachii interdum crassitie, & ad 5 pedes alta, stellarum interstitiis lineatis.

107. M. subramosa subdichotoma, tubis cylindricis trabeculis inordinatum dispositis repletis.

Pallas el. zooph. ed. germ. p. 145. n. 35. kk.

Habitat - - - ochroleuca, an hujus generis?

108. M. turbinata infundibuliformis subprolifera.

Pallas el. zooph. p. 332. n. 195. Madrepora (Crater) infundibuliformis striata, intus sparsa stellis prominulis antiquatis.

Hort. Clifft. p. 480. Madrepora cyathiformis turbinata interius prolifera.

Syst. nat. X. p. 789. Tubipora infundibuliformis.

Gualt. test. t. 42. Choana saxeae crispatula rugosa, minimis poris.

Tournef. inst. p. 376. Eschara magna pulla piliformis.

Habitat in Oceano indico, muricatae affinis, alba, solida, holcium senio infundibuliformem referens; an hujus familie?

angulosa. 109. M. dichotoma fastigiata, stellis terminalibus turbinato-angulosis : lamellis dentatis. *Pallas el. zooph. p. 299. n. 174.*

Seb. mus. 3. t. 109. f. 2. 3.

Knorr. del. 1. t. A. IV. f. 5.

Habitat in mari, Americani medium alluente, brevis, crassa, cellulosa, laevis, alba.

cooides. 110. M. disciformis subpedunculata scabriuscula : stellis marginalibus fasciculatis. *Pallas el. zooph. p. 306. n. 177.*

Habitat rarissima in Oceano indico; an hujus familia?

Chaloidi- III. M. stellarum tubis prominentibus rematis cylindricis cum. exterius & interius lamellatis. *Forsk. Fn. æg. arab. p. 136. n. 17.*

Habitat in mari rubro, scabriuscula; an hujus familia?

Cinctame- II. M. plana, stellis margine prominulis remotis: interstitiis lamellatis. *Forsk. Fn. æg. arab. p. 136. n. 18.*

Habitat - - - haec tenus modo fossilis reperta, stellarum lamellis introrsum minoribus, vix hujus familia.

rafacea- II. M. caulescens ramosa, ramulis cylindricis adscendentibus appressis: stellis terminalibus. *Esper Pflanzentz. Lief. 3. p. 115. n. 13. t. 15. f. 2-4.*

Knorr del. nat. sel. I. t. A. 2. f. 2.

Habitat - - - rosea, alba vel cana.

338. MILLEPORA. Animal Hydra.

Corallium (ut plurimum) ramosum, poris turbinatis teretibus.

alcicornis. I. M. compressa recta, poris sparsis obsoletis.

Roy. lugdb. p. 526. Millepora plana ramosissima ramorum fastigio digitata.

Pallas el. zooph. p. 260. n. 161. Millepora solida depressa polymorpha laevis, poris minutissimis obsoletis sparsis.
Soland. & Ellis corall. p. 141. n. 19. Millepora ramosa solida compressa erecta polymorpha, poris sparsis obsoletis.

J. Bauh. hist. pl. 3. p. 896. Corallium asperum candicans adulterinum.

Worm. mus. p. 232. Alis cornu figura corallium.
Moris. hist. pl. 3. p. 656. f. 15. t. 10. n. 24. & 27. Corallium album fragile polyschides, ramusculis contiguis foliosum & Corallium album digitatum, ramis contiguis in latitudinem dispositis.

Petiv. pterigr. t. 18. f. 13. Corallium porosum latum planum.

Brown. jam. p. 390. n. 1. Corallium brachiatum maximum ramis subcompressis æqualibus.

Gesn. lap. fig. p. 132. b. n. 1. Chabr. stirp. p. 573. Gypsum coralloides.

Rumpfamib. 6. p. 243. Lithodendrum saccharaceum album.
Lhwyd lithoph. p. 6. n. 92. 93. t. 3.

Seb. mus. t. 106. n. 8. t. 114. n. 1. t. 116. n. 8.

Knorr del. I. t. A. II. n. 3.

Edw. av. t. 94.

Habitat in mari indico, & Americam australem alluente, s^epe alia corpora v. g. gorgonias, lagenam vitream, nucleos nucis cocos incrustans, aut saxorum frustae includens, nivea, levigata, solidula, saxeata, interdum fragilis, poris minimis remotis vix conspicuis.

M. plana scabra laminis crassis varie tortuosis subdivisa: apicibus s^epe lobatis porisque substellatis cylindricis utrinque instructis. Solander & Ellis corall. p. 142. n. 20. t. 12. f. 4.

Pallas el. zooph. p. 256. n. 158. Millepora plana laciniata irregularis scabra, poris utrinque cylindricis intus sulcatis. Pet. gaz. t. 10. f. 12. Coralloides philippensis c^ar^ule^a. Habitat massis immen^sis in Oceano indico, milleporas madreporis ne^cdens.

M. subcompressa muricata, poris eminentibus hinc fissis. Müll. zool. dan. prodr. 3045. Act. Nidr. 4. p. 64. t. 2. f. 20-22.

Gualt. test. t. 55. Madrepora ramis dense surculosis palmatis crispis verrucose hirsutis.

Mars. hist. mar. t. 32. f. 152-157.

Habitat in mari mediterraneo, norwegico, erecta, bifaria, teretiuscula, poris ad ramos confertis latere inferiore fissis.

M. turbinata, poris confertissimis angulatis.

*Habitat - - - a*l* Gotlandiæ littora rejecta, pororum tubis intus septis transversis.*

M. dichotoma erecta, ramis truncatis. Müll. zool. dan. prodr. 3043.

Stroem. fundm. I. p. 142. & Act. Havn. 10. p. 258. t. 9. f. 10. O. Fabr. Fz. groenl. p. 432. n. 435.

Pallas el. zooph. p. 249. n. 153. Millepora teres dichotoma ramis divaricatis truncatis, poris undique crebris minutis, Soland. & Ellis corall. p. 141. n. 18. t. 23. f. 1-8. Millerpora caulescens dichotoma, ramis truncatis divaricatis, poris quincuncialibus operculatis.

Donat. adr. 55. t. 7. & act. angl. 57. t. 17. f. 1-8. Myriozoum.

Ginann. op. pojh. 2. p. 8. t. 1. f. 3. Madrepora.

Mars. hist. mar. p. 145. t. 32. n. 154. Madrepora pisca-toribus Dengueni dicta.

Begl. mus. Löchn. t. 23. Planta hirsuta forma corallii.

Cavolin. pol. mar. I. t. 3. f. 9-11. 21. & 3. t. 9. f. 7.
Habitat in mari mediterraneo, septentrionali, ex griseo slavecens, & veluti vernice obducta, fragilissima, intus cinerascens, ramis divaricatis subdichotomis, contiguis coalescentibus, poris quincuncialibus.

miniacea. 6. M. minima, sublobata rubra poris crebris minutis punctata².
Soland. & Ellis corall. p. 137. n. 12. Millepora rubra.
Pallas el. zooph. p. 251. n. 154. Millepora pumila subversa rubra, punctis crebris impressis minutis.
Brown. jam. p. 391. n. 1. Madrepore minima subversa rucosa rubra.

Habitat in mari mediterraneo, americano, indicō bafō latiore aliis coralliis, testaceis, scopolis adhaerens, vix ultra $\frac{1}{4}$ pollicis alta, punctis minutis albis varia, apice poris exilibus marginatis pertusa.

cervicor- 7. M. subcompressa dichotoma utriusque cellifera, osculis turbinosis prominulis. *Soland. & Ellis corall. p. 134. n. 8.*
Pallas el. zooph. p. 252. n. 155. Millepora plana dichotoma, poris utrinque ordinatis scabris.

Mars. hist. mar. p. 144. t. 32. f. 152. 153. Madrepore ramis compressis miniacea.

Imper. hist. nat. p. 820. Porus cervinus.

Bonann. mus. Kircher. t. 286. n. 13.

Ginann. op. posth. 2. t. 5. f. 14.

Borlaf. Cornew. t. 24. f. 7.

Habitat in mari mediterraneo, rarissima ad Cornubia littora obvia, ex griseo lutescens, intus albida, exterior vernice quasi obducta, 5-6 pollices alta.

Skenei. 8. M. plana compressa subramosa utrinque cellifera, cellulis feriatis alternis turbinatis galeatis: fauce hiante, labio inferiori denticulo unico praedito. *Soland. & Ellis corall. p. 135. n. 9.*
Habitat ad Scotiae littora prope Aberdaen, scopolis affixa alba, vernice quasi argentea fucata. Skene.

pumila. 9. M. depressa, ramis sparsis inordinatis retusis undique porosus sebriusculis. *Pallas el. zooph. p. 253. n. 156.*
Mars. hist. mar. t. 36. f. 175.
Habitat in mari mediterraneo, testaceis scopolisque affixa, 3 pollices alta, ramosissima, pallide grisea, intus alba, solidata.

- compressa*, 10. *M. caulescens* subdichotoma compressiuscula, ramis distantibus, poris undique prominulis scabris.
Habitat in mari mediterraneo. D. Kaehler.
- lichenoi-*
des. 11. *M. caulescens* decumbens bifarie dichotoma, ramis denticulatis binis porosis scabris. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 432. n. 436. Müll. zool. dan. prodr. 3046. Forsk. Fn. ag. arab. p. 138.*
Pallas el. zooph. p. 245. n. 150. Millepora in plano dichotoma, ramis subparallelis denticulatis, supra porosa.
Soland. & Ellis corall. p. 139. n. 16. Millepora (tubipora) proclinans in plano dichotoma, ramulis flexuosis subparallelis denticulatis, supra poris prominulis subtus striatis.
Ellis corall. t. 35. f. b B.
Seb. mus. 3. t. 100. f. 10.
Marsf. hist. mar. t. 33. f. 162-164.
Ginann. adr. I. t. I. f. 4.
Boddaert zooph. t. 8. f. 2.
Habitat in mari mediterraneo, norwegico, aliis zoophytis, fucus, saxis adhaerens, digitii circiter longitudine, lactea, fragilissima.
- Kolacea.* 12. *M. in plano ramosa, ramulis adscendentibus flexuosis tereti-compressis: sutura porosa marginem ambiente.*
Soland. & Ellis corall. p. 140. n. 17.
Pallas el. zooph. 258. n. 159. Millèpora pumila subramosa violascens, suturis longitudinalibus porosis.
Rumpf amb. 6. p. 243. Lithodendrum saccharaceum rubrum.
Habitat in mari indici & australi, nitida violacea, 3 pollices circiter alta, punctis elevatis aspera, hinc inde verrucosa, poris ad utrumque latus longitudinaliter seriatis.
- tabulifera.* 13. *M. solida ramosa, poris tubulosis sparsis, ramis confluentibus extremitate attenuatis scabris.* *Pallas el. zooph. p. 259. n. 160.*
Marsf. hist. mar. p. 147. t. 31. f. 147. 148. Madrepora ramis conicis.
Habitat in mari siculo, palma vix altior, alba, solida, trunco ramisque adultioribus levibus.
- facialis.* 14. *M. membranacea ramosa flexuosa utrinque porosa.*
Pallas el. zooph. p. 42. n. 9. Eschara lapidea lamellosofrondosa: laminis conglomeratis, utrinque poris quincuncialibus.

Soland. & Ellis corall. p. 133. n. 7. Millepora (^{ta}
nialis) *plana angusta ramiota utrinque porosa, ramis*
flexuolis coalitis.

Raj. syn. p. 31. Eschara retiformis.

J. Bauh. hist. pl. 3. p. 809. Reticulum marinum.

Marf. hist. mar. p. 148. t. 33. f. 160. n. 1-3.

Borlaf. Corinw. t. 24. f. 6.

Ellis corall. p. 72. t. 30. f. 6.

Habitat in mari mediterraneo.

foliacea. 15. *M. lamellosa flexuosa utrinque porosa.* *Soland.* ^g
Ellis corall. p. 133. n. 6.

Ellis corall. p. 71. t. 30. f. a. A. B. C.

*Habitat in mari septentrionali, testacea & saxa incruf-
tans, 3 pollices ad pedem usque longa.*

zeylanica. 16. *M. membranis laciniosis concrecentibus teneris, cel-*
lulis utrinque seriatim oblongis.

Pallas el. zooph. p. 44. n. 10. Eschara zeylanica.

Habitat in Oceano indico, alba.

fornicula- 17. *M. crustacea, cellulis seriatim fornicatis labiolo rin-*
fa. ^{ta}
gentibus, membrana praetensa clausis.

Pallas el. zooph. p. 47. n. 12. Eschara forniculata.

Habitat in mari, Americam australem alluente; allu-
corallium adhaerens, flustrae foliaceae facie, nonne po-
tius celleporis adnumeranda?

crustulenta- 18. *M. crustaceo subfrondescens polymorpha; cellulis se-*
riatis oblongis metalirana clausis, septis integerrinis.

Pallas el. zooph. p. 39. n. 8. Eschara crustulenta.

Buster. opusc. sulf. I. l. 2. p. 83. t. 7. f. 4. 5. Es-
chara lapidescens.

Seb. mus. 3. t. 100. f. 2.

*Habitat in Seelandiae Belgii fossis salinis lacubusque maz-
riimis, Mauritaniae littore & Oceano atlantico, ex-
cinerascente alba, in glomeres subglobosos compunda.*

erosa. 19. *M. crustacea, cellulis detectis margine laterali pec-*
tinatis.

Pallas el. zooph. p. 38. n. 7. Eschara erosa.

Habitat in mari americano, rupibus agglutinata, cel-
lularum dentibus ereditis subalatis, utrinque circiter 4-

reticulata. 20. *M. membranacea, ramis anastomosantibus depremis-*
linearibus, hinc poris prominentibus alperis. *O. Fabr.*
En. groenl. p. 433. n. 437.

Pallas

Pallas el. zooph. p. 241. n. 147. Millepora (frondipora) clathrata umbilicata undulato polymorpha, ramulis altero latere verrucosis porosissimis.

Soland. & Ellis corall. p. 138. n. 15. Millepora ramosa in planum expansa ramis dichotomis bifariam anastomosantibus supra scabris poris asperis subtus laevibus.

Imper. hist. nat. p. 821. Frondipora, Porus frondosus, crusta marina.

J. Bauh. hist. pl. 3. p. 809. Frondipora.

Tournef. inst. p. 576. Eschara marina.

Mercat. metalloth. arm. 6. c. 10. p. 109. Alcyonium polyphillum.

Ginann. op. posth. I. p. 9. t. 4. f. 8. Frondepura; Eschara marina.

Argenv. oryctol. p. 367. t. 22. f. 5. Retepora lapidea f. Eschara marina.

Bonann. mus. Kircher. p. 266. n. 14. t. 43. n. 12.

Mars. hist. mar. t. 34. f. 165. 166.

Roques de Maum. polyp. p. 72. t. 15. f. C.

Forsk. Fn. æg. arab. p. 138. n. 29.

Habitat in mari mediterraneo, rara in mari Groenlandiam alluente, levigata, fragilissima horizontalis, convoluta, ramosissima, poris supra acuminatis confertis scabra.

Villalba. 21. M. membranacea reticulata umbilicata turbinato-undulata, hinc porosa pubescens. Müll. zool. dan. prodr. 2047.

Pontopp. hist. nat. Norv. I. t. 14. f. F. Stroem. sundm. I. p. 142. a.

Ad. Nidros. 4. p. 77. t. 3. f. 1. d. f. & f. 3.

Pallas el. zooph. p. 243. n. 148. Spallanzan. act. soc. ital. 2. Millepora (Retepora) reticulata umbilicata infundibuliformis crispa, superiore latere pubescens porosaque.

Soland. & Ellis corall. p. 139. n. 14. Millepora (foraminosa) reticulata infundibuliformis inotdinate undulato-plicata, latere superiori tantum porosa.

Ellis corall. p. 72. t. 25. f. d. D. F. Retepora Eschara marina.

Imper. hist. nat. p. 821. Retepora.

Raj. syn. p. 31. n. 1. Eschara retiformis.

Rondel. æg. 2. p. 133. Gesn. pisces. 1575. p. 155.

J. Bauh. hist. pl. 3. p. 809. Tournef. inst. p. 576. Eschara.

Argenv. oryctogr. t. 22. f. 2.

Rumph amb. 6. p. 247. t. 87. f. 5. Reticulum marinum,

d'Aubent. ic. misc. t. 23. Manchette de Neptune.

Bonann. mus. Kircher. t. 286. f. 10.

Chabr. stirp. ic. 577.

Kundm. rar. nat. t. 12. f. 3.

Mars. hist. mar. p. 149. t. 33. f. 161. n. 12.

Ginann. adr. p. 9. t. 4. f. 9.

Seb. mus. 3. t. 100. f. 11. & t. 101. f. 5. 6.

Knorr delic. t. A. III. f. 3.

Borlas. Cornw. t. 24. f. 10.

Walch Naturf. 3. t. 5. f. 2.

Mus. Goettwald. t. 48. f. 5.

Roques de Maum. polyp. t. 15. f. A. B.

Cavolin. pol. mar. 1. t. 3. f. 12-15.

*Habitat in mari mediterraneo, indico, norwegico, fundo,
rupibus, fucis, gorgoniis adhaerens, ad 3 pollices alta,
fragilissima, solidiuscula, alba, extrinsecus grisea,
incolis vivacissimis.*

clathrata. 22. M. umbilicata reticulata, ramulis planis dichotomis ana-
tomofantibus hinc porosis. Pallas el. zooph. p. 145. n. 149.
Habitat in Oceano indico, inter cellulosam & lichenos-
dem quasi media, alba, centro solido sessilis.

Reticu- *23. M. filis ramosissimis anastomosantibus cancellatis.*
lum. Habitat in mari mediterraneo, concharum testis adhae-
rens, filis capillaribus, telæ craneæ in modum reticu-
latis.

Spongites. 24. M. caulescens erecta, ramis angulatis imbricatis
anastomosantibus.
Mus. Tessin. 118. t. 11. f. 2. Corallium reticulatum.
Habitat - - - poris non conspicuis, statura ad spongium
accedens, pedem longa, ramis digitum crassis.

coriacea. 25. M. submembranacea semiorbicularis subhorizontalis,
raius porosa.

*Pallas el. zooph. p. 263. n. 162. Millepora alba solidif-
fima foliosa, laminis sessilibus semiangularibus congehis-
Imper. hist. nat. p. 840. Muscus lapidofus, nonnullis*
Halcyonium quintum Dioscoridis.

*Shew afr. app. p. 47. t. f. 1. Alcyonium candidum
cretaceum lamellatum maris numidici.*

Bonann. mus. Kircher. t. 289. f. 16.

Cavol. pol. mar. 3. p. 258. t. 9. f. 15.

*Habitat in mari atlantico & numidico, faciem cartilis-
gineum sape incrustans, & in coralliiis aliis concamer-
rationum quasi teclæ efficiens, poris in pagina inferiori,
sed rarius sparsis, vix hujus generis.*

- talcarea.* 26. *M. ramosa albissima solida dichotoma*, ramulis attenuatis coalescentibus. *Soland. & Ellis corall.* p. 129.
n. 1. t. 23. f. 13.
Habitat in mari mediterraneo, laetea, 4 pollices alta.
- polymor- pha.* 27. *M. crustacea polymorpha solida*, poris nullis. *Müll. zool. dan. pradr.* 3048. *O. Fabr. Fn. groenl.* p. 433.
n. 438.
Pallas el. zooph. p. 265. *n. 163.* *Millepora (calcarea) crustacea ramecens solidissima albissima laevis.*
Soland. & Ellis corall. p. 130. *n. 2.* *Millepora fasciculata solida*, ramulis difformibus tuberculatis.
Ellis corall. p. 76. *t. 27. f. c.* *Corallium pumilum album fere lapideum ramosum.*
Raj. syn. p. 32. *Boerh. hort. lugdb.* ind. 2. *p. 3.* *Corallium album pumilum nostras.*
Petiv. pterogr. t. 18. *f. 5.* *Corallium album nodulosum.*
Moris. hist. pl. 3. *p. 651.* *Corallium maritimum, calcareis rupibus adnascens.*
Sloan. jam. 1. *t. 18. f. 2.* *Corallium album pumilum.*
Brown. jam. p. 390. *n. 2.* *Corallium minium subramosum glabrum.*
Royen prodr. lugdb. p. 521. *n. 2. & 3.* *Isis alba fasciculata ramis difformibus tuberculatis, &c Isis nuclei juglandis figura.*
Beßl. mus. Lochn. t. 23. *Alcyonium album.*
Planc. Conch. t. 10. *f. e. b. & t. 13-17.* *Petrobryum.*
Bonann. mus. Kircher. t. 289. *f. 15.*
Ginann. op. posth. 1. *p. 1. t. 1. f. 2.*
Seb. mus. 3. *t. 103. f. 8. & t. 116. f. 6. 7.*
Borlef. Cornw. p. 239. *f. 2-5.*
Blachw. herb. (ed. germ.) 4. *t. 343.*
Habitat in omni oceano, albissima, gypso duriori, laevis, & cretaceo pulvere saepe conspersa, palmi & quod excedit, altitudine, ramosissima, Norwegis ad calcem coquendam adhibita.
- decussata.* 28. *M. cretacea lamellata*, laminis varie decussantibus.
Soland. & Ellis corall. p. 131. *n. 3. t. 23. f. 9.*
Habitat ad Lusitanæ littora, massis 5-6 pollices diametro et quantibus.
- Alga.* 29. *M. laminis tenuibus semicircularibus horizontaliter foliosa.*
Soland. & Ellis corall. p. 131. *n. 4. t. 23. f. 10-12.*
Millepora lichenoides.

*Habitat ad Cornubiæ littora, rubra, purpurascens;
flava aut albicans.*

pumicosa. 30. *M. multiformis fragilis scaberrima e cellulis mucronatis
subglobosis composita. Soland. & Ellis corall. p. 135.
n. 10.*

Ellis corall. p. 75. t. 27. f. f. F.

*Habitat in mari Britannico, sertularias sœpius incrustans,
ramulis cylindricis, cellulis alternis, nonne potius
madreporæ species?*

tubulosa. 31. *M. parasitica, cellulis tubuliformibus: seriebus tran-
verse dispositis. Soland. & Ellis corall. p. 136. n. 11.
Ellis corall. p. 74. t. 27. f. e. E.*

*Habitat in mari mediterraneo & septentrionali, sertu-
lariae falcatæ adhærens, purpurascens.*

pinnata. 32. *M. dichotoma erecta, poris tubulosis pinnulatum di-
gestis. Pallas el. zooph. p. 242. n. 151.*

*Mars. hist. mar. p. 152. t. 31. f. 167. n. 1. 3. 4. 6.
3. 5. & p. 153. t. 34. f. 168. n. 1-3.*

*Habitat in mari mediterraneo, recens cinerascens, in-
terdum viridis, ad pollicem usque alta, fragilis.*

liliacea. 33. *M. reptans laciniata, poris supra transversim seriatim
tubulosis. Pallas el. zooph. p. 248. n. 152.*

Syst. nat. X. n. 3. Tubularia serpens.

*Planck. Conch. app. p. 112. c. 25. t. 18. f. n. N. Ma-
drepora rosacea.*

Mars. hist. mar. p. 153. t. 34. f. 168. n. 4. 6.

*Habitat in mari mediterraneo & Cornubiam alluente,
alba, prostrata laciniis linearibus, obtusis, crispa-
transversis quasi pedicatis, an distincta satis a tubuloja.*

Cardur. 34. *M. polymorpha membranacea concentrica rugosa:
tubulis centralibus trigono-pyramidalibus. Cavolin. pol.
mar. I. p. 71. t. 3. f. 19. 20.*

*Habitat in mari mediterraneo, lenis magnitudine, alba,
subpellucida cardui florem quodammodo referens, fir-
pulis utplurimum adhærens.*

339. CELLEPORA. *Animal* Hydra.

Corallium *foraminulis* *arceo-*
latis *submembranaceis.*

ramulosa. 1. *C. dichotomo fasciculata*, *ramulis teretibus obtusis*, *tubis confertissimis cylindricis.* Müll. zool. dan. prodr. 3049.

Habitat in Oceano norwegico, *fragilissima*, *quasi ex arena comparsita*, *ramosissima.* Gunner.

spongites. 2. *C. lamellis simplicibus undulato-turbinatis cumulatis*, *cellulis seriatis*, *osculo marginato.* O. Fabr. Fn. groenl. p. 434. n. 439.

Pallas el. zooph. p. 45. n. 11. *Eschara lapidea membranacea*, *lamellis simplicibus undulato-turbinatis cumulatis*: *cellulis seriatis.*

Soland. & Ellis corall. p. 132. n. 5. *Millepora fragilissima*, *cellulis seriatis*, *lamellis simplicibus tubulosi-turbinatis* varie coalescentibus.

Mercat. metalloth. 112. Adarce.

Imperat. hist. nat. 632. & Gualt. test. t. 70. 71. *Porus anguinus.*

Best. mus. t. 28. *Lapis spongiae.*

Bonann. mus. Kircher t. 11. f. k.

Cavolin. pol. mar. I. t. 3. f. 16-18.

Habitat in mari mediterraneo, etiam boreali, Groenlandiam alluente, lactea, grisea, vel rubra, striata, nitida, cellularum osculis calamorum organi musici aperturas referentibus.

pumicosa. 3. *C. corallio dichotomo erectiusculo subcompresso scabro.* Pallas el. zooph. p. 154. n. 157. *Millepora multiformis fragilissima* e *cellulis gibbis mucronatis coacerivata.*

Ellis cor. p. 75. n. 7. t. 47. f. F. & t. 30. f. DD. Bol. Cornw. t. 24. f. 8.

β) Mars. hist. mar. t. 31. 32. f. 149-151.

Planc. Conch. t. 27. f. I.

Habitat in mari indico, atlantico, mediterraneo, germanico, anglico, norwegico, ad Spitzbergen usque.

verrucosa. 4. *C. cellulis subrotundo-globeratis ovatis* : *ore subtridentato.* O. Fabr. Fn. groenl. p. 434. n. 440.

Syst. nat. X. I. p. 789. *Tubipora verrucosa.*

Habitat in maris mediterranei & norwegici *fucis & testaceis*, *alba*, *punctis minutissimis porosa.*

ciliata.

5. *C. cellulis convexis* : ore septemdentato. *O. Fabr.*
Fn. greenl. p. 434. n. 441.
Pallas el. zooph. p. 38. n. 6. Eschara crustacea lapides-
cens, cellulis ore ciliato septemspinosis.
Habitat in maris mediterranei & septentrionalis fucis,
cana, ciliarum in osculis numero inconstanti.

hyalina.

6. *C. cellulis subglobosis diaphanis* : ore oblique sim-
plici. O. Fabr. Fn. groenl. p. 435. n. 442.
Cavolin, pol. mar. 3. p. 242. t. 9. f. 8. 9.
Habitat in Oceano, frequens fucorum, testaceorum mil-
leporarum crusta alba verrucosa.

nitida.

7. *C. cellulis subcylindricis pellucidis annulatis* : ore
simplici terminali. O. Fabr. Fn. groenl. p. 435. n. 443.
Habitat in maris, Groelandiam alluentis, ulvis aliisque
algis minoribus, alba, nitidissima, pellucida.

annulata.

8. *C. cellulis ovalibus ventricosis punctato-annulatis* :
osculo ringente subquadridentato. O. Fabr. Fn. groenl.
p. 436. n. 444.
Pallas el. zooph. p. 48. n. 13? Eschara (annularis)
lapidea incrassans, cellulis annulatim digestis cylin-
dricis, osculo biverrucoso.
Habitat in Oceani fucis, lepidibus, lepidibus, pulcher-
rino, cellulis glabris rubentibus.

340. ISIS. *Animal crescens plantæ forma.*

Stirps lapidea articulata : articulis
 longitudinaliter striatis substantia
 spongiosa vel cornea connexis,
 carne molliori porosa atque cel-
 lulosa obductis.

Oscula hydris oviparis obseissa.

Hippuris.

1. *I. stirpe corallina* : articulis striatis, geniculis atte-
 nuatis. *Fn. suec. 2220.*
Hort. Cliffert. 480. Sertularia ramosissima articulis fulcatis.
Muj. Tessin. 118. Sertularia eadem.
Pallas el. zooph. p. 233. n. 140. Isis articulata diffusa
alterne ramosa, cortice crasso lævi poroso.
Soland. & Ellis corall. p. 105. n. 2. t. 3. f. 1-5. Isis
stirpe articulata lapidea ramulis sparsis ostre articulis
cylindricis.

lapideis albis sulcatis, internodiis carneis nigris constrictis connexis, carne subalbida porosa crassa, osculis in quincunes dispositis, polypos octotentaculatos obtengentibus.

Clus. exot. 124. *Hippuris saxeae.*

Rumpf amb. 6. p. 228. t. 84. *Accabarium album.*

Gualt. test. 118. f. 16. *Lithophyton articulatum interno-dii striatis.*

J. Bauh. hist. pl. 3. p. 788.

Aldrov. mus. metall. p. 289. n. 2.

Olear. mus. p. 69. t. 35. f. 4.

Best. mus. p. 78. t. 23.

Bonann. mus. *Kircher.* t. 42. n. 5.

Valent. ind. litt. t. 8. f. 2-4.

Valentyn ind. 3. t. 51. f. AAA.

Seb. mus. 3. t. 105. n. 3. & t. 110. n. 12.

Knorr delic. t. A. I. n. 5.

Edw. av. t. 93.

β) *Iisis elongata.* *Esper Thierpfl.* 1. t. 6.

Habitat in Oceano omni, rupibus adhaerens, testacea & alia marina includens, articulis usplurimum albidis.

dichoto- ma. 2. *I. stirpe corallina:* articulis laevibus, geniculis decorticatis. *Pallas el. zooph.* p. 229. n. 143. *Iisis articulata filiformis dichotoma diffusa, cortice fulvo verrucoso.*

Petiv. gazoph. t. 3. f. 10. *Hippuris coralloides carnea capensis.*

Seb. mus. 3. t. 106. f. 4.

Habitat in Oceano indico & æthiopico, circiter semipedalis, subflexuosa, articulis subpellucide carneis, cortice cinnabarico, papillis convexis, in ramis superioribus confertissimis, obfessò.

ochracea. 3. *I. stirpe corallina:* articulis decorticatis, geniculis nodosis. *Hort. Clifft.* 480. *Lithoxylon ramosum erectum articulatum rigidum, ramis saepius liberis oppositis compres- sis, geniculis crassiusculis.*

Pallas el. zooph. p. 230. n. 144. *Iisis articulata paniculato-dichotoma ramosissima explanata, cortice hinc papilloso.*

Soland. & Ellis corall. p. 105. n. 1. *Iisis stirpe eroso-striata lapidea rubra dichotoma explanata ramosissima articula- ta, geniculis nodosis spongiosis fulvis, carne flavescente, osculis stellatis, polypos octotentaculatos obducentibus.*

Ellis act. angl. 50. p. 188. t. 3. *Corallium rubrum indicum.*

Rumpf amb. 6. p. 234. t. 85. f. 1. *Accabarium rubrum.*

Raj. hist. p. 1. p. 63. *Pseudocorallium croceum.*

Boerh. ind. pl. 2. p. 4. Corallium geniculatum capillaceum, apice ramoso, roseum.

Moris. hist. pl. I. p. 657. n. 14. Hippuris saxeana fulvo-rubra Gonckenianæ.

Seb. mus. 3. t. 140. f. 1. Accabaar s. Corallodendron vulgare rubrum.

Habitat in Oceano indicō, basi rupibus adhærens, saturata rubra, rarissime præter genicula spongiosa lutea, alba.

Entrocha. 4. I. stirpe testacea tereti : articulis orbiculatis perforatis, ramis verticillatis dichotomis.

Habitat in pelago, stirpe digitis crassitie, confertissime articulata ex orbiculis plantis centro perforato : foramina pentagono disco utroque e centro suo striato, superficie exteriori s. corticali inæquali, ordine tuberculorum cincto, (quæ ramorum deciduorum cicatrices) ; ramis tenuibus dichotomis, continuis nec articulatis, unde Entrochi & Coralloides ejusdem speciei petrificata.

Asteria. 5. I. stirpe testacea articulata pentagona, ramis verticillatis : steda terminali dichotoma.

Ellis encrin. 1764. 4. t. 13. f. 14. Encrinus capitestellato ramoso dichotomo, stipite pentagono equisetiformi, Guettard act. Paris. 1761. Palma marina e Martinica. Act. angl. 52. t. 14.

Habitat in Oceano, Barbados alluente.

Ex hac derivand. frequenissime illa montium europæorum pe'refacta Asteriae diæta.

coccinea. 6. I. pumila varie ramosa, ramulis divaricatis, osse articulato linearie substiato ruberrimo, internodiis brevibus spongiosis fulvis, carne intus pallide rosea, extus ciliulis elevatis verruciformibus coccineis : osculis minimis. Soland. & Ellis corall. p. 107. n. 3. t. 12. f. 5.

Habitat in Oceano indicō, 2-3 pollices alta, nitidissima coccinea, rarius alba.

ANTIPATHES. *Animal crescens plantæ facie.*

*Stirps intus cornea spinulis exiguis
obsita, basi explanata, extus
carne gelatinosa, verrucis
polypiferis obducta.*

- spiralis.* 1. *A. simplicissima spiralis scabra. Soland. & Ellis corall.*
p. 99. n. 1. t. 19. f. 1-6.
*Pallas el. zooph. p. 217. n. 141. Antipathes simplicissima
attenuata flexuoso-spiralis, spinulis seriatis scabra.*
Syst. nat. XII. 2. p. 1290. n. 4. β. Gorgia spiralis.
C. Bauh. pin. p. 366. Corallina nigra setacea circumvoluta.
*Pon. bald. ital. p. 230. Antipathis vel Corallinæ quarta
species.*
*Tournef. inst. p. 574. Lithophyton nigrum setaceum
circumvolutum.*
Rumpf amb. 6. p. 202. t. 78. C. Palmjuncus anguinus.
Valentyn ind. 3. t. 52. f. BB. Tali aros f. funis aquatilis.
Ephem. Ac. Caes. Nat. Cur. Dec. 2. A. 3. p. 78. t. 4. f. 4.
*Habitat in mari indico, mediterraneo, norwegico, atra,
rigidissima, fragilis, longissima, calani scriptorii crassitie.*
2. *A. ramosissima ramis sparsis patentibus hispidissimis attenuatis. Soland. & Ellis corall. p. 100. n. 2. t. 19. f. 7. 8.*
*Habitat in mari indico, ramis tuberculis ovatis cavis ex fus-
cescente luceis sparsis, cornuum ad instar nunc sursum,
nunc ad latera, nunc deorsum versis, an ovariis? obsefisis.*
- subpinna- ta.* 3. *A. ramosa pinnata hispida, pinnulis setaceis alternis, aliis
rarioribus transversim excurrentibus. Soland. & Ellis corall.*
p. 101. n. 3. t. 19. f. 9. 10.
Habitat in mari mediterraneo, cinerea, spinulis succineis.
4. *A. incurva ramosissima pinnata, pinnulis hinc ramosis seta-
ceis. Soland. & Ellis corall. p. 102. n. 4. t. 19. f. 11. 12.*
*Pallas el. zooph. p. 210. n. 135. Antipathes incurva ra-
mosissima pinnataque, ramis sparsis divaricatis, pinnu-
lis rariusculis setaceis, hinc ramosis.*
Clus. exot. l. 6. c. 5? Ericæ facie frutex marinus.
*Petiv. gaz. t. 35. f. 12. Myriophyllum indicum ramosissi-
mum.*
*Breyn prodr. 2. p. 35. ic. p. 33. t. 29. Lithophytum fus-
cum subhirsutum ramis tenuissime divisis & subdivisis.*
Rumpf amb. 6. p. 209. Erica marina tenuis.

Habitat in Oceano indico, & mari mediterraneo, interdum sesquipedalis, asperrima ex flavicante fusca, lepades testaceasque affixa, sibi saepius habens.

alopecu- 5. *A. ramosa*, ramis arcte paniculatis hispidis setaceis.
roides. Soland. & Ellis corall. p. 102. n. 5.

Habitat ad Carolinæ septentrionalis littora, ad 2 fere pedes alta, grisea, intus splendens, nigra, basi dilatata, ramis altero latere explanatis, sulco medio exaratis.

Cupref- 6. *A. simplex scabra paniculata*, ramis recurvatis. Solan^{p.}
fus. & Ellis corall. p. 103. n. 6.

Pallas el. zooph. p. 213. n. 138. *Antipathes (cupressina) trunco simplici longissimo flexuoso ramulis confertis recurvis ramosissimis paniculato.*

Syst. nat. XII. 2. p. 1290. n. 4. α . *Gorgonia (Abies regia) simplex scabra paniculata*, ramis recurvatis.

Syst. nat. X. n. 7. *Gorgonia (ænea) paniculata*, ramis muricato-scabris.

Rumpf amb. 6. p. 207. t. 80. f. 2. *Cupressus marina.*
Seb. mus. 3. t. 106. f. 1.

Habitat in Oceano indico, ad 2 usque pedes longa, trunco penna cygnea crassitie, tomento griseo hispida, intus aterrima.

ericalia- 7. *A. ænea lævis*, trunco simplici rigidissimo ramis spirali-
cea. sparsis dichotomis paniculato. Pallas el. zooph. p. 215.
n. 139.

Syst. nat. XII. 2. p. 1290. n. 5. *Gorgonia (ænea) panicu-
lata*, culmo flexuoso, ramis alternis confertis dichoto-
mis.

Rumpf amb. 6. p. 227. t. 80. f. 2.

Seb. mus. 3. t. 100. f. 17-19.

Valentyn ind. 3. 2. p. 545. col. I.

Habitat in Oceano indico, subpedalis, rigidissima, rariori-

dichoto- 8. *A. longissima dichotoma erecta*. Pallas el. zooph. p.
216. n. 140.

Mars. hist. mar. p. 105. t. 21. 22. f. 101. & p. 68.
40. f. 179. n. I. 2.

*Habitat in mari mediterraneo, ad 2 usque pedes alta,
teres, obscura.*

clathrata. 9. *A. ramosissima intricata*, ramulis confusis ubique coalescen-
tibus: junioribus setaceis. Pallas el. zooph. p. 212. n. 137.
Hort. Cliff. p. 479. n. 2. *Isis flexilis fruticosa*, caule subdi-
viso, ramulis setaceis strictis undique prominentibus.

Bocc. mus. p. 259. t. 9. Antipathes spinosa exilis reticulata arborea indica, aut Antipathes exilis aspalatoides.
Moris. hist. pl. 3. p. 652. f. 15. t. 10. n. 18. Fruticulus marinus asperiusculus; ramulis ferulaceis spinulis excurrentibus.

Habitat in Oceano indico, lepadibus & milleporis sc̄epe obſeffa, semipedalis vel pedalis, intus atra.

Pabel-lum. 10. A. explanata ramosissima subdivisa, ramulis bifariam ramosis reticulatim cohærentibus *Pallas el. zooph. p. 111. n. 136.*

Rumpf amb. 6. p. 209. Ericæ marinæ affinis.

Habitat in Oceano indico, undulato curvata, semipedalis fere diametri, atra, tenerrima scabritie hispida.

Pennacea. 11. A. ramosa subincurva, ramis pinnatis: pinnulis setaceis creberrimis hispidis. *Pallas el. zooph. p. 209. n. 134.*

Rumpf mus. 6. p. 209. Accabaar rutturuttu f. Erica marina crassa.

Aldrov. mus. met. p. 848. ic. 1. Peucites prisma.

Habitat in Oceano indico, griseo-scabra, intus atra, pedem fere alta, truncis pedem crassitie æquantibus.

nicoides. 12. A. ramosissima hispidissima atra, ramis sparsis, ramulis ubique crebris subulatis. *Pallas el. zooph. p. 208. n. 133.*

Rumpf amb. 6. p. 207. Cupressus marina prior.

Habitat in Oceano indico, circiter pedalis, aterrima:

benicula-cea. 13. A. ramosissima, ramis setaceis decomposito pinnatis. *Pallas el. zooph. p. 207. n. 132.*

Rumpf amb. 6. p. 208. t. 80. f. 3. Fœnum marinum.

Habitat in mari mediterraneo, pedem s̄apius excedens, atra.

341. GORGONIA. *Animal crescens plantæ facie,
Stirps coriacea suberosa, lig-
nosa, cornea, ossea, tel-
tacea, fibris vitreis con-
texta vel lapidea, striata,
attenuata, basi explana-
ta, tecta carne molliori
vasculosa & cellulosa,
post exsiccationem spon-
giosa & friabili.*

*Oscula polypifera, nutrimen-
tum forbentia & ovipara.*

lepadifera. 1. *G. dichotoma, floribus sparsis confertis reflexis cam-
panulatis imbricatis.* Müll. zool. dan. prodr. 3059.

Pontopp. Naturg. Norw. I. p. 252. t. 13. f. 11.
Pallas el. zooph. p. 204. n. 131. *Gorgonia* (*Reseda*)
alterne ramosa diffusa, cortice calyculis recurvis cal-
losis confertis coagmentato.

Soland. & Ellis corall. p. 84. n. 8. t. 13. f. 1. 2. *Gor-
gonia dichotoma, osculis confertis reflexis campa-
nulatis imbricatis, carne squamulis albis obducta,
osse in ramulis majoribus testaceo, in minoribus corneo.*

Gunner. ad Nidros. 2. p. 321. t. 9. *Gorgonia resediformis*
Clus. exot. 122. t. 123. *Planta resedæ facie.*

Worm mus. 329. *Planta marina resedæ facie.*

Bell. mus. t. 24. *Reseda marina.*

Bast. op. subs. 2. p. 130. t. 13. f. 1.

*Habitat in mari norwegico, 1½-2 pedes alta, pallida,
cortice albo, basi lapidea, ramis cartilagineis.*

verticilla-
ris. 2. *G. pinnata ramosa, ramulis alternis parallelis, floribus
verticillatis incurvatis.* Müll. zool. dan. prodr. 3060.

Pallas el. zooph. p. 177. n. 109. *Gorgonia teres longa*
*pinnata, pinnis alternis setaceis subramosis, poris
corniculatis verticillatis.*

Soland. & Ellis corall. p. 83. n. 7. *Gorgonia teres*
*pinnata ramosa, ramulis alternis parallelis, osculis ver-
ticillatis incurvatis, carne squamulis albidis vitreis
obtecta, osse e laminis subtestaceis nitidis composite.*
Ellis corall. p. 60. t. 26. f. S. T. V. Sea-Feather.

Mars. hist. mar. 101. t. 20. f. 94-96.

Habitat in mari norwegico, mediterraneo, 2-3 pedes alta, alba, junior flava, ramis flexilibus.

- Placo-*
mus.
3. *G. bifaria* ramis flexuosis rarius anastomosantibus, floribus conicis eminentibus. *Fn. succ. 2223. Müll. zool. dan. prodr. 3061.*

Pallas el. zooph. p. 201. n. 129. Gorgonia teres lignosa dichotoma, cortice calyculis cylindricis coronatis.

Soland. & Ellis corall. p. 86. n. 10. Gorgonia plana dichotoma, ramis flexuosis rarius anastomosantibus, osculis conicis setaceis eminentibus, osse substantia fere lignosa.
Ellis corall. p. 67. t. 27. f. aA. A 1. A 2. A 3. War-
ted Sea-Plan.

Gunner auct. Nidr. 3. p. 1. t. 1. Gorgonia slabelliformis.

Clus. exst. l. 6. c. 5. p. 122. Frutex marinus ericæ facie.

Breyn. prodr. 3. t. 29. Lithoxylon fuscum subhirsutum.

Raj. hist. pl. I. p. 86. Corallina lignosa ericæ facie Parkinsoni.

Raj. syn. p. 32. Keratophyton slabelliforme cortice ver-
ruoso obductum.

Borl. corn. p. 238. t. f. 1. Flabellum marinum.

Mars. hist. mar. p. 93. t. 17. & p. 157. t. 35. f. 171.

Poniopp. hist. nat. norw. I. p. 273. t. II. n. 2. 3.

Stroem. sundm. I. p. 145. n. 11. I.

Habitat in pelago Europæo, mari mediterraneo & indico,
erecta, 2 pluresve pedes alta, flava, punicea, rarius
rubicunda vel cinerea, lignosa.

- Mollis.* 4. *G. coriacea* dichotoma, corticis calyculis tubulosis perpendicularibus. *Pallas el. zooph. p. 203. n. 130.*

Habitat in mari mediterraneo, fere semipedalis ex fusco
violacea, ramis flagelliformibus, cortice fusco.

- Succinez.* 5. *G. teres* flavo-cornea dichotoma, cortice undique potis
- verruciformibus hiantibus. Pallas el. zooph. p. 200.*
n. 128.

Habitat - - - rarissima, dimidium pedem superans, ri-
gidissima, cortice testaceo.

- America-*
na. 17. *G. ramosa* pinnata, ramulis suboppositis, compressis, osculis polypiferis in marginibus feriatim dispositis, carne albido flavescente intus purpurascente, osse corneo.
Soland. & Ellis coral. p. 87. n. 11. t. 14. f. 3. Gorgonia
pinnata.

Habitat in mari Americam medium alluente frequens,
purpurea aut flava, setosæ affinis.

- exserta.* 18. *G. teres sparsa ramosa*, ramulis alternis, polypis octotentaculatis exsertis, carne squamulis albis vestita, osse subfuscō corneo. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 87. n^o 12. t. 15. f. 1. 2.
Habitat in mari Americam australem alluente, 2 circiter pedes alta, ramis albis.
- patula.* 19. *G. compressa tortuose ramosa subpinnata ruberrima*, osculis distichis subrotundis haloni subalbido inclusis, osse subfuscō corneo. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 88. n^o 13. t. 15. f. 3. 4.
Habitat in mari mediterraneo.
- cerato-*
phyta. 6. *G. subdichotoma*, axillis divaricatis, ramis virgatis bisulcatis, cortice rubro, poris bifariis.
Mus. Tess. 118. *Lithophytum ramis virgatis atris*, cortice albido poroso.
Pallas el zooph. p. 185. n. 117. *Gorgonia depressiuscula dichoroma*, ramis adscendentibus, corticis purpurascens poris distiche sparsis simplicibus.
Soland. & *Ellis corall.* p. 81. n. 4. t. 12. f. 2. 3. *Gorgonia dichotoma*, axillis divaricatis, ramis virgatis adscendentibus bisulcatis, carne purpurea, polypis niveis octotentaculatis distiche sparsis, osse atro corneo suffulta.
J. Bauh. hist. pl. 3. p. 806. *Coralloides fruticosa planta marina erectior.*
C. Bauh. pin. 366. *Corallina fruticosa purpurea.*
Gesn. lcp. fig. p. 136. *Lithophyton marinum rubri s. purpurei coloris.*
Lobel hist. pl. p. 630. *Corallina rubens antipathis facie, an Quercus marina foliis myricæ Theophrasti.*
Pluken amalch. p. 102. t. 454. f. 13. *Fucus teres ramosus*, pini setis sursum rigidibus, cinerea quadam crista, velut gypso, creberrimis foraminibus referta obductis.
Bocc. mus. t. p. 8. *Corallina fruticosa.*
Petiv. Ges. t. 31. f. 8. *Coralloides epispongiosa*, virgulis dilute purpureis.
Mars. hist. mar. p. 99. t. 19. n. 83. *Lithophytum quartum.*
Catesb. Carol. 2. t. 13. *Corallina fruticosa erectior.*
Turgot mem. instr. t. 23. f. B.
Seb. mus. 3. t. 107. n. 3.
Ginann. adr. t. 8. f. 21?
Knorr delic. t. A. V. n. 2.
Mus. Goettw. t. 46. f. 1.
Forsk. Fn. æg. ar. p. 128. n. 78,

Habitat in mari mediterraneo, atlantico, Americam australem alluente, pedem circiter alta, carne purpurea, polypis albis.

- Juncæ. 20. *G. simplicissima* teres utrinque attenuata, osse corneo fusco, carne ochracea bisulcata osculis crebris linearibus notata. *Soland. & Ellis corall.* p. 81. n. 3. *Pallas el. zooph.* p. 180. n. 112. *Gorgonia simplicissima* attenuata subsieuosa, cortice crassio rubro verrucoso. *Plin. hist. m. t. 13. c. 25.* *Junci lapidei.* *Rumpf amb. 6. p. 126.* *Palmjuncus albus.* *Seb. mus. 3. t. 105. n. 1. a.* *Habitat in mari Americano, testaceis adhaerens, aurantia, 3 circiter pedes alta, dum viva, valde flexilis.*

- Gammæa. 21. *G. compressa* ramosa subpinnata, osse complanato corneo, carne miniata osculis creberimis parvis notata. *Soland. & Ellis corall.* p. 80. n. 2. t. 11. *Habitat circa promontorium Bonæ Spei, ignei coloris.*

- Umbraculum. 22. *G. flabelliiformis* subreticulata, ramis creberimis teretibus divergentibus carne rubra verrucosa obductis. *Soland. & Ellis corall.* p. 80. n. 1. t. 10. *Habitat in mari indico, coloris lateritii, trunco brevi in 2-3 ramos ramosos diviso.*

- Purpurea. 23. *G. subdichotoma*, ramis divaricatis virgatis, cortice violaceo subverrucoso. *Pallas el. zooph.* p. 187. n. 118. *Habitat in mari Americano australem alluente, teres, laevis, nigra, extremis flagellis flava.*

- Sasappo. 24. *G. dichotoma* teres, ramis divaricatis virgatis, cortice rubro, cellulæ undique piloso-muricatis. *Pallas el. zooph.* p. 188. n. 119. *Rumpf amb. 6. p. 223. t. 83.* *Accarbaa Sasappo f. Virga sanguinea.* *Habitat in Oceano indico, pedem longa, & longior, nigra, cornea, lepades frequenter sibi affixas gerens.*

- Palma. 25. *G. plana multifida*, lacinij subsimplicibus longissimis, corticis levigati poris sparsis simplicibus. *Pallas el. zooph.* p. 189. n. 120. *Clus. exot. l. 4. c. 12. p. 85.* *Chamæripha peregrina.* *Habitat in Oceano indico, 2 interdum plures pedes longa, fusca, cornea in extremis ramis flexilissima, cortice calcareo.*

- radicata. 29. *G. homogenea suberosa*, poris sparsis minimis, basi
multifida. *Pallas el. zooph.* p. 190. n. 121.
Seb. mus. 3. t. 106. n. 6.
Habitat in mari, Africam meridionalem alluente, ramosissima, subdichotoma, grisea, suberi similis, trunco bipollicari ramofo.
- suberosa. 37. *G. lignosa dichotoma ramosissima diffusa, ramis, compressis sulco aratis, poris sparsis substellatis.* *Pallas el. zooph.* p. 191. n. 122.
Boerh. ind. h. Lugdb. 2. p. 8. n. 24. *Arbor marina*
suberosa suber perfecte referens cinerea ubique eleganter
& ordinata serie pertusa.
Soland. & Ellis corall. p. 93. n. 19. *Gorgonia ramosa*
subdichotoma, ramis longioribus crassis teretibus, ad-
cendentibus, carne miniacea spongiosa, osculis sub-
stellatis in quincunces fere dispositis, osse pallide rubro
suberoso.
Ellis corall. p. 64. t. 26. f. P. Q.
Turgot. mem. instr. t. 23. f. C.
Habitat in mari indico & Africam meridionalem alluente,
pallida, saepe tripedalis, cortice obsolete lateritio.
- coralloides. 28. *G. lignea erecta subdichotoma difformis, cortice roseo*
tuberofo, poris verruciformibus stellatis. *Pallas el.*
zooph. p. 192. n. 123.
Bocc. obs. ep. 3. t. p. 15. *Corallium lignum incrustans.*
Habitat in mari mediterraneo, circiter subpedalis pallide
grisea tenacissima, osculis flavis.
- elongata. 7. *G. dichotoma divaricata cortice rubro poris papulosis*
sparsis subimbricatis.
Soland. & Ellis corall. p. 96. n. 23. *Gorgonia dichotoma divaricata, ramis longioribus adscendentibus, carne tetragona rubra crassa, osculis erectis secundum angulos subimbricatis, osse tenui corneo flavescente.*
Pallas el. zooph. p. 179. n. 111. *Gorgonia longissima*
recta dichotoma, cortice rubescente, verruculis pori-
feris quincuncialibus.
Habitat in mari atlantico, pallida, fragilis, ad 4 fere
pedes longa.
- scirpea. 20. *G. simplicissima recta, basi decomposita foliosa, cortice*
molli verrucoso. *Pallas el. zooph.* p. 182. n. 113.
Habitat in mari indico, fusca, apice attenuata, cortice
(sicco) cinereo.

- Setacea.* 30. *G. simplex rigida*, cortice calcareo-albo subverrucoso.
Pallas el. zooph. p. 182. n. 114.
Habitat in mari, Americam alluente, nigricans.
- Viminalis.* 31. *G. longissima depressa ramoso-subpinnata*, ramis divaricatis setaceis, cortice flavo, poris prominulis distichis.
Pallas el. zooph. p. 184. n. 116.
Soland. el. Ellis corall. p. 82. n. 5. t. 12. f. 1. Gorgia ramis subteretibus divaricatis setaceis sparsis erectis, carne flava, polypis albis oestotentaculatis distichis.
Mercat. metalloth. arm. 6. c. 18. 19. p. 128. 129. Isidis Plocamum II. & III.
Habitat in mari mediterraneo, sesquipedalis, tenuissima; cornea, ex fuso lutea.
- Muricata.* 32. *G. teres ramoso - dichotoma diffusa cortice crasso poris cylindricis arrestis muricato.* *Pallas el. zooph. p. 198. n. 127.*
Soland. & Ellis corall. p. 82. n. 6. Gorgia compressa ramosa dichotoma, carne crassa subalbida, osculis cylindricis arrestis muricatis, osse ancipite corneo nigricante.
Petiv. pterigr. t. 18. f. 9. 10. Epicorallum virgulif muricatis majoribus & minoribus.
Tournef. instr. I. h. p. 574. Lithophyton americanum minus album tuberculis sursum spectantibus oblitum.
Tournef. act. Paris. 1700. p. 34. ic. I. Lithophyton americanum maximum pullum, tuberculis sursum spectantibus oblitum.
Boerh. ind. h. Lugdb. 2. p. 8. n. 12.
Catesb. carol. 3. t. 37.
Knorr delic. t. A. 6. n. 4.
Turgot mem. instr. t. 23. f. A.
Ginann. adr. I. p. 16. t. 10. f. 23.
Habitat in archipelago americano, 2-3 pedes alta, ex coriaceo cornea, nervo medullari albicante.
- Verrucosa.* 8. *G. bifaria*, ramis flexuosis, cortice calcareo albido : poris prominulis.
Pallas el. zooph. p. 196. n. 126. Gorgia teres subdichotoma divaricata, cortice alba calcareo tuberculoso.
Soland. & Ellis corall. p. 89. n. 14. Gorgia in plano ramosa flabelliformis, ramis tetetibus flexuosis, osculis prominulis papillosis albidis, osse tereti substantia lignoso-cornea:
Gesn. lap. fig. ic. p. 135. b. & p. 137. Lythophyton marinum,
M m m m m m m m m m

Lobel. hist. p. 650. Corallinæ Antipathis facie varietas
corallina alba.

Imperat. hist. nat. p. 653. c. 14. *Fucus vestimento nodoso-*

C. Bauh. pin. p. 366. *Corallina alba nodosa.*

J. Bauh. hist. pl. 3. p. 808. f. p. 809. *Coralloides granu-*
losa alba.

Worm. mus. p. 234. *Frutex verrucarius s. vermicularis.*

Raj. hist. plant. 3. p. 7. *Frutex marinus flabelliformis,*
cortice verrucoso obductus.

Raj. syn. p. 32. *Ceratophyton flabelliforme, cortice ver-*
rucoso obductum.

Mercat. metalloth. arm. 6. c. 21. p. 132. *Isidis palma,*

Petiv. mus. 10. *Erica marina alba frutescens.*

Tournef. inst. 1. h. *Lithophytum album nodosum,* &
Lithophytum cortice verrucoso albo.

Sloan. jam. cat. p. 3. hist. 1. p. 56. *Corallina fruticosa*
humilior & crassior, ramis quaquaversum expansa
superficie tuberculata.

Sloan. atl. angl. v. 44. n. 478. p. 51. t. 2.

Boerh. ind. h. *Lugdb.* 2. p. 7. n. 4. 5.

Mars. hist. mar. p. 91. 96. 104. t. 16. 18. 21.

Seb. mus. 3. t. 106. n. 3.

Knorr delte. 1. t. A. V. f. 1.

Ginann. adr. 1. p. 14. t. 7. f. 20. 21.

Forsk. Fn. ag. arab. p. 129. n. 81.

Ait. angl. 50. t. 34. f. 19. a.

Cavolin. pol. mar. 1. t. 1.

Habitat in mari mediterraneo, & Americam australem
Cornubiamque alluente, ut plurimum saxo adhaerens,
rarius lepadem calceoluni obducens, exsiccata sordida
alba aut cinerea, sesquipedalis & altior.

Antipa- 9. *G. paniculato-ramosa* ligno exterius flexuose striato,
thes. *Pallas* cl. zooph. p. 193. n. 124. *Gorgia fruticans* ramo-

lissima erecta, ramis alternis divaricato-adscendentibus,
cortice crasso lœvi, poris magnis sparsis.

Lobel. hist. p. 650. *Antipathes s. Corallium nigrum* Dic.
coridis.

C. Bauh. pin. p. 366. *Corallium nigrum.*

J. Bauh. hist. pl. 3. p. 804. *Antipathes s. Corallium nigrum.*

Tournef. inst. p. 574. *Lithophyton nigrum* arboicum.

Boerh. ind. h. *Lugd.* 2. p. 6. n. 7. *Keratophyton arboreum*

nigrum.

Valent. ind. litt. p. 501. t. 8. f. 1. a. *Accabaar* pohon.

Rumpf amb. 6. p. 196. t. 77. *Accabaar* item i. *Corall-*

ium nigrum.

*Seb. ephem. Ac. C. N. C. Dac. 2. ann. 3. obs. 24. p. 77. t.
3. Corallium nigrum ramosum.*

*Valentyn ind. 4. t. 52. n. 51. epit. p. 28. Accarbaarium ni-
grum.*

Seb. mus. 3. t. 104. n. 2. & t. 107. n. 4. Corallium nigrum.

Ginann. adr. I. p. 17. t. 13. 14. f. 29.

Knorr delic. t. A. I. f. I. & t. A. VI. f. 1.

Mus. Gottwald. p. 63. t. 49. f. 4. 6.

Donat. monogr. t. I. 2.

*Habitat in Oceano indico, & mari mediterraneo, 2 & plu-
res pedes alta, cornea, aterrima, cortice ex griseo ci-
nero, Corallium nigrum officinarum.*

*aniceps. 10. G. paniculata subdichotoma, cortice compresso calca-
reo margine poroso.*

*Pallas el. zooph. p. 183. n. 115. Gorgonia teres subdicho-
toma diffusa, cortice calcareo depresso-ancipiti margini-
nibus poroso.*

*Soland. & Ellis corall. p. 89. n. 35. Gorgonia ramosa sub-
dichotoma, carne depresso-ancipiti, marginibus osculo-
sis, osse subtereti attenuato, substantia corneo subcoria-
cea.*

Ellis corall. p. 68. t. 27. f. 9. n. 2. Sea-Willow.

*Raj. syn. p. 32. Keratophyton dichotomum, caule &
ramulis leviter compressis.*

Petiv. pterigr. t. 18. f. 12. Epicorallum virgulif alatis:

*Sloan. jam. catal. p. 4. hist. I. p. 56 n. 15. t. 22. f. 4.
Corallina fruticosa ramulis & caulinibus compressis qua-
quaversum expansis purpureis elegantissimis.*

*Catesb. Carol. 2. t. 34. Lithophytum compressum obs-
cure lutescens, marginibus purpureis aperis.*

*Habitat in mari Americam & magnam Britaniam alluen-
te, ad sesquipedem alta, recens eleganter violacea, post
flava vel alba.*

*robustus. 33. G. in plano ramosa dichotoma subattenuata, carne mi-
niacea lubrica molli vaseculosa, osculis octovalvibus
conicis subhiantibus sparsis, polypos albidos octotentati-
culatos bifariam cirratos exserentibus, osse lapideo ru-
berrimo extus striato & foveolato. Soland. & Ellis
corall. p. 90. n. 16. t. 13. f. 3. 4.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 1283. n. 6. Isis stirpe corallina æqua-
li continua, striis obsoletis obliquis, ramis vagis.*

Syst. nat. X. I. p. 797. Madrepora rubra.

*Pallas el. zooph. p. 223. n. 142. Isis continua dichoto-
ma subattenuata, cortice cartilagineo sparsim papilio-*

Ellis corall. p. 93. t. 35. f. a. Red Coral.
Royen prodr. p. 521. n. I. *Isis rubra*, ramis patulis retiusculis.
Donat. adr. p. 43. t. 5. *Corallum rubrum*.
Stapel in Theophr. p. 28.
Gesn. lap. fig. p. 132.
Aldrov. mus. metall. p. 290.
J. Bauh. hist. pl. l. 39. c. 33.
C. Bauh. pin. p. 366.
Worm. mus. p. 231.
Gans hist. corall. *Frosti.* 1669. c. ic.
Bonann. mus. *Kircher* p. 265. t. p. 284. n. I.
Raj. hist. pl. I. p. 60.
Calccol. mus. p. 3. ic.
Boccon. obs. 1674.
Tournef. hist. p. 572. t. 339.
Mars. hist. mar. p. 108. t. 22-29. & p. 168. t. 40. f. 180.
Mercat. metalloith. p. II4.
Knorr delic. t. A. n. I. 2. & t. A. II. n. 4.
Seb. mus. 3. t. 115. f. 1-7.
Ginann. op. posth. p. 7.
Blackw. herb. ed. gerni. 4. t. 341. a. b.
Cavolin. pol. mar. I. t. 2.
Habitat in mari mediterraneo & rubro, a cuius accolis in calcem uritur, & in varias figuras elaboratur, coralium rubrum officinarum, iſidi affinis, pedalis, ad summum altitudinis.

crassa. 34. *G. teres dichotoma*, ramis crassis virgatis divaricatis adscendentibus, carne violacea crassa, osculis prominulis æquidistantibus, polypos octotentaculatos marginibus cirratis exferentibus, osse subfuscō corneo. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 91. n. 17.
Ad. Paris. 1700. p. 34. t. 2. *Lithophyton americanum* maximum cinereum cortice punctato.
Hugh. barbad. t. 27. f. I.
Habitat in mari, Americam medium alluente.

pinnata. II. *G. compressiuscula pinnata*, ramis compressis simplicissimis, cortice rubro : poris oblongis. *Fu. suec.* 2224. *Möll. zool. dan. predr.* 3062.
Hort. Cliffort. 489. *Lithoxylon pinnato-ramosum erectum compressum flexile*, ramulis fetaceis.
Pallas el. zooph. p. 174. n. 106. *Gorgonia depreffsa ramosa*

pinnataque, pinnis suboppositis rigentibus, cortice miniato subverrucoso.

Theophr. hist. pl. I. 4. c. 7. Palma pelagica.

Breyn. prodr. 3. p. 34. t. 30. Lithoxylon incrassatum; ramis compressis fetosis pinnatis.

Seb. mus. 3. t. 114. f. 3.

D'Aubent. ic. misc. 48.

Habitat in mari, Africam meridionalem, Norwegiam alluente, 1½-4 pedes alta, cornea, fusca, in ramulis latecens.

Languino- 35. *G. depressa* ramosissima dichotomo-pinnata, corticis flavi poris distichis purpureis. *Pallas el. zooph. p. 175.* n. 107.

Tournef. inst. I. h. p. 574. Lithophytum flavum punctatum.

Habitat in mari atlantico, americano, pedem & ultra-violacea. 36. *G. depressiuscula* ramofo-pinnata, cortice violaceo poris prominulis subquadrangulo. *Pallas el. zooph. p. 176.* n. 108.

Clus. exot. l. 6. c. 4. p. 21. cur. post. p. 47. Quercus marina Theophrasti.

Habitat in mari americano, subsesquipedalis, cornea, lepadem calceolum saepe sibi adhaerentem habens.

Setosa. 12. *G. teres* pinnata, ramulis sparsis, cortice purpurascente. *Pallas el. zooph. p. 172.* n. 105. *Gorgia (acerosa) teres* ramofo-pinnata, pinnis setaceis confertis inordinatis diffusis, cortice laeviusculo purpurascente, porosae striato-sparsis.

Olear. mus. t. 35. f. 1. *Best. mus. Lochn. t. 24.* Quercus marina Theophrasti.

Pon. bald. ital. p. 221. 228. Antipathes hirsutum.

J. Bauh. hist. pl. 3. p. 805. Antipathes hirsutum seu Corallium foliatum.

Raj. hist. pl. app. p. 1849. *Moris. hist. pl. 3. p. 652.* t. 10. n. 10. Pinus marina.

Sloan. jam. cat. p. 3. hist. I. p. 57. n. 14. t. 22. f. 1-3. *Corallina fruticosa* elatior, ramis quaqua versum expansionis teretibus.

Tournef. inst. I. h. p. 575. Lithophytum erectum elatius ad tamariscum accedens.

Catesb. Car. 2. t. 35. Lithophyton pinnatum purpureum asperum.

Habitat in mari mediterraneo, & Americam alluente, rectissima, saepe bipedalis, cortice vetusto saepe cinerascente, vel flavente above tartaro incrassato..

- petechi- 13. *G. subdichotoma ramosissima cortice flavo bisulcato*
zans. *poris rubris.*
Pallas el. zooph. p. 196. n. 125. Gorgia teres ramosissima
diffusa, cortice flavo bisulcato verrucoso, poris rubris.
Mars. hist. mar. p. 103. t. 20. f. 89-93. Lithophyton sep-
timum.
- Habitat - - - fere bipedalis, cornea, nigra, virgulisa*
succineis.
- pectinata. 14. *G. teres, ramis secundis parallelis simplicissimis, cor-*
tice rubro: poris gibbis sparsis.
Pallas el. zooph. p. 179. n. 110. Gorgia teres surculis
secunde pectinatis, pinnis adscendentibus parallelis
longissimis acutis.
- Soland. & Ellis corall. p. 85. n. 9. Gorgia teres ramu-*
lis secundis parallelis adscendentibus, carne rubra, ol-
culis creberrimis rotundis prominulis, osse duro albo-
fragili.
- Seb. mus. 3. t. 105. f. 1. a.*
Habitat in Oceano Indico, rarissima, albida, cortice rubro,
- abietina. 37. *G. ramosa pinnata, carne flava, osculis purpureis dif-*
ticis, osse corneo flavescente. Soland. & Ellis corall.
p. 95. n. 23. t. 16.
- Pluken amalh. t. 542. f. 3.*
Habitat ad Africæ occidentalis littora, pedem circiter alta-
lepadibus interdum cooperata.
- calycula- 38. *G. dichotoma, ramulis crassis arrestis, papillis truncata-*
tis, carne cinerascente intus purpurea, osculis majori-
bus calyciformibus confertis sursum spectantibus, hydriis
octotentaculatis cirratis, osse subfuscō corneo. Soland.
& Ellis corall. p. 95. n. 21.
- Habitat - - -*
- Briareus. 39. *G. subramosa teres crassa basi supra rupes late explanata,*
carne interne subalbida, externe cinerea, hydriis majori-
bus octotentaculatis cirratis, osse ex aciculis vitreis pur-
pureis inordinate sed longitudinaliter compactis compo-
sito. Soland. & Ellis corall. p. 93. n. 20. t. 14. f. 1. 2.
- Habitat in mari Americam australē alluente, calcyonitis*
affinis, trunko amplissimo.
- ventalina. 15. *G. reticulata, ramis lateribus externe compressis, cor-*
tice rubro.
- Hort. Cliff. p. 480. Lithoxylon retiforme, ramulis op-*
positis compressis.

Pallas el. zooph. p. 165. n. 101. *Gorgonia (Ventilabrum)*
reticulata, ramis compressis, cortice ruberrimo verrucoso.
Rumpf amb. 6. p. 205. t. 89. f. 1. *Flabellaria marina*.
Habitat in Oceano indicō, nigra, junior fusca.

Reticu-
lum. 40. *G. reticulata*, ramulis creberrimis teretibus cortice
rubro verrucoso. Pallas el. zooph. p. 167. n. 102.
Rumpf mus. 6. p. 205. *Flabellum multiplex*.
Seb. mus. 3. t. 105. n. 16. & t. 107. n. 6.
Habitat in Oceano indicō, pōderosissima, spithāma rara
altior, grisea.

Clathrus.
41. *G. reticulata lignosa*, ramulis teretibus, cortice lāvi
poris simplicibus. Pallas el. zooph. p. 168. n. 103.
Habitat - - - 2 sere palmorum altitudine, pallida
cortice tenui ex griseo rubente.

Flabel-
lum. 16. *G. reticulata*, ramis interne compressis, cortice flavo
Müll. zool. dan. prodr. 3058.
Hort. Cliff. 480. *Lithoxylon retiforme*, ramis parallele
compressis.

Pallas el. zooph. p. 169. n. 103. *Gorgonia reticulata*,
ramis creberrimis compressis, cortice flavescente lāvi:
poris simplicibus.

Soland. & Ellis corall. p. 92. n. 18. *Gorgonia reticulata*, ra-
mis interne compressis, carne flava (interdum purpurea),
osculis minutis sparsis, polypis octotentaculatis, osse ni-
gro corneo, in ramis majoribus tenuiter striato.

Ellis corall. p. 61. t. 26. f. A. *Flabellum Veneris*.
Clus. exot. 1. 6. c. 2. & 3. p. 120. 121. *Frutex marinus ele-
gantissimus* & *Planta marina retiformis*.

Worm. mus. p. 234. Becl. mus. Lochn. t. 24. Olear. mus.
Gottorp. p. 69. t. 35. f. 2. *Frutex marinus eleganssissi-
mus Clusii*.

Bonann. mus. Kirch. p. 266. n. 13. fig. p. 286. *Frondipora*
Petiv. pterigr. t. 18. f. 8. *Epicorallium reticulatum vulgare*.
Mercat. metalloth. arm. 6. c. 20. p. 131. *Isidis Plocamum*
quartum.

Torrub. nat. hist. hisp. t. 10. f. 12. *Lithophytum arbo-
reum nigrum*.

Brown jam. p. 75. n. 1. 2. *Keratophytum reticulatum*.
Rochef. antill. c. 19. act. 13. p. 234. *Aibre de mer*,
J. Bauh. hist. pl. 3. p. 798.

Calceol. mus. p. 16.

Boerh. ind. h. Lugdb. 2. p. 6. n. 1. 4. 5. 6.
M m m m m m m m m m 4.

VERMES ZOO PHYTA. Alcyonium.

*Mars. hist. mar. p. 100. t. 19. n. 84.
Rumpf amb. 6. p. 224.*

*Turgot mem. instr. t. 23. f. D.
Knorr del. t. A. 12. f. 1. & t. A. 13. f. 1. 2.*

*Habitat in Oceano omni, plures pedes interdum alta, &
in magnam latitudinem expansa, flexilis, cornea, ni-
gra, cortice vetusto, albicante, vel cinereo.*

342. ALCYONIUM. *Animal plantæ forma cres-
cens.*

*Stirps fixa, carnosa, gelatino-
sa, spongiosa vel coriacea:
epidermide cellulosa poris
stellatis f. osculis pertusa,
hydras tentaculatas oviparas
exserentibus.*

arboreum. 1. *A. stirpe arborea, ramis obtusis, poris papularibus.
Fn. suec. 2225. Müll. zool. dan. prodr. 3077. A. ni-
drof. 4. p. 87. t. 11. f. 1-8. Pontopp. Nat. Norw. I.
p. 274. 275. t. 12. n. 4. 5.*

Mus. Tessin. 120. t. 10. Lithoxylon norwegicum.

*Pallas et. zooph. p. 347. n. 202. Alcyonium ramosum;
poris papillaribus in tubera lateralia terminaliaque
congestis.*

*Clus. exot. l. 6. c. 1. p. 119. Arbuscula marina coralloides.
J. Bauh. hist. plant. 3. p. 797. Planta marina coralloides
rubra.*

Worm. mus. p. 230. Planta marina coralloides.

*Cupan. hort. cath. suppl. 1. Tourf. instr. 1. h. p. 576. Al-
cyonium magnum durum arborescens.*

*Rumpf amb. 6. p. 222. Accabaar gabba-garbla f. Ac-
carbaar boazagu, Amboynensisbus Hualupia.*

*Koelreuter nov. comm. Petrop. 7. p. 345. t. 13. 14. Co-
rallium spongiosum leve, ramis tuberosis nutantibus,
tuberculis aggregatis.*

*Habitat in mari norwegico, albo, indico, humanae inter-
dum altitudinis, porosissimum suberosum, ex cinereo
ferrugineum, intus magis flavicans, medulla albicante.*

2. *A. stirpe arborecente coriacea coccinea superne ramo-
sa, papillis stellatis.*

- Pallas el. zooph. p. 349. n. 203. Spallanzan. act. soc. ital. 2. p. 603. &c. Alcyonium (palmatum) stipite simplici, extremo subramoso papillosoque.*
- Rondel. aq. 2. Gesn. pisc. p. 155. b. Manus marina.*
- J. Bauh. hist. pl. 3. p. 805. Palma s. manus marina quibusdam.*
- Barrel. ic. 1293. n. 1. & 1294. Fungus amanita mari-nus gilvo luteus & purpurascens.*
- Tournef. inst. 1. h. p. 596. Fucus manum referens.*
- Mars. hist. mar. p. 85. 163. t. 11. n. 74. 75. t. 38. 39. Manus latronis aut leprosi.*
- Bohadsch mar. p. 114. t. 9. f. 6. 7. Penna ramosa, pinnis carens, tentaculis in ramis positis.*
- Planc. act. Senens. 2. p. 222. t. 8. f. 6-8. Palma s. manus marina.*
- Petiv. pl. ital. t. 1. f. 2. 3.*
- Ginann. adr. 1. p. 45. t. 50.*
- Schaeffer Blumenpol. 1755. t. 3.*
- Habitat in maris mediterranei fundo, testaceis scopulisque ad dimidium usque pedem excrescens, digitii crassitie, coriaceo-cartilagineum, laxe, inferne album, oviparum.*

Epipatrum.
3. A. stirpe cavata carnosa rufescente.

- Pallas el. zooph. p. 373. n. 221. & misc. zool. t. 13. f. 1-4. Pennatula (Cynomorium) simplex, rhachi cylindrica crassa granulosa undique polypifera.*
- Soland. & Ellis corall. p. 65. n. 7. Pennatula (Cynomorion) stirpe brevi rugosa acuta, rhachi crassa cylindrica granulosa undique polypifera.*
- Ellis cat. angl. 53. t. 21. f. 3-5. Finger-shaped Sea-Pen.*
- Rondel. pisc. 2. p. 130. Malum insanum marinum.*
- Gesn. paral 27. Jonston exang. t. 20. Epipatrum.*
- Habitat in mari mediterraneo, exalbidum, & circiter pollenes longum, digitii virilis crassitie; nonne cum agarico ad pennatulas relegandum?*

Agaric-cum.
4. A. stirpe filiformi, pileo reniformi.

- Pallas el. zooph. p. 374. n. 222. Pennatula (reniformis) altero latere polypifera, stipite lumbriciformi.*
- Soland. & Ellis corall. p. 65. n. 8. Pennatula reniformis, stirpe lumbrici facie, altero latere polypifera.*
- Ellis act. angl. 53. t. 19. f. 6-10. Kidney-shaped purple Sea-Pen.*
- Habitat in mari Carolinam alluente, purpureum, poris flavis.*

Digitatum.

5. A. acaule oblongum coriaceum rugosum. *Fn. suec*
2226. *Müll. prodr. zool. dan.* 3078. *O. Fabr. Fn.*
groentl. p. 447. n. 462.
- Pallas el. zooph. p. 351. n. 205. Alcyonium (lobatum)*
gryseum crustaceo-tuberosum lobatum , poris creber-
rimis impressis.
- Soland. & Ellis corall. p. 175. n. 1. Alcyonium albif-*
dum carnosof-spongiosum lobatum , osculis stellatis
undique notatum.
- Ellis corall. p. 83. t. 32. f. aA. A. 2. Dead Man's Hand,*
or Dead Man's Toes.
- Ellis act. angl. 53. t. 20. f. 10-13. Alcyonium Manus mar-*
rina.
- Raj. syn. 37. n. 2. Breyn eph. N. C. cent. 7. 8. obs. 159.*
Alcyonium ramolo digitatum , asteriscis undique no-
tatum.
- Rumpf mus. p. 46. Tethya.*
- C. Bauh. pin. p. 366. Fucus Palma marinus.*
- Barrel. ic. 1293. 1294.*
- Jussieu act. Paris. 1742. p. 294. t. 9. f. 1.*
- Baster op. subs. I. p. 24. t. 3. f. 6. 7.*
- Habitat in Oceano europæo, testacea lapidesque incrufans,*
extrinsecus e griseo rubellum, pallidum , intus albidum.
- Schlosseri. 6. A. subrotundum stuposum , stellis radio pertusis.
- Pallas el. zooph. p. 355. n. 208. spic. zool. 10. p. 35. 37.*
Alcyonium crustaceum pulposum fuscum , flocculis
fulvis adnatis , petalis pertusis.
- Soland. & Ellis corall. p. 177. n. 4. Alcyonium car-*
nosum lividum, asteriscis luteis radiis obtusis ornatum.
- Schlosser act. angl. 49. 2. p. 449 n. 61. Alcyonium car-*
nosum asteriscis radiis obtusis ornatum.
- Rondel. aquat. 2. p. 130.*
- Gesn. pisc. p. 155. Uva marina.*
- Gaertner ap. Pallas spic. zool. 10. p. 37. t. 4. f. 1-5.*
Botryllus stellatus.
- Borlas. cornub. p. 254. t. 25. f. 1-4.*
- Habitat in mari Cornubiam alluente , fuscum , vel cistercif-*
cens , alia corpora obducens , stellarum radiis 6-10
æqualibus basi concurrentibus , & ad basin poro pertusis.
- Lyncu-
rium. 7. A. globosum fibrosum flavum verrucosum. *Müll. zool.*
dan. 3. p. 5. t. 85. f. 1.
- Pallas el. zooph. p. 357. n. 210. Alcyonium (Auran-*
tium) globosum fuium , stellis extus verrucosum in-
tus fibris offeis fascicularibus radiatum.

Mars. hist. mar. p. 82. t. 14. n. 72. 73. Alcyones.

Planc. Conch. ed. 2. p. 44. app. 2. p. 114. n. 3. Alcyonium flavum durius.

Planc. act. Senens. 2. p. 218. t. 8. f. 1. 2. Tethym plerumque sphæricum, malum aurantium lusitanicum forma & colore referens, quod horizontaliter dissectum fibras radiatim ossas ostendit.

Donat. adr. p. 60. 64. n. 1. 2. t. 10. Tethya sphærica.

Habitat in mari mediterraneo, & ad promontorium Bonæ Spei, pomi aurantii magnitudine cartilagineum.

Bursa.
8. A. subglobosum pulposum viride.

Pallas el. zooph. p. 352. n. 206. Alcyonium subglobosum cavum viridissimum molle, papillis creberrimis hyalinis.

Imper. hist. nat. p. 633. Arantium marinum viride.

J. Bauh. hist. pl. 3. p. 795. Alga pomum monspeliensium.

C. Bauh. pin. p. 368. Raj. hist. I. p. 38. syn. p. 31. Bursa marina.

Mars. hist. mar. p. 80. t. 13. n. 69. Aurantium marinum.

Planc. Conch. ed. 2. p. 44. Asrantia marina, C. Bauh.

Cavol. pol. mar. 3. p. 261. t. 9. f. 17.

Habitat in mari anglico & mediterraneo, pomi mediocris magnitudine, coriaceum.

Cydoni-
pm.
9. A. subrotundum spongiosum flavum læve. O. Fabr. Fn. groenl. p. 448. n. 464. Müll. zool. dan. 3. t. 81. f. 3-5.

Pallas el. zooph. p. 359. n. 211. Alcyonium (Cotoneum) informe subglobosum flavum intus rubrum fibroso-spongiosum cavernosumque.

Dioscr. Ὀλ. ιατρ. §. c. 136. Αλκυονιον I.

Imper. hist. nat. p. 833. Halcyonium durum f. primum Dioscoridis.

Rumpf amb. 6. p. 259. Vespetum marinum.

Donat. adr. p. 56. n. 1. t. 9. Alcyonium primum Dioscoridis.

Planc. Conch. ed. 2. app. p. 113. c. 18. n. 1. 2. t. 10. f. B-D. H.

Seb. mus. 3. t. 99. f. 4.

Habitat in mari africano, mediterraneo, septentrionali; rupibus & coralliis affixum, a fludibus agitatum demum liberum, in cavernis saepe nereident hospitio excipiens.

Ficus.
10. A. obovatum pulposum livens.

Pallas el. zooph. p. 356. n. 209. Alcyonium tuberiforme pulposum, papillis crebris stellatis.

VERMES ZOOPHYTA. Alcyonium.

Soland. & Ellis corall. p. 175. n. 2. Alcyonium (Pulmonana) pulposum lividum lobato-compressum, osculis stellatis minimis obductum.

Ellis corall. p. 82. t. 17. f. b. B. Sea-Fig.

Imper. hist. nat. p. 839. Alcyonium tuberosum forma ficus.

J. Bauh. hist. pl. 3. p. 813. Alcyonium tuberosum.

Mercat. metalloth. arm. 6. c. 6. p. 102. Alcyonium quintum antiquorum.

Raj. syn. p. 31. n. 3. Pulmo marinus alter Rondeletii.
Marf. hist. mar. p. 87. t. 16. f. 79. Ficus substantiae inter spongiam & Alcyonium mediæ.

Mineralog. Belust. 4. p. 137. tab. f. 1-3.

Habitat in mari mediterraneo, & anglico, rarioer inter spongia, olivacei coloris, intus granulosum.

gelatino- 11. A. polymorphum gelatinosum. *Fn. suec. 2228. Müll. zool. dan. prodr. 3082.*

Pallas el. zooph. p. 353. n. 207. Alcyonium cinerascente-hyalinum ramosissimum, ramis teretibus subacutis.

Fabr. Fn. groenl. p. 447. n. 464. Alcyonium cinerascente-hyalinum polymorphum.

Soland. & Ellis corall. p. 176. n. 3. Alcyonium luteum gelatinosum polymorphum.

Ellis corall. p. 87. t. 32. f. D. & Baster op. subs. I. t. L. f. 5. s. Alcyonium ramosum molle.

Planc. Conch. ed. 2. p. 115. c. 29. t. 10. f. A. Alcyonium digitatum gelatinosum molle.

Parkins. theatr. 1304. Spongia ramosa altera anglica.

Huds. flor. angl. p. 471. n. 26. Fucus gelatinosus.

Johns. it. cantebr. p. 3. f. 3. Gerard. erwac. p. 157. Merret. pin. p. 40.

Raj. syn. p. 49. n. 42. Fucus nodosus & spongiosus.
Seb. mus. 3. t. 98. f. 4.

Habitat in Oceano europeo, mari quoque glaciali, algis, lapidibus, fertulariis, testaceis frequenter adhaerens.

Manus 12. A. polymorphum protuberantiis obtusis perforatis. Müll. zool. dan. prodr. 3079.

Seb. mus. 3. t. 97. f. 3?

Habitat in Islandia, lycopendi pulpam siccataam referens, extrinsecus levius, supra protuberans digitis aliquot brevibus obtusis perforatis apice tanquam pena, ad medium usque rami.

- Massa.* 13. A. informe fulvum spongiosum patulum stellulis quinque radiatis; centro nigro. *Müll. zool. dan.* 3. p. 1. t. 81. f. 1. 2. *prodr.* 3083.

Habitat in mari norwegico.

- Cranium.* 14. A. tuberiforme album setosum. *Müll. zool. dan. prodr.* 3080.

Pontopp. Nat. Norw. 1. p. 252. t. 13. f. 10.

Stroem. sondm. 1. p. 148. n. 7.

Habitat in mari norwegico.

- tubrum.* 15. A. crustaceum molle miniatum punctis sparsis saturatioribus. *Müll. zool. dan.* 3. p. 2. t. 82. f. 1-4. *prodr.* 3081. *Fabr. Fa. groenl.* p. 447. n. 463.

Habitat in mari norwegico.

- mammil-
dofum.* 16. A. albidum coriaceum, mammillis convexis: centro cavo substellato, coadunatis. *Soland. & Ellis corall.* p. 179. n. 5. t. 1. f. 4. 5.

Sloan. jam. 1. t. 21. f. 1-3. Lapidis astroitidis five stellaris primordia.

Habitat in mari Americam medium alluente.

- Ocella-
tum.* 17. A. ferrugineum coriaceum, cellulis subcylindricis rugosis, apicibus radiatis & ocellatis. *Soland. & Ellis corall.* p. 180. n. 6. t. 1. f. 6.

*Habitat ad insulam S. Dominici, rupibus adhaerens, stel-
larum radiis 12.*

- tuber-
tum.* 18. A. flavescentia tuberosum, apicibus saepe subdivisis, poris tubulosis confertis. *Soland. & Ellis corall.* p. 180. n. 7.

*Habitat ad insulam S. Mauritii, rupibus cohærens, 2½ pol-
lices longum, 1½ altum.*

- Gorgonoi-
des.* 19. A. cinereum arenoso-carnosum, cellulis radiatis verruci-
formibus. *Soland. & Ellis corall.* p. 181. n. 8. t. 9. f. 1. 2.
Pallas el. zooph. p. 158. n. 100. *Sertularia (Gorgonia)* lignosa ramosa pinnata, pinnis pinnatis denticuliferis, cortice ramorum verrucoso.

*Habitat ad Curassao insulam, coralliis rupibusque adhae-
rens, cellularum radiis 12.*

- Asbesti-
num.* 20. A. stirpe subsimplici teretiuscula, poris undique sparsis majusculis oblongis. *Pallas el. zooph.* p. 344. n. 200.
Boce. obs. ep. 24. ic. p. 273. *Alcyonium stuposum perso-
ratum rubrum.*

Petiv. gaz. t. 23. f. 2. 2. Porus spongoides, americana;
Habitat in mari, Americam alluente, porosissimum, alb-
dum, intus roseum.

Albur-
num.

21. A. album ramosissimum attenuatum subdivisum, poris
 tubulosis terminalibus. *Pallas el. zooph. p. 346. n. 201.*
Habitat in mari indico, ex laevo pallidum, truncis digi-
tum minimum crassitie aequantiibus, & dimidiis fere per-
dis altitudinem asequentibus.

papillo-
sum.

22. A. crustaceum, papillis magnis confeitis convexis obsitum;
Pallas el. zooph. p. 350. n. 204.
Mars. hist. mar. p. 86. t. 15. f. 76-78. Boletus marinus,
Habitat --- ex griseo ferrugineum, corio siccati
simile.

conglo-
meratum.

23. A. gelatinosum convexum, dactylis conglomeratis;
 osculis edentulis terminalibus.
Gaertn. ap. Pallas spic. zool. 10. p. 39. t. 4. f. 6. Bo-
tryllus conglomeratus.
Habitat in mari Cornubiam alluente, rario, fucis, prae-
fertim nodofo & serrato adhaerens, albicans, cavitate
centrali infundibuliformi, ovulis globosis.

ascidioi-
des.

24. A. crustaceum coriaceum, papillis sparsis; osculis duo-
 bus subdentatis.
Gaertn. apud Pallas spic. zool. 10. p. 40. n. 3. t. 4. f. 7.
Distomus variolosus.
Habitat in mari Cornubiam alluente, fucò palmato adhae-
rens, dilute rubellum, vel ex crocco albicans verrucis
singulis orificio duplice minimo coccineo pertusis.

Synoi-
cum.

25. A. stirpibus pluribus cylindricis carnosò-stuposis: ori-
 ficio ad apicem stellato.
Phipps it. p. 199. t. 13. f. 3. Synoicum turgens.
Habitat ad Spitzbergæ littus septentrionale.

vermicu-
lare.

26. A. viride ramosum, rami cylindricis obtusis fastigiatis;
Cavol. pol. mar. 3. p. 264. t. 9. f. 16.
Habitat in rupibus insulæ Nisitæ, Neapolii obversæ.

stellatum.

27. A. osculis binis stellatis terminalibus. *Bommé act. Vlijf.*
 3. p. 306. f. 5. A. B.
Habitat in mari --- infundibuliforme, sacco pellucido
inclusum; an hujus generis?

Cornicula- 28. A. osculis quatuor stellatis , papillam medium cingenti-
bus corniculisque quatuor erectis terminalibus. *Bommé*.
act. Vlissing. 3. p. 307. f. 6.
Habitat in mari belgico , an hujus generis ?

343 SPONGIA. *Animal fixum flexible polymor-
phum , torpidissimum contex-
tum vel e fibris reticulatis , vel
e spinulis gelatina viva vestitis
osculis vel foraminibus superfi-
ciei aquam respirans.*

- Ventila-
bra.*
1. Sp. flabelliformis conformis stuposa , venis lignosis reti-
culatis, obtectis poris favagineis. *Müll. zool. dan. prodr.*
3084. *Pontopp. Nat. Norw.* I. p. 251. t. 13. f. 8. *Stroem.*
sundm. I. p. 146. n. 4. *Soland. & Ellis corall.* p. 188. n. 8.
Pallas el. zooph. p. 397. n. 247? *Spongia (strigosa) sube-
rosa molliis , fronde plana laciniosa , utroque latere po-
ris clathrata.*
Gunner act. nidr. 4. p. 74. t. 3. f. 1. 2. & t. 4. f. 3. 4:
Spongia Ventilabrum.
Rumpf amb. 6. p. 253. t. 89? *Bastia marina.*
Seb. mus. 3. t. 95. f. 8. *Planta marina foliacea & spon-
giosa , singulare modo ramosa.*
Ellis act. angl. 55. p. 289. t. 11. f. H. *Sea-Fan Sponga.*
*Habitat in mari americano? norwegico , figura & ramifi-
catione Gorgoniae Flabelli , cortice spongiae.*

- flabelli-
formis.*
2. Sp. flabelliformis conformis orbiculata , fibris cartilagi-
neis dente reticulatis.
Hort. Cliffort. 480. *Spongia flabelliformis , caule tere-
tiusculo , disco compresso-plano . vix diviso.*
Pallas el. zooph. p. 380. n. 226: *Spongia rigida rara
subatra flabelliformis plana rotundataque.*
✓ Royen prodr. h. lugdb. p. 522. n. 6. *Spongia flabelli-
formis rigidiuscula , fibris capillaribus densissime reticu-
lata.*
Boerh. ind. h. lugdb. I. p. 6. *Keratophyton majus nigrum
fibris tenuioribus densissime reticulatum.*
Rumpf amb. 6. t. 80. f. 1. *Flabellum Arnense.*
Petiv. gaz. t. 32. f. 1. *Rete philippense nigrum , telis
quadrangulis:-*
Seb. mus. 3. p. 183. t. 95. f. 2. 4. *Alcyonium irregulare
rigidum membranaceum & cellulosum.*

Habitat in mari indico & rubro, lepades aliquando im' mersas habens, ambarum manuum amplitudine, aliquo linearum crassitie.

- infundi-
bulifor-
mis.
3. Sp. infundibuliformis turbinata flexilis. *Müll. zool. dan'*
prodr. 3085.
Pallas el. zooph. p. 395. n. 246. Spongia (foliascens)
foliacea lacinata tenax , altero latere exciso-scabra.
Gunner act. Nidros. 4. p. 78. t. 4. f. 5. Spongia infun-
dibuliformis.
Rumpf amb. 6. p. 254. t. 90. f. 1. Spongia infundibuli-
formia.
Clus. exot. l. 6. c. 11. p. 125. Worm. mus. p. 236. Spon-
gia elegans.
Petiv. pterigr. t. 9. f. 4. 6. Spongia foliata aspera & Spon-
gia infundibuliformis.
C. Bauh. pin. p. 369. Spongia forma infundibuli.
J. Bauh. hist. pl. 3. p. 802.
Mus. Richt. p. 384. t. 14. f. F.
- β) Pallas el. zooph. p. 386. n. 233. *Spongia (crateriformis)*
infundibuliformis molliuscula , membranaceo - cellula-
losa , extus villosa , crassior.
Mercat. metall. arm. 6. c. 2. p. 97. ic. p. 96. Alcyonium
primum antiquorum.
Habitat in mari indico ? mediterraneo , norwegico , pedis
latitudine , pallide grisea , officinali minus tenax , adul-
tior s̄epe bifurcata rupta & plana.
- fistularis.
4. Sp. tubulosa simplex fragilis sensim ampliata.
Hort. Cliffort. 480. Spongia tubulosa simplex cavernosa,
etiam Pallas el. zooph. p. 385. n. 232. Spongia tubulosa sim-
plex attenuata rigida extus tuberculosa.
Sloan. jam. cat. p. 6. hist. l. p. 62. t. 24. f. 1. Spongia
dura s. spuria maxima ramosa fistulosa.
Seb. mus. 3. t. 95. f. 1. 7.
Habitat in Oceano indico , brachii amplitudine , 3-4 pedes
longa , siccata e fulvo nigricans.
- aculeata:
5. Sp. tubulosa ramosa tenax foraminulata subaculeata.
y. Royen prodr. h. Lügdb. 522. Spongia tubulosa caver-
nosa extus aculeata.
Pallas el. zooph. p. 392. n. 242. Spongia (villosa) tena-
cissima cava extus muricata ; intus levius;
Sloan. jam. cat. p. 7. hist. l. p. 63. t. 25. f. 4. Spongia duria
s. spuria , apicibus acutis existantibus , intus cavernosa.
Plurim.

Pluckn. phyt. t. 112. f. 4. *Spongia marina fistulosa maxima muricata.*

Brown jam. p. 74. n. 5. *Spongia fistulosa major flexilis porosa & prominulata.*

β) *Petiv. pierigr.* t. 19. f. 9. *Spongia typhoides.*

Rumpf amb. 6. p. 255 t. 55. f. 2. *Chirotheca marina. Habitat in mari, India'ni & australi America'ni alluente, pallide grisea, tenacissima.*

tubulosa. 6. Sp. *tubulosa ramosissima fastigiata tenax.*

Royer prodr. h. Lugdb. 522. *Spongia tubulosa ramosissima tenax fastigiata.*

Pallas el. zooph. p. 392. n. 241. *Spongia (fastigiata) tenera duriuscula tenax tubuloso-ramosissima, ramis fastigiatis truncatis.*

Soland. & Ellis corall. p. 188. n. 9. t. 58. f. 7. *Spongia tubulosa ramosa tenax, tubulis secundis arrectis, apicibus attenuatis.*

Buerh. ind. h. Lugdb. 1. p. 9. *Spongia ramosa fistulosa millepora.*

Seb. mus. 3. t. 97. f. 2.

Habitat in Oceano indicō, 4-6. pollices alta, ex luteo aurantia.

coronata. 17. Sp. *tubulosa simplex minima apice spinulis radiatis coronata.* *Soland. & Ellis corall.* p. 190. n. 13. t. 58. f. 8. 9.

Habitat ad Angliae littora, slavevens, corona apicis margaritacea.

ciliata. 18. Sp. *simplex tubulosa conico-flexuosa, sursum attenuata in apicem ciliatum.* *O. Fabr. Fn. groenl.* p. 448. n. 466.

Habitat in Groenlandiae littore, ulvis majoribus postissimum inhærens, 8 lineas longa, alba, sericea, exterius tomentosa, rarius gemella.

cancellata. 7. Sp. *tubulosa foraminulata, fibris cancellatis.*

*Habitat in Oceano, ferruginea rarioris texturæ, quam co-
generes, superficie muricata, tubo digiti crassitie, foraminibus lateralibus raris, latitudine pennæ anferinæ.*

tubra. 19. Sp. *tenax simplex cariosa obscure rubra depressa subrotunda, tuberculis elevatis, poris æqualibus.*

Habitat in mari rubro, prope Sueciam lapidibus affixa. *Forskål.*

nigra. 20. Sp. *tenax globosa æqualis farcta exterius nigra intus cinerea.*

Habitat in mari rubro, prope Sueciam. *Forskål.*

- officinalis.* 8. Sp. *foraminulata* *diformis subramosa tenax tomentosa*,
Müll. zool. dan. prodr. 3087. Stroem sondm. I. p. 128.
Mat. mad. 527. Spongia tenax subramosa, ramis dif-
formibus pertusis.
Pallas el. zooph. p. 387. n. 234. Spongia polymorpho-
compressa sublobata tomentola poruleuta.
Soland. & Ellis corall. p. 183. n. 1. Spongia multifor-
mis tenax porosissima lobata tomentosa.
Ellis act. angl. 55. p. 288. t. 10. f. D. E. Common
officinali Sponge.
Imperat. hist. nat. p. 828. C. Bauh. pin. p. 392. Sloan.
jam. cat. p. 6. hist. I. p. 62. n. 35. Spongia globosa.
J. Bauh. hist. pl. 3. p. 818. Spongiæ compressæ schiocratae.
Tournef. inst. I. h. p. 575. Spongia ad usum præstan-
tissima, foraminibus exiguis pervia.
Cavolin. pol. mar. 3. p. 266.
Habitat in Archipelago, mari mediterraneo, rubro,
indico? americano? norwegico? cavernosissima, ex ful-
vo grisea, testaceis, corallii, arenæ granulis inter-
dum referta, intus tubulosa.
- oculata.* 9. Sp. *foraminulata*, *ramosissima erecta tenax, ramis*
teretiusculis obtusis. *Hort. Cliff. 480.*
Pallas el. zooph. p. 390. n. 239. Spongia ramosissima
mollis tenera slaveicens, ramis teretiusculis, poris
sparsis prominulis.
Soland. & Ellis corall. p. 184. n. 2. Spongia ramo-
sissima, mollis, ramis compressiusculis adscendentibus
sæpe confluentibus, poris prominulis bifarie dispositis.
Ellis corall. p. 80. t. 32. f. f. F. & act. angl. 55. p. 288.
t. 10. f. B. Branched english Sponge.
Parkins. theatr. 1304. Raj. syn. p. 29. n. 1. Spongia
ramosa anglica.
Bocc. mus. p. 258. t. 116. Spongia ramosa oculata
viridis fruticosa.
Boerh. ind. h. Lugdb. 2. p. 8. Spongia ramosissima oculata.
Seb. mus. 3. t. 97. f. 5-7. Spongia erecta ramosa
mollis & subtilis.
C. Bauh. pin. p. 369. Spongiosus fucus.
Ruysch thes. an. I. t. 5. Spongioides ramosissima ma-
rina oculata.
Pontopp. nat. norw. I. p. 276. t. 12.
Habitat frequens in mari britannico, slaveicens, 5-10
pollices alta.

muricata. 10. Sp. *foraminulata* *ramosissima* *angulata* *tenax*: *poris cylindricis* *subulatis* *prominentibus* *æqualibus* *multitudine hispidis*. *Mus. Tessin.* p. 118. t. II. f. I.*

Pallas el. zooph. p. 389. n. 237. *Spongia suberosa ramosa*, *ramis divaricatis cylindricis undique villis crenatim muricatis*.

Soland. & Ellis corall. p. 185. n. 3. *Spongia stirpe suberosa ramosa*, *ramulis cylindricis fasciculis villosis undique muricatis*.

Ellis act. angl. 55. p. 288. t. II. f. F. *Branched tuberculated Sponge*.

Seb. mus. 3. p. 188. t. 99. f. 7. *Spongia ramis crassifusculis tenax*, *tota superficie apiculis tubulibus mollibus dense confita*.

Habitat ad Guineæ littora, *frequens ibi in rapibus, griseas, trunco digitum, ramis calamum scriptorum crassitie æquantibus*.

nodosa. 11. Sp. *foraminulata* *subramosa* *diformis* *scabra* *tenacissima* *ramis nodosa cavernosa*. *Royen. prodr. h. Lugab.* 522; *Pallas el. zooph.* p. 389. n. 238. *Spongia (ribens) subramosa* *diformis* *mollis*, *poris majusculis sparsis*.

Slov. jam. cat. p. 7. hist. 1. p. 63. t. 23. f. 5. *Spongia minor* & *mollior* *medallæ panis similis*, *fibris tenuissimis*.

Imperat. hist. nat. p. 838. *Alcyonium foraminosum* f. *quartum* *Dioscoridis*.

Mercat. metalloth. arm. 6. c. 8. p. 106. *Tertium quinti generis Alcyonium*.

Seb. mus. 3. t. 96. f. 2.

Habitat in Oceano americano, *ex griseo rubens vel albida*, *digitii crassitie*:

tomento- 12. Sp. *porosa* *subaculeata* *tomentosa*.

fa. *Soland. & Ellis corall.* p. 187. n. 7. *Spongia (urens) multiformis* *porosa* *spinulis intertexta tenerissima* *mollis*.

Ellis corall. p. 80. t. 16. f. d. d 1. D 1. *act. angl.* 55: p. 288. t. 10. f. A. *Sponge like Crumb offbreed*.

Habitat ad magnæ Britanniae, Americæ borealis, Africæ, Indiæ littora, *Zosteræ aliisque plantis marinis adhaerens*, *oculatæ similis*, *recens aurantius mollissima*, *siccata albida* & *urens tanto magis*, *si in clibanio exsiccata sit*, *intus micam panis referens*, *extrinsectiæ plena papillis poro pertusis*.

bacillaris. 13. Sp. conformis caulescens erecta, ramis appressis porulosis.
O. Fr. Müll. zool. dan. prodr. 3086.

Habitat in Oceano norwegico, sesquipedalis, teres, pollicis crassitie, officinalis consilentia, magis tamen compacta, poris consertissimis, quasi acicula minima pertusis.

dichoto- 14. Sp. conformis dichotoma erecta disticha bifaria cylindrica
ma. ca flexilis tomentosa. Müll. zool. dan. prodr. 3088.

Pontopp. Nat. Norw. I. p. 251. t. 12. f. 7. Stroem.
fondm. I. p. 146. n. 3. Gunner. act. Nidros. 4. p.
79. t. 5. f. 1. & t. 6. f. 1.

Pallas el. zooph. p. 388. n. 236. *Spongia (cervicornis)*
ramosissima tenax, ramis teretibus solidis subvillosois.
Soland. & *Ellis corall.* p. 187. n. 6. *Spongia ramosa*
tenax, ramis dichotomis erexitis teretibus superosis subvil-
losis.

Ellis act. angl. 55. p. 289. t. 11. f. 1. *Dichotomous*
branched Sponge.

Rumpf amb. 6. t. 86. f. 3? *Lithodendrum littoreum.*
Habitat in mari mediterraneo? indico? norwegico, flaves- cens, 5-6 pollices alta, poris minutissimis referuntur.

fluposa. 21. Sp. ramosa teres stuposa atque villosa. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 186. n. 5.

Ellis act. angl. 55. p. 188. t. 10. f. C. Downy branched
english Sponge.

Habitat ad Angliae littora flavescentia, 3 pollices alta.

cristata. 22. Sp. plana compressa erecta mollis, poris prominulis superne
seriatim dispositis. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 186. n. 4.
Ellis act. angl. 55. p. 288. t. 11. f. G. Cock's Comb Sponge,
Habitat ad Angliae littora, rupibus adhaerens, flavicans,
et plurimum 3 pollices longa, & 2 alta.

palmata. 23. Sp. palmata, digitis apice subdivisis : poris prominulis
inordinate dispositis. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 187.
n. 10. t. 58. f. 6.

Habitat ad Angliae littus, ex flavo rubella, mollis.

prolifera. 24. Sp. multoties ramoso-palmata, digitis distinctis. *Soland.*
& *Ellis corall.* p. 189. n. 11. t. 58. f. 5.
Habitat ad Americae borealis littus, 5-6 pollices alta, poris
numerostis minimis, intus reticulata, exterius spinulosa;

- botryoides. 25. Sp. tenerima ramosa, quasi racemosa, racemis cavis neriformibus: apicibus apertis. Soland. & Ellis corall. p. 190. n. 12. t. 58. f. 1-4
Habitat ad Angliae littus, candida, nitens.
- Panicea. 26. Sp. amorpha albida mollis tenerima subtilissime rosa. Pallas el. zooph. p. 388. n. 235.
Raj. syn. p. 31. Alcyonium ramosum molle, medulla panis intus simile.
Seb. mus. 3. t. 96. f. 4. & t. 99. n. 3.
Habitat in mari, inter Angliam, & Belgium intermedio, fucis, tubulariis, sertulariis intertexta; an distinda & tomentosa.
- Fulva. 27. Sp. amorpho-subramosa rigidissima fulva. Pallas el. zooph. p. 383. n. 230.
Seb. mus. 3. t. 95. f. 9. & t. 96. f. 1. Spongia rigida simplex ramosa.
Habitat in mari americano, gelatina inter febras fusca.
- Tubularia. 28. Sp. compressa sessilis rigidula flavescens, tubulis longitudinalibus porosa. Pallas el. zooph. p. 383. n. 229. Spongia tubulosa.
Habitat in mari americano, ad rupes sessilis, intus saepem nigricans.
- Fibrillosa. 29. Sp. polymorpha subcomplanata tenera, fibris divergentibus confertissimis contextis, poris sparsis dentatis. Pallas el. zooph. p. 382. n. 228.
Habitat in Oceano indico, grisea mollis, nunc flabelliformis, nunc laciniosa, nunc caulescens.
- Fascicula- 30. Sp. rigida subglobosa, fasciculis fibrosis prismatisca. Pallas el. zooph. p. 381. n. 227.
Planck. Conch. ed. 2. app. 2. p. 117. c. 34. t. 15. E. Spongia hircina globosa.
Habitat in mari mediterraneo, fulvescens, vel ex griseo lutea.
- Basta. 31. Sp. rigidiuscula rara subatra undulato-laciniosa, stipite tereti. Pallas el. zooph. p. 379. n. 225.
Rumpf amb. 6. p. 253. t. 89. Basta marina, Basta-laut.
Habitat in Oceano indico, trunco saxis insidente, crassitate digiti.

- floribus- 32. Sp. amorpha fasciculis ramosis confluentibus paleaceo-
da. tomentosis apice crassioribus obtusis. *Pallas el. zooph.*
p. 378. n. 224.
*Habitat in Oceano indico, palmaris & majoris adhuc
altitudinis, brassicæ caulifloræ facie, grisea, rubris
paleolis interspersis.*
- lichenoi- 33. Sp. amorpha, fibris molibus ramentosum rariusculis
des. subconnexis. *Pallas el. zooph.* p. 378. n. 223.
*Habitat in Oceano indico, lichenis fruticulosi habitu,
alcyonii gelatinosi facie.*
- papillaris. 34. crustacea tenera mollis papillosa : papillis perforatis.
Pallas el. zooph. p. 391. n. 240.
Seb. mus. 3. t. 97. f. 3.
Habitat in mari americano, ex griseo alba, gelatina fusca,
- sinuosa. 35. Sp. crustacea tenera tenax, superficie sinubus creber-
rimis cavernosa. *Pallas el. zooph.* p. 394. n. 243.
*Habitat in Oceano indico ? varia corpora incrustans, ex
griseo flavescens.*
- caverno- 36. Sp. amorpha sessilis tenacissima cavernosa, superficie
fa. crebris papillis prominulis. *Pallas el. zooph.* p. 394.
n. 244.
*Habitat in mari americano, pugni magnitudine & ultra,
ex flavescente albida, intus interdum fulva.*
- frondosa. 37. Sp. frondoso lacera tenax subreticulata altero latere
laciniosa. *Pallas el. zooph.* p. 395. n. 245.
Turgot mem. instr. t. 24. f. A.
Habitat in Oceano indico, grisea.
- agaricina. 38. Sp. compressa lobata sessilis tomentoso-reticulata ex-
teriori villis muricata. *Pallas el. zooph.* p. 397. n. 248.
Habitat in Oceano indico, ex fusco lutea.
- Tupha. 39. Sp. ramosa rara mollis, ramis adscendentibus suba-
cutis undique villoso muricatis. *Pallas el. zooph.* p.
398. n. 249.
*Imper. hist. nat. p. 830. 831. Spongia forma arborea s.
Tapha.*
Mars. hist. mar. p. 81. t. 14. n. 71. Typha marina.
Habitat in mari mediterraneo, lanuginea.
- membra- 40. Sp. amorpho-subramosa membranis cellulosa exteriori
nosa. muricata purpurascente nigra. *Pallas el. zooph.* p. 398.
n. 250.
Seb. mus. 3. t. 95. f. 3.
Habitat in Oceano indico.

compreſ- 41. Sp. simplex compreſſo-conica interne rima longitudinaliſa. *O. Fabr. Fn. groenl.* p. 448. n. 467.

Habitat in mari Groenlandiam alluentis locis profundis ereda, pollicem longa, helvola.

Pocillum. 42. Sp. cylindrica pedicellata, vertice pertuso. *Müll. zool. dan. prodr. 3091. O. Fabr. Fn. groenl.* p. 449. n. 468. *Habitat in mari norwegico, albida, 1½ lineæ longa, pocillum reſerens.*

coalita. 43. Sp. ramosissima mollis tenera flava, ramis compressiusculis. *Müll. zool. dan. 3. p. 71. 8, 120. prodr. 3090.*

Habitat in mari norwegico.

Plana. 44. Sp. expansa crustacea flabelliformis. *Müll. zool. dan. prodr. 3092.*

Habitat in mari norwegico, an diſtincta ſatis a reliquis, species?

cruciata. 45. Sp. alba pinnatifido-ramosa compreſſa, ramis obtuſis villoſo muricatis. *Müll. zool. dan. prodr. 3093.*

Habitat in mari norwegico.

effor- 46. Sp. alba ſubramoſa, apice incrtaſſato lacunoſo. *Müll. zool. dan. 1. p. 149. ic. t. 40. rar. descr. 1. p. 103. prodr. 3094.*

Habitat in mari norwegico.

macida. 47. Sp. alba crustacea in aculeos producta. *Müll. zool. dan. prodr. 2095.*

Habitat in mari norwegico.

ficiſor- 48. Sp. foraminulenta rigida turbinata, apice perforata. *Poiret voyag. en Barbar. 2. p. 61.*

Habitat ad Barbariæ littora.

lacustris. 15. Sp. conformis repens fragilis, ramis erectis teretibus obtuſis. *Fl. suec. 1190.*

Fl. lapp. 535. Spongia ramis teretibus obtuſis.

Raj. hift. 81. Spongia ramosa fluviatilis.

Habitat in Sueciæ, Angliæ lacubus, orygæ & majori profunditate ſub aqua latens, in hujus poris ſparſis autumno globulos cæruleſcentes ſeminum thymi magnitudine nitidos, in candelæ flamma fulgurantes, an corpora peregrina? obſervavit Cl. Blom, Med. dr.

deviati- 16. Sp. conformis erecta fragilis polymorpha. *Fl. suec. 1191.*

Müll. zool. dan. prodr. 3089.

Nnn nnn nnn nn 4.

Pallas el. zooph. p. 384. n. 231. Spongia ramosa filiformis viridissima fragilis.

Plünn almag. p. 356. t. 112. f. 3. Spongia fluviatilis anfractuosa perfragilis ramosissima.

Rupp fl. jan. p. 308. t. 3. f. 1. Spongia fluviatilis ad conservam accedens.

Loef. fl. pruss. p. 172. t. 52. Muscus aquaticus ceratoïdes.

Habitat in Europæ, etiam australiores Russiæ aquis dulcibus, obscure viridis, vix vitæ animalis vestigia exhibens, odoris pisculentii, granulis viridisibus gelatinosis poros interdum repletibus, vix satis distincta a lacustris.

friabilis. 49. Sp. *cinerea* *friabilis* *sessilis* *amorpha*, *subramosa*. *Wartmann & Girchner Naturf. 22.*
Habitat in lacu Bodamico, piscium esca.

canarium. 50. Sp. *ramis* *dichotomis* *teretibus* *incurvatis*. *Schroeter Naturf. 23. p. 149. t. 2.*
Habitat in aquaeductu Vinariensi, an hujus generis, & regni?

344. FLUSTRA. *Animal affixum raro tubulis radicibus.*

Stirps membranacea foliacea, ex seriebus cellularum multifidis & divergentibus coalita, quasi contexta.

Cellulæ ringentes capitula hydram æmula fundo adnata exserentes.

Ovaria bullulæ supra cellulas.

foliacea. I. Fl. *foliacea ramosa* : *laciniis cuneiformibus rotundatis.*
Fn. suec. 2231. Müll. zool. dan. prodr. 3051. O. Fabr.
Fn. groent. p. 436. n. 445. Soland. & Ellis corall. p. 12. n. 2. t. 2. f. 8.

Hort. Cliff. 480. Millepora membranacea flexilis ramosissima, ramis distinctis planis obiusis.

Pallas el. zooph. p. 52. n. 16. Eschara crustaceo-frondescens spongiosa, fronde cuneiformi multifida retusa, celulis ringentibus arcuatis utrinque spinula auritis,

Ellis corall. p. 70. n. 29. f. a. A. B. C. E. Broad-leaved Horn-wrack.

C. Bauh. pin. p. 367. *Porus cervinus* Imperati.

J. Bauh. hist. pl. 3. p. 799. *Alga marina platyceratos porosa*.

Plukn. elmag. p. 119. *Corallinæ affinis platyphyllos telam sericeam textura similans.*

Moris. hist. pl. 3. p. 646. f. 15. t. 8. f. 16. *Muscus marinus scruposus albidus telam sericeam textura sua æmulans.*

Raj. syn. p. 42. n. 9. *Tournef. inst. I. h.* p. 568. t. 334. *Fucus telam lineam sericeamve textura æmulans.*

Jussieu act. Paris. 1742. p. 293. t. 10. f. 3.

Habitat in Oceano septentrionali, & mari mediterraneo, ad dimidium pedem usque longa, digitum minimum lata, subgrisea, ut plurimum albescens, utrinque porosa.

2. Fl. foliacea subdichotoma : laciniis linearibus truncatis. Müll. zool. dan. prodr. 3052.

Soland. & Ellis corall. p. 11. n. 1. *Flustra foliacea dichotoma : laciniis linearibus truncatis, tubulis radicibus instructa.*

Pallas et. zooph. p. 56. n. 19. *Eschara (securifrons) fronde radicata dichotoma margine prolifera, laciniis cuneiformibus bipartitis truncatis, cellulis longissimis ringentibus.*

Ellis corall. p. 69. t. 28. f. a. A. B. Narrow-leaved Hornwrack.

Raj. syn. p. 43. *Moris. hist.* pl. 3. p. 646. f. 15. t. 8. f. 17. *Fucus maiinus scruposus albidus angustior compressus, extremitatibus quasi abscessis.*

Habitat in Oceano europeo, & mari mediterraneo, 5 circiter pollices longa, utrinque porosa, fragilis, flavescentia, vel ex flavicante fusca, vel mediae tinturæ, cellulis ex oblongo quadratis.

3. Fl. foliacea varie ramosa : poris infimo dente setaceo. Fn. suec. 2233. Müll. zool. dan. prodr. 3053.

Soland. & Ellis corall. p. 13. n. 3. *Flustra foliacea varie ramosa, poris setaceis.*

Pallas et. zooph. p. 50. n. 15. *Eschara crustaceo-frondescens spongiosa, cellulis obconicis novemdentatis piliferisque.*

Ellis corall. p. 73. t. 31. *Irregular spongy foliaceus Coralline.*

Amoen. acad. I. p. 105. n. 20. f. 19. Millepora membranacea plana, punctis quincuncialibus.

*Reaum. ad. Paris. 1712. p. 42. t. 5. f. Corallina.
Loefling ad. Stockh. 1752. p. 118. t. 3. f. 1-4. Mille-
pora crustacea plana adnata punctis quincuncialibus
Seb. mus. 3. t. 100. f. 10.*

*Habitat in Oceano septentrionali, & mari mediterraneo,
fucos, sertularias incrustans, utrinque porosa, albida,
madida per integras noctes manu traxata egregie scin-
tillans.*

charta-
cea.

7. Fl. papyracea utrinque cellifera: summitatibus securis
aciei instar truncatis. *Soland. & Ellis corall. p. 13. n. 4.*
*Habitat ad Angliae littora, tenuis, subpellucida, dilute
straminea, interdum subdigitata, cellulis prominulis
ex oblonga quadratis.*

carbasea.

8. Fl. foliacea dichotoma, cellulis uno strato dispositis.
Soland. & Ellis corall. p. 14. n. 5. t. 3. f. 6. 7.
*Habitat ad Scotiae littora, ex fuscescente lutea, cellulis
majoribus medio subpellucidis, supra ovatis, medio
angustatis, infra truncatis.*

bombyci-
na.

9. Fl. frondescens, frondibus obtusis dichotomis & tri-
chotomis confertis radicantibus uno tantum strato cel-
lulosis. *Soland. & Ellis corall. p. 14. n. 6. t. 4. f. b. B. B.I.*
Habitat in Oceano Americam medium & Indianam alluentem.

vorticil-
lata.

10. Fl. adnata, saxe frondescens, frondibus linearibus
subcompressis basi attenuatis, cellulis turbinate ciliatis,
scribus altera super alteram dispositis. *Soland. & Ellis
corall. p. 15. n. 7. t. 4. f. a. A.*
*Habitat in mari mediterraneo, fucis adhaerens, cellulis
semipellucidis undulatis.*

dentata.

11. Fl. plano-foliacea adnata hinc cellulis subovalibus
nitidis, osculis dentatis inclinatis. *Soland. & Ellis corall.
p. 15. n. 8.*
*Ellis corall. p. 73. t. 29. f. D. D I. & act. angl. 48.
n. 630. t. 22. f. 4. D.*
*Habitat ad magnae Britanniae littora, fucis testaceisque
adhaerens, alba, semipellucida.*

bullata.

12. Fl. adnata, cellulis ovatis existantibus albis, osculis
rotundis spinulis armatis. *Soland. & Ellis corall. p.
16. n. 9.*
Ellis corall. t. 30. f. d. D.
Habitat ad Angliae littora, fucos incrustans.

- tomentosa.* 13. Fl. crustacea arenosa lutosa , poris simplicibus subquincuncialibus. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 17. n. 10.
Pallas el. zooph. p. 37. n. 5. *Eschara (lutosa) crustacea arenaceo-lutosa , poris simplicissimis subquincuncialibus.*
Ellis corall. p. 74. t. 25. f. e. *English sandes Millepora.*
Raj. syn. p. 31. *Eschara millepora arenosa anglica.*
Habitat ad Angliae littora , & in mari mediterraneo , siccō perquam friabilis , an hujus generis ; an lorica marinæ imperati ?
- tomento- fa.* 14. Fl. incrustans mollis tomentosa , cellulis inconspicuis. *Müll. zool. dan.* 3. p. 24. t. 95. f. 1. 2.
Habitat in maris balthici & septentrionalis fucis & sertulariis.
- dentata.* 15. Fl. incrustans , cellulis discretis ovalibus : marginibus oppositis tridentatis , ore marginato. *Müll. zool. dan.* 3. p. 24. t. 95. f. 1. 2.
Habitat in maris septentrionalis fucis , buccinis.
- tubulosa.* 16. Fl. adnata membranacea , cellulis simplicibus ovato-oblongis , osculis tubulosis erectis. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 17. n. 11.
Habitat ad littora insulæ S. Dominici , fucis adhærens , semipellucida , obscure flavicans.
- hispida.* 17. Fl. frondescens spongiosa , frondibus ramosis hinc muri-catis , cingulis hispidissimis. *Pallas el. zooph.* p. 49. n. 14.
Habitat rarissima in mari mediterraneo subpollicaris , pallide grisea.
- bonducu- losa.* 18. Fl. frondescens , frondibus obtusis trichotomis confertis uno tantum strato cellulosis. *Pallas el. zooph.* p. 55. n. 17.
Seb. mus. 3. t. 96. f. 6.
Habitat in Oceano indico , dimidit pugni magnitudine , albida , bullis griseis.
- papyra- cea.* 4. Fl. crustaceo frondescens , fronde cuneiformi multisidæ uni-lamellata , cellulis oblongo-rhombeis summitate ringentibus. *Pallas el. zooph.* p. 56. n. 18.
Syst. nat. XII. 2. p. 1301. n. 4. *Flustra plano-foliacea ramosa adnata hinc cellulis rhombeis.*
Mars. hist. mar. t. 6. f. 25. 26. Porus cervinus Imperati.
Cavol. pol. mar. 3. p. 347. t. 9. f. 10.
Habitat in mari mediterraneo , lichenis umbilicati statu- re , slavescens , altera pagina scabriuscula.

- birta. 19. Fl. plana coriacea adnata, hinc cellulis coarctatis diffantibus ciliatis.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 438. n. 448. Flustra hispida.
Habitat frequens in mariis Groenlandiam alluentis fucis nodosis, fulva, cellulis angustis, sicca, fragilis.
- membra- 5. Fl. plano-foliacea indivisa adnata, hinc cellulis qua-
 nacea. drangulis oblongis. *Müll. zool. dan. 3. p. 163. t. 117. f.*
1. 2. prodr. 3054. O. Fabr. Fn. groenl. p. 337. n. 446.
*Soland. & Ellis corall. p. 18. n. 12. Flustra plano-folia-
 cea indivisa adnata, hinc cellulis quadrangulis oblon-
 gis, ad angulos superiores prominulis mucronatis.
*Habitat in mari anglico, baltico, maxime septentrio-
 nali, lapidibus, testaceis, fucis adhaerens, tenuissima,
 cinerea, vel albicans.**
- lineata. 6. Fl. plano foliacea indivisa adnata, hinc cellulis ovalibus.
Müll. zool. dan. prodr. 3055. O. Fabr. Fn. groenl. p. 437.
n. 447.
*Habitat in Oceani fucis, membranaceæ simillima, at
 cellulis ovalibus, approximatis, ocdontatis trans-
 versi seriatim, spatio inter singulas series latitudine
 cellularum vacuo.*

345. TUBULARIA. *Animal vegetans radicatum,
 capite tentaculis cristato,
 ovula generans.*

*Stirps tubulosa cornea sim-
 plicissima vel raniosa, imo
 affixa, apice animal ex-
 ferens.*

- cornuco- 9. T. tubo simplici inferne attenuato flexuoso rugosoque,
 piæ. *Pallas el. zooph. p. 80. n. 37.*
Cavol. pol. mar. 3. p. 250. t. 9. f. 11. 12.
*Habitat in mariis americanis & mediterranei corallitis, lu-
 tea, per totam longitudinem rugis annulata, sparsa vel
 aggregata.*

- indivisa. 1. T. culmis simplicissimis geniculis contortis.
Pallas el. zooph. p. 81. n. 38. Tubularia(calamaris) tubus.

lis aggregatis simplicibus lăviusculis infra implexis sub-proliferis.

Soland. & Ellis corall. p. 31. n. 1. *Tubularia tubulis simplicissimis aggregatis*, sursum leviter dilatatis, basi attenuatis implexis.

Ellis corall. p. 31. n. 2. t. 16. f. C. & ad. angl. 48. t. 17. f. D? *Corallina tubularia calamos avenaceos referens.*

Bocc. mus. p. 258. t. 6. f. 5. *Fucus vermiculatus.*

Raj. syn. p. 31. n. 4. *Adianti aurei minimi facie planta marina.*

Lhwyd ad. angl. 28. p. 275. t. 6. f. 7. *Adiantum aureum marinum.*

Jussieu ad. paris. 1742. p. 296. t. 10. f. 2.

Baster op. subf. I. t. 2. f. 3. 4.

Habitat in mari europæo, & mari mediterraneo, tubulis culmorum avenaceorum crassitie, 2-2½ pollices longis, cornelis, rigidulis, ex luteo griseis, lăvibus.

ramosa. 2. *T. culmis ramosis, geniculis contortis.* *Fn. suec.* 2229.
Pallas el. zooph. p. 84. n. 41. *Tubularia (trichoides) tubulis simplicibus longis tenuissimis alterne ramosis paucimque annulatis.*

Soland. & Ellis corral. p. 31. n. 2. *Tubularia tubulis ramosis, axillis ramulorum contortis.*

Müll. zool. dan. prodr. 3067. *O. Fabr.* *Fn. groent.* p. 441. n. 451. *Fistularia ramosa.*

Ellis corall. p. 31. n. 3. t. 16. f. A. & t. 17. f. A. *Corallina tubularia gracilis & ramosa, axillis ramulorum contortis.*

Habitat in Oceano europæo, tubulorum mollium sordide griseorum aliquot pollices interdum longitudine & quantum segetibus densissimis.

camea. 10. *T. tubis compositis ramosis : ramis ramulisque alternis.*
Pallas el. zooph. p. 83. n. 40.

Habitat in mari mediterraneo, tubulis rigido-corneis ex fusco griseis.

fistulosa. 3. *T. culmis dichotomis articulatis : impressionibus rhombis.*
Fn. suec. 2232. *Flustra fistulosa.*

Pallas el. zooph. p. 61. n. 21. *Cellularia (Salicornia) geniculata dichotoma, articulis oblongo-cylindricis, cellulis undique rhombis.*

Soland. & Ellis corall. p. 26. n. 13. *Cellaria farciminoides.*

Ellis corall. p. 46. t. 23. Bugle Coralline.

Raj. hist. p. 65. *J. Bauh. hist. pl.* 3. p. 811. *Tournef. inst.* h. p. 570. *Corallina fistulosa fragilis crassior.*

Pluckn. phytogr. t. 26. f. 3. *Coralliua fistulosa*, *fragilis*, *internodiis prælongis lævibus albis*, *farciminum modo concatenatis.*

Barrel. pl. iv. 1275. n. 7. *Muscus polygonoides falicornix* forma, c. *bifidus major.*

Ellis corall. p. 46. n. 1, t. 23. f. A.

β) *Raj. hist.* p. 66. *J. Bauh. hist. pl.* 3. p. 811. *Tournef. inst.* 1. h. p. 570.

Petiv. pl. ital. t. 2. f. 9. *Corallina fistulosa fragilis subtilior.*

Boeon. mus. p. 255. *Muscus corallinus rotundus exilis articulatus ramosus italicus.*

Barrel. p. 1275. n. 8. *Muscus polygonoides tenuior.*

Habitat in mari europæo, mediterraneo, atlantico, 3 circiter pollices alta, filii grossioris crassitie, interdum tripla, pallide grisea.

fragilis. 4. T. culmis dichotomis, articulis compressis.

Pallas el. zooph. p. 430. n. 12. *Corallina (tubulosa) tubulosa subannulata dichotoma divaricata.*

Pluckn. almag. p. 118. *phytogr.* t. 168. f. 4. *Corallina fistulosa flexilis geniculata mollis americana, segmentis latis & compressis.*

Sivan. jam. cat. p. 5. *hist.* 1. p. 61. n. 28. t. 30. f. 10. *Fucus marinus coraloides minor fungosus albidus terres, segmentis in summitate planis.*

Habitat in mari americano, corallinae facie, tubulis culmi graminei crassitie, albis vel viridulis, fragilissimis, papyraceo-calcareis.

muscoides. 5. T. culmis subdichotomis totis annulofo-rugosis. *Fn. suec.* 2230.*

Pallas el. zooph. p. 82. n. 39. *Tubularia tubulis aggregatis simplicibus radiatis hinc inde annulofo.*

Soland. & Ellis corall. p. 31. n. 2. *Tubularia (Larynx) tubulis simplicibus aggregatis, hinc inde annulofo-rugosis inferne attenuatis.*

Mill. zool. dan. prodr. 3068. *O. Fabr. Fn. groenl.* p. 441. n. 451. *Fistularia ramosa.*

Ellis corall. p. 30. n. 1. t. 16. f. 6. *ad. angl.* 48. t. 17. f. C. *Baister op. subs.* 1. p. 28. t. 2. f. 3. f. 4. & t. 3. f. 2-3. 4. *Corallina tubularia laryngi similis.*

Seb. mus. 3. t. 106. f. 7.

Habitat in mari europæo & mediterraneo, ab onisco phthisico saepe devastated, pallide grisea, tubulis pollite vix longioribus, filo vix crassioribus.

Papyracea. II. T. tubulo papyraceo maximo, alternatim ramoso. Pallas el. zooph. p. 83. n. 45.

Habitat in Oceano indico, erecta, intus albiflava, crassitie æquali calami anatini; an hujus generis?

Penicillatus. 12. T. tubulis aggregatis simplicibus radicatis apice prolieris penicillatisque. Pallas el. zooph. p. 87. n. 44. *Habitat in mari americano, tubulis albis, semipellucidis, pollice fere longioribus, crassitie calami avenacei, totis annulosis, an hujus generis?*

Acetabulum. 6. T. culmis filiformibus, pelta terminali striata radiata calcarea.

Synt. nat. X. I. p. 793. n. 17. Madrepora Acetabulum Hort. Cliff. p. 480. Sertularia caule simplici, umbraculo orbiculato peltato.

Pallas el. zooph. p. 430. n. 13. Corallina (Androsace) tubulosa simplex pelta terminali radiata.

Lobel ie. p. 387. Androsaces, Cotyledon foliosum marinum.

C. Bauh. pin. p. 367. Androsaces petræ innascens.

Beßl. mus. t. 27. Herba marina androsaces.

Tournef. inst. I. h. p. 569. t. 338. Acetabulum marinum.

Mercat. metalloth. arm. 6. c. 23. 24. p. 135. 136. Plantula lapidea scutulata.

Donat. adr. p. 28. n. 2. t. 3. Callopilophorum Matthioli.

Cavol. pol. mar. 3. p. 254. t. 9. f. 14.

β) Brown. jam. 74. t. 40. f. A. Acetabulum caule simplici, cyatho striato & quasi subcalyculato.

Habitat in mari mediterraneo, americano, alba, mollis, siccitate fragilissima, lapidibus, testaceisque adnata, tubulis simplicissimis, fili crassitie, subbipollicaribus; nonne potius corallinis adscribenda?

Splachnea. 7. T. culmis capillaribus simplicissimis, pelta terminali laevi membranacea.

Habitat in mari mediterraneo, corneti coloris, tubulis pluribus ex eadem radice setæ equinæ crassitie, 2 pollices altis, flexilibus, pelta flexili.

Huic generi inferendum quoque videtur ens organicum, & Wartmanno a Girtannerio in spongea friabili notatum.

- Coryna. 13. *T. subramosa filiformis papyracea geniculata capsulis ovato-acuminatis ore dilatabili pertusis & tentaculis cylindricis armatis terminata.*
Geertn. apud Pallas spic. zool. 10. p. 40. t. 4. f. 8.
Coryne pusilla.
Habitat ad Belgii & Angliae littora, sine radiculis fucis & ferteulariis adhaerens, arenacea vel saturate rubra, basi angustior, neque capite neque tentaculis retradicibus, capsulis per omnem superficiem perforatis pro tentaculis hyalinis apice globoſis, ad basin ovigeris.
- affinis. 14. *T. simplex subannulata mollis : tentaculis oris papillam retractilem cingentibus attenuatis.* *Pallas spic. zool. 10. p. 36. 41. t. 4. f. 9.*
Habitat ad Angliae Holsatiaeque littora, fucis gregatim adhaerens, Coryna affinis, capsulis tentaculis muricatis, ad basin ſæpe ovigeris.
- Fabricia. 15. *T. fiellata, cirris pinnatis, sex radiis os cingentibus.*
Müll. zool. dan. prodr. 3066. O. Fabr. Fn. groenl. p. 440. n. 450. f. 12.
Habitat in Norwegia & Groenlandiae littore, ſæpius in fiffuris rupium, extra tubulum ingredi neſcia, ſub flumbris cirros ſuora tubulum expandens, vix 6 lineis longior, tubulo erecto, verme triplo longiore, griseo, viridi vel albo, verme ſordide viridi, cauda tamen pallida cirrisque albis, transversim fulcato tereti medio crassiore.
- longicor- 16. *T. cirris duobus setaceis tubulo decuplo longioribus.*
Müll. zool. dan. prodr. p. 3070. Fistularia longicornis.
Habitat - - -
- multicor- 17 *T. cirris ultra viginti centro candido, corpoſe tereti nis.*
hyalino, tubulo macido.
Müll. zool. dan. 3. p. 15. t. 90. f. 1-3. prodr. 3071.
Fistularia multicornis.
Habitat - - -
- campanu- 8. *T. crista lunata, orificiis vaginæ annulatis, corpore lata.*
intravaginam abscondito. *Blumenb. Naturg. p. 441. n. 2.*
Syst. nat. X. p. 817. Hydra campanulata.
Syst. nat. XII. 2. p. 1303. n. 8. Tubularia reptans,
tubis campanulatis.
Pallas el. zooph. p. 85. n. 43. Tubularia (gelatinosa)
mollis grisea linearis alterne ramosa.
Rosef.

*Roesel Inf. 3. polyp. p. 447. t. 73-75. Federbusch-polypen.
Habitat in Europæ aquis stagnantibus, cirris fere 60.*

- repens.* 18. *T. cristata*, cirris utrinque radiatis, vagina porrecta, tubulo opaco procumbente. *Müll. hist. verm. I. 2. p. 16 n. 150. zool. dan. prodr. 3064.*
Fn. suec. 2219. Tubipora corallio repente filiformi dichotomo, tubis flexilibus cylindricis erectis distantibus.
Schaeff. Armpol. 1754. t. I. f. I. 2.
Habitat in Europæ magis borealis aquis stagnantibus, nymphæ folia caulesque særæ obſidens, gelatinam album simulans, tubulis subcylindricis fusciis, basi angustatis, apice crassioribus, verme ipso hyalino.
- repans.* 19. *T. crista lunata*, corpore extra vaginam trahili. *Blumenb. Naturg. p. 440. n. 1.*
Pallas el. zooph. p. 85. n. 42. Tubularia (crystallina) mollis hyalina multifido palmata, lacinii polypiferis.
Trembl. polyp. 3. p. 209. t. 10. f. 8. q. Polypi cristati.
Baker microgr. p. 308. t. 12.
Back acd. Stockh. 8. p. 203. t. 6. f. 5. 6.
Habitat in aquis Europæ stagnantibus, hyalina, mollis, ciliis circiter 60.
- Sultana.* 20. *T. crista infundibuliformi ad basin ciliata.* *Blumenb. Naturg. p. 441. n. 3.*
Habitat in Goettingæ stagnis, cirris circiter 20 fastigiatis.
- Hellaris.* 21. *T. ^{STC}cristata*, cirris pectinatis, tubulo fusco annulato erecto. *Müll. hist. verm. I. 2. p. 18. zool. dan. prodr. 3065.*
Habitat in maris balthici furo, minimo aquæ motu territu cirros subtilissimos candidos pro libitu flexiles & extenses in tubulo duplo longiori recondens.
- Simplex.* 22. *T. cirris octo linearibus*, tubulo conico hyalino. *Müll. ver. I. 2. p. 19. von Würm. p. 153.*
Müll. zool. dan. prodr. 3067. Fistularia simplex.
Habitat frequens in maris norwegici fuco nodoſo, tubulis erectis solitariis, verme hyalino, cirris albis, aqua levissime mota in vaginam, ea fortius mota vagina in tubulum retracta.
- Spallanzani.* 23. *T. cirris quinque plumosis utrinque pectinatis*, tubulo cylindrico cornuta inferne incurvo. *Spallanz. oīt. soc. Ital. 2.*
Habitat in maris mediterranei locis pacciatoribus.

membra- 24. *T. tentaculorum fistulosorum* ordine dupli concentrico,
nacea. tubulo membranaceo contractili viscido cylindrico inco-
lam superante. *Spallanz.* ad. soc. ital. 2.
Habitat in maris mediterranei locis magis pacatis ; utrum
hujus , an distincti generis ?

346. CORALLINA. *Animal crescens habitu plantæ.*
Stirps fixa e tubis capillaribus
per crustam calcaream po-
rosam sese exferentibus com-
posita.

Rami sæpe articulati semper ra-
muloſi vel divaricati , liberi
vel conglutinati & connexi.

ridens. 9. *C. trichotoma articulata : articulis compressis planis trilobis,*
Soland. & Ellis corall. p. 109. n. 1. t. 20. f. a.
Habitat in mari Americanum alluente. Greg.

Opuntia. 1. *C. trichotoma , articulis compressis subreniformibus.*
Hort. Cliff. 480. Sertularia ramosissima , articulis reniformi-

Pallas cl. zooph. p. 420. n. 2. Corallina trichotomæ
articulata , articulis planis reniformibus concatenatis.
Soland. & Ellis corall. p. 110. n. 2. t. 20. f. b. Corallinæ
trichotoma articulata , articulis compressis undulatis
reniformibus.

Ellis corall. p. 53. t. 25. f. b. B. B. 1. Articulated
Coralline of Jamaica.

Pluckn. alm. p. 118. phytogr. t. 26. f. 1. Corallina
latifolia f. opuntia marina Cortusi.

Petiv. pterigr. t. 20. f. 19. Corallina opuntioides minor.
Sloane. jami. cat. p. 4. hist. 1. p. 57. n. 16. t. 20. f. 2.
Corallina opuntioides , ramulis densioribus & foliis ma-
gis finnatis atque corrugatis.

Bocc. mus. 1. p. 219. Muscus marinus candidus denticulatus.

C. Bauh. pin. p. 364. Fucus folio subrotundo.

J. Bauh. hist. pl. 3. p. 862. Scutellaria f. opuntia marina.

Imper. hist. nat. p. 854. Sertolaria.

Clus. hist. plant. 2. p. 250.

Habitat in mari americano, mediterraneo, alba, in illo ramosissima articulis minoribus, in hoc minus ramosa articulis majoribus.

Monile. 10. *C. trichotoma articulata, articulis inferioribus compressis convexis cuneiformibus oblongis, superioribus subcylindricis. Soland. & Ellis corall. p. 110. n. 3. t. 20. f. C. Habitat ad Jamaicæ littora.*

incrassata. 11. *C. trichotoma articulata, articulis compressis convexo-planis cuneiformibus. Soland. & Ellis corall. p. 111. n. 4. t. 20. f. d. d 1-3. D 1-6. Ellis corall. p. 53. t. 25. f. A. a. Habitat ad Jamaicæ insularumque vicinarum littora.*

Tuna. 12. *C. trichotoma articulata, articulis compressis planis subrotundis. Soland. & Ellis corall. p. 111. n. 5. t. 20. f. e. Parkins. theatr. p. 1294. f. 12. Marsf. hist. mar. p. 65. t. 7. f. 31. Opuntia marina. Habitat in mari mediterraneo.*

Nodula- 13. *C. trichotoma ramosissima, articulis crassis cuneiformibus, divisurarum latioribus, terminalibus tricuspidatis ovatisve. Pallas cl. zooph. p. 421. n. 3. Imper. hist. nat. p. 652. Nodularia alba. C. Bauh. pin. p. 364. Muscus coralloides, squamulis locatus. Habitat in mari mediterraneo, sesquipedalis, crassissima, lapidosa, alba.*

Squamata. 14. *C. trichotoma, articulis stirpium rotundato-compressis cuneiformibus, ramulorum compressis planis, ultimis complanatis acutipibus acutis. Soland. & Ellis corall. p. 117. n. 18. Fn. suec. 2235. Corallina bipinnata, articulis obovatis compressis. Ellis corall. p. 49. t. 24. n. 4. f. c. C. Upright english Coralline with Spear-like Heads and flat Joints. Habitat ad Cornubiæ littora, coloris thalassini.*

loricata. 15. *C. trichotoma articulis compressis convexisculis cuneiformibus: lateribus angulatis, ultimis sublobatis: lobis parvis obtusis. Soland. & Ellis corall. p. 117. n. 19. Habitat in mari mediterraneo, officinali major & quadriflor crassior.*

palmata. 16. C. trichotoma , articulis compressis convexiusculis cuneiformibus apice subcorniculatis : ultimis latis lobis digitiformibus instrutis. Soland. & Ellis corall. p. 118. n. 20. t. 21. f. a. A.

Habitat in mari Americam alluente, nitens, nivea.

elongata. 17. C. trichotoma , articulis stirpium subtereti-cuneiformibus, ramorum cylindricis, summis obtusiusculis, non-nullis capitatis. Soland. & Ellis corall. p. 119. n. 22. Ellis corall. p. 49. t. 24. f. 3. Slender trailing english Coralline.

Habitat ad Cornubiæ littora, rubella vel purpurascens: officinali gracilior.

Subulata. 18. C. trichotoma , articulis stirpium ancipitibus cuneiformibus ex apice utriusque lateris proliferis, ramulis brevibus subulatis : articulis teretibus. Soland. & Ellis corall. p. 119. n. 23. t. 21. f. b. B.

Habitat in mari, Americam medium alluente, alba, angustissima, tenerima, complanata.

granifera. 19. C. trichotoma , articulis stirpium compressis cuneiformibus, ramulorum subteretibus, ovaris ovalibus pedunculatis oppositis, interdum proliferis. Soland. & Ellis corall. p. 120. n. 24. t. 21. f. c. C.

Habitat in mari mediterraneo, ad Africæ littora, tenera, coloris thalassini.

officina- lis. 2. C. subbipinnata , articulis subturbinatis. Fn. suec. 2234. Müll. zool. dan. prodr. 3056. a. a. Havn. 10. t. e. f. 7. Pallas el. zooph. p. 422. n. 4. Corallina bipinnata articulis ovatis, superioribus compressis, terminalibus ovato-lanceolatis planis.

Soland. & Ellis corall. p. 118. n. 21. t. 23. f. 14. 15.

Corallina trichotoma articulis stirpium subcompressis subcuneiformibus, ramulorum cylindricis, terminalibus nonnullis capitatis.

Ellis corall. p. 48. t. 24. n. 2. f. a. A. A. I. A. 2. B. B. I. B. 2. Coralline of the shops.

Lobel ic. 2. p. 240. Chabr. Stirp. p. 577. J. Bauh. hist. pl. 3. p. 818. Raj. hist. p. 65. syn. p. 33. n. 1. Tournef. inst. I. h. p. 577. t. 338. A. Dale harvic. 338. pharm:ac.

p. 112. Russel. aq. mar. tit. f. 3. Corallina.

Tobernaem. herb. p. 813. Corallina altera.

Perkins. theatr. 1296. Corallina alba officinarum.

Johns. merc. bot. p. 30. it. cantabr. 2. p. 3. Merret. pin. p. 30. Corallina pennata longior.

Pluckn. alm. p. 118. phytogr. t. 48. f. 4. Corallina magis erecta pennata eburneo nitore candidans.

Moris. hist. pl. 3. p. 651. sect. 15. t. 9. Corallina s. muscus marinus tenui capillo, spermophoros.

C. Bauh. p. 363. Muscus maritimus s. Corallina officinaria.

Barrel. ic. 1276. n. 1. Muscus corallinus filicinus.

Seb. mus. 3. t. 100. f. 13-15.

Habitat in Oceano europeo, & mari mediterraneo, 4 & plures pollices longa, filii grossioris crassitie, alba, rufescens, flavicans, vel rubella, inter vermisfuga relata.

pinnata. 20. C. ramis pinnatis continuis surfuraceis. *Soland.* & *Ellis corall. p. 117. n. 17.*

Habitat ad insularum Bahamensis littora.

tubens. 3. C. dichotoma capillaris fastigiata: articulis superioribus elevatis. *Fn. suec. 2238.*

Pallas el. zooph. p. 426. n. 7. Corallina filiformis dichotoma fastigiata, articulis omnibus cylindricis.

Soland. & Ellis corall. p. 123. n. 28. Corallina dichotoma filiformis, articulis stirpium teretibus, dichotomiae claviformibus, inferioribus nonnullis bicornibus.

Ellis corall. p. 50. t. 24. n. 5. f. e. E. Reddish Hair-like Coralline.

Cavol. pol. mar. 3. p. 257. t. 9. f. 16.

Habitat in mari, Angliam alluente & mediterraneo, ad 2 pollices longa, rubra.

crustata. 21. C. filiformis dichotoma fastigiata, articulis teretiunculis divisarum superiorum clavatis. *Pallas el. zooph. p. 425. n. 6.* *Müll. zool. dan. prodr. 3057.*

Soland. & Ellis corall. p. 121. n. 26. Corallina dichotoma capillaris, articulis teretibus, ramulis fasciculatis crustatis, divisuris penultimis & extremis ovariferis.

Ellis corall. p. 51. t. 24. n. 7. f. f. F. Crested or Cock's Comb Coralline.

Pluckn. almag. p. 119. phytogr. t. 168. f. 3. *Sloan. jamcat. p. 4. hist. 1. p. 58. n. 19. t. 20. f. 5.* Corallina marinaria capillacea.

J. Bauh. hist. pl. 3. p. 811. Corallinis affinis s. muscus marinus tenui capillo.

C. Bauh. pin. p. 363. Muscus capillaceus, multifido folio, albidus.

*Imper. hist. nat. p. 652. Villus petræus s. Muscus marinus.
Barrel. ic. 1296. f. 2. Muscus coralloides crustatus.
Habitat in mari septentrionali, mediterraneo, americano,
dimidium a. l. sesquipollicem longa, ut plurimum rubens
aut purpurascens, saepe alba, interdum viridis aut fla-
vescens.*

spermo- 22. *C. dichotoma capillaris inferne pinuata, articulis cy-
phoros. lindricis. Syst. nat. X. t. p. 807.*

*Soland. & Ellis corall. p. 122. n. 27. Corallina dichotoma
capillaris, articulis subteretibus, divisuris penultimis
& ultimis ovarifexis, corniculis terminalibus setaceis.
Ellis corall. p. 51. t. 24. n. 8. f. g. G. Seed-bearing
Coralline.*

*Moris. hist. pl. 3. p. 651. f. 15. t. 9. f. 9. Corallina muscosa.
β) Ellis corall. t. 24. n. 9. f. h. H. H I.
Habitat ad Cornubiæ littora, ut plurimum laetea, viz
ultra pollicem longa.*

cornicu- 4. *C. dichotoma inferne pinnata, articulis bicornibus.
lata. Fn. suec. 2236.*

*Pallas el. zooph. p. 424. n. 5. Corallina inferne pinnata,
extremitate dichotoma.*

*Soland. & Ellis corall. p. 121. n. 25. Corallina dichoto-
ma, articulis stirpium bicornibus, ramulorum teretibus.
Ellis corall. p. 50. t. 24. n. 6. f. d. D. White slender join-
ted Coralline.*

*Habitat ad Cornubiæ littora, & (articulis omnibus bico-
nibus) in mari Americanum medium alluente, in divisuris
extremis interdum ovarifera.*

fragilissi- 5. *C. dichotoma, articulis filiformibus divaricatis apice
ma. basique latioribus.*

*Pallas el. zooph. p. 429. n. 13. Corallina dichotoma rigida
erecta, articulis longis cylindricis coarticulatis.*

*Soland. & Ellis corall. p. 123. n. 29. t. 21. f. d. Corallina
dichotoma, articulis cylindricis æqualibus levibus,
ramis erectis.*

*Sloan. jam. cat. p. 2. hist. I. p. 53. t. 20. f. 1. Corallium
minimum capillaceum.*

*Habitat in mari indico, mediterraneo & Americanum medium
alluente, laetea, fragilissima, bipollicaris & longior.*

fruticolo- 23. *C. dichotoma, ramis teretibus continuis furfuraceis :
ta. apicibus attenuatis. Soland. & Ellis corall. p. 116. n.
16. t. 22. f. 5.*

Habitat ad insularem Bahamensem littora.

- indurata. 24. *C. dichotoma*, ramis subcontinuis teretibus lævibus divaricatis. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 116. n. 15. t. 22. f. 7.
Habitat ad insularum Bahamensium littora.
- lichenoi- des. 25. *C. dichotoma*, ramis continuis rugosiusculis superne complanatis. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 116. n. 14. t. 22. f. 8.
Habitat ad insularum Bahamensium littora, coloris thalassini.
- rugosa. 26. *C. dichotoma*, articulis annulato-rugulosis subcontinuis cylindricis: apicibus compressis. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 115. n. 13. t. 22. f. 3.
Pluckn. phytoogr. t. 168. f. 4. *Corallina geniculata* mollis americana, segmentis latis & compressis.
Sloan. jam. hist. I. p. 61. t. 20. f. 10. *Fucus marinus* coralloides minor fungosus albidas teres, segmentis in summitate planis.
Habitat ad Jamaicæ littora.
- marginalia. 27. *C. dichotoma*, ramis subcontinuis lævibus complanatis: marginibus subinflexis. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 115. n. 12. t. 22. f. 6.
Habitat ad insulæ Bahamensis, littus, fibris tenerrimis.
- cylindrica. 28. *C. dichotoma*, articulis cylindricis subæqualibus lævibus. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 114. n. 11. t. 22. f. 4.
Habitat in mari, Americanum medium alluent. Gieg.
- oblongata. 29. *C. dichotoma*, articulis oblongis subcompresso-cylindricis. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 114. n. 10. t. 22. f. 1.
Habitat in mari, Americanum medium alluentem, inter oblongatam & cylindricam media.
- obtusata. 30. *C. dichotoma*, articulis oblongo-ovatis utrinque rotundatis subcompressis. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 113. n. 9. t. 22. f. 2.
Habitat ad insularum Bahamensium littus.
- lapides- cens. 31. *C. dichotoma*, articulis cylindricis villosis. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 112. n. 8. t. 21. f. g. & t. 22. f. 9.
Habitat - - - villis subtilibus, brevibus, rubellis, vermicillatim ex poris corticis calcarei progerminantibus.
- burbata. 6. *C. dichotoma*, articulis cylindricis, ramulis apice barbatis. *Pallas el. zooph.* p. 428. n. 9. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 112. n. 7.

VERMES ZOOPHYTA. Corallina.

Ellis corall. p. 54. t. 25. c. C. Rosary or Bead-Coralline of Jamaica.

Pluckn. almag. p. 118. *Corallina fistulosa jamaicensis candida* cum internodiis brevissimis, nostratis Bead-bandstring.

Sloan. jam. cat. p. 4. hist. 1. p. 58. n. 17. t. 20. f. 3. *Corallina major*, nervo crassiori fuciformi intermedia breviora necente.

Habitat ad Jamaicæ littus, tripollicaris & longior, fili grossio, is crassitie.

Rosar n. m. 32. *C. dichotoma*, articulis submoniliformibus inferioribus cylindricis. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 111. n. 6. t. 21. f. h. H. H. 1-3.

Sloan. jam. cat. p. 4. hist. 1. p. 58. n. 18. t. 20. f. 4. *Corallina* nervo tenuiori fragiliorique internodia longiora necente.

Brown. jam. p. 390. n. 3. *Corallium brachiatum & articulatum*, articulis cylindraceis, nervo tenuiore connexis.

Habitat ad Jamaicæ & vicinarum insularum littus, barbatæ affinis.

cuspidata. 33. *C. subtetrachotoma*, articulis cylindricis: geniculis tendinaceo glutinosis, ramulis acutis. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 124. n. 30. t. 21. f. f.

Habitat in mari American mediam alluente, nitidissima, alba, 3 circiter pollices alta.

Tribulus. 34. *C. subpentachotoma*, articulis ancipitibus: geniculis tendinaceo-glutinosis. *Soland.* & *Ellis corall.* p. 124. n. 31. t. 21. f. e.

Habitat in mari American mediam alluente, albida, cuspidata crassior & latior.

Flabel-
lum. 35. *C. fligate simplici incrustato*, ramis omnibus conglutinatis, fronde flabelliformi incrustata subundulata.

Soland. & *Ellis corall.* p. 124. n. 32. t. 24.

Habitat in mari American mediam alluente, figura & colore a virescente fusco ad lacteum varians, nunc folium reniforme pollicem altum, petiolo dilatato referens, nunc lobata & undulata 1-5 pollices alta & late.

Dubiam, et vexatam a multis animalem corallinæ indolem probabilem reddit confitans, quo obducitur, cortex calcarius porosus, et summa specierum nonnullarum cum mieloporis affinitas.

- congluti- 36. C. stipite simplici subincrustato, ramis dichotomis
nata. omnibus conglutinatis, fronde flabelliformi nuda. Soland. & Ellis corall. p. 125. n. 33. t. 25. f. 7.
Habitat ad insularum Bahamenium littus, 1½ pollicem alta, coloris thalassini.
- Phoenix. 37. C. stipite simplici incrustato, fronde oblonga, ramis
undique fasciculatis erumpentibus complanato-connatis.
Soland. & Ellis corall. p. 126. n. 34. t. 25. f. 2. 3.
Habitat ad insularum Bahamenium littus, ladea, 3½ pollices alta.
- Penicil- 7. C. culmo simplici, ramis fasciculatis fastigiatis dichoto-
lus. mis flexilibus continuis.
Ancen. ac. 4. p. 257. t. 3. f. 1. Hydra glomerata.
*Pallas el. zooph. p. 428. n. 10. Corallina culmo stupido-
simplici, apice penicillato, ramulis conferatis dichoto-
mis filiformibus.*
*Soland. & Ellis corall. p. 126. n. 35. t. 25. f. 4-6.
Corallina stipite simplici incrustato, ramis fasciculatis
fastigiatis dichotomis filiformibus articulatis.*
Seb. mus. I. t. 1. f. 10.
*Habitat in mari Americam medium alluente, 1-4 pol-
lices longa, ut plurimum alba, filamentorum tubula-
rium ope testaceis adhaerens.*
- Penicu- 38. C. stipite simplici membranaceo ruguloso, ramis fas-
lum. cculatis fastigiatis dichotomis articulatis. Soland. &
Ellis corall. p. 127. n. 36. t. 7. f. 5-8. & t. 25. f. 1.
*Habitat in mari Americam alluente, sursum dilatatu,
tubolorum ope adhaerens.*
- terrestris. 8. C. brachiata, articulis cylindricis, fructificationibus
lateralibus pedunculatis transversim rugosis.
*Pallas el. zooph. p. 427. n. 8. Corallina opposita ramosa,
articulis cylindricis, fructificationibus lateralibus pe-
dunculatis transversim oblongis.*
*Meese flor. fris. p. 75. n. 503. t. 1. Lichen fruticulosus
ramosus articulatus, articulis longis cylindricis, peltis
pedunculatis.*
*Habitat in Frisiæ ericetis, vix aliquot lineas alta, vix
vera, distincta, perfecta, hujus generis & regni species.*

347. SERTULARIA. *Animal crescens plantæ
habitu.*

*Stirps emittens e cellulis
vel denticulis calyci-
formibus hydras.*

*stirpe tubulosa cornea, denticulis calyciformibus ob-
fita, bæsi affixa, vesiculis hydras, ova vel prolem
vivam continentibus instruenda.*

rosacea. 1. *S. paniculata*, denticulis oppositis, tubulosis truncatis,
ramis alternis, vesiculis coronato-spinosis. Soland. &
Ellis corall. p. 39. n. 7.

Pallas el. zooph. p. 129. n. 78. *Sertularia (Nigellastrum)*
alterne-ramosa, calyculis oppositis tubulosis, ovariis
ovatis truncato-sexspinosis.

Ellis act. angl. 48. t. 23. f. 5. & corall. p. 8. t. 4. Lily
or Pomegranate flowering Coralline.

Seb. mus. 3. t. 69. f. 6.

Habitat in Oceano, & mari mediterraneo, alba, tenera,
testaceis aliisque zoophytis affixa:

pumila. 2. *S. denticulis oppositis mucronatis recurvatis, ovariis
obovatis, ramis vagis.*

Pallas el. zooph. p. 130. n. 79. *Sertularia subsimplex*
articulata, calyculis oppositis recurvis submucronatis,
ovariis ovatis, ore marginato.

Soland. & Ellis corall. p. 40. n. 8. *Sertularia denticulis
oppositis mucronatis recurvatis, ovariis subrotundis.*

Ellis corall. p. 9. t. 5. n. 8. f. a. A. act. angl. 48. t. 23.
f. 6. FF. & 57. t. 19. f. 11. Sea-Oak Coralline.

Raj. syn. p. 37. n. 19. *Corallina pumila*, repens minus
ramosa, denticulis bijugis.

Rezum. ad. Paris. 1711. p. 279. t. 11. f. 4. MM.

Seb. mus. 3. t. 100. f. 1.

Cavolin. pol. mar. 3. p. 216. t. 8. f. 8-10.

Habitat in Oceano, fucis, præfertim ferrato adhærens.

operculata. 3. *S. denticulis oppositis mucronatis erectiusculis, vesiculis
obovatis operculatis, ramis alternis.* Soland. & Ellis
corall. p. 39. n. 6.

Pallas el. zooph. p. 132. n. 80. *Sertularia (usneoides)*
dichotoma, calyculis oppositis bidentatis erectiusculis,
ovariis ovatis operculatisque.

Ellis corall. p. 8. t. 3. n. 6. f. b. B. Sea-Hair.

Pluckn. almag. p. 119. *phytogr.* t. 47. f. 11. *Tournef. inf.* p. 570. *Raj. syn.* p. 36. n. 13. *Corallina muscosa denticulata procumbens*, caule tenuissimo, denticellis bijugis. *Raj. hist. pl.* 3. p. 79. *Muscus marinus denticulatus procumbens* denticulis bijugis.

Moris. hist. pl. 3. p. 650. f. 15. t. 9. n. 2. 3. *Muscus marinus lendiginosus minimus*, arenacei coloris & *Muscus marinus procumbens*, caule tenuissimo, denticellis bijugis.

Bocc. mus. t. 6. f. 8.

Seb. mus. 3. t. 102. f. 3.

Habitat in mari europæo, americano, mediterraneo, radicibus suis in testaceis, rarius in furcis defixa, surculis ad 5 pollices longis, denticulis bicuspidiatis, utrinque seta brevi minutis.

tamaris- 4. *S. denticulis suboppositis truncato subtrideticulatis ves-*
ca. *culis obovatis bidentatis, ramis alternis.* *Fn. suec.* 2240.

Pallas el. zooph. p. 129. n. 77. *Sertularia sparse ramosa, calyculis oppositis tubulosis subdenticulatis, ovarii ovato-bispinosis, ore tubuloso.*

Soland. & Ellis corall. p. 36. n. 1. *Sertularia alternatim ramosa, denticulis oppositis tubulosis crenatis, ovarii ovato truncatis, bidenticulatis, ore tubuloso.*

Ellis corall. p. 4. t. 1. n. 1. f. a. A. Sea-Tamarisk.

Habitat in mari septentrionali, in testaceis reptans, congenerum maxima, abietinæ affinis, ad 4 fere pollices longa.

abietina. 5. *S. denticulis suboppositis tubulosis, vesiculis ovalibus, ramis pinnato alternis.* *Fn. suec.* 2241. *Müll. zool. dan. prodr.* 3072. *O. Fabr.* *Fn. groenl.* p. 442. n. 453.

Pallas el. zooph. p. 133. n. 81. *Sertularia pinnata, pinnis alternis, calyculis suboppositis ovato-tubulosis, ovarii oblongis.*

Soland. & Ellis corall. p. 36. n. 2. *Sertularia alternatim pinnata, denticulis suboppositis ovato-tubulosis, ovarii ovalibus.*

Ellis corall. p. 4. t. 1. n. 2. f. 6. B. Sea-Fir.

Roxen prodr. h. Lugdñ. p. 524. n. 7. *Sertularia ramosissima, articulis membranaceis ovatis alternatim ex finu alterius enascentibus.*

Tournef. inf. p. 571. *Raj. syn.* p. 35. *Corallina marina abietis forma.*

Imper. hist. nat. p. 652. *Pennaria marina.*

Lobel. ic. 2. p. 250. *Muscus coralloides albus alter.*

C. Bauh. pin. p. 365. Abieti similis maritima.
Perkins. theatr. p. 1301. Abies marina.

Clus. hist. 35. Ger. amac. 1574. Abies marina belgica.

*F. Bauh. hist. pl. 3. p. 799. Musci marini genus foliis
pinnatis.*

*Raj. hist. pl. 1. p. 78. Pluckn. almag. p. 119. phyteagr.
t. 48. f. 5. Corallinæ affinis abies marina dicta s. Muscus
marinus major argute denticulatus.*

*Moris. hist. pl. 3. f. 15. t. 9. p. 953. Muscus marinus
silicis folio C. B.*

*Mars. hist. mar. p. 76. t. 17. f. 59. Muscus phyllidiæ
similis.*

Baster op. 2. t. 7. f. 2. 3.

*Habitat in mari europæo, mediterraneo & indicō, teſ-
taceis utplurimum adhærens, crebro serpulis obſelli,
ad 5 pollices longa.*

nigra.

43. *S. pinnata nigricans, calyculis suboppositis minutis,
vesiculis magnis secundis ovato-quadrangulis. Pallas
el. zooph. p. 135. n. 82.*

*Habitat in Oceano indicō? americano? ad Cornubiæ littor-
a, mytilo margaritifero ſæpe affixa, ad 4 pollices longa.*

fuscen-
cens.

44. *S. pinnata fuscefcens, calyculis suboppositis tubulofiſ-
vesiculis crebris secundis minutis trituberculatis.*

Pallas el. zooph. p. 136. n. 83. Sertularia pinnata.

Bast. op. subf. I. l. I. t. I. f. 6.

*Habitat in mari Cornubiæ alluente, nigrae affinis & ex-
griseo fusca.*

obfoleta. 45. *S. pinnata, pinnis alternis calyculis utplurimum octo-
fariam per quincunes dispositis ovato - subcordatis.*

Lepechin. act. Petrop. 1778. 2. p. 137. t. 7. f. 3.

*Habitat in mari glaciali, potissimum ad littora ſabulofa-
promontorii Canin Nos, ad 5 pollices alta, cornet
coloris, articulis superiora versus obfoletioribus, tandem
obfoletissimis.*

Pinus.

46. *S. pinnata, pinnis subalternis cylindricis ob caliculos
utplurimum sexfariam dispositos echinatis, vesiculis utri-
cularibus turgidis subdiaphanis: osculo simplici. Lepe-
chin. act. Petrop. 1780. 1. p. 223. t. 9. f. 1. 2.*

*Habitat circa Promontorium Canin Nos maris albi, ſpiri-
larum ope teſticeis aut lapillis affixa, cornea.*

cūpreffoi- des. 47. *S. pauculata, ramis dichotomis sparsis, calyculis vix
osculo prominulo simplicibus oblique truncatis, vesiculis*

ovatis; osculo subtubuloso, trunco ramisque articulatis: commissuris biannulatis. *Lepechin. act. Petrop.* 1780.

I. p. 224. t. 9. f. 3. 4.

Habitat in mari albo, circa promontorium Canin Nos, cupressinæ affinis, subdiaphana flavicans, vix dimidium pedem longæ.

cupressi- 6. *S. denticulis suboppositis alternis subacutis, vesiculis obovatis, ramis paniculatis longissimis.*

Pallas el. zooph. p. 141. n. 89. Sertularia caule paniculato, ramulis dichotomis sparsis, calyculis suboppositis mucronatis, ovariis bispinosis.

Soland. & Ellis corall. p. 38. n. 5. Sertularia denticulis suboppositis oblique truncatis, ramis paniculatis sparsis longioribus, ovariis obovatis.

Ellis corall. p. 7. t. 3. n. 5. f. a. A. Sea-Cypress. Seb. mus. 3. t. 101. f. 2.

Habitat in maris europæi, præsertim britannici profundis.

sentea. 48. *S. denticulis suboppositis mucronatis, vesiculis ovalibus, ramis alternis paniculatis. Syst. nat. X. I. p. 809. n. 7. Soland. & Ellis corall. p. 38. n. 4.*

Ellis corall. p. 6. t. 2. n. 4. Squirrel's Tail.

Mercat. pin. p. 29. Corallina comis ad instar caudæ vulpinæ sparsis.

Raj. sýn. p. 36. n. 7. Pluckn. alm. p. 119. phytogr. t. 84. f. 3. Corallina muscosa alterna vice denticulata, ramis in creberrima capillamenta sparsis.

Bocc. mus. p. 259. t. 6. f. 9. Muscus albus denticulatus maritimus fruticens & exilis ramosus.

Moris. hist. pl. 3. p. 650. fert. 15. t. 9. n. 4. Muscus marinus miuor, denticulis alternis bijugis.

Baster op. subs. I. t. I. j. I. 2.

Habitat in Oceano europæo & americano, a cupressinæ vere distincta, conservam geniculatam ramosissimum pedalem referens.

rugosa. 7. *S. denticulis alternis obsoletis, vesiculis rugosissimis tridentatis, ramis vagis. Soland. & Ellis corall. p. 52. n. 24. O. Fabr. Fn. groenl. p. 443. n. 454.*

Pallas el. zooph. p. 126. n. 75. Sertularia sertulæ minutæ racemosis, calyculis paucis ovatis rugosissimis, ovariis rugosis tridentatis.

Ellis corall. p. 26. t. 15. n. 23. f. 2. A. Snail-trefoil Coralline.

Habitat in mari europæo, flustræ foliaceæ aliisque sertulariis adhærens.

halecina, 8. *S. denticulis alternis obsoletis, calycibus biarticulatis, vesiculis ovalibus, caulinis coadunatis.* Fn. suec. 2242.
Müll. zool. dan. prodr. 3073. O. Fabr. Fn. groenl. p. 443. n. 455.

Pallas el. zooph. p. 113. n. 64. Sertularia scruposa ramosa pinnata, ramulis alternis calyculis tubuliformibus, ovariis sparsis oblongis.

Soland. & Ellis corall. p. 46. n. 15. Sertularia ramosa pinnata, ramulis alternis denticulis tubiformibus biarticulatis, ovariis ovalibus, pedunculis lateraliter coadunatis.

Ellis corall. p. 17. t. 10. act. angl. 48. t. 17. f. E. F. G. Herring-bone Coralline.

Raj. syn. p. 36. n. 15. Corallina scruposa pennata, caulinis crassi scutulis rigidis.

Seb. mus. 3. t. 100. n. 16.

Edw. glean. t. 286.

Habitat in mari europæo, atlantico, mediterraneo, indico, in teffaceis reptans, cornea, ex griseo lutescens.

Thūja. 9. *S. denticulis distichis appressis, vesiculis obovatis marginatis, stirpe dichotoma disticha.* O. Febr. Fn. groenl. p. 444. n. 456.

Pallas el. zooph. p. 140. n. 88. Sertularia caule simplici paniculato, ramis creberrimis dichotomis acutis, calyculis distichis adpressis, ovariis ovatis.

Soland. & Ellis corall. p. 41. n. 9. Sertularia denticulis distichis alternis appressis, ovariis ovatis marginatis, caule angulato rigido paniculato, ramulis creberrimis dichotomis attenuatis.

Ellis corall. p. 10. t. 5. n. 9. f. b. B. & in front. Bottle brush Coralline.

Raj. syn. p. 50. n. 47. Sibb. Scot. ill. 2. p. 56. t. 1. Fucus equiseti facie, ostreæ testæ adnatus.

Seb. mus. 3. t. 100. f. 17-19. & t. 106. f. 2. a. Corallina equiseti forma.

Habitat in mari septentrionali, mediterraneo, antipathicu cuppresso similis, ad $\frac{1}{2}$ pedem longa.

Myrio- 10. *S. denticulis secundis acutis, vesiculis secundis cylindricis phyllum. imbricatis, surculis semipinnatis incurvatis.* Fn. succ. 2243.

Pallas el. zooph. p. 153. n. 96. Sertularia simplex pinnata, rhachi interrupta, pinnis secundis incurvis, calyculis campanulatis stipulatis.

Soland. & Ellis corall. p. 44. n. 13. *Sertularia pinnata*,
pinnis alternis, rhachi nodosa, nodulis externe arcuatis
distantibus, denticulis secundis truncatis stipulatisque.
Ellis corall. p. 14. t. 8. Pheasant's tail Coralline.

Barrel. ic. plant. 1292. f. 2. *Petiv. pl. ital. t. 2. f. II.*
Corallina fruticosa pennata.

C. Bauh. pin. p. 363. *Muscus maritimus*, *filicis folio*.
Moris. hist. pl. 3. p. 650. *Muscus marinus pennatus*,
ramulis & capillamentis falcatis.

Zanich. monogr. Venet. 1714. *Ginann. adr. t. II. f. 24.*
Myriophyllum pelagicum. Anisocalicum.

Donat. adr. p. 24. Anisocalicum.

Habitat in Oceano, maii mediterraneo, pallida, subco-
riacea; 3 circiter pollices longa, rhachis pennæ referens,
a latere anteriore sulco exarata, pennata radiis e sulco
alternis, simplicibus, approximatis, alterno divarica-
tis, parallelis, æqualibus, articulatis incurvis, vesiculis
solitariis e singulis radiis articulis, a latere incurvato,
cylindricis, pellucidis, ranno approximatis, brædea subu-
lata se dimidio brevioribus.

hypnoi- 49. *S. surculis pinnato-ramosis pinnulatis*: pinnulis creber-
rimis, calyculis secundis campanulatis dentatis rostra-
tisque. *Pallas el. zooph. p. 155. n. 97.*

Habitat in Oceano indico, semipedalis, ex fusco cornea,
radiculis lutescentibus intricatis.

Speciosa. 50. *S. pinnata rigida*, pinnis subsecundis incurvis, calyculis
campanulato effusis dentatis stipulatisque. *Pallas el.*
zooph. p. 152. n. 95.

Habitat in Oceano indico, ex fusco cornea, surculis cre-
berrimis 3-4 pollicum, radiculis tubulosis fasciculatis
implexis gorgoniae adhaerens.

falcata. 11. *S. denticulis secundis imbricatis truncatis*, vesiculis ovatis,
ramis pinnatis alternis. *Fn. suec. 2244.*

Pallas el. zooph. p. 144. n. 90. *Sertularia flexuosa al-*
ternatim ramosa, ramis pinnatis, calyculis secundis
consertis tubulosis, vesiculis ovatis sparsis.

Soland. & Ellis corall. p. 42. n. 11. *Sertularia denticulis*
secundis imbricatis truncatis, ovariis ovato-oblongis,
ramis pinnatis alternis, caule flexuoso.

Ellis corall. p. 12. t. 7. n. 11. f. a. A. & in front.
centr. Sickle-Coralline.

Raj. syn. 3. p. 36. n. 16. Morif. hist. 3. p. 650. f. 15^t. 9. f. 2. Pluckn. alm. p. 119. phytogr. t. 47. f. 12. Tournef. inst. 1. h. p. 570. Muscus f. Corallina multcosa pennata, ramulis & capillamentis falcata.

Merr. pin. p. 81. Johns. merc. hot. 2. p. 26. phyt. brit. p. 78. Muscus marinus spiralis pennatus.

β) Syst. nat. X. 1. p. 813. n. 29. Sertularia stipulata. Ellis corall. t. 38. f. 5. 6.

Habitat in Oceano, & mari indico, 3 pollices ad $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ pedem longa, tubulis capillaribus radicularum vices agentibus.

Pluma. 12. *S. denticulis secundis imbricatis campanulatis, vesiculis gibbis cristatis, surculis pinnatis alternis lanceolatis.*

Fn. suec. 2245. Soland. & Ellis corall. p. 43. n. 12.

Pallas el. zooph. p. 149. n. 93. Sertularia surculis pinnatis falcatis, calyculis secundis campanulatis, ovariis gibbis annulatim muricatis cristatisque.

Ellis corall. p. 13. t. 7. n. 12. f. b. B. Podded Coralline.

Seb. mus. 3. t. 101. f. 1. Corallina falciformis.

Bocc. mus. p. 257. t. 6. f. 6. Pinnaria marina Imperati.

Mercat. metall. arm. 6. c. 19. p. 129.

Cavol. fin. pol. mar. 3. p. 210. t. 8. f. 5.

Habitat in Oceano omni, radiculis in circulo dispositis fucis adhaerens.

echinata. 13. *S. denticulis oppositis secundis campanulatis, vesiculis gibbis cristatis, surculis pinnato alternis lanceolatis.*

*Fn. suec. 2246.**

Pallas el. zooph. p. 152. n. 94. Sertularia pinnata, ramulis bifidis, calyculis oppositis semicampanulatis, ovariis reticulato-muricatis.

Habitat in mari Sueciam alluente.

antenni- 14. *S. denticulis verticillato-quaternis setaceis, vesiculis oblique truncatis verticillatis, stirpis subsimplicibus.*

Fn. suec. 2245.

Pallas el. zooph. p. 146. n. 91. Sertularia surculis subsimplicibus verticillatis, setulis secunde calyculatis, ovarisque axillaribus pedunculatis oblique truncatis.

Soland. & Ellis corall. p. 45. n. 14. Sertularia surculis subsimplicibus verticillatis, setulis denticulis secundis calyciformibus, ovariis axillaribus pedunculatis obliqua truncatis.

Ellis corall. p. 15. t. 9. Lobster's Horn-Coralline or Sea-Board.

Raj. syn. 3. p. 34. n. 10. Petiv. pl. it. 2. f. 10.
Corallina astaci corniculorum æmula.

Dodon. peript. p. 476. Muscus marinus secundus.

Bocc. mus. p. 258. t. 6. f. 2. Fucus vermiculatus asper
alter, s. Polytubuli arteriosi maritimi asperiusculi.

Plurkn. almag. p. 119. phytogr. t. 43. f. 6. Corallinæ
affinis non ramosa, arenacei coloris, astacorum cor-
niculi instar geniculata.

Raj. hist. pl. p. 79. Muscus marinus equisetiformis non
ramosus.

Ginann. opusc. 16. t. 11. f. 25. Myriophyllum non
ramosum.

Tournef. inst. 1. h. p. 570.

Barrel. pl. ic. 1292. n. 3.

β) Raj. syn. p. 35. n. 11. Corallina ramosa cirris obsita;
Ellis ad. angl. 48. t. 22.

Habitat in Oceano, jæpe fere pedalis, flava, radiculis
tubulosis tenuissimis, capillaceis, flavescensibus, ves-
culis solitariis ad setarum articulos a latere interiorè
vel superiorè.

Verticilla- 15. S. denticulis obsoletis, vesiculis campanulatis denticu-
ta, latis erectis, pedunculis longissimis contortis quaternis.

Pallas el. zooph. p. 115. n. 66. Sertularia scruposa sub-
ramosa, calyculis campanulatis pedunculatis verticil-
latisque.

Soland. & Ellis corall. p. 53. n. 21. Sertularia subra-
mosa, denticulis campanulatis pedunculatis margine
dentatis suberectis verticillatisque, ovariis ovato-tubu-
losis.

Ellis corall. p. 23. t. 13. n. 20. f. a. A: Horse-tail
Coralline with bell-shaped Cups.

Habitat in Oceano, plures pollices longa, tenera & fra-
gilis, denticulis glutinosis.

Gelatino- 51. S. scruposo-gelatinosa ramosissima, ramis decompositis
divaricatis sparsis, calyculis campanulatis. Pallas el.
zooph. p. 116. n. 67.

Raj. syn. p. 34. n. 7. Corallina confervoides gelatinosa
alba, geniculis crassiusculis pellucidis.

Habitat in mari Belgium alluente; geniculatae affinis,
 $\frac{1}{2}$ pedem longa, ex griseo fusca, cortice hyalino.

Volubilis. 16. S. denticulis obsoletis, vesiculis campanulatis dentatis
alternis, pedunculis longissimis contortis solitariis. O.
Fabr. Fn. groenl. p. 444. n. 457.

Pallas el. zooph. p. 121. n. 70. Sertularia (uniflora) calyculis solitariis campanulatis, pedunculis radicatis longissimis contortis.

Soland. & Ellis corall. p. 51. n. 22. t. 4. f. e. f. E. F. Sertularia denticulis campanulatis dentatis alternis, pedunculis longissimis contortis, ovariis ovatis interdum transverse rugosis.

Ellis corall. p. 24. t. 14. n. 21. f. a. A. act. angl. 48. t. 22. f. 2. Small climbing Coralline with bell-shaped cups.

Ellis act. angl. 57. p. 437. t. 19. f. 9. Sertularia uniflora. Baßl. opusc. subi. I. t. 2. f. 2. a. b. d. & f. 3. 4. c. e. & f. 7. a. b. c.

Habitat in Oceano, aliis congeneribus adnata, flustris, fucisive, tenera, albida.

Syringa. 17. *S. denticulis obsoletis, vesiculis cylindricis pedunculo integririmo.*

Pallas el. zooph. p. 122. n. 71. Sertularia calyculis solitariis cylindricis, pedunculis calyculo brevioribus contortis.

Soland. & Ellis corall. p. 52. n. 23. Sertularia (repens) denticulis cylindricis oblique truncatis alternis, pedunculis contortis denticulis brevioribus.

Ellis corall. p. 25. t. 14. f. b. B.

Habitat in Oceani europei sertulariis, testaceis, flavescens.

Cuscuta. 18. *S. denticulis obsoletis, vesiculis ovatis axillaribus ramis opposito simplicibus. Soland. & Ellis corall. p. 53. n. 27.*

Pallas el. zooph. p. 125. n. 74. Sertularia repens geniculata opposita ramosa, vesiculis axillaribus ovalibus.

Ellis corall. p. 28. t. 14. n. 26. f. c. C. Climbing Dodderlike Coralline.

Müll. zool. dan. 3. p. 62. t. 117. f. 1-3.

Habitat in mari anglico, fucis adhaerens.

pustulosa. 52. *S. articulata sparsim & alternatim ramosa, geniculis superne obsolete denticulatis. Soland. & Ellis corall. p. 54. n. 28.*

Ellis corall. p. 54. t. 27. f. b. B. Dichotomous tubular Coralline.

Habitat ad littora insulæ Wight, tenera, ad 4 pollices longa.

*frutic-
cens.* 53. *S. ramosa tubulosa pinnata, pinnulis setaceis alternis arietis, denticulis secundis cylindrico-campanulatis.*

Soland. & Ellis corall. p. 55. n. 29. t. 6. f. a. A.

Habitat ad Angliæ littora, durior congenibus, nigra, ramis fuscis.

Pinaster. 54. *S. simplex pinnata*, pinnis alternis, denticulis oppositis basi cauli appressis, apice tubulosis incurvis, vesiculis secundis majoribus ovato-quadrangulis: angulis mucronatis, ore tubuloso. *Soland. & Ellis corall. p. 55. n. 30. t. 6. f. b. B.*

Habitat - - -

Peanatu-la. 55. *S. simplex pinnata*, pinnis incurvis articulatis, denticulis secundis campanulatis corniculo truncato suffultis: marginibus crenatis, spinis duabus oppositis instructis. *Soland. & Ellis corall. p. 56. n. 31. t. 7. f. 1. 2.*

Habitat in Oceano Indico, ex lutescente fusca, 5-6 pollices longa.

Filicula. 56. *S. ramosissima pinnata* stirpe flexuosa, ramulis ex angulis alternis, denticulis ovato-tubulosis singulis ad axillas erectis, vesiculis obverse ovatis apice tubulatis. *Soland. & Ellis corall. p. 57. n. 32. t. 6. f. c. C.*

Habitat ad Angliæ littora, tenerrima, adietinæ affinis.

Quadri-dentata. 57. *S. simplex articulata repens*, denticulis quaternis oppositis ventricolis, articulis subturbinatis basi contortis. *Soland. & Ellis corall. p. 57. n. 33. t. 5. f. g. G.*

Habitat ad Africæ littora, fuso lendigero adhaerens.

Spicata. 58. *S. stirpe tubulosa paniculata annulata*, ramulis crebermis trichotomis ad annulos verticillatim dispositis, denticulis ternis cylindricis cæcisque terminalibus, vesiculis ovatis axillaribus. *Soland. & Ellis corall. p. 58. n. 34.*

Habitat - - -

Evansi. 59. *S. ramosa*, ramis oppositis, denticulis brevibus oppositis, vesiculis ramosis lobatis oppositis ex tubulo reptante enascentibus. *Soland. & Ellis corall. p. 58. n. 35.*

Habitat ad Angliæ littora, gracillima, 2 pollices alta, fucis adhaerens, flava, vesiculis fulvis. Evans.

Muricata. 60. *S. articulata*, denticulis pedunculatis ex singulis articulis alternis, vesiculis subglobosis cristatis muricatis pedunculatis ex tubulis radiciformibus enascentibus. *Soland. & Ellis corall. p. 59. n. 36. t. 7. f. 3. 4.*

Habitat ad Scotiæ littora.

secunda- 61. *S. minima alba*, stirpe incurva, denticulis secundis
ria, campanulatis, vesiculis axillaribus. *Cavol. pol. mar.*
3. p. 226. t. 8. f. 15. 16.

Habitat in mari mediterraneo, vix 3 lineas alta, statim
tenerimæ crassitie.

misenen- 62. *S. ramosissima dichotoma*, denticulis alternis tenuissimis
divaricatis, vesiculis ovalibus pedunculatis axillaribus.
Cavolin. polip. mar. 3. p. 187. t. 7. f. 1. 2.

Habitat in mari mediterraneo, circa promontorium Misenense,
tenella, apicem versus pellucida, a cancro liniari infestata.

racemosa, 63. *S. stirpe recta tereti ramosa opaca*, cornea, denticulis
sparsis pellucidis, vesiculis racemosis, ramis subarcua-
tis. *Cavolin. pol. mar. 3. p. 160. t. 6. f. 1. 2.*

Habitat in mari mediterraneo, potissimum ad promonto-
rium Misenense.

Uva. 19. *S. subramosa denticulis obsoletis, vesiculis ovatis race-*
mosis, ramis vagis. Soland. & Ellis corall. p. 53. n. 26.
Pallas el. zooph. p. 123. n. 72. Sertularia (acinaria) rep-
tans subramosa, calyculis terminalibus oblongis, ova-
riis vesicularibus.

Ellis corall. p. 27. n. 25. t. 15. f. C. Grape Coralline.
Habitat ad Seelandiae & magnæ Britanniae littora, fascis
aliisque zoophytis adhærens, vesicalis hyalinis, nucleo
albo.

lendigera, 20. *S. denticulis obsoletis, calycibus secundis cylindricis p**
arallelis pauci congestis, stirpibus filiformibus. Fn.
suec. 2248.

Pallas el. zooph. p. 124. n. 73. Sertularia geniculata
dichotoma implexa, calyculis cylindricis ad genicula
congestis parallelis.

Soland. & Ellis corall. p. 52. n. 25. Sertularia articulata
subdichotoma implexa, denticulis cylindricis secundis
parallelis ad genicula minoribus.

Cavolin. pol. mar. 3. p. 229. t. 9. f. 1. 2. Sertolara lendinosa,
Ellis corall. p. 27. t. 15. n. 24. f. b. B. Nit-Coralline.
Raj. syn. p. 38. n. 3. Fucoides lendigerum, capillamen-
tis cuscute justar implexis.

Habitat ad magnæ Britanniae, Belgii, Italie littora,
fucis aliisque zoophytis adhærens.

genicula- 21. *S. denticulis alternis contortis, vesiculis obovatis subro-*
stratis, stirpe geniculata flexuosa. Fn. suec. 2. n. 2249.

- En. suec.* I. 2241. *Sertularia flexuosa*,
Pallas el. zooph. p. 117. n. 68. *Sertularia subsimplex*
 geniculata mollis, calyculis alternis subturbinatis,
 ovariis axillaribus ovato-truncatis.
Soland. & Ellis corall. p. 49. n. 20. *Sertularia den-*
ticulis alternis calyciformibus, pedunculis contortis,
 ovariis ovato-truncatis axillaribus.
Ellis corall. p. 22. t. 12. n. 19. f. b. *B. act. angl.*
 48. t. 22. f. 1. Knotted Sea-thread Coralline.
Cavolin. pol. mar. 3, p. 205. t. 8. f. 1. 2. *Sertularia*
 geniculata.
Loest. act. Stockh. 1752. p. 114. t. 3. f. 5-10. *Ma-*
 drepora plantiformis mollis, canale flexuoso, ramis
 alternis turbinatis.
Müll. zool. dan. 3. p. 3. p. 61. t. 117. f. 1-4.
Habitat in mari septentrionali, mediterraneo, stirpibus
semipollucaribus.

- Dichotoma.* 22. *S. denticulis obsoletis, vesiculis obovatis axillaribus,*
pedunculis intortis, stirpe dichotoma geniculata.
Pallas el. zooph. p. 119. n. 69. *Sertularia (longissima)*
 longa alterne ramosa, ramis subdivisis, calyculis ter-
 minalibus campanulatis, ovariis axillaribus.
Soland. & Ellis corall. p. 48. n. 19. *Sertularia longif-*
sima ramosa dichotoma, denticulis campanulatis, pe-
dunculis annulosis contortis, ovariis ovatis axillaribus.
Ellis corall. p. 21. t. 12. n. 18. f. a. c. A, C. Sea-
 thread Coralline.
Cavolin. pol. mar. 3. p. 194. t. 7. f. 5-7.
Habitat in mari septentrionali & mediterraneo, peden-
sæpe longa, junior, albida, adultior testacea.

- Spinosa.* 23. *S. denticulis obsoletis, calyculis ovato-subulatis,*
ramis dichotomis spinosis.
Pallas el. zooph. p. 114. n. 65. *Sertularia (sericea)*
 scruposa gelatinosa ramosa, ramulisque creberrimis
 teneris dichotomis hirsuta.
Soland. & Ellis corall. p. 48. n. 18. *Sertularia mollis*
 ramosa pellucida, ramulis creberrimis teneris dicho-
 tomis in spinas terminatis, denticulis obsoletis se-
 cundis distantibus, ovariis vesiculæformibus.
Ellis corall. p. 20. t. 11. f. n. 17. f. b. d. B. C.
 D. Silk-Coralline.
Habitat in mari europæo, mediterraneo, 8 sæpe pol-
liges longa.

- pinnata. 24. *S. denticulis obsoletis, vesiculis oblongis, stirpe simplici pinnata lanceolata.*
Pallas el. zooph. p. 148. n. 92. Sertularia (setacea) simplex pinnata, pinnis alternis erectis, calyculis remotissimis secundis, ovariis oblongis axillaribus.
Soland. & Ellis corall. p. 46. n. 16. Sertularia simplex pinnata & articulata, pinnis alternis arcuatis, denticulis semicampanulatis secundis, ovariis ovatis confertis ore coronatis.
Cavolin. pol. mar. 3.
Ellis corall. p. 19. t. II. n. 16. f. a. A. Sea-Bristles.
Raj. syr. p. 38. n. 6. & p. 39. n. 7. Fucoides setaceum.
Habitat in mari anglico & indico, 3 pollices alta, vesiculis racemosis.
- Setacea. 64. *S. simplex pinnata, pinnis alternis subincurvatis, denticulis obsoletis remotissimis secundis, vesiculis oblongo-tubulatis axillaribus.* *Soland. & Ellis corall. p. 47. n. 17. Synt. hat. X. 1. p. 813. n. 28. Sertularia setacea.*
Cavolin. pol. mar. 3. p. 228. Sertularia pennata.
Ellis corall. t. 38. f. 4.
Habitat in mari septentrionali & mediterraneo, 1½ pollicem alta, pinnata duplo angustior.
- polyzo-nias. 25. *S. denticulis alternis subdenticulatis, vesiculis obovatis polyzoniis, stirpe ramosa.* *Fn. juec. 2250.*
Pallas el. zooph. p. 127. n. 76. Sertularia (ericoides) subramosa, calyculis alternis ovatis subdenticulatis, ovariis ovatis rugosis.
Soland. & Ellis corall. p. 37. n. 3. Sertularia sparse ramosa, denticulis ovatis alternis, ovariis obovatis transverse rugosis.
Cavolin. pol. mar. 3. p. 224. t. 8. f. 12-14. Sertularia polyzonaria.
Ellis corall. p. 5. t. 2. n. 3. f. a. b. A. B. Great Tooth. Coralline.
Raj. syr. p. 35. n. 13. Corallina minus ramosa, alterna vice denticulata, denticulis lineis transversis externe ictiatis.
Sci. mus. 3. t. 102. n. 4. & t. 103. n. 6.
Habitat in mari sere omni, marinis variis adhaerens.
- Pennaria. 26. *S. denticulis secundis, stirpe contorta bipinnata.*
Cavolin. pol. mar. 3. p. 134. t. 5. f. 1-6.
Habitat in mari indico? mediterraneo, cespitosa rupibus, lepadibus &c. adhaerens, setæ porcinæ crassitie, sursum

sensim, at lente attenuata, recta adscendens, cornea, flexilis, fusca, ramis albidis, denticulis albis sursum versis, aequo distantibus, 10 circiter in singulis ramis, ovariis ovalibus in singulis denticulis uno vel binis.

Lichenas- 27. *S. denticulis obtusis bifarium imbricatis, vesiculis obovatis secundis parallelis, stirpe pinnata, ramis dichotomis.*

Soland. & Ellis corall. p. 42. n. 10. Sertularia (Lonchitis) articulata pinnata, denticulis alternis distichis appressis, ovariis ovatis operculatis.

Pallas el. zooph. p. 138. n. 85. Sertularia ramosa pinnataque, calyculis distichis appressis, ovariis secundis ovato-campanulatis minoribus.

Ellis corall. p. 11. t. 16. Sea-Splean wort or Polypody. Habitat in Oceano Indico, mari hibernico, & inter Asiam borealem & Americam intermedio, ramis bifarium imbricatis.

Cedrina. 28. *S. denticulis subcylindricis tubulosis quadrifarium imbricatis, ramis vagis quadrangulis sursum incrassatis.*

Pallas el. zooph. p. 139. n. 86. Sertularia subramosa, calyculis subcylindricis quadrifarium imbricatis.

Habitat in mari Kamtschatcam circumfluentem, squalens, ramis dichotomis. obtusis, quadrifarium imbricatis.

Steller.

Purpurea. 29. *S. denticulis subovatis tubulosis quadrifarium subimbri-catis, vesiculis erectis campanulatis, ramis dichotomis quadratis.*

Pallas el. zooph. p. 140. n. 87. Sertularia dichotoma quadrangularis, calyculis subovatis tubulosis quadrifaria subimbri-catis, ovariis erectis campanulatis.

Habitat in mari Kamtschatcam alluente, tota ex atro purpurea, festigata.

Articulata. 65. *S. articulata pinnata, calyculis appressis, vesiculis secundis ovatis operculatisque majusculis. Pallas el. zooph. p. 137. n. 84.*

Habitat in mari atlantico, in testaceis reptans, bipollicaris, lutea, an distincta species?

Glicina. 66. *S. scruposa ramosa pinnata pennulataque, pinnulis ethachis fulco alternis, calyculis secundis imbricatis, vesiculis articulatis. Pallas el. zooph. p. 156. n. 98.*

Habitat in Oceano Indico, pallida, rigida, 3 pollices longa, & longior, an eadem cum Pennaria?

fruticans. 67. *S. scruposa lignosa ramosa pinnataque, pinnulis setaceis alternis, calyculis secundis semicampanulatis*. Pallas el. zooph. p. 157. n. 99.

Habitat in mari americano? cespitosa testaceis insidens, ex lutescente grisea ligneo-suberosa, 6 pollices longa.

** *stirpe crustacea, lapidescente, e cellulis seriatim composita, ovarii distinctis nullis, sed earum loco bullulis, Cellariæ, vel Cellulariæ.*

Bursaria, 30. *S. denticulis oppositis compressis fastigiatis, ramis dichotomis*. Fn. suec. 2252.

Pallas el. zooph. p. 65. n. 23. *Cellularia ramosa articulata, cellulis bijugis pellucidis carinatis, tubuloque adnato subclavato auctis.*

Soland. & Ellis corall. p. 25. n. 9. *Cellaria ramosa articulata, cellulis oppositis pellucidis carinatis, tubulo adnato subclavato auctis.*

Ellis corall. p. 41. t. 22. n. 8. f. a. A. Shepherd's purse Coralline.

Habitat in mari anglico, fucis adnærens, minuta, flexilis, hyalina.

Loricula- 31. *S. denticulis oppositis oblique truncatis obsoletis, ramis dichotomis erectis*. Fn. suec. 2253.

Pallas el. zooph. p. 64. n. 22. Soland. & Ellis corall. p. 24. n. 8. *Cellularia ramosissima articulata grysea, cellulis bijugis oblique truncatis.*

Ellis corall. p. 40. t. 21. n. 7. f. b. B. Coat of Mail Coralline.

Pluckn. mant. 56. *Corallina geniculata mollis, interno-dii rotundis brevioribus.*

Raj. suppl. 15. *Muscus coralloides mollis clatior ramosissimus.*

Habitat in mari anglico, antiquas saepe sertularias cingens, sesquipolllicaris.

fastigiata. 32. *S. denticulis alternis acutis, ramis dichotomis erectis fastigiatis*. Fn. suec. 2254. O. Fabr. Fn. groenl. p. 445. n. 458.

Pallas el. zooph. p. 66. n. 24. *Cellularia (plumosa) mollis fibrosa, ramolissima, ramulis dichotomis fastigiatis.*

Soland. & Ellis corall. p. 21. n. 1. *Cellaria (plumosa) cellulis unilateralibus alternis extrosum acutis, ramis dichotomis erectis fastigiatis.*

Ellis corall. p. 33. t. 18. Soft-feathered Coralline.

Carolin. pol. mar. 3. p. 237. t. 9. f. 3.4. *Sertolare fastigiate.*

Raj. syn. p. 37. n. 20. & p. 330. *Corallina pumila erecta* ranunculina & *Fucus minimus hirsutus*, fibrillis herbaceis terminalis.

Habitat in mari anglico.

Vicula. 33. *S. denticulis secundis suboppositis mucronato-appendiculatis, calycibus globo-mucronatis sessilibus, ramis dichotomis continuae fastigiatis.*

Pallas el. zooph. p. 68. n. 26. *Cellularia latiuscula dichotoma fastigiata, cellulis ore galeato biseptis, necariis marginalibus.*

Soland. & Ellis corall. p. 22. n. 3. *Cellaria latiuscula dichotoma erecta, cellulis unilateralibus alternis biseptis, ore galeato, appendiculis instar avium capitum marginalibus.*

Ellis corall. p. 36. t. 20. n. 2. f. a. A. Bird's-head Coralline. *Habitat in mari inter Angliam & Belgiam Germaniamque intermedio, flustris affinis, fragilis, sordida, ex cinereo grisea, $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ pollicem longa, cellularum seriebus longitudinalibus 3-5.*

Heritina. 34. *S. denticulis alternis secundis acutis, ramis dichotomis inaequalibus erectis.*

Pallas el. zooph. p. 67. n. 25. *Cellularia mollis dichotoma grysea, cellulis alternis extorsum mucronatis interjectisque galericulis labiatis albis.*

Soland. & Ellis corall. p. 22. n. 2. *Cellaria dichotoma ferruginea, cellulis alternis unilateralibus extorsum mucronatis, ovulis subtestaceis nitidis interjectis, osculis margine subfuscocinctis.*

Ellis corall. p. 35. t. 19. & act. angl. 48. p. 115. t. 5. f. a. A. *Habitat in mari mediterraneo & Americam medium alluvente, mollis, cellularum serie dupli.*

Scruposa. 35. *S. denticulis alternis angulatis spinosis, ramis dichotomis reptantibus. Fn. suec. 2255.*

Pallas el. zooph. p. 72. n. 30. Soland. & Ellis corall. p. 23. n. 5. *Cellularia reptans lapidosa dentata dichotoma, cellulis alternis unilateralibus.*

Ellis corall. p. 38. t. 20. n. 4. f. c. C. Creeping flony Coralline.

Habitat in mari indico, mediterraneo, americano, europeo, fragilissima, linearis, pallida, cellularum ordine dupli.

Cellaria flustris & corallinis affines, per eburneum & cornutum, quibus vesiculae distinguuntur, cum fortularis coherent.

- pilosæ. 68. *S. dichotoma fastigiata lapidosa*, cellulis alternis obliquis ore prælongo subsolitario.
Pallas el. zooph. p. 72. n. 29. Cellularia pilosa.
Habitat in mari mediterraneo, scruposæ affinis, vix & linearum.
- crispæ. 69. *S. ramosissima dichotoma elongata crispæ*, articulis de-
 presis ovatis uno latere celliferis.
Fallas el. zooph. p. 71. n. 28. Cellularia crispæ.
Seb. mus. 3. t. 101. n. 8.
*Habitat in Oceano orientali, grandis, flexilissima, pal-
 lide griseæ.*
- floccosæ. 70. *S. ramosissima dichotoma fastigiata*, articulis subcunci-
 formibus uno latere celliferis.
Pallas el. zooph. p. 70. n. 27. Cellularia floccosæ.
*Habitat in Oceano indico, insignis, albæ, geniculæ
 subgriseis flexilibus.*
- reptans. 36. *S. denticulis alternis bidentibus, ramis dichotomis re-
 tantibus*. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 445. n. 459.*
*Pallas el. zooph. p. 73. n. 31. Cellularia repens dichotoma
 articulata, cellulis unilateralibus bijugis, ore subciliato.*
*Solnd. & Ellis corall. p. 23. n. 4. Cellaria reptans dicho-
 toma articulata, cellulis alternis unilateralibus, osculis
 bifurcatis.*
Ellis corall. p. 37. t. 20. n. 3. f. b. B. Creeping Coralline.
Raj. syn. app. p. 330. Muscus coralloides pumilus ramosus.
*Habitat in mari europæo, flustræ foliaceæ fascisque adhae-
 rens, scruposæ affinis, albæ, vel pallide grisea, $\frac{1}{2}$ -
 pollicis.*
- parasitica. 37. *S. denticulis verticillatis turbinatis ciliatis parasiticis*. *O.
 Fabr. Fn. groenl. p. 447. n. 461.*
*Cavolin. poi. mar. 3. p. 181. t. 6. f. 8-13. Sertularia
 parasita.*
*Habitat in mari septentrionali & mediterraneo, aliis seru-
 laris corellinique adhaerens, obscure rubra, ramis
 translucentibus, denticulis terminalibus, adulteribus
 ovigeris; an hujus tribus?*
- ciliata. 38. *S. denticulis alternis ciliatis infundibuliformibus, ramis
 dichotomis erectis*. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 446. n. 460.*
*Pallas el. zooph. p. 74. n. 32. Cellularia moliuscula di-
 chotoma, fastigiata, cellulis binatis alternis turbinatis,
 ore patulo ciliato.*

Soland. & Ellis corall. p. 24. n. 6. *Cellaria cellulis alternis ciliatis*, ore obliquo patulo, ramis dichotomis erectis.
Ellis corall. p. 38. t. 20. n. 5. f. d. D. Ciliated Coralline.
Habitat in mari anglico, norwegico, aliis sertulariis, fucis, spongiis adnata, albida, 4·5 lineas alta.

eburnea. 39. *S. cellulis alternis truncatis prominulis, vesiculis gibbis rostratis, ramis patulis.* *Soland. & Ellis corall.* p. 24. n. 7.

Pallas el. zooph. p. 75. n. 33. *Cellularia vesiculifera erecta dichotoma articulata, articulis linearibus, poris tubulosis alternis.*

Ellis corall. p. 39. t. 21. n. 6. f. a. A. Tufted Ivery Coralline.

Carolin. pol. mar. 3. p. 240. t. 9. f. 5-7. Sertolara d'avorio.
Habitat in mari europaeo, mediterraneo, aliis marinis adhaerens, ad pollicem usque alta, alba.

cornuta. 40. *S. denticulis alternis truncatis spinis adjectis, vesiculis gibbis rostratis, ramis alternis.*

Pallas el. zooph. p. 76. n. 34. *Cellularia (falcata) vesiculifera erecta articulata subpinnataque, cellulis solitariis tubulosis curvatis, seta longissima ad os.*

Soland. & Ellis corall. p. 25. n. 10. *Cellaria vesiculifera ramosa articulata, cellulis simplicibus tubulosis curvatis altera super alteram, seta ad osculum longissima.*

Ellis corall. p. 42. t. 21. n. 10. f. c. C. Goat's-horn Coralline.
Habitat in maris europaei & mediterranei fucis, lapidosa, albiflava, vix 4 lineis longior.

loricata. 41. *S. deutericulis secundis concatenatis ore subtus cornuto, ramis alternis.*

Pallas el. zooph. p. 77. n. 35. *Soland. & Ellis corall.* p. 25. n. 11. *Cellularia (chelata) fragilissima dichotoma, cellulis corniformibus concatenatis, ore marginato, spina infera.*

Ellis corall. p. 42. t. 22. n. 9. f. b. B. Bull's-horn Coralline.
Habitat in mari anglico, mediterraneo, gorgoniis, fucis adhaerens, exigua, veluti vitrea.

anguina. 42. *S. denticulis nullis, surculis simplicissimis clavatis obtusis apertura lateralii.*

Pallas el. zooph. p. 78. n. 36. *Cellularia tubulis solitariis subclavatis, apertura lateralii.*

Soland. & Ellis corall. p. 26. n. 12. *Cellaria cellulis simplicissimis, tubulis obtusis clavatis, apertura lateralii.*

Ellis corall. p. 43. t. 22. n. 11. f. c. C. D. Snake Coralline.

Carolin. pol. mar. 3. p. 221. t. 8. f. 11.

Habitat in mari septentrionali & mediterraneo, albo, mollissima, flexilissima, fucis aliisque marinis adhaerens, scandens, formam varians, sertulariani hydrenagens.

S. articulata ramosa, articulis subcylindricis, osculis cellularum undique prominulis. *Soland. & Ellis corall. p. 26. n. 14. t. 5. f. b. B. C. D. E.*

Habitat in mari mediterraneo ad Barbariae littora, 3 pollices alta, exalbida, lapidosa, aggregata, articulis $\frac{1}{2}$ pollicis longis.

S. stirpe articulata lapidea subdiaphana, articulis clavatis, cellulis ternis dentatis connexis ex apicibus articulorum excurrentibus & fæpe terminantibus. *Soland. & Ellis corall. p. 27. n. 15. t. 5. f. a. A.*
Habitat ad Jamaicæ, insularumque vicinarum littora, fuso adhaerens, candidissima, $\frac{1}{2}$ pollicem alta.

S. lapidea articulata ramosa dichotoma, articulis subcuneiformibus uno latere cellulosis. *Soland. & Ellis corali. p. 28. n. 16. t. 4. f. c. C.*
Habitat ad insularum Bahamensum littora, cespitosa, alba, 2 circiter pollices alta, articulis altero latere convexis striatis, altero complanatis celliferis, cellulis 3pli serie dispositis.

S. lapidea articulata ramosa dichotoma incurvata, articulis subciliatis ovato-truncatis uno latere planis celliferis. *Soland. & Ellis corall. p. 29. n. 17. t. 4. f. d. D.*
Habitat in Oceano Indico, 2 circiter pollices alta, articulis altera parte convexis striatis, altera complanatis celliferis, cellularum per tubulos flexiles connexarum in singulis articulis serie dupli, osculis ovalibus.

S. ramosa dichotoma articulata repens, articulis angulatis subturbanatis, cellulis ternis unilateralibus. *Soland. & Ellis corall. p. 30. n. 18.*
Habitat in mari scotico, lapidosa, semipellucida.

S. dichotoma filiformis, articulis linearibus quadrilateris, cellulis oblongis.
Pallas et. zooph. p. 63. n. 21. β. Cellularia filiformis.
Habitat in Oceano Indico, pallide grisea, confertissima, digiti longitudine, an forsan varietas tubularia fistulosa?

Opuntioi- 77. *S. geniculata*, ramis ternatis, articulis cylindraceis;
poris undique prominulis.

Pallas el. zooph. p. 61. n. 20. *Cellularia opuntioides*.

Habitat in Oceano orientali, sesquipollicularis, erecta, ramosissima, alba lapidea, poris in quincunces dispositis.

350. PENNATULA. *Animal natans liberum multiforme, officulo suffultum, basi nuda, hydras tentaculis radiatis oviparis superne exferens.*

coccinea. 8. *P. stirpe tereti radicata, lateribus papillofis hydrigeris, summitate clavata.* Lepch. act. Petrop. 1778. 2. p. 136. t. 7. f. A.

Habitat in maris albi, potissimum ad sinum Candalacensem, profundissimis, inter alcyonia & pennularias quasi media, mollis, sanguinea aut miniata, sesquipollicem longa, digitii auricularis crassitie, rugosa, papillis seriatim.

grisea. 1. *P. stirpe carnosa, rhachi lœvi, pinnis imbricatis plicatis spinosis.* Modeer nov. act. Stockh. 1786. 4. n. 5. §. 10. Pallas el. zooph. p. 367. n. 214. *Pennatula penniformis, stipite tereti ad pennam bulboso, pinnis oviferis acute dentatis, dentibus multifloris.*

Soland. & Ellis corall. p. 62. n. 3. *Pennatula spinosa.*

Rondel. aquat. p. 129. Gesn. nomencl. p. 273. Aldrov. zooph. l. 4. c. 8. t. 18. f. 35. Jonst. exang. l. 4. c. 5. t. 20. *Penna marina.*

Seb. mus. 3. p. 39. t. 11. f. 8. *Penna marina phosphorica.*

Barrel. ic. t. 1316. Petiv. pl. it. t. 1. f. 8. *Penna marina spinosa grisea obsoleta.*

Albin. annot. acad. 1. p. 77. t. 6. f. 1. 2. *Penna marina alba.*

Bohadsch mar. p. 109. t. 9. f. 1-3. *Penna marina grisea.*

Ellis act. angl. 53. t. 21. f. 6-10. *Grey Sea-Pen.*

(β) Modeer nov. act. Stockh. 1786. 4. n. 5. §. 12. *Pennatula palmata.*

Habitat in mari adriatico, 8 circiter pollices longa, supra dilatato-globosa, noctu lucens, rhachidis dorso late lanceolato lœviusculo, radiis imbricatis, margine anteriori undulatis, lobulis a latere spina armatis marginc obtuse crenatis, crenulis lateralius calyculo obsoleto poris formi,

- phospho- 2. *P. stirpe carnosa*, rhachi scabra, pinnis imbricatis. *Fn. suec.*
 rea. 2260. *Aman. acad.* 4. p. 256. *Müll. zool. dan. prod.*
 3075. *Modeer nov. ad. Stockh.* 1786. 4. n. 5. §. 18.
Soland. & Ellis corall. p. 61. n. 1. *Pennatula (britannica)*
 stirpe carnosa tereti, rhachi scabra, polypis tentacula-
 tis ordine simplici.
In imperat. hist. nat. p. 650. *Seb. mus.* 3. t. 6. f. 1. *J. Bauh.*
hist. pl. 2. p. 790. *Ginann. adr.* t. 55. f. 114. *Tournefi-*
er. I. h. I. p. 569. *Penna marina.*
Gesn. nomencl. p. 273. *Penna alia.*
Aldrov. zooph. l. 4. c. 8. t. 18. f. 36. *Penna marina*
 sanguinei coloris.
Jonst. exang. l. 4. c. 5. t. 20. *Penna marina* alia.
Barrel. icon. 1313. 1314. *Penna marina carnea & purpurea.*
Planc. Conch. c. 18. t. 8. f. E. D. *Penna marina* f. *Men-*
tula alata minor.
Bokadisch mar. t. 8. f. 5. *Penna rosea.*
Pontopp. Dan. atl. t. 30. f. 1-3. & *nat. Norw.* p. 196.
 t. 17. f. 1-3. *Pinna pennacea.*
Albin. annot. ac. I. t. 6. f. 3-5? *Penna marina rubra.*
C. Bauh. pin. p. 363. *Muscus pennæ similis.*
Shaw afr. app. p. 5. *Fucus pennam referens.*
Petiv. pl. ital. I. I. f. 5. 6.
Ellis ad. angl. 53. p. 426. t. 19. f. 1-5.
Habitat in Oceano omni, noctu egregie lucens, ad 4 pol-
lices longa, ex flavicante rubra, stirpe æquali, villosa,
rhachis dorso ex linearí lanceolato, confertim paleaceo-
denticulato, radiis subincumbentibus, calyculis se:oso-
spinosis secundis.

- filosa. 3. *P. stirpe subcarnosa*, rhachi utrinque pennata, basi ten-
 taculis duobus filiformibus. *Modeer nov. ad. Stockh.*
 1786. 4. n. 5. §. 21.
Salvian. aquat. p. 128. *Vermiculus.*
Boccon. mus. 1674. p. 286. t. 286.
Ellis ad. angl. 53. t. 20. f. 15.
Habitat in maris mediterranei xiphiiis, 4-6 pollices longo,
stipite semitereti, rugoso-imbricato, bicirrato, radiis
secarum æmulis confertis.

- rubra. 4. *P. stirpe carnosa*, rhachi pennata, pinnis imbricatis levibus.
Modeer nov. ad. Stockh. 1786. 4. n. 5. §. 13.
Pallas el. zooph. p. 368. n. 215. *Pennatula penniformis ovalis*,
 stipite tereti, rhachi, ovifera, pinnis lacero-dentatis.

Soland. & Ellis corall. p. 61. n. 2. *Pennatula (italica)*
stirpe carnosa tereti, rhachi patula verrucosa, spina
brevi ad basin dorsi cujusque pinnæ.

Ellis act. angl. 53. t. 21. f. 1. 2. Red Sea-Pen.

Bohadisch mar. p. 101. t. 8. f. 1-3. *Penna rubra.*

β) *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. n. 5. §. 16. *Pennatula*
stupata.

Habitat in mari mediterraneo, ad 6 pollices longa, al-
bida punctis rubris lineisque croccis varia, stirpe elon-
gata obovata, rhachi subulata, radiis incumbenti-im-
bricatis, dorso ad basin confertissime granulatis; ven-
tre calyculis inermibus ad apicem serie duplicit.

mirabilis. 5. P. stirpe filiformi, rhachi distiche pennata : pinnis lu-
natis remotis alternis. *Fn. suec.* 2261. *Müll. zool. dan.*
I. p. 38. t. II. f. 1-3. *rare descr.* I. p. 23. *prodr.* 3074.
Soland. & Ellis corall. p. 63. n. 4.

Pallas el. zooph. p. 370. n. 216. *Pennatula simplex alba*,
calyculis recurvis alternis octodentatis.

Ellis act. angl. 53. t. 20. f. 17.

Mus. Ad. Fr. I. p. 96. t. 19. f. 4.*

Amœn. acad. 4. p. 256.*

Habitat in mari atlantico, americano, norwegico, fulva,
3-4 pollices longa, vix calami scriptorii crassitie, sen-
sim attenuata, stipite levi utrinque ferrulato, rhachi
lineari, radiis remotis alternis, calyculis teretibus,
apice setoso spinosis.

Sagitta. 6. P. stirpe filiformi, rhachi utrinque approximata pen-
nata, apice nudo. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4.
n. 5. §. 23. 24.

Soland. & Ellis corall. p. 64. n. 6.

Ellis act. angl. 53. t. 20. f. 16.

Amœn. acad. 4. p. 257. t. 13. f. 13.

Habitat in Pelagi lophiis histrionibus, utrum distincta
species, an junior mirabilis?

antenni- na. 7. P. stirpe subtetragona setiformi hinc pinnata, flosculis
confertis. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. n. 5. §. 30.
Pallas el. zooph. p. 372. n. 219. *Pennatula (quadrangula-*
ris) simplex rhachi quadrangulari altero latere polypifera.

Pennatulæ motæ, aut post mortem contredictæ lucem phosphori æmulam spargentes
nodus, locum mutantæ, ceterum alcyonis per quam affines per Epipetrum &
agaricum, & p. phætloidem intermedice his neiduntur, hinc generi adjudicanda
*quoque videtur *Amphisbæna marina* a Johnstonio de pyc. t. 8. & de serpent. p.*
25. memorata, & a Seba Mus. I. t. 90. f. 3. adumbrata,

Soland. & Ellis coroll. p. 63. n. 5. Pennatula stirpe simili pici rhachi quadrangulari, lateribus tribus polypifera.
Ellis ad. angl. 53. p. 431. t. 20. f. 4. Pen of Peacock Fish.
Bohadsch mar. p. 112. t. 9. f. 4. 5. Penna piscis pavonis pectorum.

Habitat in mari mediterraneo, ad 10 pollices ultra 2 pedes longa, flavicans, rubro fundata, stirpe elongata subattenuata, radiis e calyculis sessilibus confertis secundis,

Bellifera. 9. *P. simplex æqualis, apicem versus hydriæ solitariiæ Müll. zool. dan. I. p. 133. n. 66. t. 35. f. 1-3. rari descr. I. p. 88. prodr. 3076.*

Habitat in mari norwegico, rarissima, carnoxa, rubella, ad 4 pollices longa, diametro 2-3 linearum, inferne incrassata obtusa, superne hydriæ 5 alternas exserens,

phalloides. 10. *P. simplex rhachi cylindrica obtuso-punctata undi pos hydriæ. Pallas el. zooph. p. 373. n. 220. müll. zool. p. 179. t. 15. f. 5-9.*

Habitat in Oceano indico, ad $\frac{1}{2}$ pedem longa cinerascens, rhachi crassitatee digitæ infantilis, officulo quadrangulari.

arundinacea. 11. *P. stirpe quadrangula longissima. I. Fabr. it. norv. p. 349. Modeer nov. ad. Stockh. 1786. 4. n. 5. §. 28.*

Habitat in mari norwegico, ad 4 pedes longa, stipite linearis, radiis e calyculis solitariis cylindricis, deciduæ confertis, creidis, tubulosis utrinque petiolo tenui indentibus.

scirpea. 12. *P. simplex lineari attenuata, rhachi tereti altero latere polypifera. Pallas el. zooph. p. 372. n. 218. Modeer nov. ad. Stockh. 1786. 4. n. 5. §. 29.*

Habitat in Oceano, sesquipedalis, stirpe carnoxa crassiore terete, rhachi longiore, officulo subflexu.

junccea. 13. *P. simplex linearis, rachi truncata, rugis distichis transversis polypiferis. Pallas el. zooph. p. 371. n. 217. Modeer nov. ad. Stockh. 1786. 4. n. 5. §. 25.*

*Rumpf mus. p. 43. n. 1. Sagitta marina alba.
amb. 6. p. 256. Sagitta marina alia.*

Seb. mus. 3. t. 114. f. 2.

Habitat in Oceano indico, ad 2 pedes longa, alba, inferne, carneæ, radiis ex fulvo alboque missis, stirpe 5-6 pollices longo, molli, vermiculari, rachi 4plo 5plo longiori, officulo albo, fragilissimo.

14. p.

- grandis.* 14. *P. penniformis linear-lanceolata*, stirpe tereti lăvissima, pinnis lacero-dentatis. *Pallas el. zooph. p. 366.*
n. 213. Modeer nov. ad. Stockh. 1786. 4. n. 5. §. 15.
Rumpf mus. p. 43. 44. n. 2. Sagitta marina nigra.
Habitat in Oceano indico, pedem longa, & longior, ex
cinereo virescens, osse fragili utrinque attenuato, tan-
gentem manum interdum urens, pinnis imbricatis, lu-
cem cinereum in tenebris spargens.

- argentea.* 15. *P. lanceolata pennæ facie*, stirpe lăvi tereti, pinnis creberrimis imbricatis dentatis virgatis. *Soland. & Ellis corall. p. 66. n. 9. t. 8. f. 1-3.*
Habitat in Oceano indico, noctu egregie lucens, pede
sæpe longior, nitens, pinnis albo nigroque striatis.

- Encrinus.* 16. *P. stirpe quadrangulari attenuata longissima ossea, mem-*
brana callosa vestita, hydris oviparis apice in umbellam
congestis. Soland. & Ellis corall. p. 67. n. 10.
Pallas el. zooph. p. 365. n. 212. Pennatula bipite ossea
quadrangulo contorto, corporibus tereti-attenuatis
apice florescentibus, in umbellam congestis.
Syst. nat. XII. 2. p. 1317. n. 1. Vorticella composita,
floribus octoradiatis, stirpe simplicissimâ contorto-ossea.
Syst. nat. X. 1. p. 80. Isis Encrinus.
Ellis ad. angl. 48. p. 305. t. 12. corall. p. 96. t. 37.
Clusterpolypi.
Mylius monogr. 1753. 4. c. fig. Zoophyton groenlandicum.
Ad. Petrop. 1766. p. 425. t. 11. f. 7.
Habitat in mari groenlandico, 6 pedes longa, & longior,
hydris umbellæ 20-30, cylindricis, flagulis apice 8 ten-
taculatis, radiis ferrato-pinnatis; an protypus encrinii? &

349. HYDRA. *Animal basi se affigens contractile.* *Os terminale tentaculis cinctum.*

* *marinæ, animali carnoso oblongo tereti viviparo,*
ore dilatabili, Actinia Ellisii.

- Cereus.* 5. *H. tentaculis denudatis numerosissimis, corpore longitudinaliter sulcato. Gærin. ad. angl. 52. p. 78. t. 1. f. 1.*
Soland. & Ellis corall. p. 2. n. 1. Actinia Cerens.
Habitat ad Cornubiæ littora, fusca, tentaculis thalass-
nis, apice roseis.

- Bellis. 6. *H. calyciflora verrucosa*, tentaculis retractilibus variegatis. *Gaertn. atl. angl.* 52. p. 79. t. 1. f. 2.
Soland. & Ellis corall. p. 2. n. 2. *Actinia Bellis*.
Habitat ad Cornubiæ littora, mollis, incarnata, verrucis albis, in purpureum violaceum fuscum extrinsecus colorem vergens, tentaculis pellucidis inæqualibus, aliis pallide cinereis fusco maculatis, aliis badiis albo maculatis, disco stellato, fuso, flavo, cinereo alboque radiato.
- gemma- 7. *H. disciflora*, tentaculis retractilibus subdiaphanis, corpore cylindrico glandulis miliaribus longitudinaliter striato. *Gaertner atl. angl.* 52. p. 82. t. 1. f. 4.
Soland. & Ellis corall. p. 3. n. 3. *Actinia gemmacea*.
Habitat ad Cornubiæ littora, in rupium fissuris, ad basin rubella, ceterum ex albo flavo & cinereo mixta, glandulis medii ordinis albis, tentaculis albidis.
- Mesem- 8. *H. disciflora*, tentaculis retractilibus, extimo discri marginac tuberculato. *Gaertner atl. angl.* 52. p. 83. t. 1. f. 5.
Soland. & Ellis corall. p. 4. n. 4. *Actinia Mesembryanthemum*.
Habitat ad Angliæ littora, estate rubra, colore auctummo in obscure viridem vel fuscum transeunte, tentaculis & tuberculis discri rubris, cæruleis, albis, aut variegatis.
- sociata. 9. *H. tenuis tubæformis*, capitulo subgloboso tentaculato, ex tubulo carnosø adhærente prolitera.
Ellis atl. angl. 57. p. 436. t. 19. f. 1. 2. *Soland. & Ellis corall.* p. 5. n. 5. t. 1. f. 1. 2. *Actinia sociata*.
Hugh. nat. hist. Barbad. p. 296. *Clester's of Waterbottles?*
Habitat in mari, Americam medium alluente.
- Aster. 10. *H. stirpe crassa carnosa subcylindrica lævi truncata*, tentaculis radiata.
Ellis atl. angl. 57. p. 436. t. 19. f. 3. *Soland. & Ellis corall.* p. 6. n. 6. *Actinia aster*.
Habitat in mari, Americam medium alluente.

Hinc tribus actiniis jungit hydras, molluscis zoophyta; huc spectare queque videntur
Veretillum Apulei, sive *Priapus marinus Valisneri* op. 3. p. 442. *J. Lucumius marinus Barcieler pl. ic. 1293. n. 2. f. Hydra Bohadisch mar. c. 4. t. 6. f. 3. mensula marina. Planc. Conch. min. not. ed. 2. app. p. 108. c. 17. t. 8. ejusdem p. 99. c. 6. t. 6. f. D. E. F. *Echinus criaceus*.*

Anemo- 11. *H. carnosa complanata*, disco subhexagono tentaculis plurimis cincto.

Ellis ad. angl. 57. p. 436. t. 19. f. 4. 5. Soland. & Ellis corall. p. 6. n. 7. Actinia Anemone.

Habitat in mari, Americam medianam alluente.

Helian- 12. *H. carnosa complanata hypocrateriformis*, disco rotundo thus. tentaculis plurimis praedito.

Ellis ad. angl. 57. p. 436. t. 19. f. 6. 7. Soland. & Ellis corall. p. 6. n. 8. Actinia Helianthus.

Habitat in mari, Americam medianam alluente.

Dianthus. 13. *H. laevis subcylindrica*, disco quinquepartito foliaceo tentaculis exiguis albis ornato, osculo elevato striato.

Ellis ad. angl. 57. p. 436. t. 19. f. 8. Soland. & Ellis corall. p. 7. n. 9. Actinia Dianthus.

Habitat ad Angliæ littora, flava; an eadem cum adinia plumosa?

Calendu- 14. *H. stirpe subturbinate*, disco tentaculis petaliformibus cincto.

Soland. & Ellis corall. p. 7. n. 10. t. 1. f. 3. Actinia Calendula.

Hugh. nat. hist. Barb. p. 293. t. 24. f. 1. Animal Flower.
Habitat ad insulas Barbados; an hujus generis?

Dolio- 15. *H. quinquelatera cinerascens*, angulis obsoletioribus papillum. lis bifariam asperis, disco convexiusculo tentaculis viginti.

Pallas mis. zool. p. 152. t. 9. f. 10-12. & t. 10. Actinia Dolium.

Habitat ad Caput Bonæ Spei, subdecaëdra, ueroque fine truncata, posteriori magis attenuata, tentaculis bipartitis fuscis villoso-granulatis.

** vagæ, lineares, gelatinosæ, nudæ, tentaculis sessileis, prolibus lateralibus (autumno ovis) deciduis, in aquis dulcibus habitantes.

Gelatino- 16. *H. minuta gelatinosa lactea cylindrica*, tentaculis duodecim corpore elongato brevioribus. *Müll. zool. dan. 3. p. 25. t. 95. f. 1. 2.*

Habitat gregaria in succorum facie inversa.

viridis. 1. *H. tentaculis subdenis brevioribus.*

Pallas el. zooph. p. 31. n. 3. Hydra (viridissima) corpore viridissimo, cirsis viridis corpore brevioribus,

Müll. hist. verri. I. 2. p. 13. n. 147. zool. dan. prod. 2783.

Hydra viridissima, cirris corpore brevioribus.

Lesuwenh. act. angl. 23. n. 283. p. 1494. n. 4.

Ledernüll. microsc. t. 67. f. e. f.

Trembl. polyp. I. p. 22. t. 1. f. I.

Roesel inf. 3. polyp. p. 531. t. 88. 89.

*Schaeff. grün. Arnipolyp. Regensb. 1755. t. I. f. 10-15.
t. 2. f. 10-12. & t. 3. f. 4-8.*

*Habitat in Europæ aquis stagnantibus, & rivulis, sub
plantis aquaticis primo vere & autumno potissimum
conspicua, tentaculis 8-10.*

fusca. 2. *H. tentaculis suboctonis longissimis. Soland. & Ellis cor-
rall. p. 9. n. 1.*

*Pallas el. zooph. p. 29. n. 1. Hydra (oligactis) corpore
caudato gryseo, cirris multoties longioribus.*

Ellis corall. t. 28. f. C.

Trembl. polyp. I. p. 22. t. 1. f. 3. 4.

Roesel inf. 3. polyp. p. 505. t. 84. (α). 85-87. (β).

Schaeff. polyp. 1754. t. 3. f. 1.

*Habitat in Europæ aquis dulcibus, ex fusco grisea,
antrorsum subattenuata. tentaculis ad summum 8, te-
nuissimis contractis setaceis albidis.*

grisea. 3. *H. tentaculis subseptenis longioribus.*

*Pallas el. zooph. p. 30. n. 2. Hydra (vulgaris) corpore
potice attenuato gryseo, cirris vix duplo longioribus.*

Müll. hist. verri. I. 2. p. 14. n. 148. zool. dan. prod. 2784.

Hydra aurantia, cirris corpore vix duplo longioribus.

*Soland. & Ellis corall. p. 9. n. 2. Hydra (vulgaris) ten-
taulis longioribus subseptenis, corpore lutescente po-
tice attenuato.*

Ellis act. angl. 57. p. 430. t. 19. Fresh-water Polype.

Roesel inf. 3. polyp. p. 473. t. 78-83. Polypus aurantius.

Trembl. polyp. I. p. 22. t. 1. f. 2.

Lederm. microsc. t. 67. f. m.

Baker microsc. t. 7. f. 3-7.

*Habitat in Europæ rivulis aquisque stagnantibus puriori-
bus, tentaculis interdum 12, plantis aquaticis, e. g.
fijo adhærens.*

*Hydræ posteroris hujus tribus gregaricæ, semipellucidæ, testibus Roeselii, Trem-
bleyi, Bonneti, Blumenbachii, Lichtnebergii experimentis, vi prolifea in-
figi spectabiles.*

Pallens. 4. H. tentaculis subsenis mediocribus.

Pallas el. zooph. p. 32. n. 4. *Hydra (attenuata) corpore flavescente sursum attenuato.*

Müll. hist. verm. I. 2. p. 14. n. 149. zool. dan. prodr. 2785. *Hydra pallida*, cirris corporis longitudine.

Roesel inf. 3. polyp. p. 465. t. 76. 77. *Polypus stramineus*.
Habitat rario in Europæ stagnis purioribus, tenerrima, grisea paulo major, tentaculis albidis.

V. INFUSORIA.

Vermes minimi simpliciores.

BRACHIONUS. *Corpus contractile, testa tectum, ciliis rotatoriis.*

- urceola-
ris. 1. Br. testa apice multidentata, basi mutica, cauda sim-
plici. Müll. hist. verm. I. I. p. 131. n. 142. zool. dan.
prodr. 2571.
Syst. nat. XII. 2. p. 1319. n. 12. Vorticella simplex pe-
dunculata, ore dentato.
Pallas el zooph. p. 91. n. 47. *Brachionus (capsuliflorus)*
simplex calyculatus, capsula depressa postice crenata,
oris labio superiore sexdentato.
Hill anim. p. II. *Brachionus corpore breviori campani-*
formi, cauda brevi.
Fn. suec. p. 537. *Müll. fl. Friedrichsd.* p. 238. *Tubipora*
Urceus.
Joblot microsc. I. 2. p. 68. t. 9?
Baker microsc. p. 338. t. 12. f. 7-10.
Schaeff. grün! Armpol. t. I. f. 8. k. t. 2. f. 7-9.
Habitat frequens in Europæ aquis stagnantibus, Augusto
potissimum, & oculo quidem nudo tanquam punctum
mobile albicans conspicuus, oviparus & viviparus, ciliis
uncinatis.
- Patella. 2. Br. univalvis, testa apice bidentata basi emarginata,
cauda bifida. Müll. hist. vermi. I. I. p. 130. n. 142.
zool. dan. prodr. 2570.
Joblot microsc. I. 2. t. 4. f. F. G?
Habitat in Europæ aquis palustribus, per totam hiemem
conspicua, testa plana, crystallina, ovato-orbiculari,
capite, truncō caudaque distinctis.
- cirratus. 3. Br. bivalvis, testa apice mutica abbreviata basi bicorni,
cauda longa bifida. Müll. hist. vermi. I. I. p. 232. n. 143.
zool. dan. prodr. 2172.
Joblot microsc. 2. p. 54. t. 6. f. 10. A. B. C. D.
Habitat in Europæ aquis, testa corpore breviore, urceolari
major, ventricosus subpellucidus, capite conico utrinque
barbato, truncō ovato.
- tripus. 4. Br. bivalvis, testa apice mutica basi tricorni, cauda du-
plici. Müll. hist. vermi. I. I. p. 133. n. 144. zool. dan.
prodr. 2573.

Habitat paulo rario in aquis asservatis, urceolari minor, pellucidissimus fere triqueter, organo rotatorio duplicitus.

- uncina- 5. Br. bivalvis, testa apice mutica rotundata basi unicus.
tus. dentata, cauda bifida. *Müll. hist. verm. I. I. p. 134.*
n. 145. zool. dan. prodr. 2574.

Habitat in Europæ fossis aquosis, congeneribus minor, anterius unco armatus, cauda 4-5 articulis composita, testa utrinque rotundata & operiunda.

- mucrona- 6. Br. bivalvis, testa apice basique bidentata, cauda
tus. spina duplice. *Müll. hist. verm. I. I. p. 134. n. 146.*
zool. dan. prodr. 2575.

Habitat sat frequens in aquis Europæ, lemna cooperitis, organi rotatorii medio mucronato, caudæ spinis pellucidis mobilibus, testa crystallina, oblongiuscula, utriusque truncata;

- cernuus. 7. Br. pedunculo piloso, capitulis cernuis. *Pallas spic.*
zool. 10. p. 37. t. 4. f. 10.
Habitat gregarius in tubularia fistulosa.

- calyciflo- 8. Br. simplex calyculatus, testa posterius crenata, oris
rus. labio superiore quadridentato *Pallas el. zooph. p. 93. n. 48.*
Baker. microgr. p. 304. t. 12. f. 4-6. Animalculum testa notulisque instructum tertium.
Habitat - - - vagus.

- tubifex. 9. Br. testa tubulosa punctata, corpore opposite proliferis,
limbo lobato ciliatoque. *Pallas el. zooph. p. 91. n. 46.*
Schaeff. monogr. 1755. cum tab. Blumenpolypen der Süßen Wasser.
Habitat in Europæ stagnis, an hujus generis?

- quadriden- 10. Br. testa ventricosa apice quadridentata, organo rota-
tatus. torio duplice, basi bicorni, cauda longa simplici.
Hermann. Naturf. 19. p. 47. t. 2. f. 9.
Baker microgr. t. 11-13.

*Habitat in Europæ aquis stagnantibus, lemne saepe adha-
rens caudæ ope, celerrime natans, testa pellucidissima.*

- Patina. 11. Br. testa orbiculari mutica integra, organo rotatorio.
duplice, cauda brevi simplici. *Hermann Naturf. 19.*
p. 48. t. 2. f. 10.
Eichhorn. Naturg. Wafferm. t. 1. f. 2. 4.
*Habitat in Europæ stagnis, in quibus lemna, hydro-
charis vegetat.*

348. VORTICELLA. *Corpus contractile nudum,*
*ciliis rotatoriis.*** pedunculatae.*

racemosa. 1. *V. composita*, pedunculo rigido : pedicellis ramosissimis longis. Müll. *hist. verm.* I. I. p. 128. n. 140. *zool. dan. prodr.* 2568.

Habitat in aquis e stagno Embderupensi Hafniam deudis, hieme conspicua, stipite elongato subtilissimo, rarissime tota simul in motum agitata.

polypina. 2. *V. composita* ovato-truncata, pedunculo reflexili ramosissimo. Müll. *hist. verm.* I. I. p. 123. n. 137. *zool. dan. prodr.* 2569.

Syst. nat. XII. 2. p. 1317. n. 2. *Vorticella composita*, floribus concatenatis, stirpe paniculata subdigitata.

Syst. nat. X. I. p. 816. *Sertularia corpusculis concatenatis pellucidis hyalinis*, panicula subdigitata.

Pallas *el. zooph.* p. 98. n. 55. *Brachionus* (*ramosissimus*) vegetans, stirpe retortili ramosissima, corpusculis campanulatis.

Ellis-corall. t. 13. f. b. B. c. C. *Corallina omnium minima.*
Baster opusc. subs. I. l. I. t. 3. f. I. a. b. c. *Minima polyporum species.*

Trembl. *ad. angl.* 44. p. 639. t. I. f. 5. 6.

Hebicas frequens in mari balthico, mediterraneo, aliis, fucis adhaerens, oculo nudo tanquam punctum album apparens, motu duplice spontaneo agitata.

Anastatica. 3. *V. composita* oblonga oblique truncata, pedunculo squamoso rigido. Müll. *hist. verm.* I. I. p. 127. n. 139. *zool. dan. prodr.* 2567.

Syst. nat. XII. I. p. 1317. n. 3. *Vorticella composita*, floribus campanulatis, stirpe multiflora rigescente.

Fn. suec. 2221. *Iris Anastatica.*

Pallas *el. zooph.* p. 99. n. 56. *Brachionus vegetans*, stirpe retortili umbellata, radiis racemosis, corpusculis campanulatis.

Aman. *acad.* 2. p. 64. n. 4. 5.

Trembl. *ad. angl.* 44. p. 637 t. I. f. 7-9.

Brady *ad. angl.* 49. p. 248. t. 7. f. 1-6.

Deger *ad. Stockh.* 1746. t. 6. f. 4. 5.

Needh. *microsc.* t. 7. f. 2-5.

Schaeff. *monogr.* 1754. t. I. f. 3. 4.

Habitat in Europæ aquis dulcibus, testaceis plantisque insidens, quarum superficiem exasperat, ramulis in umbellam ex umbellulis conformatum expansis, capitulis in singulis pedicellis 5-10, pellucidissimis, ovato oblongis, corpusculis 5-6 subsphaericis repletis.

conglome- 4. *V. composita*, capitulis eroso-dentatis, stirpe multi-
rata, flora, crassitie pennæ columbinæ.

Ancen. acad. 4. p. 257. t. 3. f. 1.

Habitat in Oceano indico.

Pyrraria. 5. *V. composita* inverse conica, pedunculo ramoso.
Müll. hist. verm. I. I. p. 126. n. 138. zool. dan. prodr. 2566.

Syst. nat. XII. 2. p. 1318. n. 5. Vorticella composita, floribus muticis obovatis, tentaculis bicorniis, stirpe ramosa.

Pallas el. zooph. p. 102. n. 59. Brachionus (pyriformis) vegetans, stirpe setacea extremitate dichotoma fastigiata, corpusculis ovatis utrinque bitentaculatis.

Hill. hist. an. t. I. 2. Macrocerus corpore utrinque angustato & truncato, cauda longissima.

Roefel inf. 3. polyp. p. 606. t. 98. f. 1. & 2. d. e.
Habitat in Europæ aquis stagnantibus, ceratophyllo potissimum adhærens, rigida, setacea, elongata.

Opercula- 71. *V. composita*, capitulis muticis ovalibus stirpe ramosa:
ta. *Pallas el. zooph. p. 104. n. 62. Brachionus vegetans,*
stirpe articulata ramosissima, corpusculis ovalibus pistillo ciliato operculatis.

Roefel inf. 3. polyp. 609. t. 98. f. 5. 6. Pseudopolypus operculatus.

Baker microgr. p. 351. t. 13. f. 13. 14.

Ledermüll. microsc. t. 88. f. W.

Habitat in Europæ aquis stagnantibus, ramosissima.

tuberosa. 12. *V. stirpe dichotoma, capitulis turbinatis bi-vel trituberculatis.*

Pall. el. zooph. p. 105. n. 63. Brachionus tuberosus

Baker microgr. p. 350. t. 13. f. 10-12.

Habitat in Angliæ stagnis, rigida, capitulorum tuberculis convexis radiatis.

hians. 14. *V. simplex citriformis, pedunculo retortili.* *Müll. hist. verm. I. I. p. 135. n. 137. zool. dan. prodr. 2565.*
Wrisb. anim. infus. p. 417. f. 1. B. C. K. I. & G. F.
E. f. 2. f. 13. B. F. C. H.

Habitat in vetustis infusionibus & fimetiis, ex minimis hujus generis, pedunculo relicto saepe in aquis vagans, capitulo pomì interni fornìa, in apice interdum hianse, pedunculo capitulo triplo longiore, cauda corpore sextuplo breviore.

- Bellis. 15. *V. simplex hemisphaerica*, margine contractili. Müll. hist. verni. I. 2. p. 123. n. 136. zool. dan. prodr. 2564.
Habitat rario in aqua fossarum Europæ, convallariae facie, at minor, capitulo flavicante disco lato ciliisque marginis bellidis floreni referente, pedunculo longo, pellucido, tenuissimo, ad apicem bifido.
- umbella-ria. 8. *V. simplex globosa*, granis nigricantibus, pedunculo rigidior. Syst. nat. XII. 2. p. 1318. n. 8. Vorticella composita, floribus ciliatis globosis muticis, stirpe umbellata. Müll. hist. verni. I. I. p. 122. n. 135. zool. dan. prodr. 2563. Vorticella acinosa.
Pallas el. zooph. p. 100. n. 37. Brachionus (acinosus) vegetans, stirpe rigida dichotoma, corpusculis truncatis fimbriato-ciliatis, acinis opacis.
Trembl. act. angl. 43. p. 171. t. 11. f. 5-7.
Baker microgr. p. 348. t. 13. f. 6. 7.
Roesel inf. 3. polyp. p. 614. t. 100.
Ledermüll. microsc. t. 88. f. 1. n.
Habitat in Europæ aquis stagnantibus, capitulis flavescentibus punctis opacis distinctis, coarctatorum basi hyalina, pedunculo octuplo longiore, interdum apice bifido.
- berberina. 9. *V. simplex ovalis*, stirpe ramosa rigida, granis albida. Syst. nat. XII. 2. p. 1319. n. 9. Vorticella composita, floribus ovalibus muticis, stirpe ramosa.
Pallas el. zooph. p. 103. n. 60. Brachionus (berberiformis) vegetans, stirpe deorsum attenuata, subramosa, corpusculis terminalibus oblongis muticis.
Trembl. act. angl. 43. p. 179. Polypi bipertientis altera species paulo minor.
Roesel inf. 3. polyp. p. 613. t. 99. Pseudopolypus beriformis.
Ledermüll. microsc. t. 88. f. q. s.
Habitat in Europæ aquis.
- digitalis. 10. *V. simplex cylindrica unisulcata semiclausa*, stirpe ramosa.
Syst. nat. XII. 2. p. 1319. n. 10. Vorticella composita, floribus cylindricis unisulcatis semiclausis, stirpe ramosa.
Pallas el. zooph. p. 104. n. 61. Brachionus vegetans stirpe

umbellata, corpusculis oblongo-truncatis, longitudinaliter unifalcatis.

Roesel inf. 3. polyp. p. 607. t. 98. f. 4. Pseudopolypus corniculum chartaceum referens.

Habitat in Europæ stagnis, stirpe brevi.

fascicula- 16. *V. simplex viridis campanulata : margine reflexo, pedunculo retortili.* Müll. hist. verm. I. 1. p. 121. n. 134. zool. dan. prodr. 2562.

Habitat in Daniæ conservis fluvialibus, primo vere conspicua, numerosissima, gelatinosa, capitulo opaco, basi pedunculoque longissimo, tenuissimo hyalinis.

annularis. 17. *V. simplex truncata, pedunculo apice retortili.* Müll. hist. verm. I. 1. p. 121. n. 133. zool. dan. prodr. 2561.

Habitat in stagnorum Daniæ testaceis, nudo oculo visibilis, capitulo inverse conico, pedunculo longissimo, rigido insidente.

nutans. 18. *V. simplex turbinata, pedunculo retortili.* Müll. hist. verm. I. 1. p. 120. n. 132. zool. dan. prodr. 2560.

Habitat in Daniæ stagnis, stratiotæ & testaceis adhærens, oculo nudo non usurpanda, capitulo apice albo, quasi annulo lucido cincto, basi hyalino, pedunculo longo tenui.

gemella. 19. *V. simplex sphærica, capitulo gemino.* Müll. hist. verm. I. 1. p. 120. n. 131. zool. dan. prodr. 2559.

Habitat in testis monocolorum inter conservas marinas degentium, oculo nudo invisibilis, capitulis hyalinis punctis obscuris repletis.

nebulosa- 20. *V. simplex ovata, pedunculo reflexili.* Müll. hist. verm. I. 1. p. 119. n. 130. zool. dan. prodr. 2558.

Habitat in maris balthici conserva polymorpha, oculo nudo inconspicua, pedunculo basi dilatato, in medio bipartito.

Convallaria- 21. *V. simplex campanulata pedunculo retortili.* Müll. hist. verm. I. 1. p. 118. n. 129. zool. dan. prodr. 2557.

Syst. nat. XII. 2. p. 1319. n. 11. Vorticella simplex gregaria, flore campanulato mutico : tentaculis bigemini, stirpe fixa.

Pallas el. zooph. p. 97. n. 54. Brachionus (campanulus) gregarius, pedunculo setaceo retortili unifloro, corpusculo campaniformi.

Trembl. act. angl. 43. p. 474. Polypi bipartientis tertia species.

Baker microgr. p. 339. t. 13. f. 1. d. e. Animalcula campanacea.

Roesel inf. 3. polyp. p. 597. t. 97. Pseudopolypus parvus socialis crateriformis.

Ledermüll. microsc. t. 88. f. 1.

Cavol. pol. mar. 3. p. 253. t. 9. f. 13.

Habitat in Europæ aquarum dulcium testaceis, cerathophyllo, lenina, capitulis oculo inermi puncta minima albida referentibus, pedunculo simplici, setaceo, longissimo, an eadēni, quam Cavolini in mari mediterraneo veneris testæ adhærentem, Schiranck in infuso granorum avenæ conspexit?

lunaris. 21. *V. simplex hemisphærica, pedunculo retortili.* Müll. hist. verm. I. I. p. 117. n. 128. zool. dan. prodr. 2556.

Habitat in Daniæ stagnorum lemna minori, capitulo pedunculo 8-10plo breviori, apertura dimidiata lunæ æquante: margine protuberante flexuoso, ciliis quasi fasciculo in horizontali & perpendiculari partito.

Globula- 22. *V. simplex sphærica, pedunculo retortili.* Müll. hist. ver. I. I. p. 117. n. 127. zool. dan. prodr. 2555.

Hill hist. an. t. I. f. I. Macrocerus corpore rotundo, cauda tenuissima.

Habitat frequens in Daniæ stagnorum monoculo quadricorni, capituli apertura diametrum non superante, ciliis quasi pedinatis coronata, pedunculo vix quadruplo longiori.

inclinans. 23. *V. simplex deflexa, pedunculo brevi, capitulo retractili.* Müll. hist. ver. I. I. p. 116. n. 126. zool. dan. prodr. 2554.

Müll. von Würm. p. 70. 71.

Habitat in aquis Daniæ dulcibus, nādibus adhærens, oculo nudo inconspicua, hyalina, syringam, ex quā sumus nicotianæ hauritur, referens, capitulo pendulo anterius truncato; pedunculo duplo longiore.

ringens. 24. *V. simplex obovata, pedunculo minimo, orificio contractili.* Müll. hist. ver. I. I. p. 116. n. 125. zool. dan. prodr. 2553.

Müll. von Würm. p. 70. 71.

Habitat in Daniæ stagnis, nādibus adhærens, oculo nudo non usurpanda, hyalina, erēcta, pyruni, contractu pomum citreum potius referens; capitulo in aperturæ cor-

tractilis medio quasi operculato, pedunculum non contractilem quadruplo superante.

Pellata. 13. *V. simplex repens*, orificio decemfido, pedunculo capillari.
Habitat in Oceano africano, plantis submarinis infidens, alba, perennans, capilli crassitie, rarius unum alterumve ramum protrudens, pedunculo erecto, molli, 3 lineas longa, capite subcampanulato, seminis thymè magnitudine, an hujus generis?

pirifor- 25. *V. simplex obovata*, pedicello minimo retractili. Müll.
 mis. *hifl. ver. I. I. p. 115. n. 124. zool. dan. prodr. 2552.*
Hill hifl. an. t. I. f. 2. Brachiurus corpore ovato.

β) Schaeff. grün. Armpol. t. I. f. 8. h.
Habitat in Europæ stagnorum monoculis, oculo nudo inconspicua, hyalina, capitulo pedicellum quadruplo superante.

citrina. 26. *V. simplex multiformis*, orificio contractili, pedunculo æquali. Müll. hifl. ver. I. I. p. 114. n. 123. zool. dan.
 prodr. 2551.
Habitat in Daniæ aquis stagnantibus, trichodæ bombardæ affinis, capitulo majori moleculis flavo virentibus facto, basi pellucidissimo, pedunculo curvato.

Cyathina. 27. *V. simplex crateriformis*, pedunculo retortili. Müll. zool.
 dan. I. p. 131. n. 63. t. 35. ser. I. rar. descr. I. p.
 85. prodr. app. p. 281.
Habitat in aqua marina affervata, hyalina, vaga, pedunculo tenuissimo, longo, corpus subspæricum ventricosum 2-4plo superante.

putrida. 28. *V. simplex*, apice retractili, pedunculo rigido. Müll.
 zool. dan. I. p. 132. n. 64. t. 35. f. 2. rar. descr. I. p.
 86. prodr. app. p. 281.
Habitat in aqua marina affervata putrida, segnis, gelatinosa, hyalina, oblonga, ventricosa, orificio clauso in papillam prolongata, pedunculo corpore vix duplo longiori.

Patellina. 29. *V. simplex patinæfornis*, pedunculo retortili. Müll.
 dan. I. p. 133. n. 65. t. 35. f. rar. descr. I. p. zool.
 87. prodr. p. 281.
Habitat in aqua marina aliquantis per affervata, hyalina, vivida, oculo nudo non isitrianda, celerime natans, intus moleculas 2 crassiores, globulosque 3-4 ostendens, pedunculo tenui corpore quadruplo longiori.

** caudatae.

flosculo- 30. *V. aggregata oblongo-ovata*, disco dilatato pellucido. *Müll.*
fa. *hist. verm. I. I. p. 113. n. 112. zool. dan. prodr. 2550.*

Habitat in Daniæ paludosis, ceratophyllo adhærens, Septembre, & primo vere potissimum conspicua, oculo nudo globulum flavescens offerens, disco capitis in abdomen hyalinum retrorsum reniformi hyalino, cauda acuminatissima abdomine duplo longiori, nunc lær, nunc annulis rugosa;

socialis. 31. *V. aggregata clavata*, disco obliquo. *Müll. hist. verm. I. I. p. 112. n. 121. zool. dan. prodr. 2549.*

Syst. nat. XII. 2. p. 1321. n. 7. Müll. fl. Fridrichsd. p. 238. Hydra mutica torosa rugosa.

Pallas el. zooph. p. 96. n. 53. Brachionus aggregatus, corpore toroso mutabili caudato oblique truncato, disco reniformi.

Roesel ins. 3. polyp. p. 585. t. 94. f. 1-6. & t. 95. 96. Pseudopolypus socialis clavæformis.

Brady act. angl. 49. I. p. 249. t. 7. f. 1.

Ledermüll. microsc. t. 88. f. f. g.

Habitat in Europæ aquis stagnantibus, ceratophyllo sa- pius adhærens.

stentorea. 32. *V. tubæformis*, limbo ciliato. *Müll. hist. verm. I. I. p. 111. n. 120. zool. dan. prodr. 2548.*

Syst. nat. XII. 2. p. 1321. n. 6. Hydra tentaculis cilia- ribus, corpore infundibuliformi.

Pallas el. zooph. p. 95. n. 52. Brachionus simplex nu- dus infundibuliformis, limbo ciliato.

Trembl. act. angl. 43. p. 180. Polypi infundibuliformes virides, cærulei & albidi.

Baker microgr. p. 340. t. 13. f. I. f. g. Animalculum infundibuliforme.

Roesel ins. 3. polyp. p. 594. t. 94. f. 7. 8. Pseudopolypus tubiformis.

Ledermüll. microsc. t. 88. f. d. e. i.

Habitat in Europæ aquis dulcibus, hyalina, in tubam quasi stentoream elongata.

hyacin- 33. *V. simplex involucrata*, aperturæ limbo multidentato.
thina. *Pallas el. zooph. p. 93. n. 49. Brachionus hyacinthinus,*

Baker microgr. p. 302. t. 12. f. 2.

*Habitat - - - vaga, oblonga, cauda attenuata, ab
 hujus generis & tribus!*

- auricula-** 34. V. nuda, cauda biseta parvula. *Müll. hist. verm. I. ta.* I. p. III. n. 119. zool. dan. prodr. 2547.
Habitat in Daniæ aquis dulcibus purioribus, pellucida, cylindrica, retrorsum angustior, apertura utrinque in auriculam dilatata, lacinula media subtriangulari, motu per diagonalem celeri.
- furcata.** 35. V. apertura mutica, cauda simplici bifida. *Müll. hist. verm. I. I. p. 110. n. 118. zool. dan. prodr. 2546.*
Ledermüll. microsc. p. 88. t. 48.
Habitat vulgaris in Europæ aquis dulcibus, cylindrica, interaneis pellucidissimis, caudæ cruribus quiescenti jundis.
- Senta.** 36. V. apertura spinosa, cauda apice fissa. *Müll. hist. verm. I. I. p. 109. n. 117. zool. dan. prodr. 2545.*
Habitat in Europæ aquis lemna coopertis, pellucida, varie plicata, antrorsum truncata, organo rotatoria simplici, intestino lutescente.
- Catulus.** 37. V. cylindrica, apertura mutica, cauda reflexa. *Müll. hist. verm. I. I. p. 148. n. 116. zool. dan. prodr. 2544.*
Jablot. microsc. I. 2. t. 13. f. X.
Habitat in Daniæ aqua palustri, in varias directiones natans, crassiuscula, sulcis longitudinalibus exarata, organo rotatorio minutissimo, cauda brevissima exsertili bifida.
- Felis.** 38. V. cylindrica mutica, cauda spinis duabus longis terminata. *Müll. hist. verm. I. I. p. 108. n. 115. zool. dan. prodr. 2543.*
Habitat in Daniæ aquis, lemna teclis, torosa, anteriore sui parte se contrahens, spinis caudæ pellucidis teritur corporis ipsius longitudinis.
- vermicu-** 39. V. cylindrica annulata, proboscide exsertili. *Müll. hist. latis.* I. I. p. 107. n. 114. zool. dan. prodr. 2542.
Jablot microsc. I. 2. p. 80. t. II. f. A-Z.
Habitat rario in Daniæ aquis lemna coopertis, elongata, carnosa, mutabilis, annulis 8-9 rugosa, apice nunc obtusa, nunc 2 mucronibus terminata, proboscide articulata bifida, cauda spinis 2. pellucidis terminata.
- macrou-** 40. V. organo rotatorio duplice, cauda gracili triplici spina terminata. *Hermann Naturf. 19. p. 57. t. 2. f. 23.*
Baker microgr. p. 380. t. 12. f. 1.
Habitat in Europæ aqua palustri, rotatoriae affinis, at tota hyalina.

- rotatoria. 41. V. cylindrica, organo rotatorio duplice. *Müll. hist. verm. I. I. p. 106. n. 113. zool. dan. prodr. 2541.*
Pallas el. zooph. p. 94. n. 50. Brachionus simplex nudus oblongus, capite discreto bilobo, lobis ciliatis.
Hill hist. an. t. I. 2. Brachionus corpore conico torulo, cauda tricuspidi.
Goeze Hannöv. Magaz. 1772. & Besch. berl. Naturf. 2. p. 287.

Leeuwenh. cont. arc. nat. p. 386. f. I. 2.

Joblot microsc. 2. p. 96. t. 5. f. A-E. K.

*Baker microsc. p. 348-379. t. II. f. I-14.
expl. p. 95. t. 6-8.*

*Habitat in Europæ aquis stagnantibus, vere & auctumno
in vegetabilium infuso frequens, cordis & interaneorum
motu diverso, visibili, flavicans.*

*** cauda pedunculoque orbæ.

- cratæga- 6. V. subglobosa conferta. *Müll. hist. verm. I. I. p. 105.
n. 112. zool. dan. prodr. 2540.*

Syst. nat. XII. p. 1318. n. 6. Vorticella composita, floribus muticis globosis: tentaculis binis, stirpe ramosa.
Pallas el. zooph. p. 101. n. 58. Brachionus vegetans, stirpe rigida brevi dichotoma, corpusculis confertis ovalibus ore bitentaculatis.

Roesel ins. 3. polyp. p. 604. t. 98. f. 2. aa. & f. 3. Pseudopolypus fructus cratægi forma, tentaculis binis.

Baker microgr. p. 357. t. 13. f. 15. I. 2. 3. Animalculum moriforme.

Ledermüll. microsc. t. 88. f. o. p.

Habitat in Europæ stagnis, Aprili sc̄e caudæ monoculi quadricornis adhærens, corpusculis plerumque caulinibus, sessilibus, coacervatione morum referentibus.

- canalicu- 42. V. dilatata pellucida, latere inciso. *Müll. hist. verm. I. I. p. 104. n. 111. zool. dan. prodr. 2539.*

Habitat in aqua conservæ fluviatili infusa, postquam hæc virorem exuerat, gregaria, alba, pellucida, interante obscuris.

- nasuta. 43. V. cylindrica, crateris medio mucrone prominente. *Müll. hist. verm. I. I. p. 102. n. 110. zool. dan. prodr. 2538.*

Habitat parcius in Daniæ aquis inter lemnam, nudo oculo inconspicua, pellucida, formam pro lubitū mutans, motu multiplici, organo rotatorio medium corpus cingente.

- crateriformis. 44. *V. subquadrata*. Müll. hist. verm. I. I. p. 101. n. 109.
Hill hist. an. p. 6. t. 1. f. 2. Craspedarium corpore subovato.
Habitat in fossis Daniæ aquosis lemma obductis, & frequens
in aqua graminibus infusa, oculo nudo inconspicua,
vivacissima, pellucidissima, ut vesiculas tamen 8-10 in
medio distinguere liceat, organo rotatorio utrinque in
fasciculum ciliorum unito.
- truncata. 45. *V. cylindrica truncata*, ciliis confertis. Müll. hist. verm.
 la. I. I. p. 100. n. 108. zool. dan. prodr. 1536.
Hill. hist. an. p. 6. t. 1. Craspedarium corpore cylindrico.
Habitat haud frequens in aquis Daniæ lemnam ferentiibus,
limacina crassior, hyalina, moleculis nigricantibus farta,
posterior obtusa, anterior truncata, aperturæ margine
toto ciliis ornato.
- limacina. 46. *V. cylindrica truncata*, ciliis bigeminis. Müll. hist. verm.
 I. I. p. 100. n. 107. zool. dan. prodr. 2535.
Habitat in Daniæ aquis stagnantibus, testaceorum tenta-
culis orique insidens, oculo nudo inconspicua, hyalina.
- cornuta. 47. *V. inverse conica viridis opaca*. Müll. hist. verm. I. I.
 p. 99. n. 100. zool. dan. prodr. 2534.
Habitat in Daniæ paludibus, Decembri potissimum obvix,
crassa, formæ nutabilis, situ obliquo vacillando incedens.
- cincta. 48. *V. trapeziformis nigro viridis opaca*. Müll. hist. verm.
 I. I. p. 98. n. 105. zool. dan. prodr. 2533.
Habitat in Daniæ paludibus, oculo nudo invisibilis, circa
centrum lente rotata, formæ irregularis.
- Polymorpha. 49. *V. multiformis viridis opaca*. Müll. hist. verm. I. I. p.
 98. n. 104. zool. dan. prodr. 2532. Besch. berl. Naturf.
 2. p. 20. t. I.
Habitat - - - oculo nudo punctum agilissimum viride
ostendens.
- viridis. 50. *V. cylindrica uniformis viridis opaca*. Müll. hist. verm.
 I. I. p. 97. n. 103. zool. dan. prodr. 2531.
Habitat in Daniæ aquis purioribus, Septembri præsertim
obria, lente sc̄epe in linea recta, s̄epissime per circulum
in aqua mota, oculo nudo punctum parvum viride re-
presentans.

nigra. 51. V. trochiformis nigra. Müll. hist. verm. I. 1. p. 96. n. 102. zool. dan. prodr. 2530.

Habitat in Daniæ pratis inundatis. Augusto occurrens vacillando sere continue in summo aquæ mota, oculo nudo puncta minima nigra sistens.

TRICHODA. *Vermis* nudo oculo inconspicuus, pellucidus, altera parte crinitus.

* acaudatae.

Patella. 1. Tr. univalv's, anterius & posterius setis inæqualibus porrectis. Müll. hist. verm. I. 1. p. 95. n. 101. zool. dan. prodr. 2529.

Habitat rara in Daniæ aqua palustri, vacillando natans, pulposa, superius & inferius setis, pedum quasi vices agentibus hirta, valvula orbiculari crystallina, anterius subemarginata.

Inquili- 2. Tr. vaginata folliculo cylindrico hyalino, pedicello retor-
nus. Müll. zool. dan. I. p. 31. n. 8. t. 9. n. 2. rar. deser.
i. p. 17. prodr. app. p. 231.

Habitat in aqua marina putidissima, crateriformis, moleculis obscuris farrez, pedicello filiformi, vagina corpore triplo vel quadruplo longiori, rarius pedunculata; an fersan cum Patella distincti generis?

Anas. 3. Tr. elongata, apice colli subtus elongato. Müll. hist.
verm. I. 1. p. 95. n. 100. zool. dan. prodr. 2528.
Jublot microsc. t. 4. f. 1. n. m?

Habitat in aquis purioribus, moleculis obscuris impleta,
complanata, latitudine quintuplo longior, lente vagans.

Larus. 4. Tr. antrorsum dilatata, dorso gibbo. Hermann Natuf.
20. t. 3. f. 61.

Müll. zool. dan. prodr. add. p. 281. n. 4. Trichoda Anas.
Habitat in palude populi foliis putrescentibus plena, lente
& corpore ad latus curvato natans.

Ursula. 5. Tr. planiuscula elongata æqualis anterius crinita. Müll.
hist. verm. I. 1. p. 94. n. 99. zool. dan. prodr. 2527.
Habitat in forni aliorumque vegetabilium infusis putridis,
sæpe mucoscentibus, per aquam vagans, latitudine sua
sextuplo longior flexuosa, æqualis teretiuscula.

- Sannio. 6. Tr. incurvata, supra ciliata infra truncata. Müll. hist. ver. I. I. p. 94. n. 98. zool. dan. prodr. 2526.
Habitat rara in aquis, in quibus lemna nascitur, ludionem referens, ac cirris ventris nullis, capuis lateralibus utrinque duobus, mobilibus, pendulis, pilis in margine truncato 3-4 brevissimis.
- Linter. 7. Tr. ovato-oblonga, utroque fine prominula. Müll. hist. ver. I. I. p. 93. n. 97. zool. dan. prodr. 2525.
Habitat in aqua licheni coriario Groenlandorum infusa, centro vacillando festino motu agitata, interdum sursum deorsumque gyrata, utroque fine aequalis, globulorum serie utrinque duplice vel triplice.
- Pubes. 8. Tr. ovato-oblonga gibba, antrorsum depressa. Müll. hist. ver. I. I. p. 92. n. 96. zool. dan. prodr. 2524.
Habitat in aquis lemnam ferentibus, Decembri per cas regias, supra posterius maxilla nigra ab interaneis notata, apice obtuso pilis minimis, setis nullis obpresso.
- Cypris. 9. Tr. obovata, posteriora versus superne sinuata, anterius crinita. Müll. hist. ver. I. I. p. 91. n. 95. zool. dan. prodr. 2523.
Habitat in aquis lemna testis, quovis momento retrogrado motu agitata, monoculum cypridem referens, compressa, frontis capillis basi latiusculis.
- Cyclidi- 10. Tr. ovata, apice hiante, basique crinita. Müll. hist. um. ver. I. I. p. 90. n. 94. zool. dan. prodr. 2522.
Joblot microsc. I. 2. t. 2. f. 3. t. 8. f. 9. & t. 10. f. 19.
Habitat vulgaris in aqua vegetabilibus infusa, margine vacillando incedens, latere plano promota, antrorsum angustior, globulis diversi voluminis, retrorsum obscurioribus, repleta.
- Urina- 11. Tr. ovata, rostro brevissimo crinito. Müll. hist. ver. ri- um. I. I. p. 90. n. 93. zool. dan. prodr. 2521.
Joblot microsc. I. 2. p. 65. t. 8. f. 2-4?
Habitat rarius in aqua foeno infusa, vacillando mota, de- pressa, vesiculis molecularibus impleta, rostri ciliis brevissimis.
- Lepus. 12. Tr. ovata, apice crinito, basi setosa. Müll. hist. ver. I. I. p. 89. n. 92. zool. dan. prodr. 2520.
Habitat in simetis, infusionibusque tum animalibus tum vegetabilibus, abundantie, latice fluctuans, margine

utrinque sursum flexo, parciore lente procedens, & omni momento comitatum a via deflectens, compressa, anterorsum punctis 2-3 lucidis mobilibus.

- Calotium. 13. Tr. latiuscula oblonga, anterius corniculis micantibus. Müll. hist. verm. I. I. p. 89. n. 91. zool. dan. prodr. 2519.
Habitat in aqua vegetabilibus infusa, æqualis, planiuscula, utrinque obtusa, moleculis nigricantibus impleta, anterius corniculis 2-3 punctisque lucidis mobilibus 3-5, posterius setis brevissimis instruata.

- Silurus. 14. Tr. oblonga, anterius & posterius crinita, dorso ciliato. Müll. hist. verm. I. I. p. 88. n. 90. zool. dan. prodr. 2518.
Habitat copiosi in aqua conserva plena, & aliquandiu in vaseculo servata, opaca, subincurvata, complanata, sœre ovata, punctis inæqualibus lucidis & opacis plena, pilis ciliisque undique mobilibus.

- Mytilus. 15. Tr. subclavata, utroque fine latori hyalino ciliato. Müll. hist. verm. I. I. p. 87. n. 89. zool. dan. prodr. 2517. Hermann Naturf. 20. p. 51. t. 3. f. 12.
Habitat in aqua, potissimum palustri, paulo diutius affervata, celerrime natans nullumque aquani continue hauriens, vorticellæ affinis, immuculata, utroque fine quasi ex 2 laminis conflata, rotundata, medio interaneis nigricantibus, quibus vesiculae pellucidae interjacenti, obscura.

- Urnula. 16. Tr. urecolaris anterius crinita. Müll. hist. verm. I. I. p. 87. n. 88. zool. dan. prodr. 2516.
Habitat rarissima in aqua lemna obiecta, lente incedens, vorticellæ facie, membranacea, posterius obtusa, medio latiuscula, anterius truncata, moleculis vesicularibus & nigricantibus repleta, pilis æqualibus brevibus.

- Lynceus. 17. Tr. subquadrata, rostro adunco: ore crinito. Müll. hist. verm. I. I. p. 86. n. 87. zool. dan. prodr. 2515.
Habitat in aqua ante 3 septimanas regelata, a Mullero in copula deprehensa, in lineum rectam vix 2-3 corporis diametros progressa, confessim se paulisper recipiens, retroque in circulum mota, monoculum lynceum referens, membranacea, compressa, rostro porrecto infra truncato, pilorum fasciculo pendulo, interaneis tubulosis eximie conspicuis.

- Seminula. 18. Tr. senioribicularis, anterius subtus crinita. Müll. hist. verm. I. I. p. 85. n. 86. zool. dan. prodr. 2514.

Habitat in aqua lemnae infusa, lento, convulsivo quasi motu agitata, complanata, figuram lunæ in primo quadrante constitutæ, præ se ferens, pilis raris brevissimis.

Orbis. 19. *Tr. orbicularis anterius emarginata crinita.* Müll. hist. ver. I. I. p. 85. n. 86. zool. dan. prodr. 2513.

Habitat rara in aquis, cimicem referens, at major & planior, tota e nueris moleculis vesicularibus conflata.

Cimex. 20. *Tr. supra convexa subtus plana crinita.* Müll. hist. ver. I. I. p. 84. n. 85. zool. dan. prodr. 2512. Goeze Besch. berl. Naturf. 3. p. 377. t. 8. f. 7-12.

Joblot microsc. I. 2. p. 78. t. 2. f. 3. t. 8. f. 99.

Habitat frequens in aqua simetorum & vegetabilibus infusa, colpodas devorans, rapacissima, natans & ambulans, lynceo affinis, at ovalis interaneis pellucidissimis indistinctis, interdum gibba & posterius opaca.

Charon. 21. *Tr. cymbiformis, fronte crinita.* Müll. hist. ver. I. I. p. 83. zool. dan. prodr. 2511.

Habitat in aqua maris, lynceo duplo major, undulatim mota, anterius setis 2-3 porrectis, in medio solitariis mobilibus instructa.

Tinea. 22. *Tr. clavata anterius crinita, posterius grossa.* Mull. hist. ver. I. I. p. 83. n. 84. zool. dan. prodr. 2510.

Habitat in aqua foeno infusa, post 3 demum septimanas conspicua, lepore triplo minor, lente pilis continue micantibus incedens, teres, subpellucida, anterius angusta, tineam referens.

trigona. 23. *Tr. convexa anterius ciliata posterius erosa.* Müll. hist. ver. I. I. p. 82. n. 83. zool. dan. prodr. 2509.

Habitat rario in aquis, sub lemna vacillando incedens, pilis brevissimis.

Angulus. 24. *Tr. angulata apice crinita.* Müll. hist. ver. I. I. p. 81. n. 82. zool. dan. prodr. 2508.

Habitat rara in aqua foeno infusa, interrupte per circulum mota, elongata, teretiuscula, quasi infracta, pilis brevibus, interaneis non discernendis.

Pullaster. 25. *Tr. ovata, anterius sinuata, fronte cristata basi crinita.* Müll. hist. ver. I. I. p. 81. n. 81. zool. dan. prodr. 2507.

Habitat in aquis sub lemna, pulci affinis, sed minor, supra pellucida pundis nigricantibus vacue, anterius

VERMES INFUSORIA. Trichoda.

singuata fronte truncata, totaque capitinis superficie pilis aspera, distincta.

Pulex.

26. Tr. ovata anterius incisa, fronte basique crinitis. Müll. hist. ver. I. I. p. 80. n. 80. zool. dan. prodr. 2506.
Habitat rario in aqua sub lemna, quoties 3-4 gressus processit, unum mox retrogradiens, Colpodam cucullum referens, erecta, convexiuscula, pellucida, moleculis nigricantibus undique referita, fronte obtusa pilis ratiibus instructa, quibus alternatim vibrat.

- Pellionel-27. Tr. cylindrica anterius crinita posterius setosa. Müll. hist. ver. I. I. p. 80. n. 79. zool. dan. prodr. 2505.
Habitat in aqua vegetabilibus infusa, lente incedens, medio paulo crassior, utrinque obtusa.

- Camelus. 28. Tr. anterius crinita crassiuscula medio utrinque emarginata. Müll. hist. ver. I. I. p. 80. n. 78. zool. dan. prodr. 2504.
Habitat rara in aqua, vegetabilibus infusa, in qua lente movetur pilis quasi oscillantibus, anterius ventricosa, dorso medio in 2 quasi tubercula diviso.

- Acarus. 29. Tr. piriformis, anterius subtus crinita, posterius pedata. Müll. hist. ver. I. I. p. 79. n. 77. zool. dan. prodr. 2503.
Habitat raro in aqua lemna, testa plurimum per circulum mota, vivida, conica, moleculis nigricantibus impleta, anterius hyalina, apice attenuato, subtus ciliis longis radiato, subtus cirris & mobilibus, longis, curvatis inflexu.

- Bomba. 30. Tr. mutabilis anterius pilis sparsis. Müll. hist. ver. I. I. p. 78. n. 76. zool. dan. prodr. 2502. Schranck oberdeutsch. Beytr. 1787. p. 146. t. I. f. L.
Habitat frequens in aquis, ubi lemna vegetat, granatae affinis, at major & slavegens, vivacissima, crassa, moleculis latescentibus repleta.

- Granata. 31. Tr. sphaerica, centro opaco, peripheria crinita. Müll. hist. ver. I. I. p. 78. n. 75. zool. dan. prodr. 2501.
Habitat in aquis lemna coopertis, grandinellæ & cometæ affinis, at vita sedentaria, nucleo obscuro, interaneis non discernendis, ciliis totum marginem occupantibus diametro brevioribus distincta.

- Cometa. 32. Tr. sphaerica, anterius crinita, globulo appendente. Müll. hist. ver. I. I. p. 77. n. 74. zool. dan. prodr. 2500.

Habitat in aqua purissima, auctumno conspicua, vorticellarum peduncularum more circumnatans, tota pellucida.

- Grandinella. 33. *Tr. sphærica pellucida superne criuita.* Müll. hist. verm. I. t. I. p. 77. n. 73. zool. dan. prodr. 2499.
Habitat in aqua purissima, & vegetabilis insusa, interaneis vix discernendis, setis 2, 3 pluribus in puncto superficie.
- Sol. 34. *Tr. globularis undique radiata.* Müll. hist. verm. I. t. p. 76. n. 72. zool. dan. prodr. 2498.
Joblot microsc. I. 2. p. 64. t. 7. f. 15.
Habitat in aqua per 3 septimanas affervata, radiis ex tota superficie prodeuntibus innumeris subtilissimis, diametro longioribus interaneis molecularibus similaribus.
- Syncaster. 35. *Tr. subquadrata rostro obtuso, disco pedicellis micantibus.* Müll. zool. dan. I. I. p. 33. ic. I. t. 9. n. 3. rar. descr. I. 3. 19. prodr. app. p. 281.
Habitat in aqua marina affervata, minima.
- Rattus. 36. *Tr. oblonga cariata, anterius pilis brevissimis, posterius seta longa simplici.* Müll. zool. dan. prodr. app. p. 281.
Hermann Naturf. 20. p. 163. n. 47. t. 3. f. 47.
Habitat in aqua stagnante, inter lemnas, aequaliter mota, interaneis in gilbo dorſi conspicuis.
- ciliata. 37. *Tr. ventricosa, posterius crinibus pectinata.* Müll. zool. dan. 2. t. 73. f. 13-15. rar. descr. 2. p. 100.
Habitat in aqua mytilli edulis, leucophrani fluidum referens, flavicans, crassa, reniformis, vel triangularis, ciliis undique cincta, crinibus totum marginem posteriorem occupantibus, intermedii longioribus.
- fulcata. 38. *Tr. ovato ventricosa apice acuminata, fulco ventrali utrinque crinito.* Müll. zool. dan. 2. t. 73. f. 16-20. rar. descr. 2. p. 100.
Habitat in aqua inter valvulas mytilli edulis retenta, ignis referens, at major, flavicans, anterius pallida absque ciliis.
- ** caudatae.
- transfuga. 39. *Tr. latiuscula anterius crinita posterius setosa, altero lateris sinuata, altero mucronata.* Müll. zool. dan. I. p. 29. ic. t. 9. n. 1. rar. descr. I. p. 16. prodr. app. p. 281.

Habitat in aqua marina, aliquandiu affervata, in dorso ut plurimum natans, primo antrorsum procedens, mox con vulsivo quasi motu retrogradiens, inter congeneres magna, duplo longior, quam lata, ad latus & retrorsum conspicuis interaneis, anterius rotundata, pilis interdum in 2 fasciculos junctis, dorso ultra medium convexo, in caudam latam depresso subtetragonam oblique truncatam terminata, sub qua setae 4 pluresve flexuose.

Delphi- 40. *Tr. oblonga, anterius crinita, posterius cauda reflexa
nus.* truncata. *Müll. hist. ver. I. I. p. 75. n. 71. zool.
dan. prodr. 2497.*

*Habitat in aqua foeno infusa, post 2 septimanas conspicua,
lateribus planis potissimum mota, complanata,
cauda dimidia corporis longitudine apice dilatata:
angulo superiore prominulo.*

Ludio. 41. *Tr. cirrata, supra crinita, cauda sursum extensa. Müll.
hist. ver. I. I. p. 75. n. 70. zool. dan. prodr. 2496.*

*Habitat rarissima in aquis Daniæ nemoralibus, lepida, vi-
vida, nunc in gyrum circumdata, nunc per lineam
angulatam vacillans, pendulata, anterius clavata, pos-
terius angustior, basi versus anteriora oblique truncata,
ciliis cirrisque mobilissimis.*

Musculus. 42. *Tr. ovalis anterius crinita, posterius subtus caudata. Müll.
hist. ver. I. I. p. 71. n. 69. zool. dan. prodr. 2495.*

*Habitat in aqua foeno infusa, post plures demum septimæ
nas conspicua, lentius mota, complanata, pilis raris
brevissimis, cauda spinam referente, interdum triplo
minor & vivacior.*

Fiscis. 43. *Tr. oblonga anterius crinita, posterius in caudam ex-
quisitam extenuata. Müll. hist. ver. I. I. p. 73. n. 68.
zool. dan. prodr. 2494.*

*Habitat in aquis lemna plenis, per septimanam affervatis,
lente mota, complanata, & qualis ubique latitudinis, mo-
leculis fluorescentibus plana, anterius obtusa: pilis ra-
rioribus & brevissimis, posterius hyalina.*

Cunicu- 44. *Tr. oblonga anterius crinita, posterius subacuminata.
lus.* *Müll. hist. ver. I. I. p. 73. n. 67. zool. dan. prodr. 2493.*

*Habitat rario paulo in aquis purioribus, motu vagatorio,
complanata, moleculis & vesiculis nigricantibus repleta,
anterius obtuso: ciliis brevissimis, posteriori apice hyalino.*

- Clavus. 45. Tr. anterius rotundata crinita, posterius acuminato-caudata. Müll. hist. verm. I. I. p. 72. n. 66. zool. dan. prodr. 2492.
Habitat in paludosis, lente mota, clarum referens, pilis anterius raris, passim mobilibus.
- Pupa. 46. Tr. aculeata fronte crinita, cauda inflexa. Müll. hist. verm. I. I. p. 72. n. 65. zool. dan. prodr. 2491.
Habitat rara in aquis cum lemna, culicis pupam referens, lente in circulum mota, teretiuscula, capitis pilis brevissimis, in inferiore ejus regione vesicula hyalina, cauda obliqua.
- Clava. 47. Tr. clavata, fronte crinita, cauda reflexili. Müll. hist. verm. I. I. p. 71. n. 64. zool. dan. prodr. 2490.
Habitat rario in paludosis Daniæ, Novembri conspicua, cypridi affinis, at triplo major, pilis anicis longis, posteriori parte angustiore nuda.

CERCARIA. *Vermis* nudo oculo inconspicuus, pellicidus, caudatus.

* *depressæ.*

- Pleuronectes. 1. C. orbicularis, cauda unisetata. Müll. hist. verm. I. I. p. 70. n. 63. zool. dan. prodr. 2488.
Habitat in aqua per 6 septimanas asservata, vacillando mota, membranacea, albida (a morte virens), anterius punctis 2 subapproximatis nigris, cauda subili acuta: interaneis in medio orbicularibus, majori uno pellucidissimo.
- tenax. 2. C. membranacea anterius crassiuscula truncata, cauda triplo breviore. Müll. hist. verm. I. I. p. 69. n. 62. zool. dan. prodr. 2487.
Habitat in aqua sordibus dentium infusa, post 4 dies apparet, celeri gyro in varias direcciones vagans, lente paulo major, obovata.
- Cyclidium. 3. C. ovalis posterius subemarginata, cauda exsertili. Müll. hist. verm. I. I. f. 68. n. 61. zool. dan. prodr. 2486.
Habitat frequens in aquis purioribus, ad angulum acutum vacillando, per diagonalem guttulæ currendo mota, pellucidissima, margine nigricante, cauda latente, interaneis vesicularibus pellucidis.

** *subtrigona*.

- tripus.* 4. *C. brachiis deflexis.* Müll. zool. dan. prodr. 2489.
Habitat in aqua marina.
- *** *teretes.*
- Lemna.* 5. *C. mutabilis, cauda annulata.* Müll. hist. ver. I. I. p. 67. n. 60. zool. don. prodr. 2485.
Habitat in aqua palludosa, lente incedens, & incedendo m-
rifice se contrahens formant que nutans, pyriformis, ob-
longa, elongata, reniformis vel triangularis, cauda brevi
crassa annulata, aut flexuosa tereti, absque annulis.
- Lupus.* 6. *C. cylindrica elongata torosa, cauda spinis duabus*
Müll. hist. ver. I. I. p. 67. n. 59. zool. dan. prodr. 2484.
Habitat rara in aquosis lemnam ferentibus, congeneribus du-
pto vel triplo major, Vorticella feli affinis, & organo
rotario nullo, & apice subtus in mucronem terminato dif-
cernenda, musculosa contractilis, capite trunco dimidio
majorc, apice deorsum in uncum parvum producto.
- Podura.* 7. *C. cylindrica, posterius acuminata subsissa.* Müll. hist.
verni. I. I. p. 66. n. 58. zool. dan. prodr. 2483.
Habitat in Daniæ paludofis lemna cooperatis, Novembri &
. Decembri obvia, poduras pullas referens, corpus circa
axin volvendo in quamvis plagam incedens, capite hale-
cem referens, trunco fornice pro lubitu mutabilis, intes-
tinis nigris spiralibus replete.
- Catellus.* 8. *C. tripartita, cauda bifeta.* Müll. hist. ver. I. I. p. 65.
n. 57. zool. dan. prodr. 2482.
Habitat in aqua per annum servata, & in aqua per septima-
nam flores nutrita, abdome capite duplo longiori
cauda latiori.
- Gyrinus.* 9. *C. rotundata, cauda acuminata.* Müll. hist. ver. I. I.
p. 64. n. 56. zool. dan. prodr. 2481.
Hill hist. an. t. I. 3. Macrocerus corpore globose,
cauda crassiore.
Leeuwenh. ep. phys. 41. f. 5.
Fraenk. Samml. 4. p. 227. n. 1. f. a. p. 372. t. 3. f. a. b.
Ledermüll. an. sperm. f. 1. 2?
Baker microsc. expl. t. 10. f. 1?
 β) *Hill anim. hist. t. I. 4?*
Habitat rara in aqua partibus animalibus infusa, candida,
gelatinosa, absque omni interaneorum vestigio, anterius

subglobosa, posterius teres elongata, interdum utrinque compressa, natando caudam instar gyrini vibrans.

BURSARIA. *Vermis simplicissimus membranaceus cavus.*

- Hirundi-nella. 1. *B. excavata mucronata.* Müll. hist. verm. I. I. p. 63. n. 55. zool. dan. prodr. 2480.

Habitat in aquis nemoralibus, Julio & Augusto circa lennam copiosissima, lente volutata, brachiisque extensis hirundines in aere circumvolitantes mentiens, linea dupli subelevata transversa inæqualis, margine in quatuor mucrones plagas oppositas spectantes, 2 laterales æquales breviores expanso.

- Truncu-tella. 2. *B. ventricosa apice truncata.* Müll. hist. verm. I. I. p. 62. n. 54. Müll. zool. dan. prodr. 2479.

Habitat in Daniæ fossis aquosis paludibusque nemoralibus, foliis fagi putrescentibus repletis, vere copiosa, nudo oculo usurpanda, albida, lente se ab uno latere ad alterum volvendo per lineam spiralem in aquæ superficiem ascendens, ovata, $\frac{1}{2}$ lineæ magnitudine, apice hiantæ, ovis saepius in fundo 3-5 sphæricis, rufis.

GONIUM. *Vermis nudo oculo in conspicuus simplissimus, complanatus angulatus.*

- polyf-phasium. 1. *G. orbiculare pellucidum moleculis sphæricis innume-ris.* Schrank. oberd. Beytr. I. p. 145. §. 5. t. 2. f. 1. K.

Habitat in aqua stagnante pariere, Julio conspicua, innumeris globulis conflans, tunicae communi inclusis, pellucidissimis, ex virescente flava, pectorali multo minus.

- trunca-tum. 2. *G. obtusangulum posterius arcuatum.* Müll. hist. verm. I. I. p. 61. n. 52. zool. dan. prodr. 2477.

Habitat haud frequens in aquis puris, pulvinato multo majus, lente procedens, antrosum linea recta terminatum, subtus linea brevior in angulum obtusum; truncatum, turibus arcu unius, interaneis obscure virescentibus, in medio vesiculis 2 majoribus hyalinis.

- lunatum. 3. *G. rectangulum posterius acuatum.* Müll. hist. verm. I. I. p. 62. n. 53. zool. dan. prodr. 2478.

VERMES INFUSORIA. Colpoda.

Habitat frequentius, truncato minus, interaneis virescentibus, intermedia vesicula majore hyalina.

- pulvina-
tum. 4. *G. quadrangulare opacum, pulvillis quatuor.* Müll.
hist. verm. I. I. p. 61. n. 51. zool. dan. prodr. 2476.
Habitat in simetis, ad angulum acutum lente vibrando mo-
tum, in 4 quasi areolas divisum.
- pectorale. 5. *G. quadrangulare pellucidum, moleculis sedecim sphæ-*
ricis. Müll. *hist. verni. I. I. p. 60. n. 50. zool. dan. prodr.*
2475. act. Stockh. 1781. p. 21. kl. Schr. I. p. 15. f. 1-3.
Goeze apud Bonnet. insectol. p. 376. t. 4. f. 8.
Pellisson Besch. berl. Naturf. I. p. 339.
Bescke leipz. Magaz. 1784. 3. p. 319.
Schrantz Beytr. z. Naturg. p. 107. I. 4. f. 23-27.
Habitat in Europæ aquis puris, alternatum dextram sinis-
tramque versus ultra circuli quadrantem se volvendo
progrediens, moleculis motu ovalibus, subvirentibus,
unioni instar pectoralis summi pontificis membranæ
quadrangulæ inclusus.

COLPODA. *Vermis nudo oculo inconspicuus, sim-*
plicissimus, pellucidus, complana-
tus, sinuatus.

- Hippocre-
pis. 1. *C. torosa medio angustata semilunaris virescens.* Her-
mann *Naturf. 20. p. 169. n. 59. t. 3. f. 60.*
Habitat in aqua inundante, asservata, formæ constantis
agilis, continue mota.

- Melea-
gris. 2. *C. mutabilis, anterius uncinata posterius complicata.*
Müll. *hist. verm. I. I. p. 59. n. 49. zool. dan. prodr. 2474.*
Habitat rara in aquis cum lemna, varie se plicando lente
mota, apice in uncum flexo, anterius hyalina, poste-
rius moleculis repleta.

- Cucullius. 3. *C. ovata anterius incisa.* Müll. *hist. verm. I. I. p. 58. n.*
48. zool. dan. prodr. 2473.
Joblot microsc. I. 2. t. 2. f. 2-7. t. 3. f. F.G. P. t. 4. f. 2. t.
f. p. g. A. B. t. 5. f. 5. S. f. 6. V. f. 7. & t. 6. f. 2. 4. 5. 6.
Leddermüll. microsc. p. 88. t. 48. f. 1.
Wrisberg an. infus. p. 59. f. 4. D. E. F. G. O. f. 10.
C. D. E. F. G. H. & f. 12.
Spallanz. anim. infus. p. 128. 129. t. I. f. 3. 4.

Schranck Beytr. 1. Naturg. p. 17. t. 1. f. 21.

Goeze Besch. berl. Naturf. 3. p. 376. t. 8. f. 1-6.

Habitat vulgaris in aqua foeno aliisque vegetabilibus infusa, in variis directiones vivide mota, ventricosa, pellucidissima, antrosum infra apicem in rostrum utplurimum obtusum sinuatum, vesiculas pellucidas, junior nullas, adultior 8-24 continens, sobolem.

Ren. 4. C. crassa medio sinuata. Müll. hist. verm. I. 1. p. 57. n. 47. zool. dan. prodr. 2472.

Joblot microsc. I. 2. p. 65. c. 8. f. 3. A. B. C.

Habitat in aqua foeno infusa, decem horis elapsis comparentis, celeriter vacillando mota, flavescens, aut crystallina subobscura, teres, interaneis molecularibus farta.

Rostrum. 5. C. oblonga anterius uncinata. Müll. hist. verm. I. 1. p. 57. n. 46. zool. dan. prodr. 2471.

Habitat haud frequens in aquis leninam ferentibus, lente & horizontaliter mota, saepe in alteram paginam praecipue projecta, moleculis nigris tantibus repleta, posterius obtusa.

Lamella. 6. C. elongata membranacea, anterius curvata. Müll. hist. verm. I. 1. p. 56. n. 45. zool. dan. prodr. 2470.

Habitat rarissima in aquis, margine acuto vagando vacillans, crystallina, pellucidissima angusta, posterius obtusa.

PARAMECIUM. *Vermis* nudo oculo inconspicuus, simplex, pellucidus, complanatus, oblongus.

Histrio. 1. P. ovato-oblongum, anterius punctis mobilibus nigris. Müll. hist. verm. I. 1. p. 55. n. 44. zool. dan. prod. 2469. Habitat inter conservas aquarum dulcium, motu convulso retrahili agitatum, punctis anterius 4-5 omni momento locum mutantibus notatum.

Aurelia. 2. P. oblongum anterius in longitudinem plicatum. Müll. hist. verm. I. 1. p. 54. n. 43. zool. dan. prodr. 2468. Hermann Naturf. 20. t. 3. f. 41. a.

Hill hist. anim. t. 1. 3. Paramecium corpore sublongo medium versus angustato.

Wrisberg an. infus. f. 7. a. E.

Habitat in fossis lemna plenis, Junio obvia, & copiosa aqua vegetabilibus infusa, secundum lineas redas vacillans,

*juscula, membranacea, latitudine quadruplo longior, anterius obtusa, hyalina, posterius moleculis varia-
tum producita.*

cauda-
tum.

3. P. utroque fine acuminatum, medio latiore moleculis
referro. Hermann Naturf. 20. p. 157. n. 38. t. 3. f. 38.
Habitat in aquis sub lemma, motu lento & quilibet agitatum.

anceps.

4. P. cauda ancipite, capite obtuso. Hermann Naturf. 20.
p. 157. n. 39. t. 3. f. 39.
*Habitat in aqua, hydrocharide referta, motu lento & qua-
bili laterali directionem spiralem sequens.*

acutum.

5. P. cauda ancipi, capite acuto. Hermann Naturf. 20.
p. 158. n. 40. t. 3. f. 40.
*Habitat in lemma aquarum stagnantium, minus agile,
caudam continue motitans.*

CYCLIDIUM. *Vermis nudo oculo inconspicuus simplicissimus, pellucidus, com- planatus, orbicularis vel ovatus.*

Pedicu-
lus.

1. C. ovale convexum subtus planum. Müll. hist. verm. I.
I. p. 54. n. 42. zool. dan. prodr. 2457.
Trembl. polyp. I. p. 282. t. 7. f. 10. II.
Goeze Besch. berl. Naturf. 2. p. 281. t. 8. f. 13.
*Habitat in hydra fusca & pallente, corpori tentaculisque
adhaerens, Julio potissimum & Augusto occurrentis, motu
formaque multiplici varians, gelatinosum, albidum,
utroque fine depresso truncatum.*

Nucleus.

2. C. ovale, posterius acuminatum. Müll. hist. verm. I. I.
p. 53. n. 41. zool. dan. prodr. 2466.
Hill hist. anim. I. 4? Cyclidium corpore ovato.
*Habitat rara in aqua vegetabilibus infusa, figura nucleus
uvarum referens, compressum, distinde marginatum,
anterius convexo-obtusum interaneis vesicularibus, an-
terius & posterius ab altero latere obscurioribus.*

rostra-
rum.

3. C. ovale anterius mucronatum. Müll. hist. verm. I. I.
p. 53. n. 40. zool. dan. prodr. 2465.

Habitat in aqua vegetabilibus infusa, complanatum, pellucidissimum, intus canali cæruleo ab apertura in zucrura diviso, ad medium corporis, infra medium lineolatis 2 transversis.

- radians. 4. *C. ovatum, interaneis manifestis. Müll. hist. vermt. I. I. p. 52. n. 39. zool. dan. prodr. 2464. Hermann Naturf. 20. p. 151. t. 3. f. 27. i.*
Hill hist. an. t. I. f. 3. Cyclidium corpore elliptico. Spallanz. an. infus. t. I. f. 2-6.
Habitat haud frequens in aqua vegetabilibus infusa, inter ovatum & orbiculare medium, pellucidissimum, planum, margine nigricante, interaneis vesicularibus hyalinis, materice cæruleæ inclusis.
- Glaucous. 5. *C. ovatum, interaneis ægre conspicuis. Müll. hist. vermt. I. I. p. 51. n. 38. zool. dan. prodr. 2463. Hermann Naturf. 20. p. 148. t. 3. f. 27. b?*
Habitat in aqua ultra 6 menses hiemales in vase aperto servata, in abundante aqua motu celere circulari & diagonali, quemadmodum gyrini, agitatum, utrinque planiusculum, intestinis cærulecentibus.
- Milium. 6. *C. ellipticum crystallinum. Müll. hist. vermt. I. I. p. 50. n. 37. zool. dan. prodr. 2462.*
Habitat in aqua variis stirpibus infusa, post plures septimanas copiosissimum, sparsum, milii semina referens, motu celeri micatorio interrupto agitatum, pellucidissimum, puncto anteriori & posteriori nigricante.
- Bulla. 7. *C. orbiculare hyalinum. Müll. hist. vermt. I. I. p. 49. n. 36. zool. dan. prodr. 2461.*
Hill hist. anim. t. I. 2. Cyclidium corpore orbiculari subfuscō.
Wrisberg anim. infus. f. I. b. & f. 2. i?
Habitat passim in aqua fœno infusa, motu lento semicirculari agitatum, interaneis globularibus, margine solo obscuriore.

VIBRIO. *Vermis nudo oculo inconspicuus, simplicissimus, teres, elongatus.*

* pelucentes.

- Columbus. 1. *V. crassius posterius acuminatus, collo subfalcato.* Müll. hist. ver. I. I. p. 49. n. 35. zool. dan. prodr. 2460.
Habitat rarus in aquis, lente rotutus, congeneribus major, aven aquaticam referens, truncu subtriquetro, moleculis fluorescentibus replete, antrosum late, collo breviori aequali, hyalino, apice obtuso.
- Fasciola. 2. *V. anterius attenuatus, medio latiusculus, posterius acutus.* Müll. hist. ver. I. I. p. 48. n. 34. zool. dan. prodr. 2459.
Habitat rarius in aqua gelu soluta, lente fasciolæ instar incedens, festine autem utrumque finem alternatim sum deorsumque movendo, totumque sinu corpus cylindri in modum circumagendo, interaneis pundorum æmulis mediis.
- Utriculus. 3. *V. teres anterius angustatus truncatus, posterius ventricosus.* Müll. hist. ver. I. I. p. 48. n. 33. zool. dan. prodr. 2458.
Habitat in aqua marina putrida, etiam fluviali per mensis in vasculo stagnante, utrem figura referens concitam vacillans, vagandoque collum hyalinum, apice truncatum quovis momento citissime in utrumque latu motans, ventre interaneis replete: punto interdum ad basin pellucido.
- Malleus. 4. *V. linearis, bafi globose, apice linea transversa.* Müll. hist. ver. I. I. p. 47. n. 32. zool. dan. prodr. 2457.
Habitat copiosus in putei aquis, albus, T latinum referens, alternatim motus & quiescens.
- Cygnus. 5. *V. ventricosus, collo adunco.* Müll. hist. ver. I. I. p. 47. n. 31. zool. dan. prodr. 2456.
Habitat in aqua stagnante, congenerum inertissimus, collum modo exserens & retrahens, exilis, pellucidissimus, posterius acutus truncu anteriori parti aequali, moleculis obscuris & intessinis pellucidis replete, cauda triplo breviore.
- Ausser. 6. *V. ellipticus, collo longo, tuberculo dorsali.* Müll. hist. ver. I. I. p. 46. n. 30. zool. dan. prodr. 2455.
Habitat in aquis, quæ lemnam ferunt, lento motu, collis flexuoso vivaciori, sœpe spirali agitatus, inter falcem & Proteum medius, ab illa collo longiori tuberculo dorsali huic

vicino, ab hoc colli apice æquali discernendus, teres moleculis refertus, posterius hyalinus, canalibus intra margines colli cærulecentibus.

- Falx. 7. V. gibbosus, posterius obtusus, collo falcato. *Müll. hist. ver. I. I. p. 46. n. 29. zool. dan. prodr. 2454.*
Habitat in paludosis lemlna refertis, latere plano sursum vergente progrediens, colloque immobili felcis formam mentiens, pellucidus supra planus, subitus gibbus, moleculis minimis globulijque 2 hyalinis impletus, collo teretiusculo, hyalino, trunci fere longitudine, attenuato.

- Proteus. 8. V. ellipticus, collo longissimo: apice nodoso. *Müll. hist. ver. I. I. p. 45. n. 28. zool. dan. prodr. 2453.*
Pallas el. zooph. p. 94. n. 51. & p. 417. n. 2. Brachionus simplex mutabilis, tentaculo longissimo retractili, ore ciliato, & Volvox polymorpho-mutabilis, totus e moleculis homogeneis compositus.
Baker microgr. p. 270. t. 10. f. 110. a-f.
microsc. t. 10. n. XI. f. 1-6.
Roes. inf. 3. polyp. t. 101. f. A-T?
Habitat rarus in aqua diutius in vasculo servata virore que vegetabili plena, vividus, colli motu continuo, corporis lento, formæ mutabilis, posterius moleculis obscuris repletus, collo corpore duplo & triplo longiore, pellucidissimo.

** gelatinosi.

- Intesti- 9. V. teres anterius angustatus. *Müll. hist. ver. I. I. p. num. 44. n. 27. zool. dan. prodr. 2452.*
Habitat in Daniæ paludosis, lente progrediens, laetus, utroque fine obtusus, anteriorem scapius in se retrahens, versus posteriorum ora 4-5 sphærica ostendens.

- Undula. 10. V. filiformis flexuosus. *Müll. hist. ver. I. I. p. 43. n. 26. zool. dan. prodr. 2451. Hermann Naturf. 20. p. 150. t. 3. f. 27. g.*
Leeuwenh. epist. phys. 41. f. 5.

arcan. nat. 96? Anguilla.

Habitat in aqua lemna coperta asservata, vivacissimus adscendendo, descendendo, recta pergendo progrediens, teres, Lineola longior, Vermicula multoties minor, interaneis nullis conspicuis, nunquam recta extensus.

Vermiculus. V. tortuosus. Müll. hist. verm. I. t. I. p. 42. n. 25. zool. dan. prodr. 2450.

Leuwenh. op. omn. p. 56. (in ranarum fæcere) arcana. nat. p. 18. f. 5.

Habitat rarus in aqua palustri, Novembris obvius, undulations at lentissime motus, interdum at laboriose recta extensus progredivis, quiescendo nonnunquam complanus, laetus, teres, elongatus, apice obtusus, retrorsum acuminatus.

Serpens. 12. V. æqualis utrinque subacuminatus. Müll. hist. verm. I. talus. I. p. 42. n. 24. zool. dan. prodr. 2449.

Hill hist. anim. t. I. Enchelis corpore utrinque attenuato graciliiori.

Frank. Samml. 4. p. 227. n. 1. f. b.-f.

Spallanz. microsc. p. 189. f. 2. 12.

Habitat in aqua vegetabilibus infusa per septimanas assertata, serpentis more motus, at sèpe recta extensus, & tranquillus, brevior anguillula, & serie punctorum minutorum longitudinali notatus.

Anguilla. 13. V. æqualis subrigidus. Müll. hist. verm. I. I. p. 41. n. dulca. 23. zool. dan. prodr. 2448. Naturf. 16. p. 161.

Mundus invisib. in amœniss. acad. Coruscum vermiculo simile.

Roffredi Journ. de physique 1775. Jan. t. I. f. 7. 1778. Nov. p. 401. Anguille vulgaire.

Needham microsc. t. 5. f. 7. & Hamb. Mag. I. p. 399.

Spallanz. an. infus. p. 189. f. 12.

Gleichen microsc. p. 61. t. 28. f. 6.

Eichhorn kl. Wäserth. p. 72. t. 8. f. A.

β) Roffredi Journ. de phys. Jan. 1775. t. I. Anguille de blad rachitique.

γ) Roffredi journ. de phys. 1776. Jan. p. 72. Mart. p. 372. 436. Anguille du faux ergot.

T. Fontana suggio d'osserv. sopra il falso ergot e la tremella. Flor. 1775.

Habitat in sedimento vegetabili, parietes vasorum, in quibus aqua stagnat, obvestiente, aut frumenti granis rhachiticis vel cornutis infusa, pellucidissimus, absque conspicuis interaneis, ut tamen interdum linea media transversa, rarius corpuscula bina ovata, rarissime longitudinatis globularum series oculis armata occurrit, oviparus.

- aceti. 14. A. subrigidus, cauda longiore tenuiore acuminata : mucrone retractili ad basin prominente. *Goeze Naturf.* 1. p. 1. 9. p. 179. 18. p. 38. t. 3. f. 12-19. & apud Bonnet org. Koerp. p. 59.
Müll. Naturf. 19. p. 162.
Rossmundi journ. de phys. 1775. t. 1. f. 5. 1776. *Jan.* p. 71. *Mart.* p. 382. Anguille du vinaigre.
Borelli observ. microsc. 1. p. 7.
Leeuwenh. op. omn. p. 3. f. 1-0.
Baker. microsc. t. 10. f. 8. 9.
Joblot microsc. I. 2. t. 1.
Power microsc. p. 30.
Hoon microsc. t. 25 f. 2.
Unzer phys. Schr. p. 260.
Bischoff n. opt. Beytr. p. 24-26 & *Beytr. z. Opt.* p. 40.
Fraenk. Samml. 4. p. 277. n. 2. f. g. o.
Habitat in aceto aliisque acidis mitioribus, aëri opportunitis, quibus congelatis obrigescit, relegati ad motum reddit, evaporatione dissipatis, quemadmo ium alia infusoria, dilabitur & perit, nunquam reviviscens, nisi pulvifculis a vi aëris defendantibus involutus fuerit, exuvias deponens, Julio autumnum versus viviparus, in serum usque autumnum oviparus, fertilissimus, sexibus distinctis, filiformis, vivax, pellucidus, utroque fine quam maxime, & vacuo, medio granulis repleto.

- glutinis. 15. V. filiformis, dorsi clypeo obscurō annulo albido cincto, capite clavato. *Goeze Naturf.* 9. p. 181. *Müll. Naturf.* 19. p. 162.
Syst. nat. XII. 2. p. 1326. n. 1. *Chaos (redivivum)* filiforme utrinque attenuatum.
Rossmundi journ. de phys. 1775. *Mart.* f. 4. 1776. p. 383.
Lederwüll. microsc. p. 33. t. 17. f. 1.
Habitat in glutine bibliopegorum, aliisque viscidis frumentaceis, atmospharæ contactui obviis, fertilitate, motu, vita, propagatione v. aceti similis, at multo tardior, brevior, cauda minus acuta.

- marinus. 16. V. filiformis æqualis. *Müll. Naturf.* 19. p. 163.
Habitat in aqua marina, an vere distinctus ab anguillula?

- Bacillus 17. V. linearis æqualis utrinque truncatus. *Müll. hist. verm.* I. 1. p. 40. n. 22. *zool. dan. prodr.* 2447.
Leeuwenh. arc. nat. p. 40. f. F. & p. 315. f. C. D.

Joblot microsc. I. 2. p. 67. t. 8. f. 12. 14.

Habitat in aqua foeno infusa diu servata, palustri, lemnam ferente, fætente *languidus*, *serpens*, recta semper linea progredivs, gordio laðeo similis, sed subtilissimus, ut monade lente dimidio sit angustior, quamvis sextuplo & decuplo longior.

Lincola. 18. V. linearis obscurus. Müll. hist. verm. I. 1. p. 39. n. 21. zool. dan. prodr. 2446.

Habitat in aqua vegetabilibus infusa, post aliquot dies copiosissima, bacillo tricies minor, ipsa monade ter mone fere minor, motu tremulo continuo agitatus.

LEUCOPHRA. *Corpus* undique ciliis albicantibus, motu argenti instar splendentibus cinctum: oculo nudo non conspicuum.

Euida.

1. L. subreniformis ventricosa. Müll. zool. dan. 2. t. 73. f. 1-6. rar. descr. 2. p. 97.

Habitat in aqua mytili edulis, flavicans, crassa, moleculis farta, in quas sensim fatiscunt, formæ mutabilis, ovatæ, oblongæ, vel subtriangularis.

acuta.

2. L. nigra acuminata. Müll. zool. dan. rar. descr. 2, p. 97.

Habitat - - -

fluxa.

3. L. sinuata reniformis. Müll. zool. dan. 2. t. 73. f. 7. 10. rar. descr. 2. p. 99.

Habitat in aqua mytili edulis, oblonga flavicans, altera parte obtusa, ciliis undique cincta, altera in conum producta, in plurimis in moleculas diffluentem.

Armilla.

4. L. teres annularis. Müll. zool. dan. 2. t. 73. f. 11. 12. rar. descr. 2. p. 99.

Habitat rario in aqua mytili edulis, altero fine paucisper incrassato & in annuli formam curvato farcimen referens.

Plures adhuc Leucophra species in aqua fluviatili & marinæ, in naidis tunicati, raro intestinalis occurunt, hadenvis nondum cura satis definita.

nodulata. 5. L. ovato-oblonga depressa, serie nodolorum duplici. Müll.
zool. dan. 2. t. 80. f. a-e. rar. descr. 2. p. 124.

v. *Gleichen microsc.* p. 59. t. 27. f. I. & t. 28. f. II.
Knopthierchen, Perlenthierchen.

*Habitat in lumbrici terrestris & naidis littoralis intestinis,
pellucidissima, argentei splendoris, partitione transver-
sali propaganda, junior ovalis, adultior oblonga, apice
truncata, ac rimula orificium simulante notata, ciliis
motu tremulo agitatis.*

BACILLARIA. *Corpus ex bacillis cylindricis situ-
parallelo, ceterum varia direc-
tione digestis compositum.*

paradoxa. I. B. Müll. kl. Schrift. I. p. I. f. 1-8:

*Habitat in littoris Havniensis ulva latissima, constans 5-40
& ultra bacillis brevibus, cylindricis; longitudine dia-
metrum 12es superante, intus niembranula flavicante
punctis lucidis sparsis 2-3 notata referis, quie:o ani-
mali in parallelepipedum jundis, facile in lineam
rectam, angulatunque pro lubitu animalis disponendis,
in qua singuli bacilli eundem semper obtinent locum..*

ENCHELIS. *Vermis* nudo oculo inconspicuus,
simplicissimus, cylindricus.

* *pellucidæ.*

Pyrum. 1. E. inverse conica, posterius hyalina. *Müll. hist. ver. I.* I. p. 38. n. 20. *zool. dan. prodr.* 2745.

Habitat haud frequens in aqua lemnam serente, diu servata, festine currendo & recurrendo per guttulæ diametrum se volutans, vivida, pellucida, anterius ventricosa, obtusa, moleculis mobilibus farta.

Spathula. 2. E. cylindrica striata, apice hyalino spatulata. *Müll. hist. ver. I.* I. p. 38. n. 19. *zool. dan. prodr.* 2444.

Habitat rara in aquis, in quibus lemna vegetat, vacillando mota, pellucidissima, striis secundum longitudinem exarata, globulos 2 hyalinos ut plurimum includens.

Papula. 3. E. cylindrica, apice papillari. *Müll. hist. ver. I.* I. p. 37. n. 18. *zool. dan. prodr.* 2443.

Habitat in simetis, ultimiis anni mensibus obvia, circa axim longitudinalem rotando mota, moleculis subsphaericis mobilibus antrorsum confertis impleta, utroque fine obtusa, antrorsum ventricosa, obscura, posterius pellucida: apertura circulari.

Fritillus. 4. E. cylindrica anterius truncata. *Müll. hist. ver. I.* I. p. 37. n. 17. *zool. dan. prodr.* 2442. *Hermann Naturf.* 19. p. 55. t. 8. f. 21.

Habitat in aqua gramini fœnove infusa, rarer post multas demum septimanas conspicua, motu vacillatorio guttulæ diametrum confertim percurrens, interdum per temporis momentum in gyrum acta, pellucidissima, posterius convexo-obtusa.

Ovalum. 5. E. cylindrico-ovata hyalina. *Müll. hist. ver. I.* I. p. 36. n. 16. *zool. dan. prodr.* 2441.

Habitat in simetis, solitaria inter monadum myriades, pellucidissima.

Fusus. 6. E. cylindrica, utroque fine angustiori truncata. *Müll. hist. ver. I.* I. p. 36. n. 15. *zool. dan. prodr.* 2440.

Habitat in aquis purioribus, lente mota, intestino longitudinali subflexuoso, liquore cæruleo & moleculis nigricaniibus repletos.

Episto- 7. *E. cylindrico-elongata, apice gracili globoso.* Müll.
mum. *hist. ver. I. I. p. 35. n. 14. zool. dan. prodr. 2439.*

Habitat in aqua scutente, ut plurimum per diametrum guttae vacillans, congenerum sere minima, teres, posterius obtusa, anterius subacuminata.

Seminu- 8. *E. cylindrica æqualis.* Müll. *hist. ver. I. I. p. 35.*
lum. *n. 13. zool. dan. prodr. 2438.*

Habitat in aqua diez aliquot servata, alternatim descendendo & ascendendo mota, latitudine duplo longior, interaneis anterius pellicidis, posterius obscuris.

** opacæ.

nebulosa. 9. *E. ovato-cylindrica, interaneis manifestis.* Müll. *hist.*
verm. I. I. p. 34. n. 12. zool. dan. prodr. 2437.

Habitat cum Cyclidio Glaucomate in eadem aqua, at triplo major, multoque rarior, anteriorem corporis partem elevando mota, anterius angustior, interaneis opacis.

Farcimen. 10. *E. cylindrica curvata utrinque truncata.* Müll. *hist.*
verm. I. I. p. 34. n. 11. zool. dan. prodr. 2436.

Joblot microsc. I. 2. p. 33. t. 5. f. 2. M.

Habitat rara in aqua diu servata, incedendo litteram S referens, latitudine quadruplo longior, æqualis, interaneis opacis.

viridis. 11. *P. subcylindrica anterius oblique truncata.* Müll. *hist.*
verm. I. I. p. 34. n. 10. zool. dan. prodr. 2435.

Habitat copiosa in aqua plures septimanas servata, omnino momento dextrorsum & sinistrorsum mota, posterius obtusa interaneis obscuris non distinctis.

352. VOLVOX. *Vermis nudo oculo inconspicuus, simplicissimus, pellucidus, sphæricus.*

Bulla. 1. V. subovalis. *Martinier journ. de phys.* 1787. Oct. p. 265. t. 2. f. 12.

Habitat in aqua, in vitro asservata, bullam saponis referens, in gyrum continuo acta, nunc solitaria, nunc gregaria.

Fileus. 2. V. hemisphæricus subitus excavatus membranaceus. *Schränck oberd. Beytr.* I. p. 144. §. IV. t. 2. f. G. H. *Habitat in aqua, inter congeneres major, dilute virescens, in gyrum saepius acta.*

Globator. 3. V. sphæricus membranaceus. *Müll. hist. verm.* I. I. p. 32. n. 9. *zool. dan. prodr.* 2434. *Syst. nat.* XII. 2. p. 1325. n. 3. *Fn. suec.* 2266. *Volvox globosus.*

Pallas el. zooph. p. 417. n. 1. *Volvox globosus immutabilis, scutibus sparvis.*

De Geer. act. Stockh. 1761. p. III. t. 3. f. 1-5.

Roesel inf. 3. *polyp.* p. 67. t. 101. f. 1-3.

Leeuwenh. cont. arc. nat. p. 149-152. f. 2.

Baker act. microsc. p. 418. c. 13. t. 12. f. 27.

Habitat in Europæ aquis stagnantibus, primo vere & ætate copiosissimus, in aqua foeno infusa hieme quoque obvius, viridis, ætate albidus & aurantius, globulis minoribus saturate viridibus factus, circa axim lente motus, nudo oculo conspicuus, membrana constans pellucida, moleculis rotundis centro pellucidis immobilibus in superficie obsoita, globulos 8-30-40 magnitudine diversos includens, qui membrana dehiscente prodeunt, propriam agentes vitam, aliosque iherum includeentes & pari ratione ententes, ut liberis, nepotibus, & pronepotibus saepè gravidum dixeris animalculum.

dimidia-
tus.

4. V. incessu hemisphæricus.

Wilk. act. Stockh. 1762.

Habitat saepius in caudis larvarum ranæ temporariæ, dum in aqua se volutat, hemisphæricus, dum quiescit, globosus; an vere distincta a reliquis hujus generis species?

- Sphærula. 5. *V. sphæricus*, moleculis similaribus rotundis. Müll.
hist. verm. I. I. p. 31. n. 8. zool. dan. prodr. 2433.
Schranck oberd. Beytr. I. p. 141. §. III. t. 2. F.
Hermann Naturf. 20. p. 154. n. 33. t. 3. f. 33.
Habitat haud frequens in Europæ aquis stagnantibus,
lente a dextra ad sinistram vix ultra quadrantem
circuli, & mox rufus dextrorsum motus, e punctis
circiter 60 pellucidis homogeneis conflatus, nunc hya-
linus, nunc ex virescente flavicans.
- Uva. 6. *V. orbicularis*, moleculis ovatis pellucidis succineis
puncto connexis. Hermann Naturf. 20. p. 148. t. 3.
f. 27. f.
Habitat in aqua palustri, motu vivaci, æquabili, circa
axis rotando agitatus, moleculis 8-10 constans.
- Lunula. 7. *V. hemisphæricus*, moleculis similaribus lunatis Müll.
hist. verm. I. I. p. 30. n. 7. zool. dan. prodr. 2432.
Habitat rarus in Daniæ aqua palustri, primum vere ob-
vius, continue motus, tum lente totum corpus rotando,
tum moleculis singulis concitate agitatis, hyalinus,
moleculis innumeris.
- Conflitor. 8. *V. sphæricus* subopacus, interaneis mobilibus. Müll.
hist. verm. I. I. p. 29. u. 6. zool. dan. prodr. 2431.
Habitat in fimetis, rarius vere quidem obvius, in aqua
vegetabilibus infusa, hieme, vorticellis plerisque ma-
jor, flavescens, margine nigricans dextrorsum & sinis-
trosum lente per intervalla rotatus, moleculis innu-
meris minutissimis in circulo contentis continue motis,
& absque omni conspicuo ordine vehementer quasi conflu-
gentibus, aqua desicere incipiente, in figuram ovato
oblongam vel cylindricam, posteriore parte sæpe tri-
gonam transiens, nunc pellucidus interaneis vacuus,
nunc vacillando aut gyrando corpus per aquas latas,
molecularum rotatione decuplo celeriore, aqua penitus
desiciente totus quiescens, & humore omni tandem dissi-
pato, in moleculas informes effusus, sensim evanidas.
- Pilula. 9. *V. sphæricus*, interaneis immobilibus virescentibus.
Müll. hist. verm. I. I. p. 28. n. 5. zool. dan. prodr. 2430.
Habitat in aquis purioribus, lemnam minorem feren-
tibus, Decembbris medio frequens, lente & festine circa
axis rotatus, conflictore minor.

Globulus. 10. V. globosus, posterius subobscurus. Müll. hist. verm. I. I. p. 28. n. 4. zool. dan. prodr. 2429.

Habitat in aqua vegetabilibus infusa, subovalis, monad lente decuplo major, volutando, vel eodem loco lente motus, vel celeriter currens, interaneis vesicularibus posterius obscurioribus.

MONAS *Vermis nudo oculo inconspicuus simplissimus pellucidus puncti æmulus.*

Mica. 1. M. circulo notata. Müll. hist. verm. I. I. p. 27. n. 3. zool. dan. prodr. 2428.

Habitat paßim in aquis purioribus, vacillando mota hyalina, circulo ovali, medio, mobili.

Lens. 2. M. hyalina. Müll. hist. verm. I. I. p. 26. n. 2. zool. dan. prodr. 2427.

Hill hist. anim. t. I. I. Cyclidium corpore orbiculari pellucidissimo.

Leeuwenh. arc. nat. p. 40. f. E.

Joblot microsc. I. 2. t. 5. f. 8. Z.

Baker microsc. expl. t. 10. f. 1-3.

Ledermüll. microsc. p. 115. t. 60.

Wrisberg anim. infus. f. 1-4.

Spallanz. an. inf. f. II.

Habitat per myriades in omni aqua, rarius in purissima, etiam in dentium fordidus, eodem in loco per intervalla tremulo motu agitata, dein lente incedens, demum vivacior totum guttulae oceanum percurrent, figura inter ovatum & sphæricum media, interancorū vestigio nullo, aggregata, massas vesiculares membranaceas fingens.

Termo. 3. M. gelatinosa. Müll. hist. verm. I. I. p. 25. n. 1. zool. dan. prodr. 2424.

*Habitat in aqua animalibus aut vegetabilibus infusa,
brevi, antequam fætet, comparens, omnium anima-
lium simplicissimum, minimum.*

Sed

*Animadvertis immensum Opus DEI
non posse hominem affequi,
quamvis laboriose quærat.*

Eccl. XVIII. 2-5.

*Pauca hæc vidimus operum DEI,
Multæ abscondita sunt minora his majora.*

o JEHOVA!

Omnia ista ANIMANTIA in TE sperant,
 ut des illis Escam tempore suo ;
 TE ipsis dante illam colligunt ,
 aperiente manum.Tuam satiantur bono ;
 TE recipiente Spiritum eorum pereunt ,
 & in Pulverem revertuntur ;
 TE emittente spiritum Tuum creantur ,
 & renovas faciem Terræ.
 Gloria Domini erit in Secula ,
 & lætatur Jehova operibus suis.
 Canam JEHOVÆ in diebus vitæ meæ ,
 reflectam Sapientiæ EJUS radios , quamdiu superero !

David Psalm. CIV. 27.

RUDOLPHIPOLI ,
 LITTERIS BERGMANNIANIS .

INDEX

