


BULLETIN
DU
MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

RÉUNION MENSUELLE DES NATURALISTES DU MUSÉUM



TOME VINGT-DEUXIÈME
1916

PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE

MDCCCCXVI

LISTE DES LIMACIENS
PROVENANT DES RÉCOLTES DE M. PALLARY DANS LE GRAND ATLAS,
PAR M. CARLO POLLONERA.

MALACOLIMAX NYCTELIUS Bgt.

Dar M'tougui, Ourika, vallon de l'Oued Aït Hassen, Taguenahoutz.

AMALIA GAGATES Drpd.

Dar M'tougui, Amismiz, vallon de l'Oued Aït Hassen.

AMALIA CABILIANA Pollonera.

Dar M'tougui, Amismiz.

Geomalacus (Letourneuxia) marocanus n. sp.

Diffère du *G. Tournieri* Pollonera par les bandes médianes du dos et du bouclier moins fortes que les bandes latérales; par sa limacelle à nucléus latéral et à stries d'accroissement concentriques; enfin par son appareil reproducteur à bourse copulatrice ronde.

Dar Goundafi, échantillons pas tout à fait adultes. Taguenhaoutz, un échantillon très jeune.

NOTE ADDITIONNELLE PAR M. PALLARY.

J'ai tout lieu de craindre que plusieurs des Limaciens provenant de mes captures ne soient pas parvenus à M. Pollonera, car je ne vois pas mentionnée sur la liste ci-dessus une Limace de grande taille dont j'avais recueilli plusieurs exemplaires, dans des détritits, sur la rive droite de l'O. N'fis à Dar Goundafi, ni mes récoltes de l'Imi n'Takandout (dar Anflous), ni la grosse Parmacelle qui a été nommée : *P. dorsalis* par Mousson.

Cette Parmacelle, qui est très répandue dans le grand Atlas, ne me paraît se distinguer du *P. Deshayesi* M. T. que par sa coloration, car les limacelles n'offrent aucune différence appréciable. La coloration du *P. Deshayesi* est d'un brun roux uniforme, tandis que la variété du Sud Marocain est d'un jaune soufre clair avec des zébrures brunes.

Le *P. dorsalis* est fréquent au pied du massif au printemps. J'ai même capturé un exemplaire vivant à Aguer gour au commencement de juin.